

کتابخانه حضرت مولانا ابوالحسن علی Nadwi

ممبر و صاحب

تاریخ رجسٹر

نام کتاب

فصل کتاب

نمبر کتاب

و

۱۰

سورية وفلسطين والقطر

المصري وبواديهما

المجلد الاول

وهو يتضمن تسعاً واربعين رقعة

من الشقيقتين الى الكورنية

تأليف الدكتور جورج بوسست

تدعوا في الكاوب الببائي الثورياني في نيويورك والجمعية الببائية في ادنبرج واستاذ الببائ
في المدرسة الكنية الانجليزية في بيروت سابقاً

طبع في بيروت سنة ١٨٨٤

ان للباري تعالى كتابين احدهما أنزل بالوحي على الانبياء الملهيتم والرسل المكرمين مكتوباً على قرطاس بنلم الانسان والآخر كتيبه يده تعالى على صفحات الطبيعة فشرحت مفالاة في تضاد الصغور وكتبت آياته على اوراق النبات وأعلنت اسرارهُ في اجسام الحيوان . ولما كانت مؤلف هذين الكتابين واحداً وافق كل منهما الآخر واتضح تفسير كل منهما بواسطة نصيح الآخر فالذي يدالع الطبيعة ككتاب الله روح القوى يجد فيها من فضله تعالى ما يعزز فيه اركان الحميد ويزيد فيه الميل الى الاحترام

اما علم النبات فهو فصل من فصول كتاب الطبيعة وربما اسطفا معنى واسهلها ادراكاً نظراً اوجود النبات على سطح الارض فلا يحوج قاصده الى نقب الصغور او الحمر تحت الارض كالملرلوجيا (علم الجماد) او الجيولوجيا (علم تكوين الارض) او الصيد كالزولوجيا (علم الحيوان) او السفر الشاق كالجغرافيا او الرصد بالآلات التنبية كالميتة بل توجد انواع النبات على سطح الارض في كل بلاد ويمكن الولد جمعها وحفظها ونشرمجها وتحليلها . وعلم النبات من الذ الدروس الطبيعية نظراً الى اتساعه واختلاف الهيئات النباتية من اعشاب والقم واشجار ونباتات برية وبحرية ومكروسكوبية وعجيب بنيتها وحسن اوراقها وانوارها ولذة اثمارها ويوافق على نوع خصوصي طلبة المدارس ذكوراً واناثاً اذ يرغبهم في الجولان في البرية ويغريهم بالتفتيش عن الهيئات المستغربة ومجملهم على احكام الاستفراء واتقان التحليل والتركيب ويقوي فيهم كل القوى المتعلقة بذلك

وينيد علم النبات الجنس البشري اكثر من سائر العلوم الطبيعية اذ يبحث عن الماكة التي يوتق منها بأكثر غذائه ودوائه وكسائه وبنائه وهي ركن تحارته وصاعته وقد شعر بذلك افاضل القدماء واطال علانهم البحث في انواع النبات المعروفة في العصر الحالية الا انه لم يوضع لهذا العلم اساس قرار قبل لينوس الشهير في منتصف القرن الماضي ولم يبن على هذا الاساس بناءً وطيد قبل اختراع جوسبو النظام الطبيعي في آخر القرن الماضي

وطالما الفذ النباتيون نباتات الاقاليم التي ذُكرت في هذا الكتاب نظراً الى موقعها وهيئتها الجغرافية وخواصها الجيولوجية والميتورولوجية الا انه لم يسبق المؤلف احد بكتاب مختص بشرح نبات هذه الاقاليم في لغة من اللغات ولا يوجد ذكر اكثر انواعه الا في كتاب بويسيه الكبير وهو في اللغة اللاتينية ويتضمن خمسة مجلدات ونحو اربعة آلاف وخمس مئة صفحة ويشرح نبات المشرق من بلاد اليونان الى الهند ومن جبال قوهنفا الى السودان وحضرموت ومع ذلك هو قاصر في شرح انواع اقاليمها وتبايناتها . قد

شعر المؤلف منذ نحو عشرين سنة بوجوده تأليف كتاب في اللغة العربية يتضمن شرح نبات البلدان العربية التي قد نُظمت في سلك القُدس وأنشئت فيها المدارس غير أنه لم يَكُنْ ذلك ما لم يجمع متينة تشتمل على الجانب الأكبر من نبات هذه البلدان وسائر حوض البحر المتوسط فقام في ذلك مشاق السفر إلى القطر المصري وأرض الصعيد وإلى بادية سينا وإلى فاس وإلى فلسطين وسورية وقد أعانه في جمع الروايات جم من تلامذته الكرام وحضرة الأستاذ بيرتر من المدرسة الكلية حتى صارت متينة هذه المدرسة من أوفى منابت العالم في عدد رواياتها الشرقية وقد انضم إليها أيضاً الوَف من الأنواع الأوروبية والهندية والإمبركانية وقد صُرف في هذا العمل العظيم ما أمكن المؤلف من الوقت ووسط الانشغال المتنوعة ذات الشأن مدة ثمان عشرة سنة. وبعد جمع المتينة واقتناء الروايات الأجنبية بالمبادلة ثم تصنيف نحو اثني عشر ألف نوع وأكثر من خمسين ألف راموز وتسميتها وتلصيقها على الأوراق وترتيبها في المتينة قام صعوبة ترجمة اصطلاحات هذا الفن من اللغة اللاتينية إلى العربية ولم يكن له في ذلك من سابق أو عاضد. وما زاد مشقة هذا المشروع صعوبة موافقة الأحرف الرومانية بالعربية في الطبع وتنوع الأحرف العربية بحيث تظهر خواص الأنواع للطالب باجلى بيان فاضطر أهل المطبعة إلى استبدال أحرف رومانية غليظة خاصة لهذا الكتاب ونحت أحرف جديدة عربية تطابقها غلظاً ففقد أنوار كتاب حسن الطبع متن الترتيب واضح الدليل

وقد استعملنا للربط والأجناس الأسماء الموضوعية في اللغة العربية أو الكثرة الدوران على السنة لعل هذا العصر أو المعربة من اللغات الأجنبية في أيام السالطين وعربنا من اللغة اللاتينية ما لم نجد له أمماً عربياً محضاً. ووضعنا اسم النوع المتعارف (إذا وجد) بجانب الاسم العلمي بين هلالين فاذا نظرت إلى الوجه ١٥ السطر ٨ رأيت العبارة الآتية

٤ N. sativa, L. الشونيز المزروع (حبة البركة. الحبة السوداء) © فان ٤
 دليل على عدد النوع و L. منقطوعة من اسم لينوس وهو الذي سَمَّى هذا النوع و sativa اسم النوع و N. منقطوعة من Nigella وهو اسم الجنس والشونيز المزروع ترجمة اسم الجنس والنوع إلى العربي و (حبة البركة. حبة السوداء) اسم متعارفان لهذا النوع و © دليل على كون هذا النوع سنوي وفي السطر ١٢ العبارة الآتية

brachyloba, Boiss. ب. التصير النصوص. فان Boiss. منقطوعة من اسم بويسيه المؤلف الذي سَمَّى هذا النبات و brachyloba اسم النباتين ويقدر قبله اسم الجنس والنوع فلو كتبت العبارة بتامها لكانت Nigella sativa brachyloba وتسميها العربي الشونيز المزروع التصير النصوص. و. ب. دليل على عدد النباتين ولم يذكر هنا ١٠. لأن الرمز يُجْعَل النبات الأول وإذا ذكرت ١٠. تُرِنَتْ بلفظة اعتيادي كما في الوجه ١٢ والسطر ١٥ ووجهتي كما في الوجه ٣٤

والسطر ٦ او الرمزي كما في بعض الاماكن وما خرج عن ذلك كاهليجي في الوجه ١٠٣ والسطر ٨ فادر ومنقول عن المؤلفين . ولا يخفى على من يعين النظر في ما تقدم الفرق بين الاحرف اللاتينية المستعملة للدلالة على النوع والبيان تسهيلاً لطالبيها

وفي الوجه ١٥ والسطر ١١ بعد شرح النوع لفظة - الربيع - وهي دلالة على حين الابتسام ثم مزارع مصروفي دلالة على موضع نوره

وفي الوجه ١٢ والسطر ٢٤ عبارة (*R. cornutus, D. 11*) وهي تعني ان البان المشروح اعلاه قد اعتُبر قبلاً نوعاً فانزلته الى منزلة تباين

ولا اطع بالخلو من الغلط في مؤلف مدقق بهذا المقدار وقد ذُيِّلت الكتاب بفهرس يتضمن بعض ما عثرت عليه من هذا القبيل مدة الطبع الا انني اضله جزءاً صغيراً ما . ينف عليه الطالب فارجو من المتفند عطالة الحكم وغض النظر عما يجرد من الخطأ والنقصان

١. اما الاصطلاحات المستعملة في هذا الكتاب فقد اوضح جانب منها في كتاب سابق لنا في علم النبات وهو يهيم عن تشريحه وفيسيولوجيته التامين سنة ١٩٢١ : فيها في دابعة ثمانية المالك الكتاب ان شاء الله

السلسلة الاولى

PHÆNOGAMIA. النباتات المزهرة او الظاهرة التزوج

نباتات ذات ازهار مؤلفة من أسدية ومدقات متضمنة في غلاف واحد او أكثر فسمي الغلاف الخارجي كاسا والداخلي تويجا ويتبع منها بزر مجنوي على جنين

EXOGENÆ. الصف الاول. الناميات من خارج

سوقها مؤلفة من قشر وخشب ولب. ويزداد الخشب طبقة خارجية كل سنة من حياتها وكذلك النسر طبقة داخلية تدفع الطبقات الخارجية أكثر الى الخارج فكثيرا ما نشة با وتكسر ها. والأوراق مشبكة الأوردة على الغالب. ولخمين فلتان او عدة فلتات متشعبة. واجزاء الزهر غالبا أربعة اربعة او خمسة خمسة

ANGIOSPERMÆ. الصفيف الاول. الوعائية البذر

المدقة مشتملة على مبيض حقيقي يتضمن بويضات وينشأ فبصير ثمرا. الفلقات اثنتان

THEALAEPODES. الفصيلة الاولى. التخنبة الازهار

الثلاث والاسدية منفصلة مندغمة في الفئار تحت المبيض مستقلة عن الكاس. المبيض مستقل

ERANUNTHACEÆ. الرتبة الاولى. الشقية

الازهار قياسية او غير قياسية. السبلات ٢-١٤. البتلات ٢-١٤ وغالبا بعدد السبلات وقد تكون غير قياسية او منقودة. الاسدية منفصلة غير محدودة وانثيرامها ملتصبة بالخطوط. الثغيرات معادلة للسبلات عددا او غير محدودة منفصلة او متحدة قليلا ذات غرفة واحدة. الانثراف ثغيرات او اجرة شاقة. البزور بلا بساسة. الجنين صغير عند قاعدة الأليوم من انثري او الهي

السبط الاول. الملعويات. CLEMATIDÆ. الكاس مصراعية في البرعم. البتلات مفقودة. البزرة معلنة

١. Clematis. دوال متعرشة اوراقها متباعدة

السبط الثاني. الشقریات. ANEMONEÆ. الكاس متراكبة في البرعم ملونة. البتلات مفقودة او مفلطحة. البزرة معلنة

* البتلات مفقودة

٢. Thalictrum. الظرف مفقود. الثمرات مثلثة طولاً

٣. Anemone. الظرف بعيد عن الزهرة. الثمرات بلا انلام

** البتلات بلا سفع

٤. Adonis. اعشاب سنوية ذات اوراق مشرحة

*** البتلات ذات سفع عند قمة الخلب

٥. Myosurus. اعشاب سنوية ذات اوراق كاملة

السبط الثالث. الشقيقيات. RANUNCULEÆ. الكاس والتويج مفطحان متراكبان

في البرعم. البتلات ذات سفع او فليس عند قاعدتها. البزرة منتصبة

٦. Ranunculus. الثمرات بلا غريفات سرحاء عند قاعدتها

٧. Ceratocephalus. الثمرات ذات غريفتين سرحاويتين عند قاعدتها

السبط الرابع. الخربقيات. HELLEBOREÆ. السبلات متراكبة في البرعم. البتلات

مفقودة او خطبة او غير قياسية. الثمرات ذات بزور عديدة

* الازهار قياسية

٨. Helleborus. الاوراق كنية. الكاس شبيهة بتل. البتلات انبوية شموية

٩. Garidella. الاوراق ريشية. الكاس غير شبيهة بتل

١٠. Nigella. الاوراق ريشية. الكاس شبيهة بتل


** الازهار غير قياسية

١١. Delphinium. السيلة العليا ذات مهاز. المتلات صغيرة مرتبة زوجين

السبط الخامس. النار مشكيات. PÆONIEÆ. الكاس متراكبة في البرعم. البتلات

منسمة. قاعة الثمرات محاطة بحوية. البويضات كثيرة

١٢. Pæonia. الاوراق ثنائية المنشأ الثلاثي. الازهار كبيرة حمراء



شرح الشكل ١ . (ب) نصف زهرة نوع من الشقيق نرى فيها التفج وعلو المبايض القفيرة وتحتها الاسدية الككيرة العدد . ثم البتلات التي منها ثلاث ظاهرة واثنان منزعجتان . ثم السيلات وكل هذه الاعضاء منفصلة . ترى (ت) بذلة وعند قاعدتها فلس حامل شيقاً من المادة العطرية . (ج) زهرة من الشقرة . (ث) مدقةها والمبيض مقطوع لاظهار البذر فالامر واضح انه فبيرة والبزرة معلقة . (ح) فبيرة الشقيق . (خ) مقطوعها يظهر فيه البزرة المتحصية . (د) تصيبف نوع من الملهى وهو مصراعى . (ذ) تصيبف نوع آخر مثله وهو منى الى الداخل (ر) فبيرة من الملهى الابيض وهي تنهى بقلم ريشي

١ ملهى CLEMATIS, L.

السلالات ٤ . البتلات مفردة . الثمرات جالسة شاقفة جافة . القلم ذني شبيه بريش - دولر
ممرعة متعرشة بواسطة النفاق الرججلات . الاوراق متغابلة
* الازهار مفردة متغصّة ذات ظرف
C. cirrhosa, L. ١ الملهى العنبي . (جبل مسكي) 2٤ الاوراق باقية قلبية بيضية كبيرة الاسنان
غير مقسومة او ذات فصوص غير واضحة . الظرف قدسحي ذو شفتين اسفل الزهرة بتليل . السلالات
بيضاء مصفرة بيضية - الربيع - سياجات عنتاب الى جنوبي فلسطين
** قاعة العنقود عريانة

C. Flammula, L. ٣ الملهى اللهب 2٤ الاوراق الجديدة زغبية ثم ملساء ثنائية التفصيل الريشي
بيضية او مستطيلة النطع الكاملة او الثلاثة الفصوص المنخرقة قليلاً . السيلات مستطيلة كاله بيضاء .
الثمرات زغبية ذات حافة واضحة - الربيع والصيف - سياجات وغابات سورية وفلسطين

تندرج النباتات من الرمز الذي في الوريقات كاملة الى
maritima, Boiss. ب. البحري . الوريقات ذات فصوص ضيقة خطية - لبنان
lobata, Post. المنصص . الوريقات اعرض كبيرة الاسنان او الفصوص - بيروت
C. vitalba, L. ٣. الملحي الابيض 2/ الاوراق زغبية ولا سيما على الاعصاب ثنائية الفصيل
الريشي قطعها يضيء مديبة قلبية القاعدة قليلاً مسننة اسناناً كبيرة بعيدة ونادراً كاملة. السبلات بيضاء
مستطيلة صوفية على الوجهين. الثمرات عنائية غير واضحة المحافة - الصيف - سياجات وغابات
بقرب البحر في سورية وفلسطين
Syriaca, Boiss. ب. السوري . الوريقات ذات اسنان متعظمة كبيرة . الثمرات اقل
تحدباً - طرابلس
integrifolia, Post. ت. الكامل الوريقات . الوريقات كاملة - مع الرمز

٣ ثَلَاثُكَتْرُم *THALICTRUM*, L.

الازهار بلاظروف . السلات ٤-٥ . الثلاث مفقودة . الثمرات جانة باراً اذنان - اعشاب
معرة اورافها ثلاثية المنشأ اوريشية
T. orientale, Boiss. 1. الثلاثكترم الشرقي 2/ الاوراق ثلاثية التركيب التي المنشأ وقصتها
بيضية مقلوقة شبيهة بثلاث بيضاء اطول من الاسدية. الثمرات ٣-٦ متبعية اسمة مستديرة مستقيمة
- نيسان الى حزيران - شقوق الصنوبر بقرب غزير
T. minus, L. ٢. الثلاثكترم الاصغر 2/ الاوراق ريشية ثلثة التركيب ونقصها بيضية او اسدية
بيضية مقلوقة اكثراً اقل ذات ٢ خرق او فصوص . اعتدود هرمي منثر. السبلات وثيقة معاداة
الحويطات طولاً او اقصر منها. الثمرات ٣-٨ متبعية اسمة قصيرة ملتصقة بها ور.
nutans, Regel. ١. المنفض . املس . انقطع احبائاً بيضاء . من ١٠ الى ذات ١٥ سم او
خرق حادة - في الي في الجبل الاقصر وشمالاً

٣ شَقْرِي *S. ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠ ١٠٠١ ١٠٠٢ ١٠٠٣ ١٠٠٤ ١٠٠٥ ١٠٠٦ ١٠٠٧ ١٠٠٨ ١٠٠٩ ١٠١٠ ١٠١١ ١٠١٢ ١٠١٣ ١٠١٤ ١٠١٥ ١٠١٦ ١٠١٧ ١٠١٨ ١٠١٩ ١٠٢٠ ١٠٢١ ١٠٢٢ ١٠٢٣ ١٠٢٤ ١٠٢٥ ١٠٢٦ ١٠٢٧ ١٠٢٨ ١٠٢٩ ١٠٣٠ ١٠٣١ ١٠٣٢ ١٠٣٣ ١٠٣٤ ١٠٣٥ ١٠٣٦ ١٠٣٧ ١٠٣٨ ١٠٣٩ ١٠٤٠ ١٠٤١ ١٠٤٢ ١٠٤٣ ١٠٤٤ ١٠٤٥ ١٠٤٦ ١٠٤٧ ١٠٤٨ ١٠٤٩ ١٠٥٠ ١٠٥١ ١٠٥٢ ١٠٥٣ ١٠٥٤ ١٠٥٥ ١٠٥٦ ١٠٥٧ ١٠٥٨ ١٠٥٩ ١٠٦٠ ١٠٦١ ١٠٦٢ ١٠٦٣ ١٠٦٤ ١٠٦٥ ١٠٦٦ ١٠٦٧ ١٠٦٨ ١٠٦٩ ١٠٧٠ ١٠٧١ ١٠٧٢ ١٠٧٣ ١٠٧٤ ١٠٧٥ ١٠٧٦ ١٠٧٧ ١٠٧٨ ١٠٧٩ ١٠٨٠ ١٠٨١ ١٠٨٢ ١٠٨٣ ١٠٨٤ ١٠٨٥ ١٠٨٦ ١٠٨٧ ١٠٨٨ ١٠٨٩ ١٠٩٠ ١٠٩١ ١٠٩٢ ١٠٩٣ ١٠٩٤ ١٠٩٥ ١٠٩٦ ١٠٩٧ ١٠٩٨ ١٠٩٩ ١١٠٠ ١١٠١ ١١٠٢ ١١٠٣ ١١٠٤ ١١٠٥ ١١٠٦ ١١٠٧ ١١٠٨ ١١٠٩ ١١١٠ ١١١١ ١١١٢ ١١١٣ ١١١٤ ١١١٥ ١١١٦ ١١١٧ ١١١٨ ١١١٩ ١١٢٠ ١١٢١ ١١٢٢ ١١٢٣ ١١٢٤ ١١٢٥ ١١٢٦ ١١٢٧ ١١٢٨ ١١٢٩ ١١٣٠ ١١٣١ ١١٣٢ ١١٣٣ ١١٣٤ ١١٣٥ ١١٣٦ ١١٣٧ ١١٣٨ ١١٣٩ ١١٤٠ ١١٤١ ١١٤٢ ١١٤٣ ١١٤٤ ١١٤٥ ١١٤٦ ١١٤٧ ١١٤٨ ١١٤٩ ١١٥٠ ١١٥١ ١١٥٢ ١١٥٣ ١١٥٤ ١١٥٥ ١١٥٦ ١١٥٧ ١١٥٨ ١١٥٩ ١١٦٠ ١١٦١ ١١٦٢ ١١٦٣ ١١٦٤ ١١٦٥ ١١٦٦ ١١٦٧ ١١٦٨ ١١٦٩ ١١٧٠ ١١٧١ ١١٧٢ ١١٧٣ ١١٧٤ ١١٧٥ ١١٧٦ ١١٧٧ ١١٧٨ ١١٧٩ ١١٨٠ ١١٨١ ١١٨٢ ١١٨٣ ١١٨٤ ١١٨٥ ١١٨٦ ١١٨٧ ١١٨٨ ١١٨٩ ١١٩٠ ١١٩١ ١١٩٢ ١١٩٣ ١١٩٤ ١١٩٥ ١١٩٦ ١١٩٧ ١١٩٨ ١١٩٩ ١٢٠٠ ١٢٠١ ١٢٠٢ ١٢٠٣ ١٢٠٤ ١٢٠٥ ١٢٠٦ ١٢٠٧ ١٢٠٨ ١٢٠٩ ١٢١٠ ١٢١١ ١٢١٢ ١٢١٣ ١٢١٤ ١٢١٥ ١٢١٦ ١٢١٧ ١٢١٨ ١٢١٩ ١٢٢٠ ١٢٢١ ١٢٢٢ ١٢٢٣ ١٢٢٤ ١٢٢٥ ١٢٢٦ ١٢٢٧ ١٢٢٨ ١٢٢٩ ١٢٣٠ ١٢٣١ ١٢٣٢ ١٢٣٣ ١٢٣٤ ١٢٣٥ ١٢٣٦ ١٢٣٧ ١٢٣٨ ١٢٣٩ ١٢٤٠ ١٢٤١ ١٢٤٢ ١٢٤٣ ١٢٤٤ ١٢٤٥ ١٢٤٦ ١٢٤٧ ١٢٤٨ ١٢٤٩ ١٢٥٠ ١٢٥١ ١٢٥٢ ١٢٥٣ ١٢٥٤ ١٢٥٥ ١٢٥٦ ١٢٥٧ ١٢٥٨ ١٢٥٩ ١٢٦٠ ١٢٦١ ١٢٦٢ ١٢٦٣ ١٢٦٤ ١٢٦٥ ١٢٦٦ ١٢٦٧ ١٢٦٨ ١٢٦٩ ١٢٧٠ ١٢٧١ ١٢٧٢ ١٢٧٣ ١٢٧٤ ١٢٧٥ ١٢٧٦ ١٢٧٧ ١٢٧٨ ١٢٧٩ ١٢٨٠ ١٢٨١ ١٢٨٢ ١٢٨٣ ١٢٨٤ ١٢٨٥ ١٢٨٦ ١٢٨٧ ١٢٨٨ ١٢٨٩ ١٢٩٠ ١٢٩١ ١٢٩٢ ١٢٩٣ ١٢٩٤ ١٢٩٥ ١٢٩٦ ١٢٩٧ ١٢٩٨ ١٢٩٩ ١٣٠٠ ١٣٠١ ١٣٠٢ ١٣٠٣ ١٣٠٤ ١٣٠٥ ١٣٠٦ ١٣٠٧ ١٣٠٨ ١٣٠٩ ١٣١٠ ١٣١١ ١٣١٢ ١٣١٣ ١٣١٤ ١٣١٥ ١٣١٦ ١٣١٧ ١٣١٨ ١٣١٩ ١٣٢٠ ١٣٢١ ١٣٢٢ ١٣٢٣ ١٣٢٤ ١٣٢٥ ١٣٢٦ ١٣٢٧ ١٣٢٨ ١٣٢٩ ١٣٣٠ ١٣٣١ ١٣٣٢ ١٣٣٣ ١٣٣٤ ١٣٣٥ ١٣٣٦ ١٣٣٧ ١٣٣٨ ١٣٣٩ ١٣٤٠ ١٣٤١ ١٣٤٢ ١٣٤٣ ١٣٤٤ ١٣٤٥ ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٥ ١٣٨٦ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦ ١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠ ١٤٠١ ١٤٠٢ ١٤٠٣ ١٤٠٤ ١٤٠٥ ١٤٠٦ ١٤٠٧ ١٤٠٨ ١٤٠٩ ١٤١٠ ١٤١١ ١٤١٢ ١٤١٣ ١٤١٤ ١٤١٥ ١٤١٦ ١٤١٧ ١٤١٨ ١٤١٩ ١٤٢٠ ١٤٢١ ١٤٢٢ ١٤٢٣ ١٤٢٤ ١٤٢٥ ١٤٢٦ ١٤٢٧ ١٤٢٨ ١٤٢٩ ١٤٣٠ ١٤٣١ ١٤٣٢ ١٤٣٣ ١٤٣٤ ١٤٣٥ ١٤٣٦ ١٤٣٧ ١٤٣٨ ١٤٣٩ ١٤٤٠ ١٤٤١ ١٤٤٢ ١٤٤٣ ١٤٤٤ ١٤٤٥ ١٤٤٦ ١٤٤٧ ١٤٤٨ ١٤٤٩ ١٤٥٠ ١٤٥١ ١٤٥٢ ١٤٥٣ ١٤٥٤ ١٤٥٥ ١٤٥٦ ١٤٥٧ ١٤٥٨ ١٤٥٩ ١٤٦٠ ١٤٦١ ١٤٦٢ ١٤٦٣ ١٤٦٤ ١٤٦٥ ١٤٦٦ ١٤٦٧ ١٤٦٨ ١٤٦٩ ١٤٧٠ ١٤٧١ ١٤٧٢ ١٤٧٣ ١٤٧٤ ١٤٧٥ ١٤٧٦ ١٤٧٧ ١٤٧٨ ١٤٧٩ ١٤٨٠ ١٤٨١ ١٤٨٢ ١٤٨٣ ١٤٨٤ ١٤٨٥ ١٤٨٦ ١٤٨٧ ١٤٨٨ ١٤٨٩ ١٤٩٠ ١٤٩١ ١٤٩٢ ١٤٩٣ ١٤٩٤ ١٤٩٥ ١٤٩٦ ١٤٩٧ ١٤٩٨ ١٤٩٩ ١٥٠٠ ١٥٠١ ١٥٠٢ ١٥٠٣ ١٥٠٤ ١٥٠٥ ١٥٠٦ ١٥٠٧ ١٥٠٨ ١٥٠٩ ١٥١٠ ١٥١١ ١٥١٢ ١٥١٣ ١٥١٤ ١٥١٥ ١٥١٦ ١٥١٧ ١٥١٨ ١٥١٩ ١٥٢٠ ١٥٢١ ١٥٢٢ ١٥٢٣ ١٥٢٤ ١٥٢٥ ١٥٢٦ ١٥٢٧ ١٥٢٨ ١٥٢٩ ١٥٣٠ ١٥٣١ ١٥٣٢ ١٥٣٣ ١٥٣٤ ١٥٣٥ ١٥٣٦ ١٥٣٧ ١٥٣٨ ١٥٣٩ ١٥٤٠ ١٥٤١ ١٥٤٢ ١٥٤٣ ١٥٤٤ ١٥٤٥ ١٥٤٦ ١٥٤٧ ١٥٤٨ ١٥٤٩ ١٥٥٠ ١٥٥١ ١٥٥٢ ١٥٥٣ ١٥٥٤ ١٥٥٥ ١٥٥٦ ١٥٥٧ ١٥٥٨ ١٥٥٩ ١٥٦٠ ١٥٦١ ١٥٦٢ ١٥٦٣ ١٥٦٤ ١٥٦٥ ١٥٦٦ ١٥٦٧ ١٥٦٨ ١٥٦٩ ١٥٧٠ ١٥٧١ ١٥٧٢ ١٥٧٣ ١٥٧٤ ١٥٧٥ ١٥٧٦ ١٥٧٧ ١٥٧٨ ١٥٧٩ ١٥٨٠ ١٥٨١ ١٥٨٢ ١٥٨٣ ١٥٨٤ ١٥٨٥ ١٥٨٦ ١٥٨٧ ١٥٨٨ ١٥٨٩ ١٥٩٠ ١٥٩١ ١٥٩٢ ١٥٩٣ ١٥٩٤ ١٥٩٥ ١٥٩٦ ١٥٩٧ ١٥٩٨ ١٥٩٩ ١٦٠٠ ١٦٠١ ١٦٠٢ ١٦٠٣ ١٦٠٤ ١٦٠٥ ١٦٠٦ ١٦٠٧ ١٦٠٨ ١٦٠٩ ١٦١٠ ١٦١١ ١٦١٢ ١٦١٣ ١٦١٤ ١٦١٥ ١٦١٦ ١٦١٧ ١٦١٨ ١٦١٩ ١٦٢٠ ١٦٢١ ١٦٢٢ ١٦٢٣ ١٦٢٤ ١٦٢٥ ١٦٢٦ ١٦٢٧ ١٦٢٨ ١٦٢٩ ١٦٣٠ ١٦٣١ ١٦٣٢ ١٦٣٣ ١٦٣٤ ١٦٣٥ ١٦٣٦ ١٦٣٧ ١٦٣٨ ١٦٣٩ ١٦٤٠ ١٦٤١ ١٦٤٢ ١٦٤٣ ١٦٤٤ ١٦٤٥ ١٦٤٦ ١٦٤٧ ١٦٤٨ ١٦٤٩ ١٦٥٠ ١٦٥١ ١٦٥٢ ١٦٥٣ ١٦٥٤ ١٦٥٥ ١٦٥٦ ١٦٥٧ ١٦٥٨ ١٦٥٩ ١٦٦٠ ١٦٦١ ١٦٦٢ ١٦٦٣ ١٦٦٤ ١٦٦٥ ١٦٦٦ ١٦٦٧ ١٦٦٨ ١٦٦٩ ١٦٧٠ ١٦٧١ ١٦٧٢ ١٦٧٣ ١٦٧٤ ١٦٧٥ ١٦٧٦ ١٦٧٧ ١٦٧٨ ١٦٧٩ ١٦٨٠ ١٦٨١ ١٦٨٢ ١٦٨٣ ١٦٨٤ ١٦٨٥ ١٦٨٦ ١٦٨٧ ١٦٨٨ ١٦٨٩ ١٦٩٠ ١٦٩١ ١٦٩٢ ١٦٩٣ ١٦٩٤ ١٦٩٥ ١٦٩٦ ١٦٩٧ ١٦٩٨ ١٦٩٩ ١٧٠٠ ١٧٠١ ١٧٠٢ ١٧٠٣ ١٧٠٤ ١٧٠٥ ١٧٠٦ ١٧٠٧ ١٧٠٨ ١٧٠٩ ١٧١٠ ١٧١١ ١٧١٢ ١٧١٣ ١٧١٤ ١٧١٥ ١٧١٦ ١٧١٧ ١٧١٨ ١٧١٩ ١٧٢٠ ١٧٢١ ١٧٢٢ ١٧٢٣ ١٧٢٤ ١٧٢٥ ١٧٢٦ ١٧٢٧ ١٧٢٨ ١٧٢٩ ١٧٣٠ ١٧٣١ ١٧٣٢ ١٧٣٣ ١٧٣٤ ١٧٣٥ ١٧٣٦ ١٧٣٧ ١٧٣٨ ١٧٣٩ ١٧٤٠ ١٧٤١ ١٧٤٢ ١٧٤٣ ١٧٤٤ ١٧٤٥ ١٧٤٦ ١٧٤٧ ١٧٤٨ ١٧٤٩ ١٧٥٠ ١٧٥١ ١٧٥٢ ١٧٥٣ ١٧٥٤ ١٧٥٥ ١٧٥٦ ١٧٥٧ ١٧٥٨ ١٧٥٩ ١٧٦٠ ١٧٦١ ١٧٦٢ ١٧٦٣ ١٧٦٤ ١٧٦٥ ١٧٦٦ ١٧٦٧ ١٧٦٨ ١٧٦٩ ١٧٧٠ ١٧٧١ ١٧٧٢ ١٧٧٣ ١٧٧٤ ١٧٧٥ ١٧٧٦ ١٧٧٧ ١٧٧٨ ١٧٧٩ ١٧٨٠ ١٧٨١ ١٧٨٢ ١٧٨٣ ١٧٨٤ ١٧٨٥ ١٧٨٦ ١٧٨٧ ١٧٨٨ ١٧٨٩ ١٧٩٠ ١٧٩١ ١٧٩٢ ١٧٩٣ ١٧٩٤ ١٧٩٥ ١٧٩٦ ١٧٩٧ ١٧٩٨ ١٧٩٩ ١٨٠٠ ١٨٠١ ١٨٠٢ ١٨٠٣ ١٨٠٤ ١٨٠٥ ١٨٠٦ ١٨٠٧ ١٨٠٨ ١٨٠٩ ١٨١٠ ١٨١١ ١٨١٢ ١٨١٣ ١٨١٤ ١٨١٥ ١٨١٦ ١٨١٧ ١٨١٨ ١٨١٩ ١٨٢٠ ١٨٢١ ١٨٢٢ ١٨٢٣ ١٨٢٤ ١٨٢٥ ١٨٢٦ ١٨٢٧ ١٨٢٨ ١٨٢٩ ١٨٣٠ ١٨٣١ ١٨٣٢ ١٨٣٣ ١٨٣٤ ١٨٣٥ ١٨٣٦ ١٨٣٧ ١٨٣٨ ١٨٣٩ ١٨٤٠ ١٨٤١ ١٨٤٢ ١٨٤٣ ١٨٤٤ ١٨٤٥ ١٨٤٦ ١٨٤٧ ١٨٤٨ ١٨٤٩ ١٨٥٠ ١٨٥١ ١٨٥٢ ١٨٥٣ ١٨٥٤ ١٨٥٥ ١٨٥٦ ١٨٥٧ ١٨٥٨ ١٨٥٩ ١٨٦٠ ١٨٦١ ١٨٦٢ ١٨٦٣ ١٨٦٤ ١٨٦٥ ١٨٦٦ ١٨٦٧ ١٨٦٨ ١٨٦٩ ١٨٧٠ ١٨٧١ ١٨٧٢ ١٨٧٣ ١٨٧٤ ١٨٧٥ ١٨٧٦ ١٨٧٧ ١٨٧٨ ١٨٧٩ ١٨٨٠ ١٨٨١ ١٨٨٢ ١٨٨٣ ١٨٨٤ ١٨٨٥ ١٨٨٦ ١٨٨٧ ١٨٨٨ ١٨٨٩ ١٨٩٠ ١٨٩١ ١٨٩٢ ١٨٩٣ ١٨٩٤ ١٨٩٥ ١٨٩٦ ١٨٩٧ ١٨٩٨ ١٨٩٩ ١٩٠٠ ١٩٠١ ١٩٠٢ ١٩٠٣ ١٩٠٤ ١٩٠٥ ١٩٠٦ ١٩٠٧ ١٩٠٨ ١٩٠٩ ١٩١٠ ١٩١١ ١٩١٢ ١٩١٣ ١٩١٤ ١٩١٥ ١٩١٦ ١٩١٧ ١٩١٨ ١٩١٩ ١٩٢٠ ١٩٢١ ١٩٢٢ ١٩٢٣ ١٩٢٤ ١٩٢٥ ١٩٢٦ ١٩٢٧ ١٩٢٨ ١٩٢٩ ١٩٣٠ ١٩٣١*

الزهر مفقود . الاسدية متعددة . الثغيرات متعددة بلا اذنانب - اعشاب معبرة ذات ازهار هجينة
واوراق ثلثة المنشأ مشرمة او مقصوفة

A. Coronaria, L. ١ الشجر الاكيلي (شقائق النعمان) (واحدة الشفر شفرة ج شفرات
وشنار وشنران وشناري) 2٤ الجذر بضاضي مشرم . السبلات ٥-٧ بيضية زغبية من الخارج . الثغيرات
مغطاة بصوف كثيف تنتهي بقلم خيطي . الثخت يبيضي او مستطلي - اول الربيع - مزارع وجوانب
الطرق في سورية وفلسطين

typica, Post. ١٠ . الرمزي . الكاس قرمزية او صفراء او وردية . السبلات بيضية عريضة .
الاوراق مشرمة . الازهار كبيرة قد يبلغ قطرها ٧ سنتيمترات . عام في سورية .
caerulea, Post. ب . الازرق . الازهار غالباً اصغر . السبلات بيضية او مستطيلة -
كثير الوجود في سورية

parviflora, Boiss. ت . الصغير الزهر . قطع الوراق غير مشرمة . الجرايد طويلة .
الازهار صغيرة زرقاء . السبلات مستطيلة - نادر في سورية

incisa, Boiss. ث . المتصوص . الوراق كما في الاخيرة . الازهار متوسطة - يبروت
A. blanda, Schott et Kotschy, ٢ الشجر الطريف 2٤ الجذر بضاضي مستطلي ونادراً
اسطوانى . السلات ٩ - ١٥ مستطيلة خطية زرقاء ملساء من الخارج . الثغيرات زغبية تنتهي بقلم اسود
قصير ذي سمة كروية سوداء . الثخت نصف كروي - الريح - جبل طوروس الى لبنان ١٠٠٠ متر
الى ٢٠٠٠

٢ ادونس *A. Adonis, L.*

الازهار بلا ظرف . السبلات ٥ . البتلات ٥ - ١٥ بلا سخ عصلي . الثغيرات جافة كروية تقريباً
ذات قلم صلب منقاري - اعشاب اوراقها مشرحة وازهارها حمراء او صفراء او برتقالية
* حافة الثمرة الانسية مستقيمة عادمة السن

Adonis vernalis, Boiss. ١ . الادونس الفلسطيني ٥ الزهرة كبيرة . الكاس ملساء . البتلات
مفلطحة بيضية مقاربة . السبل المشر مندج اسطوانى . الثغيرات متمعة عند منتصفها ذات عرف
مستن محيط بها والجذر السنلي درني مغضن والعلوي قصير متد بمشار قصير هرمي مثلث اعنف قليلاً
- الربيع - مزارع فلسطين

A. Aleppica, Boiss. ٢ . الادونس المحلي ٥ الزهرة كبيرة . الكاس ملساء . البتلات مفلطحة

ملثمرة بيضية مقلوبة. السبل المثر اسطواني. الثمرات مستطيلة مفضضة طولاً مستدقة الى منقار حاذق مستقيم مزب القاعدة مثلها طولاً - الربيع - مزارع البقاع الى حلب وعينتاب وشمالاً

٢ A. autumnalis, L. الادونس الخريفى ☉ الزهرة معتدلة. الكاس لمساء. شكل ٢

البتلات مقعرة مفضضة. السبل المثر مستطيل. الثمرات سغية مفضضة منتبهة بمنقار قصير مستقيم - الربيع - مزارع سورية وفلسطين الأفي الجرود وتحتها

ericalycina, Post. ب. الوري الكاس. الكاس وبرية صوفية - بتياس.

يرويت (A. ericalycina, Boiss.)



سبل الادونس الخريفى

** حافة الثمرة الانسية مجهزة بسن

A. festivalls, L. ٤ الادونس الصيفى ☉ الزهرة اكبر قليلا من السابق ذكره. الكاس لمساء.

البتلات مفلطحة اهليجية. السبل مندمج مستطيل ثم اسطواني. الثمرات مستطيلة هرمية سغية منتبهة بمنقار صاعد يحيطها اعلى قاعدتها بقليل عرف مسنن. السن بعيد عن قاعدة المنقار - الربيع - مزارع شمالي سورية

squarrosa, Boiss. ب. المندج. السبل مندمج. قاعدة الثمرات مربعة الزوايا.

العرف حاد. السن بارز يكاد يعادل المنقار طولاً - مع الرمز

longirostra, Post. ت. الطويل المنقار. المنقار كالثمرة طولاً مثل - بعنك

A. microcarpa, D.C. ٦ الادونس الصغير الثمر. الزهرة متوسطة. البتلات مصحطة

اهليجية. السبل مندمج مستطيل. الثمرات صغيرة مشبكة سغية مستطيلة منتبهة بمنقار طويل صاعد. السن كال وقرب قاعدة المنقار - الربيع - مزارع حلب الى المثناء. الاسكندرية

A. dentata, Del. ٧ الادونس المسنن ☉ قزم. منفرج من الناعة. الزهرة برتقالية معتدلة.

الكاس لمساء. السبل مندمج اسطواني طويل. الثمرات سغية مفضضة مجصها بقرب منتصفها عرف مسنن يبرز من وحنه مهاد يعادل المنقار طولاً. المنقار صاعد مسود. السن الانسي قرب قاعدة المنقار غليظ - الربيع - مزارع طينة قرب حلب. رمال تدمر وغزة الى الوادي الابيض في النيه. الاسكندرية

A. flammea, Jacq. ٨ الادونس اللهبى ☉ الساق يابس. الزهرة متوسطة. الكاس ملازبة.

العفاء. البتلات اهليجية خطية مفلطحة. السبل اسطواني مسنن. الثمرات بيضية منتبهة بمنقار صاعد مسود. الحافة الانسية مجهزة بسن كال عند قاعدة المنقار - الربيع - مزارع شمالي سورية. الشام.

٥ ميوسورس MYOSURUS, L.

الازهار بلاظرف . السبلات ٥ ذات مهاز عند قاعدتها . البتلات ٥ ذات غلب خطي والصفحية ذات مسامة عسلية انبوية عند قاعدتها . الثمرات يابسة اسفينية . القلم منقاري قصير - اعشاب صغيرة سنوية غير منقسمة الاوراق

M. minimus, L. . الميوسورس الاصفر ① جميع الاوراق جذرية خطية . الجريدة احادية الزهر . البتلات افسر من الكاس . الثمرات متراكمة على سنبل مستدق - الربيع - فوق زبانة . البلقاء

٦ شقيق RANUNCULUS, L.

السبلات ٢ - ٥ . البتلات ٥ ونادراً اكثر ذات سنخ عند قاعدتها عريان او مغطى بفلس . الثمرات متعددة مفالطة على الغالب مرآسة - اعشاب سنوية او معمرة القسم الاول . *Eutrachium* . صفدع . البتلات يضاء ذات سنخ عريان عند قاعدتها - اعشاب مائية عائمة

R. aquatilis | *trichophyllus* ٢

القسم الثاني . *Ficaria* . قمقي . البتلات ٨ - ١٢ صفراء . السنخ القاعدي مغطى بحرشف

R. calthaeifolius ٢ *ficarioides* ٤

القسم الثالث . *Euranunculus* . شقيق صحيج . السبلات ٥ . البتلات غالباً صفراء او حمراء . السنخ القاعدي غالباً مغطى بحرشف

السلسلة الاولى . معمرات

§ الياف الجذراسطوانية باقية

* الثمرات كروية تقريباً

R. myosuroides ٥

** الثمرات مفالطة

X الاوراق الجذرية كفية منصصة او مشنوقة

١ . الازهار كبيرة حمراء او وردية او برتقالية او بيضاء

R. Asiaticus ٦

ب. الازهار متوسطة صفراء

R. Damascenus ٧ cuneatus ٨ Chaeorophyllos ٩ Sprunerianus ١٠

XX الاوراق الجذرية منفصلة ريشية

R. millefoliatus ١١ myriophyllus ١٢

§ الالياف الجذرية غير باقية

* القنار عسائي

R. palustris ١٣ Neapolitanus ١٤ elionophilus ١٥ demissus ١٦

* القنار املى

R. Cassius ١٧ Constantinopolitanus ١٨

السلسلة الثانية . سنويات

الثمرات بيضية غير محرفة . الثلاث عربية الباعنة

R. acceleratus ١٩

الثمرات مفلطحة محرفة وكثيراً ما تكون ذات درنات او حلك . الثلاث ذات سحر بمعنى بمرشد

* الاوراق غير منشمة

R. ophioglossifolius ٢٠ lateriflorus ٢١

* * الاوراق شقوقية او منشمة

R. ... ٢٢ trachycarpus ٢٣ Pauli Jordani ٢٤ lomatacarpus ٢٦

... ٢٧ Arvensis ٢٨ Pinarli ٢٩

R. aquatilis, L. الشقيق المائي . الزناد معادلة الاوراق طويلة والبريل ...

بيضية مقلوبة عريضة . الاسدية متعددة - الربيع - جذران وسوني

R. heterophyllus, D. C. ١. المتخالف الاوراق . الاوراق الغائبة مستديرة ذات فصوص

اسفينية شرافية والغائصة شعرية كثيرة المنحرق - حصص

R. submersus, Gr. et Godr. ب. الغائص . كل الاوراق غائصة شعرية ومنحرفة صلبة -

كثير الوجود

R. sparsospermus, Boiss. ت. التكروي البزرخ . سيات

الاوراق غائصة وخرقها قصيرة يابسة . الثمرات كروية تقريباً تكاد لا تكون محيطة - كبر الوجود

pantothrix, Bl. ث. الكلي الشعر. الاوراق كثيرة الخرق الشعرية الدقيقة - مع ب
R. trichophy Hus, Chaux. ٢. الشقيق الشعري الورق 2٢ الازهار اصغر مما في السابق ذكره.

الزناد قصيرة. البتلات ضيقة. الاسدية قليلة العدد - الربيع - غدران وسواقي. حلب. الثوم -
 وربما هوثبان من النوع السابق

R. cathartifolius, Jord. ٣. الشقيق الكلي الورق 2٢ الاوراق قليلة يضيئة كاملة او ذات خلعجان
 او اسنان متلوجة. الزناد مثل الاوراق طولاً او اطول منها. السبلات صفراء مبيضة غشائية. التويج
 نحو ستمينين عرضاً. الثمرات يضيئة قصيرة لحوية - شباط الى نيسان - اماكن رطبة من عينتاب
 الى القدس

R. ficarioides, Bory et Chaud. ٤. الشقيق الشبيه بالثميني 2٢ قزم. الاوراق صغيرة
 قليلة القاعدة يضيئة مفصصة فصوصاً كاله شرائفة. الزناد اقصر من الاوراق. السبلات صفراء غشائية.
 التويج نحو ستمينين عرضاً. الثمرات ملساء مستطيلة - اذار الى ايار - لبنان من علو ١٨٠٠ متر
 فصاعداً

R. nigrescens, Boiss. et Ry. ٥. الشقيق الشبيه بالميسورس 2٢ قزم (٢٠٣ متر
 الى ٢٠٦) ملساء. الاوراق الجذرية ١-٢ مخروقة الى خرق ٢-٥ مستطيلة كاملة او منشعبة والساقية
 ذات ٣ اقسام او مفقودة. الازهار ٧ مليمترات عرضاً فالبتلات اهلجية اطول قليلاً من السلات.
 السبل مستطيلة والثمرات ملساء مستطيلة والثم اقصر منها مستقيم - ايار الى تموز - جرود لبنان
 والجبل الشريقي

R. Asiaticus, L. ٦. الشقيق الاسيوي (شقاعق النعمان) 2٢ ملازم العناء. الاوراق
 الجذرية مخنثة فالسلى مستديرة شرافية والبنية ذات ٢ نصوص فصاعداً او مخروقة خرقاً مستطيلة والبنية
 كثيرة الخرق المستطيلة. الازهار ١-٤. التويج ستمينان الى ٦ عرضاً قزمي او وردي واصفر او
 ابيض. السبل ستمينان او اكثر طولاً مندمج. الثمرات قرطاسية مستطيلة ملساء تنهب بمنقار
 مغنوب اقصر منها - شباط الى ايار - سورية وفلسطين الى علو ١٠٠٠ متر

tenuilobus, Boiss. ب. التحيل النصوص. جميع الاوراق مشرحة - مع الرمز

R. Dama crenus, Boiss. et Gail. ٧. الشقيق الشامي 2٢ منفرج العناء. الاوراق
 الجذرية قليلة القاعدة يضيئة مستديرة المحيط اقسامها متراكبة كاله النصوص. الثروع كثيرة. السبل
 بيضي. المنقار مخنث - الربيع - مزارع حلب والشام والبناع

R. emeatus, Boiss. ٨. الشقيق الاسفيني 2٢ ملازم العناء. الاوراق الجذرية يضيئة
 المحيط اسفينية او مستديرة القاعدة ذات ٣ اقسام مفصصة. الثروع متشعبة. السبل بيضي. المنقار

مستقيم - الصيف

lobatus, Boiss. الب. المفصص. الاوراق الجذرية منقصة قاية الفاعلة - جرود لبنان

R. Charophyllos, L. ٩ الشقيق الخيزروفيلوس 2٢ ملازم الشعر الحريري. العنق كنيف

الاياف . الاوراق الجذرية السفلى مستديرة تقريباً مسنة وثلاثية الفصوص . والبقية مشرحة الى
فصوص مستطيلة او خطية . الساق ذوزهرة الى ٣ . السبل المثيريضي مستطيلي . الثمرات بيضبة
منطقة منبهة بمقار منفرج اعقف - نيسان وابار - شاطي سورية والجبال الى علو ١٠٠٠ متر

R. Sprunerianus, Boiss. ١٠ الشقيق السر ونري 2٢ لحوي. الاوراق الجذرية مستديرة

المحيط قليلة الفاعلة ذات ثلثة اقسام كالة الفصوص . السبل مستطيلي . الثمرات منسة ذات درنات
حاملة شعر . المنفار مثلها طولاً مستقيم ذوشص - ابار الى نموز - تحت جرود لبنان والجبل الشرقي
R. millefoliatus, Vahl. ١١ الشقيق الالفى الورق 2٢ مستطيل . الاوراق ثنائية
الفصل الريشي وثلاثية . خرقة مستطيلة خطية حادة . الساق بسيط ذوزهرة او ٢ . السبل مستطيلي .
الثمرات مستديرة تقريباً . المنفار اعقف ونصفها طولاً - الربيع - المحضرة في عيه

R. P. copulatus, Russ. ١٢ الشقيق الربوي الورق (ثميرة) 2٢ ملازم الصوف

مستشيب . الاوراق ريشية مشرحة وخرقبا قصيرة خطية حادة قليلاً . الساق كثير انشعب . الزناد
الثمره طويلة . السبل مستطيلي . الثمرات مثلثة متباولة منطقة ماساء منبهة بمقار منفرج قليلاً اقصر
منها - الربيع - مزارع سورية ولسطابن

Hierosolymitanus, Post. ب. القدس. الزناد المثره متضخمة . المنفار اقصر مما في الرمز - القدس

(R. Hierosolymitanus, Boiss.)

R. palustris, L. ١٣ الشقيق المستنقي 2٢ ام الجذور قصيرة . السوق والرجيلات قصيرة

العفاء وكثيفته . الاوراق ملازمة الور فالجذرية بيضبة المحيط ثنية القواسم المقصوصة الكالة الاسنان .
الزناد مثله . الثمرات بيضبة منبهة بمقار قصير مستقيم - الربيع - اماكن رطبة بقرب حاب

R. Neapolitanus, Ten. ١٤ الشقيق النابولي 2٢ ملازم العفاء . ام الجذور قصيرة ذات

الاياف ليفية ضخمة . الاوراق بيضبة مستديرة المحيط ثنية القواسم المقصوصة الحادة الاسنان . الزناد
مستدقة مثله . الثمرات مستديرة منبهة بمقار قصير مخروطي - آخر الربيع - لبنان الى عينتاب وشاليها
R. chionophilus, Boiss. ١٥ الشقيق المحب الثلج 2٢ املس قزم حرمي . العنق ضخم

والجذور مستدقة . الاوراق الجذرية مستطيلة المحيط ثنية المنشا ريشية قطعها منقسمة الى خرق مستطيلة
قصيرة فالقطعة الانتهاية ذات رجلة طويلة . السوق غير زائدة عن الاوراق منبهة ذات زهرة او ٢ .
الزناد المثره طويلة منخططة . السبلات ماساء . الثمرات بيضبة ضخمة المحافة مددنة القرص ذات منفار

هرمي اعنف قليلاً - الصيف - جرود لبنان والجبل الشرقي

١٦. *شقيق المستطلي* 24 قزم. أم الجذور منحرفة. العنق محاط بغمدود

ليفية مغطاة بشعر ابيض. الاوراق لمساء قليلة العفاء مستديرة المحيط كغنية منقسمة الى اقسام ٣-٥ ذات رجيلات قصيرة ومخروقة خرقاً قصيراً خطية مستطيلة كاله. السوق متصاعدة او منخفضة غالباً ذات زهرة واحدة ومستطيلة في الإنثمار. الكاس زغية. الثمرات مثلثة بيضية مفلطحة غير ضخمة المحافة. المنقار قصير شحي - الصيف والخريف - جرود لبنان والجبل الشرقي

١٧. *الشقيق الأقرعي* 24 عالٍ ملازم الحريز الفضي. أم الجذور افقية

مجهزة من الاسفل بالياض اسطوانية ومنتمية بسواص قصيرة افقية ضخمة مغطاة بمحاشف وبرية. الزهر كورني مسنرسل. الاوراق الجذرية بيضية المحيط خماسية الزوايا ثلثية المنشأ فالقطعة الوسطى ذات رجلة والجميع مخروقة خرقاً مستطيلة اسفينية منصوفة. الثمرات بيضية مفلطحة ذات حوافي والمنقار قصير مستقيم - اول الصيف - اماكن رطبة من عنتاب الى بودان وبيروت

١٨. *الشقيق التمسطنيني* 24 الساق والرجيلات

منعكسة الوبر. الاوراق ملازمة الحريز. الجذور ليفية مخددة من العنق. الساق عالٍ كورني كثير الازهار. الاوراق طويلة الرجيلات مثلثة بيضية المحيط ذات ثلاثة اقسام بيضية حادة النصوص السننة. الثمرات مفلطحة ذات حافة منتهية فجأة بمنقار شحي ثلثي اربعها طولاً - الصيف

Palustrius, Boiss. ١. *الفلسطيني*. فصوص الاوراق اسفينية الناعة - سياجات الشام والجبل

الشرقي ولبنان الى الحولة

١٩. *الشقيق الشقي* ٢٠ العناق منتصب متفرع. الاوراق السفلى

تلفية الاقسام المخروقة والمحطية. الثمرات متراكمة صغيرة بيضية مقبولة منضغطة محاطة عدد حافتها بمخيط منبج وقرصها مثل عرضا وحمها قصيرة - الشتاء والربيع - بر مصر

٢٠. *شقيق ورق لسان الحمية* ٢٠ مستطيل. الساق ناصوري.

الاوراق غير منقسمة فالسفل قليلة بيضية والعليا مستطيلة رمحية. الازهار صغيرة. الثمرات صغيرة بيضية مفلطحة قليلاً وحافتها بيضية حادة وقرصها درني ومنقارها قصير مسود - الربيع - مستنقعات طرابلس والاربع في اماكن اخرى

٢١. *الشقيق الجاني الزهر* ٢٠ امس. الساق منتصب ناصوري.

الاوراق اهليلجية مستطيلة. الازهار صغيرة جالسة تقريباً في المشعبات وانتهائية. الراس بيضي كروي كثير الثمرات البيضية الدرنية القرص المحاطة بمحافة حادة. المنقار مثلها طولاً تقريباً رمحي دوشص - الربيع - سورية. البلقاء

٢٢ R. Chiusi, 7, 11. شقيق شيون) ناعم الوراء. الساق منتصب. منفرج الفروع. الاوراق

قلبية مستديرة ثلثية المحرق المنفصصة الشراعية. الزناد مقابلة الاوراق متعصبة في الفهر. السلات كالثلثات طولاً. الثمرات بيضية منضغطة كثيفة الدرناث المنتهية بشعرة شعيرة. الحافة حادة مساه منتهية بمقار عريض القاعدة شوي الرأس ونصف الثمرة طولاً - الربيع ساحل سورية الجوري ولبنان

٢٣ R. philonotis, 11. الشقيق الحبب الرطوبه منرج النجبة. الاوراق السفلى

بيضية المحيط والبنية ثلثية الاقسام او المحرق وقطعها مقصصة. السلات سبع الثمرات ثلثية طولاً. الثمرات منضغطة كروية تقريباً وحافتها ذات ثلثين. الرص دور. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. الثمرات مرووسة مقار قصير منحرف - السحب انماك ردة من يداد الى حب

٢٤ R. Chiusi, 7, 11. الشقيق القصور الفجر منرج النجبة. الاوراق

الجذرية مستديرة شراعية ثلثية الفصوص او الانسام. النجبة ثلثية المحرق. الشرح. الثلات بيضة. سبل قليلا من الكاس. الثمرات منضغطة بيضية محاطة بجافة ذات ميزاين. الرص. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. الثمرات مرووسة مقار قصير - الربيع - اماكن رطبة من حص الى كرك

٢٥ R. Chiusi, 7, 11. الشقيق باولي جوردان مستلس. الاوراق الجذرية

ثلثية الفصوص المنفصصة او الاقسام المنفصصة. واقسام الاوراق الساقية اسفينية القاعدة مستديرة رمية او خطية. الثلات اطول قليلا من السلات. الرأس. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. الثمرات مرووسة مقار قصير - الربيع - اليوم

٢٦ R. Chiusi, 7, 11. الشقيق المحرق الثمر مستلس. الاوراق

الاوراق ثلاثية الاقسام التي هي في السفلى بيضية مقولبة كالة المحرق وفي العليا رمية خطية حادة. الثلات ضعف السلات طولاً. الرأس. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. الثمرات مرووسة مقار قصير - الربيع - مزارع. كثير الوجود في سورية وفلسطين - ويتباين هذا النوع كثيراً في دقة فصوص الاوراق التي قد تكون مشرحة خطية المحرق

٢٧ R. cornutus, Post. القروي. المقار مثل الثمرة طولاً مفلطح - مع الرمز

(R. cornutus, D. C.)

٢٨ R. muricatus, L. الشقيق التوتوي مستلس. الاوراق الجذرية طويبة رمية

كروية او كلوية ثلثية المحرق المنفصصة الشراعية والعليا اسفينية ثلثية التناصيل. الثلات اطول من السلات الهليلجية. الثمرات منفرجة مفلطحة بيضية محاطة بجافة ذات ميزاين. الرص. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. الثمرات مرووسة مقار قصير نصف الثمرة طولاً - الربيع - حذر واحاديث. كثير الوجود

٢٨. *R. arvensis*, L. الشقيق المنجلي ⊙ امس او قليل الغناء. الاوراق السفلى اسفنية بيضية مسننة او ثنائية الخرق والبقية ثلثية المنشأ ذات رجلات ومشرحة الى خرق رحمة متشعبة. الثمرات كبيرة منفردة بيضية مغلوبة ذات حسك توتويوي ولا سيما عند حافتها العريضة - الربيع - مزارع سورية ولسطين

٢٩. *R. Flinardii*, Boiss. شقيق بينارد ⊙ قزم (٤ ستمترات الى ٨). ملازم الغناء. الاوراق السفلى اسفنية كروية تقريباً ذات اسنان ٢-٥ كالة والبقية منفصلة الى قطع خطية مستطيلة كاملة او ثلثية الاسنان. الثمرات قبلية منفردة كبيرة (ستيمتر طولاً و ٣-٤ متر عرضاً) مستطيلة منفلجة ملازمة الغناء. القرص صغير الدرن عريض الحافة. المتقار ملتف وضعف الثمرة طولاً - الصيف - فوق راشيا وزبدانة

٧ الكرتوكفلس CERATOCEPHALUS, Moench.

السبلات ٥. البتلات ٥ ذات سنخ عسلي عند القاعدة مغطى بفلس. الثمرات سريعة السقوط ذات حذبة على كل من جانبي القاعدة لها غريفتان خاليتان. المتقار طويل رمحي - اعشاب قزمة اوراقها كفية مشرحة الى خرق خطية

شكل ٤



C. salicatus, Pur. الكرتوكفلس المنجلي ⊙ المتقار مغنر الى

الاعلى شصي القمة - الربيع

C. vulgaris, Boiss. ١. الاعتمادي. الجرائد مثل الاوراق طولاً

او اطول. المتقار عريض منجلي القاعدة - مزارع سورية

C. exscapus, Boiss. ب. العادم الجرائد. صوفي. الجرائد قصيرة

او مفقودة - اماكن جافة. كثير الوجود

C. incurvus, Boiss. ت. المنحني. الجرائد اطول من الاوراق. راس ثمرات الكرتوكفلس

المنجلي الاعتمادي

المتقار اضيق ما في الرمز شصي القمة - عيذاب وحص الى الشام والباق

٨ الخرق HELLEBORUS, L.

السبلات ٥ شبيهة بتلات خالدة. البتلات صغيرة انبوية شفوية. الثمرات جالسة ملتصقة جزئياً

بعضها ببعض - اعشاب معرة ازهارها خضراء ارجوانية

H. Vesicarius, Auch. الخرق المثاني ٢٤. ٢٣ متر الى ٢٥. الاوراق المجذبة ثلثية القطع

ذات الرجلات والمصلة الى خرق اسفينية رحيمة خطية منصوصة . الساق ذوزهرين الى ٥ . الاوراق الزهرية جالسة ذات خرق ٣-٥ اسفينية . الثمرات منتفخة كروية ٢.٣ ملم قطراً - شباط واذار - غابات الجبال حول عيتاب وجبل اللكام والافرع

٩ الكريدل *GARIDELLA, Tourn.*

السبلات ٥ ساقطة غير مثلية اقصر من التويج . البتلات ٥ ذات مخضب مجوهر اسفنج عملي عند راسه والمخضب شفوي حلبي القاعدة فالشفة الوحشية متشعبة والانسية قصيرة تمد السنج الغصلي الذي تمد قاعدة الصفيحة - اعشاب سنوية

G. unguicularis, Lam. . الكريدل الخيلية ٥ سوية البتلات ٥ منها الصفيحة والانس طولاً واكثر . الصفيحة كlobية متموجة . البرور مستطيلة شبكية او مثلمة - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

١٠ الشونيز (الشهينز) *VEGETELLA, L.*

السبلات ٥ شبيهة ببتلات ساقطة اكبر من التويج . البتلات صغيرة ذات مخضب وصفيحة شفوية فالشفة الوحشية متشعبة ذات سنخ عملي عند قاعدتها . الثمرات ٥ - ١٠ متحدة اكثر او اقل . الثم طویل منقاري - اعشاب سنوية اوراقها ريشية ثنائية التركيب او ثلثية وخرقها خطية او مدببة * الازهار مزرقة

N. arvensis ١ deserti ٢ stellaris ٣ sativa ٤

** الازهار صفراء مبيضة

N. orientalis ٥ oxypetala ٦ ciliaris ٧

N. arvensis, L. . الشونيز المحفلي ٥ البتلات قصيرة السوية والشفة الانسية ٥ - ١٠ متحدة طولاً . الثمرات ٣-٤ متحدة الى ثلثي طولها في حبيب مغروطي منلوب وظاهرها ذو ثلثة اصابع . المنقار كالثمرة طولاً واقصر منها - الربيع

glauca, Boiss. . الاغبر . مستغبر . خرق الاوراق طويلة دقيقة - شاطئ سورية . الجبل الشرقي

divaricata, Boiss. . المتشعب . اغبر . خرق الاوراق قصيرة . اوراق الشروع غير منتسبة

حياناً - شاطئ سورية . جبال النصيرية . شاطئ فلسطين . الاسكندرية

caudata, Boiss. . ث . الذنب . الثمرات متحدة الى منتصفها فقط - كروم عيتاب ومزارعها

٣. *N. deserti*, Boiss. شونيز البادية © واطى (٢٠٢ متر إلى ٢٠٤). الأزهار صغيرة. الثلاث قصيرة السويقة والشفة الانسية أقصر من الوحشية قليلاً. الثمرات ٣ متحدة إلى ثلثها وظهرها ذو ٣ أعصاب عند القاعدة وه في الأعلى. المنقار أطول قليلاً من الثمرة - الربيع - وادي موسى. بادية التيه. البلقاء

٤. *N. stellaris*, Boiss. الشونيز الكوكبي © الأزهار متوسطه. الثلاث طويلة السويقة فالشفة الانسية نصف الوحشية طولاً تقريباً. الثمرات ٥ رحيحة طويلة محزمة الظهر ذات عصب متحدة إلى ربعا. المنقار ضعفاً أو ٢ أضعاف الثمرة طولاً - الربيع - كسب. اللاذقية

٥. *N. verticillatus*, L. الشونيز المزروع. (حبة البركة. الحبة السوداء) © الثلاث قصيرة السويقة فالشفة الانسية مثل الوحشية طولاً تقريباً. الثمرات ٥ - ٧ متفخمة مستديرة الظهر ثولولية بجانب متحدة إلى القمة. المنقار مثل الثمرة طولاً - الربيع - مزارع مصر

٦. *brachyloba*, Boiss. ب. القصير الفصوص. كثيف الفروع كثير الغناء. الحبيب كثير التأكل - عيتاب - تثر ثمرات هذا النوع على الخبز لحسن منظرها وطيبة طعمها

٧. *N. orientalis*, L. الشونيز الشرقي © خرق الاوراق خطية. الثلاث نصف السبلات طولاً وشفتها الوحشية بيضية متشعبة شعبتين قصيرتين. الثمرات متحدة إلى منتصفها وظهرها ذو ٢ أعصاب متباعدة موصلة باوردة مستعرضة - آخر الربيع - مزارع جبل اللكام وشرقية

٨. *N. oxypetala*, Boiss. الشونيز الحاد البتل © الثلاث صغيرة فالشفة الوحشية اعرض من طولها رباعية الفصوص فالنصان الخارجيان قصيران مستديران والمتوسطان مقعمان إلى خرق هلبية لحوية قد تعلو الاسدية. الثمرات متحدة إلى أكثر من منتصفها قليلاً وظهرها ذو ٢ أعصاب متقاربة - آخر الربيع - مزارع عيتاب وحلب

٩. *Nocana*, Boiss. م. نُو يَافِي. سويقات الثلاث طويلة - بلودان

١٠. *tenuifolia* Boiss. ت. التحيل الاوراق. الخرق خطية هلبية. سويقات الثلاث طويلة -


عيتاب

١١. *N. ciliaris*, D.C. الشونيز الهدبي © السبلات لحوية. الثلاث ذات سويقة فالشفة الوحشية اسفينية متشعبة شعبتين طويلتين خطيتين لحويتين. الثمرات لحوية متحدة إلى منتصفها ومنقارها مثلها طولاً. الزور مستديرة متموجة قليلاً - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

السبلات ٥ شبيهة ببتل فالعليا ذات مهاز او شبيهة بمخرقة. الثلاث غالباً ٤ وكل واحدة من

الزوج العلوي مستطيلة الى مهاز متضمن في المهاز الكاسي وكل البتلات مستقلة او متحدة بعضها ببعض وبالمهاز المذكور. الثمرات ١ - ٥ مستقلة - اعشاب سنوية او عمرة

شكل .



فرج الشكل . ع (ع) زهرة العائق العالي . (غ غ غ غ غ) ميلاتها خمس فلهذا ذات مبرز. افند .
بتلاتها الاربع . ولكل من العلويين مهاز يدخل في مهاز النبله العليا

** الثمرات ١ . البتلات متحدة

† التلة ثلاثية الفصوص

‡ الزند مفتوح تقريبا

D. acilliflorum ١

‡ الزند مثل الجيب طولاً او اقل

D. deserti ٢ *torontoensis* ٣ *oliganthum* ٤ *sulphureum* ٥ *pusillum* ٦

viridum ٧ *Cappadocicum* ٨

†† البتلة بيضيه مقلوقة عرضها اكثر من طولها وثمها جذومة رماعية انسان

D. deserti ٩

††† البتلة خماسية الفصوص

D. anthoroideum ١٠

** الثمرات ٣ . البتلات منفصلة فلهذا مبروزة

D. cretense ١١ *puum* ١٢ *Bovei* ١٣ *virgatum* ١٤

*** الثمرات ٣ - ٥ . البتلات منفصلة فلهذا سنوية

D. italo-arense ١٥ *staphysagria* ١٦

١. *D. axilliflorum*, DC. العائق الابطي الزهر © مستطيل او قصير الغناء من الاعلى .

الاوراق الزهرية مشرحة. السبلات بيضية مستطيلة. فص البتلة العلوي خطي مشقوق القمة مثل الفصين الجانيين طولاً. المهاز نصف التلة طولاً. الجراب اسطواني ملازم الغناء وقصير جالس تقريباً منحرف الفضون - الربيع - عيناب الى البقاع . يتفاوت لون ازهاره من البنفسجي الى الازرق فالايض تقريباً

٢. *D. orientale*, Gay. العائق الشرقي © متفرق الزغب. الراسيات طويلة مندجبة .

فص البتلة المتوسط اطول كثيراً من الجانييتين متشعب. المهاز اقصر من التلة . الزند مخن الى الاعلى وهو طويل في الزهور السفلى . الجراب متفرق الغند اسطواني حموي . حافتا الدرزين ضخمتان - الربيع - من عينتاب ومرعش الى دير عطية ويبروت

٣. *D. tomentosum*, Auct. العائق اللبادي © ملازم الشيب متفرع من الاعمدة .

الراسيات قصيرة . الية مثلبة غبر واضحة الفصوص وقاعدتها مثلبة . المهاز اطول قليلاً من التلة . الزند متصب ذو فلسين طويلين ثم منعكس . الجراب ملازم اشعر اسطواني مخن قليلاً مستدق المنثار - الربيع - مزارع متروكة من عينتاب الى حلب

٤. *D. oliganthum*, Boiss. العائق القليل الازهار © ملازم الشيب . الراسيات قصيرة

مندجبة الازهار التي عددها ٥-٣ . البتلة مثلبة ذات ٣ فصوص الجانيان منها افقيان . المهاز اقصر قليلاً من التلة . الكاس والويج تدومان قليلاً بعد الزهر . الزند منعطف ذو فلسين طويلين قرب قمته . الجراب صوفي مستطيل منتفخ ذو منقار قصير - الربيع - من عيناب الى تدمر والبقاع وشرقيها

٥. *D. sulphureum*, Boiss. et Hausskn. العائق الكبير يتي © ملازم الزغب واطى متشعب

الفرع الكورنية. الراسيات قصيرة فيها من ثلاثة ازهار الى خمسة كبريتية . فص البتلة المتوسط ثلاثي الاسنان اطول واضيق من الفصين الجانيين . المهاز نصف التلة طولاً . الزند مخن الى الاسفل . الجراب متدل ايض الغناء مستطيل رمحي حموي - الربيع - اماكن كثيرة العشب حول مرعش

٦. *D. pusillum*, Labill. العائق الحقير © قزم من ٢-٣ متر الى ٠.٦ ناعم الخمل اشيب .

الفرع منتصبه منفرجة من العنق . الراسيات مندجبة . الازهار من ٣-٥ وردية . البتلة معوية ثلثية الفصوص المتساوية طولاً فالمتوسط مجزوم ثلاثي الاسنان . المهاز اقصر من التلة . الزند منعطف القمة . الجراب مستطيل منضغط ملازم الغناء - حزيران - دمشق وجبل الشيخ

٧. *D. zigzagum*, DC. العائق اليابس © خلي اشيب لوج كثيراً العشب اليابس . الراسيات

قليلة الازهار وازهارها متعانة صغيرة بيضاء وردية . فص التلة المتوسط متشعب اقصر كثيراً من

الجانبين . المهاز كالبتلة طولاً . الزند طويل مستقيم او منعطف . الجراب منفرد الغدد مستطيلي مثنى قليلاً منقاره نصفه طولاً - الربيع - كثير الوجود في مزارع سورية وفلسطين

D. Cappadocicum, Boiss. ٨ . العائق الاناضولي ☉ الرغب السفلي ابيض والعلوي

ذهبي غدي القاعدة . الراسيات مسترسلة . قص البتلة المتوسط خطي منشعب مثل الجانبين طولاً واضيق منها . المهاز ضعف البتلة طولاً . الزند مثنى الى الاسفل . الجراب منقص مستطيلي منفرد الغطاء مستدق الى منقار - الربيع - شمالي سورية عند بئر

D. deserti, Boiss. ٩ . عائق البادية ☉ قصير الغطاء ارجع قزم منشعب الفرع من قاعدته .

الاوراق مستطيلة صغيرة . الازهار صغيرة انتهائية صفراء . المهاز اقني مثل المتة طولاً . الجراب عماني مستطيلي قليل البزر - الربيع - بادية التيه

D. anthoroideum, Boiss. ١ . العائق الانثورويدي ☉ ملازم الرغب منشعب المنفرع .

فص البتلة العلوي منشعب اطول قليلاً من المتوسطين والسفليان كبيران بيضيان . المهاز منقش المتة . وهو نصف المتة طولاً . الجراب مستطيلي والمنقار قصير - الصيف - اماكن جافة من عينتاب الى اسناخ وتحت جرد لبنان والجبل الشرقي

Ed. peregrinum, L. ١١ . العائق المرتحل ☉ زغبى . الدرع ياسة عريانة تقريباً . الاوراق

السفلى ثلاثية التفاصيل الخطية المرحية والعليا بسيطة . صفحة البتلة الجانبيتين مثل الخشب طولاً . المهاز متصاعد وهو ضعف الزهرة طولاً . الثمرات ملساء مستطيلة ٢.١ متر طولاً الصيف اماكن جافة من عينتاب الى فلسطين

criocarpum, Boiss. ب . الصوفي الثمر . الثمرات منعرة . بيلزن . ساحل سورية المجري

Ed. sagranusche, DC. ١٢ . العائق القزم ☉ متفرق الصوف قزم من ٢.٨ متر ٢.١٢ . الاوراق

السفلى صغيرة قاسمينة ثلاثية المحرق والبتلة غير متقسمة خطية . الراسيات مسترخية قليلة الازهار صفحية المتة الجانبية اطول من الخشب . المهاز اقني او متصاعد ضعف الزهرة طولاً . الثمرات عائية بيتية مستطيلة - الصيف - شاطئ الاسكندرية

D. Borei, Decaisne. ١٣ . عائق بوفي ☉ ٢.٠٣ . املس الا الزناد المازمة الغطاء . باس

الفرع . الاوراق السفلى مستطيلة ملوقة ثلثية المحرق . والساقية خطية رمحية حادة غير منقسمة . الراسيات قصيرة مسترخية . صفحة البتلة الجانبية ثلث الخشب او نصفه طولاً . المهاز مثنى الى الاعلى وهي ثلثة اضعاف السيلات طولاً . الثمرات ملساء - الصيف - بادية التيه

١٤. *D. virgatum*, Poir. العائق العصوي ○ أملس مستغبر الأزهار. الفروع طويلة بآسة. الأوراق بآسة فالسفل قصيرة الرجبات اسفنية بيضية قصيرة المحرق والفصوص الثلاث عند قممها. والفروع غير متنسفة. الراسيات طويلة مسترخية. صفحة البتلة الجانبية أقصر من المقلب. المهاز متصاعد مستقيم كالزهرة مرة ونصفًا طولاً. الثمرات قليلة الغفاء - الصيف - من حلب إلى البلقاء. أواسط لبنان. ساحل سورية البحري

١٥. *D. Ithaburensis*, Boiss. العائق الطوري ○ قليل اللحمية قصيرها. الساق عال. ذوزوايا بسيط. الأوراق كغنية قطعها مستطيلة اسفنية مشقوفة إلى فصوص مستطيلة خطية كالة. الراسيات مندحمة. الزناد نصف المهاز طولاً مجهزة عند قاعدتها بثلاثة فلوس رحيمة مهدبة. الزهرة مزرقه متفرقة الملب بياضه. المهاز مستقيم كال أطول من السيلات. البتلات العليا لمساء. الثمرات كثيفة الغفاء - الربيع - جبل الطور

١٦. *D. staphyngria*, L. العائق الستافسكريبيا ○ ناعم اللحمية. الساق عال. الراسم مستطيل متفرع القاعدة. الأوراق كغنية ذات أقسام إلى ٧ رحيمة بيضية كالة وذات ٢ شعب. الزناد ضخمة ضعف الزهرة طولاً ذات فلسين عند قاعدتها. المهاز كال خمس السيلات طولاً. صفحة البتلات السفلى بيضية مقلوحة رحيمة. الحبيب متفتح لحوي - أول الصيف - طرابلس

١٢. النارمشك PÆONIA, L.

السيلات ٥ مستمرة ورقية غير متساوية. البتلات ٥ أو أكثر. الثمرات ٢-٥ شاقفة إلى الانسية. اعشاب معمرة أوراقها احادية المنشأ الثلاثي أوثنائية. الأزهار كبيرة. الجذر معجهر باللياف ذات بضايض *P. corallina*, Retz. النارمشك المرجاني (ورد الحبيب) ٢٤ الأوراق ثنائية المنشأ الثلاثي لمساء وزغيبية من الأسفل. الوريقات بيضية مستطيلة كاملة. الأزهار وردية. الثمرات صوفية - الربيع - جبل اللكام. الجبل الاقصر

الرتبة الثانية البربريسية BERBERIDACEÆ.

الأزهار قياسية. السيلات ٣-٦. البتلات مقابلة السيلات ونادراً ضعفها. الاسدية مثل البتلات عددًا. القلم قصير. البويضات متنبصة. الثمر جراب مثاني أو عيبية - اعشاب معمرة أو النجم متردفة الأوراق

BONGARDIA, C.A. Mey.

١ البونكرديا

شكل ٦



السيلات ٣-٦ بلافلوس . الثلثات ٦ بلا معلقة ذات سنخ عسلي . الاسدية ٦ . القلم قصير والسمة قرصية منقصة مفصصة . البويضات ٥-٦ . الثمر جراب مثاني - اعشاب ملساء جذرها بضاضي واوراقها جذرية ريشية

chrysogonum, L. . البونكرديا الذهبية الزوايا (عرف

الديك) ٢٢ الاوراق ريشية وريقاتها متقابلة او في اسفل الورقة : دولابية جالسة اسفلية مستديرة القاعدة مستطيلة ذات ٣ خرق الى ٥ قبة . الزهر سنودي وعند قاعدة الفروع حراشف . الجراب مستطيلي مستدق الطرفين (شكل ٦)

- اول الربيع - مزارع من حلب الى القدس . لبنان الى عاز ٨٠٠ متر

جرب البونكرديا الذهبية الزوايا

٢ الليونتكة

LEONTICA, L.

السيلات ٦ بلافلوس . الثلثات ٦ ذات حُرشف معمول على سويق . الاسدية ٦ . القلم قصير والسمة غير واضحة . البويضات ٢-٤ . الثمر جراب مثاني كبير يتزق اخيراً عند قمته - اعشاب ملساء جذرها بضاضي ساقها ورقية

leontopetalum, L. . الليونتكة الليونتوبلوم (خبرة اذار) : اغوارق ثنائية المنشأ


الثلاثي . قطعها بيضيه ابيضيه مقلوقة فالانتهائية منقصة او مخروقة . الزهر سنودي ورقية . الثمر جراب مثاني والزنداد طويلة . الجراب يضي كروي - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

٣ البربريس

BERBERIS, L.

الكاس ذات فلسين ٦ سيلات مقعرة ذات غدين من الباطن . الاسدية ٦ . السمة مجنبة . العنبيه ذات برتين او ٢ مركبة بقرب القاعدة . متصبه . الجنين كبير - انجم شوكية مخنصة بالجروح

شكل ٢



خروع البربريس : اعداد

B. Creten, L. البربريس الاكريتي. (البربريس) 24 واطى 2. الاوراق غشائية. مستدقة الفأعة بيضية رحيمة مقلوبة كاملة او مسننة اسنانياً حسكية واقصر من الشوك الثلاثي الفروع. الراسيات قليلة الازهار كورينية متضبة اقصر من الاوراق. العتبات الهلجمية سوداء. السمة جالسة - الصيف - جرد لبنان والجبل الشرقي - شراب الثمار مبرد يستعمل في الحميات ويُعمل من جذره صباغ اصفر

الرتبة الثالثة النيمفية NYMPHAEACEAE.

الازهار قياسية. الثخت جري لحي تنغرز فيه الثمرات. السبلات ٤-٥ مندغمة في اسفل الثخت. البتلات متعددة مصطفة صفوفاً عديدة. الاسدية غير محدودة متعددة الصفوف. الثمرات ملتصقة بالحويط. المبيض كثير الغريبات مولف من ثمرات ملتصقة بعضها ببعض وبالثخت. الثمر عني - اعشاب مائية ذات ام جذور تحت الماء واوراق وازهار عائمة على سطوح

١ الحوذان NYMPHAEA, L.

السبلات ٤. البتلات عادية السخ العسلي على ظهرها. الاسدية مندغمة في قرص. يتند الى السمة والوحشية منها شبيهة ببتلات. الثمرات متحدة في عتية جيبية ندية
N. alba, L. ١. الحوذان الابيض 24 الاوراق قلبية كاملة. السبلات كالة دقيقة الاعصاب.
البتلات بيضاء بيضية كالة. الانثيرات سرحاء. معلقات السمة قصيرة اسطوانية - الصيف - مجمرات
وانهر من شمالي سورية الى الحولة

N. Lotus, L. ٢. الحوذان اللوتوس 24 الاوراق قلبية خليجية حادة الاسنان. السبلات كالة ذات اضلاع الى ٧. البتلات خطية مستطيلة بيضاء. الانثيرات سرحاء. معلقات السمت اسطوانية دبوسية - الصيف - ذالية مصر

N. stellata, Willd. ٣. الحوزان الكوكبي 24 الاوراق خليجية كالة الاسنان او كاملة. السبلات عصبية. البتلات زرقاء خطية رحيمة حادة مستدقة القمة. الانثيرات ذات زوائد طويلة. اشعة السمت مستطيلة الى قرون قصيرة بلا معلقات - الصيف - ذالية مصر

٢ النوفر NUPHAR, Smith.

السبلات ٥. ظهر البتلة مجهز بسخ عسلي. الاسدية مندغمة في قرص تحت المبيض. الثمرات

مقعدة في عنبية جيبة ملساء


N. luteum, L. . النوفر الاصفر 24 الأوراق بيضية كاملة قلبية القاعدة . السبلات مستديرة

منعرة . الاقتران مستطيلة خطية . السمة سرية كاملة اوجونية قليلاً - الربيع - بجزرات سورية وفلسطين ومستنقعاتها

الرتبة الرابعة الخشخاشية PAPAVERACEÆ

الازهار قياسية او غير قياسية . الكاس مولدة من سبلتين ساقطتين . التلات ٤ - ٦ . الاسدية متعددة ونادراً ٤ . المبيض ذو غريفتين كاذبتين والمشتبان متحدتان مع المحاجر الكاذب او كثيرة الغريفات غير الكاملة فالمشيمات على هيئة حواجز ممتدة من الجدار الى قرب المحور . و فئات متعددة . الثمر خرنوبي او جيب فانح بسام عند قبته - اعشاب كثيرة ما يتلون عصارها

شكل ٨



شرح الشكل ٨. (ب) برعم الخشخاش نرى الكاس واقعة من قبته . (ث) زهرة مفتوحة . (ث) خرنوبية الكبدوبوم . (ج) ذلك بعد وقوع الصراخ وتظهر البذور معلقة بالحافة المحيطة بالمحاجر . (ح) برعم اسود اسكندريا وهو مزروع في بعض الجنانين . (خ) الكاس القوية مفصلة من (د) التلات قبل اشسامها . (ذ) الجيب بعد نسجه

* الازهار قياسية *

Papaver. ١ . المبيض مولد من عدة غريفات كاذبة . السبات ٤ - ٣٠

Romeria. ٢ . المبيض احادي الغرقة . السبات ٦ - ٤

Glaucium. ٣ . المبيض خرنوبي . السمة ثنائية الفصوص

* الازهار غير قياسية *

٤. *Hypecoum*. البتلات ٤ مرتبة أزواجاً. المبيض ذو غريفة واحدة

١ الخشخاش *PAPAVER, L.*

السلالات ٢-٣. البتلات ٤ ونادراً ٥-٦ مجمدة في التصيف. الاسدية متعددة. السمات جالسة مرتبة على هيئة قرص اعلى المبيض. الجيب يضي دوسي او اسطواني فالشباب الجدارية ممتدة الى قرب المحور فتكون عدة غريفات كاذبة تنفتح عند قمتها بمسامات ذات صمامات

* محولة

P. Libanoticum I

** سنوية

† الجيوب ملساء

‡ الخويطات مخززية

١. الاوراق الساقية غير معانقة

P. umbonatum ٢ *Rhœas* ٣ *polytrichum* ٤ *dabium* ٥

ب. الاوراق الساقية معانقة

P. Decaisnei ٦ *glaucum* ٧

† † الخويطات دوسية القمة

P. somniferum ٨

أ الجيوب هلمسة

P. hybridum ٩ *Argemone* ١٠

١. *P. Libanoticum*, Boiss. الخشخاش اللبناني © طويل الهلب منفردة. السوق واطمة

منصاعة بسيطة ذات زهرة واحدة او متفرعة من الاسفل ذات زهرتين او ٣. الاوراق ريشية وخرقها صغيرة متراكمة مستطيلة كالة. البتلات لحيوية. الجيب املس يضي مغلوب مستطلي. الفرس اصيق من الجيب بكتير وهو مخروطي منبعج. السمات ٥ او ٦ - الصيف - قم جل مكل وجبل الشيخ

P. umbonatum, Boiss. ٢ الخشخاش العجتي © قزم من ٢٠ سم الى ٢٠٨. قصير الهلب

ومتفرقة. متفرع من العنق. السوق منتشرة متفرقة الفروع ملازمة الهلب. الاوراق صغيرة ريشية قطعها قليلة بيضبة كالة. السلالات قليلة الهلب. البتلات صغيرة. الاثيرات كروية تقريباً. الجيب ذو سوقية

قصيرة مستطيلي خطي. القرص متربعين مخروطي. السمات ٥ - الصيف - جبل الباروك
P. Rhoeas, L. الخشخاش الرياس ن هلي ونادراً مستطيل. الاوراق احادية التقسيم او
 المخرق الريشي او ثنائيتها والقطع مستطيلية رحيمة ونادراً قيثارية. السبلات هليبية. الثلات مستديرة
 عرضها اكثر قليلاً من طولها قرمزية ذات نقطة قائمة او لا نقطة فيها. الانثيرات مستطيلية. السمات ٦ -
 ١٠. الحبيب يضي مقلوب - الربيع -

genuina, Boiss. الحبيب يضي مقلوب - المزارع وجوانب الطرق
oblongatum, Boiss. ب. المستطيلي. الحبيب مستطيلي يضي مقلوب - المزارع والخرق
Syriacum, Boiss. ث. السوري. الحبيب مستطيلي ديموي. وهو يتدرج الى الآتي
umbonatum, Post. ث. المعجني. القرص مجني كثيراً او قليلاً مع التقدم ذكره
P. polystrichum, Poiret et Ky. الخشخاش الكثير الشعر. كثير الغلب ديموي.
 الاوراق رحيمة المحيط ريشية مخروطية ومنصوصة وخرقها قديمة كالأصوص. الثلات مستديرة زهرية
 بلا نقطة غامقة. الانثيرات بيض كروية. الحبيب يضي مقلوب مستطيلي. القرص مخدب. السمات ٧ الى
 ٨ - الربيع - دمشق ومثاليها

P. dubium, L. الخشخاش المشبه بالسوق منرجة الحليب والاوراق وانزاد مازرته.
 الاوراق احادية التقسيم الريشي او ثنائيتها والقطع خطية رحيمة. السبلات هليبية. الثلات مستديرة نارية
 ارجوانية. الانثيرات مستطيلية. الحبيب مستطيلي مستدق القاعدة. السمات ٦ - ١٠. اذرات انترص
 غير متراكبة - الربيع - من حصص الى القدس

P. Decaisnei, Hochet et Steud. خشخاش دككين. مستطيل مستدير. الاوراق ريشية
 قطعها قصيرة رحيمة مستديرة والساقية منها مستديرة القاعدة. السبلات مسطحة. الثلات بيضاء متبوعة ودية
 ارجوانية ذات نقطة غامقة. الانثيرات مستطيلية قصيرة. الحبيب يضي مقلوب والقرص منقطع. السمات
 ٥ الى ٧ - الربيع - مزارع سيناء

P. zizianum, Boiss. et Haussk. الخشخاش الاغبر اغبر واملس الا الرجيلات المستديرة
 الحليب. الاوراق الجذرية بيضية مقبولة مستطيلة مستديرة الى رجيلة. الساقية رحيمة القاعدة ريشية
 الفصوص والقطع المثالية المسننة اسناناً كالة صلبة سرحاء. السبلات كبيرة قرمزية ذات نقطة غامقة.
 الانثيرات مستطيلية. الحبيب يضي ذو سويقة. القرص منقطع واسع الشراعات. السمات اقل من ١٢ -
 الربيع - مثالي سوريا

P. somniferum, L. الخشخاش المنوم اغبر واملس او قليل الغلب. الاوراق مستطيلية
 غير متساوية الاسنان والساقية منها قلبية القاعدة. الثلات مستديرة بيضاء او وردية محمرة حافتها

مفصومة منصصة . الحبيب يضي مغلوب ذو سويقة والقرص مفلطح - الربيع - بُزْرَع لاجل الاقيون وقد يثبت من ذاتي

P. hybridum, L. الخشخاش النغلي ⊙ هليبي . الاوراق ثنائية التفصيل الريشي وقطعها خطية .

البتلات بيضية مغلوبة محمرة ذات نقطة غامقة . الحبيب يضي كروي كثير اللململ المخفي . القرص نصف الحبيب قطراً مفصل الشرافات . السمات ٥ الى ٧ - الربيع - كثير الوجود في الاماكن المهله

P. Argemone, L. الخشخاش الاركونة ⊙ هليبي . الاوراق ريشية وخرقها حادة النصوص .

الساق منتصب . البتلات بيضية مستطيلة قرمزية باهتة ذات نقطة . الحبيب مستطيل دويبي منفرد الهلب المستقيم . القرص شراقي اضيق قليلاً من الحبيب . السمات ٥ الى ٧ - الربيع - مزارع سوريا وفلسطين

الريمريا *ROEMERIA, Medik.*

السيالات ٢ . البتلات مجمدة في التصيف . الاسدية متعددة . المبيض خطي . القلم قصير . السمات جالسة . الحبيب اسطواني نحيل احادي الغريفة خرنوبي ذو ٢٠ مصاربع الى ٤ - اعشاب سنوية ازهارها بنفسجية او قرمزية

شكل ٩



R. hybrida, L. الريمريا النغلية ⊙ الاوراق ثنائية التركيب الريشي

او ثلاثية وخرقها خطية . البتلات متوسطة . الجيوب قصيرة الهلب منفردة او مستتلة اعرض قليلاً من الزند وغالباً اطول كثيراً منه - الربيع - مزارع سوريا وفلسطين

R. Orientalis, Boiss. الريمريا الشرقية (سليج) ⊙ الاوراق

ريشية وقطعها بيضية مستطيلة او مسنة . البتلات صغيرة . الجيوب طويلة الهلب المتفرق اعرض من الزند وغالباً اطول منه قليلاً واحياناً اقصر منه - اودية سينا . شمالي مصر

R. rhaediflora, Boiss. الريمريا الرياسي الزهر ⊙ الاوراق ثنائية

التفصيل الريشي وقطعها خطية . البتلات كبيرة قرمزية . الجيوب ملساء الا انها ذات هلب قليل بقرب قمته - الربيع - دير عطية شمالي دمشق

خرنوبية الريمريا
النغلية

الكلوسيوم *Gl. acutum*, Tourn.

السبلات ٣. البتلات ٤ ملتفة معاً في التصييف. الاسدية متعددة. الجيب اسطوانى نخيل خرنوبى ثنائى الثغيفات والمصاريع. المشيتان متصلتان بالحاجز الاسفنجي - اعشاب ازهارها صفراء او صفادية ونادراً قرمزية

* المبيض ذو شعر او ابر أكثر او اقل

G. corniculatum ١ *Arabicum* ٢ *grandiflorum* ٣ *Aleppicum* ٤

** المبيض درني

G. luteum ٥ *leiocarpum* ٦

١. *G. corniculatum*, L. الكلوسيوم القرني (حشيشة الماميتا) - جميع الاوراق ريشية وقطعها مسننة ومستطيلة الا العليا وفي يعضة مقلوبة مجذومة الفه. السبلات قصيرة الغشاء. الخرنوبيات ٢٠ متر الى ٣٠ طولاً مخشنة بهليب ملازم غليظ القاعدة الربيع *Phoeniceum*, D.C. ب. الفينيقي. الازهار برتقالية وقد تكون ذات بقعة أرجوانية. مزارع سورية وفلسطين، يدق الفلاحون اوراقه ويستعملون عصاها كعصار الخشخاش للتسكين في الرمد فبعضونه على خرق يكبدون بها الجفون

٢. *G. Arabicum*, Fresen. الكلوسيوم العربي (النعمانة) - ما قبل اواخر اذار. الجذرية قيثارية ٢٠ متر الى ٣٠ طولاً وقطعها يعضة كاتبة متساوية الاسنان. العليا معاننة ذات ٣ قصوص الى ٥ خطية مجذومة. السبلات حلزمية عفاية. البتلات صفراء. الخرنوبيات مستقيمة ذات ٥ م قيل ملازم غليظ القاعدة او مستلسة - الربيع - اودية سيناء

٣. *G. grandiflorum*, Boiss. et Huet. الكلوسيوم الكبير الزهر: اغبر صوبي. الجذرية قيثارية وقطعها يعضة مقلوبة مستطيلة والساقية معاننة ريشية. السبلات حلزمية شامية. البتلات كبيرة صفادية برتقالية ذات نقطة بفسجية. الخرنوبية ٢٠٨ متر الى ١٠٠ ذو. ملازمة الغشاء وطويلة - الربيع - قلدون شمالي الشام

٤. *G. Aleppicum*, Boiss. et Haussk. الكلوسيوم الحلبي: اخضر متفرق الخبيبات القصصة. جميع الاوراق ريشية وقطعها مستطيلة مفصلة الى فصيصات حموية. السبلات طويلة عريضة ملساء. البتلات كبيرة قرمزية. الخرنوبية ملازمة الغشاء - الربيع - مزارع حب

G. luteum, Scop. ٥ . **الكليوم الاصفر** ⊙ او 24 اغبر حلبي خلي . الاوراق المجذرية
قيشارية وقطعها بيضية . والاوراق العليا قليلة عريضة القاعدة ومعانفتها بيضية خليجية التفصص . السبلات
حليبية عنائية اكثر اقل . البتلات صفراء . الخزنية طويلة (٢١٠ متر - ٢٢٠) مخشنة بدون ايض .
فصوص السمات كالة - الربيع والصيف - ساحل سورية وفلسطين المجري
G. lelocarpum, Boiss. ٦ . **الكليوم الاملس الثمر** 24 حلبي خملي او مستلس .
الاوراق المجذرية قيثارية وقطعها مستطيلة مسننة والعليا بيضية او مستطيلة قليلة القاعدة خليجية التفصص .
السبلات قليلة الملب او مستلسة . البتلات صفراء . الخزنية ملساء . مستندة مخنقة كثيرا او قليلا بين الزهور
- الصيف - تحت جرود لبنان والجبل الشرقي

الهيكوم HYPECUM, L.

السبلات ٢ . البتلات ٤ ملينة معا في التصيف مرتبة زوجين غير متشابهين . الاسدية ٤ . المبيض
خطي ذو غريفة واحدة . السمات ٢ . اللومنت مفصل عرضا وفي كل تفصيلة برة ذات اربل - اعشاب
سنوية اوراقها ثنائية التفصل الريشي وازهارها صفراء

* البتلات الخارجية ثلثة الفصوص

H. procumbens, L. ١ . **الهيكوم المتكى** ⊙ السوق متصاعدة او مستلقية . السبلات
شکل ١٠



لومنت الهيكوم المتكى
ب الكبير الزهر

مدببة مسننة او كاملة . البتلات الداخلية ثلثة النطع فالتطعتان الجانبيان
منها خطبتان والمتوسطة ملعقة ذات هدب . اللومنتات منتصبه مخنقة
مخنطة طولاً مخنقة بين الزهور - الربيع - بادية سينا

grandiflorum, Post. ب . **الكبير الزهر** . منتصب السوق .
الاوراق مشرحة طويلة المخرق . . الازهار اكبر واقتم لونا ما في الرمز .
يتنارج الى الرمز (*R. grandiflorum, Benth.*) - كثير الوجود في
مزارع سوريا وفلسطين

H. imberbe, Sibth. ٢ . **الهيكوم العادم اللحية** ⊙ السوق متصاعدة او مستلقية . السبلات
مسننة . البتلات الداخلية بنفسيبة القاعدة والمخرقة المتوسطة منها زورقية كاملة الحافة . اللومنت منتصب
نحيل مخنط طولاً - غرة . الشواطئ قرب الاسكندرية وادي قير

شرح الشكل ١٢. (ذ) زهرة من الشاهنرج المعمم. (ر) السهولة البيضاء مكبرة قليلاً. (ز) البتلة العليا. (س) البتلة السفلى (ش) إحدى البتلتين الجانبيتين. (ص) خوة من الاسدية. (ض) المبيض مع قلوب. (ط) الثمر الناضج و يرى فلس عند قاعدة الزند المخفي

الكوريديالس CORYDALIS, DC.

البتلة السفلى ملفطة او منقورة. حزمة الاسدية العليا ذات زائدة مهازية تدخل في مهاز البتلة العليا. السمة ذات فصين. الخرونية كثيرة البرور ذات مصراعين ينصلان من المشيمتين. البرور ذات بسباسة كاملة او احادية المنشأ الثلاثي او ثنائية. الفلوس بيضية كاملة. الزهرة ارجوانية كبيرة ٠.٢ متر طولاً. البتلة العليا هلالية. الجيب يضي. الزند منعطف منعض - الربيع - تحت الجرد من جبال طوروس الى لبنان والجبل الشرقي

١. *C. rufifolia*, Sibth. الكوريديالس السذابى الورق (شكل ١١) 24 الاوراق الساقية متقابلة قصيرة الرجلات او جالسة ثنية المنشأ وقطعها ذات رجلات وبيضية او بيضية مستطيلة كاملة او احادية المنشأ الثلاثي او ثنائية. الفلوس بيضية كاملة. الزهرة ارجوانية كبيرة ٠.٢ متر طولاً. البتلة العليا هلالية. الجيب يضي. الزند منعطف منعض - الربيع - تحت الجرد من جبال طوروس الى لبنان والجبل الشرقي

٢. *C. officinalis*, Smith. الكوريديالس الجسيم 24 الاوراق الساقية مترادفة ثنائية المنشأ الثلاثي وقطعها بيضية او مستطيلة منفصلة الى خرق مستطيلة. الفلوس اسفينية مقصوفة قصاً اصعباً. المهاز مستقيم تقريباً. الجيب مستطيل ربي. الزند متصاعد منفرج - الربيع

brachyloba, Boiss. م القصر الفصوص. قطع الاوراق قصيرة مسندبة كالة الخرق. ويقرب من دغم التلة السفلى تحذب - جبال عنتاب وكسب الى لبنان والجبل الشرقي

٣ الكروتوكينس CERATOCARPUS, Durieu.

البتلة العليا ذات مهاز وكذلك الخوة العليا من الاسدية ايضاً. السمة صغيرة منضغطة. الثمر نوعان فالسفي علة غير شافئة ذات غطاء وبزرة واحدة. والمهوي جيب رمي ذو مصراعين وبزرة واحدة مستدق الى منقار. البرور بلا بسباسة - اعشاب معبرة ازهارها مثل ازهار الشاهنرج

١. *C. trachelium*, Boiss. الكروتوكينس الفلسطيني 24 امس متعرج بنعم. الاوراق ثنائية المنشأ الثلاثي وقطعها بيضية كاملة كالة حوثة ذات رجلات. الفلوس خطية اطول قليلاً من الزندبات. العلة قدحية مجذومة مثلية. الزند مستطيل ربي. الجيب منقطع مثلي مثلاً طولاً - الربيع

٢. *C. trachelium*, Boiss. الكروتوكينس الفلسطيني 24 امس متعرج بنعم. الاوراق ثنائية المنشأ الثلاثي وقطعها بيضية كاملة كالة حوثة ذات رجلات. الفلوس خطية اطول قليلاً من الزندبات. العلة قدحية مجذومة مثلية. الزند مستطيل ربي. الجيب منقطع مثلي مثلاً طولاً - الربيع

٣. *C. trachelium*, Boiss. الكروتوكينس الفلسطيني 24 امس متعرج بنعم. الاوراق ثنائية المنشأ الثلاثي وقطعها بيضية كاملة كالة حوثة ذات رجلات. الفلوس خطية اطول قليلاً من الزندبات. العلة قدحية مجذومة مثلية. الزند مستطيل ربي. الجيب منقطع مثلي مثلاً طولاً - الربيع

الشامرج *FUMARIA, L.*

النبلة العليا ذات مهاز. خوق الاسدية العليا ذات مهاز وكثيراً ما يكون مضجلاً. السمة ذات قرنين. الفقيرة كروية تقريباً غير شاقة ذات بذرة واحدة. البذرة بلا بسباسة—جنس انواعه كثيرة النهايات تندرج بعضها الى بعض بحيث يعسر تمييزها التام

* الزنيدات المثمرة منعقة

F. capreolata | *Anatolica* | *Thureti* ٢

** الزنيدات المثمرة منقصة او منفرجة

† الازهار اصغر من ازهار الشامرج المخزني (٢)

‡ السيلات اعرض من التويج

F. micrantha ٤

‡‡ السيلات اضيق من التويج او مفتوحة

F. Vaillantii ٥ *parviflora* ٦ *asepala* ٧

†† الازهار مثل ازهار الشامرج المخزني حجماً او اكبر

١ السيلات مثل التويج عرضاً او اعرض منها

F. Gaillardoti ٨

ب السيلات اضيق من التويج

F. officinalis ٩ *macrocarpa* ١٠ *Judaica* ١١

F. capreolata, L. | الشامرج المعنم (شكل ١٢) ٥ خرق الاوراق مستطيلة متسعة

كالة حموية. السيلات بيضية اعرض قليلاً من التويج حادة السنينات نصف التويج طولاً. الفلوس اقصر من الزنيدات المنعقة. الثمر مضغوط قليلاً كروي تقريباً كالـ الربيع—كثير الوجود في—واحد سورية وفلسطين واسافل الجبال

F. Anatolica, Boiss. ٢ الشامرج الاناضولي ٥ خرق الاوراق خطية منفلجة. السلات

بيضية مدببة اعرض قليلاً من التويج ونصفه طولاً. الفلوس اطول من الزنيدة المثمرة المنعقة. الثمر كروي كالـ الربيع—مزارع سورية وفلسطين

F. Thureti, Boiss. ٣ شامرج ثبورت ٥ خرق الاوراق صغيرة منفلجة خطية مستطيلة

حادة. السبلات بيضية جرونية مسننة اعرض قليلاً من التويج وثلاثة الى نصف طولاً. الفلوس اقصر قليلاً من الزنيدات المثمرة المنعقدة. الثمر يضي كروي حاد قليلاً خشن - الربيع - قرب اهدن

٤. *F. micrantha*, Lag. الشاهترج الصغير الزهر ⊙ خرق الاوراق خطية ضيقة مبرزة.

السبلات مستديرة بيضية نصف التويج طولاً واعرض منه قليلاً. الفلوس اطول قليلاً من الزنيدات المنفرجة قليلاً. الثمر كروي محزوم قليلاً كال مغضن قليلاً - الربيع - مزارع سورية وفلسطين وحول الاسكندرية - يختلف لون ازهاره من وردي غامق الى وردي باهت

٥. *F. Vaillantii*, Loisel. شاهترج فالينت ⊙ اغبر متيس. خرق الاوراق مفلطحة خطية

ضيقة. السبلات صغيرة ثمن التويج او عشرة طولاً اضيق من الزنيدة. الفلوس مثل الزنيدات المثمرة طولاً. الثمر كروي تقريباً اسرج كال مغضن - الربيع - مزارع حلب

٦. *F. parviflora*, Lam. الشاهترج ذو الزهر الصغير ⊙ خرق الاوراق مبرزة ضيقة

خطية كالة. السبلات بيضية مسننة حادة سريعة السقوط اعرض قليلاً من الزنيدة وسدس الزهرة طولاً. الفلوس مثل الزنيدات المثمرة القليلة الانفراج طولاً. الثمر كروي مغضن حموي - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

٧. *F. asepala*, Boiss. الشاهترج العادم العبل ⊙ يابس اغبر. خرق الاوراق مفلطحة

مستطيلة خطية حادة مسندقة القاعدة. الراسيات قليلة الازهار جالسة تقريباً تعلوها الاوراق العليا. الفلوس مثل الزنيدات القليلة الانفراج طولاً. السبلات مفقودة. الثمر كروي مغضن حموي - الربيع - مزارع سورية - وربما ليس هذا النوع الاً تبايناً من السابق ذكره

٨. *F. Gaillardotii*, Boiss. شاهترج كيارادو ⊙ خرق الاوراق مستطيلة كالة.

السبلات مستطيلة حادة مسننة القاعدة وهي نصف التويج طولاً. الفلوس اطول من الزنيدة المثمرة المنفرجة قليلاً او الخنعية. الثمر كروي منضغط محزوم كال حموي درني - الربيع - مزارع سورية. نادر

٩. *F. officinalis*, L. الشاهترج الخنزري ⊙ خرق الاوراق مفلطحة مستطيلة خطية.

السبلات بيضية مدببة ثلث التويج طولاً. الفلوس اقصر من الزنيدة المثمرة المنفرجة قليلاً. الثمر قلبي مغلوب

عرضة أكثر من طولاً وسطحه مغضن - الربيع - بعلبك

١٠. *F. macrocarpa*, Farlat. الشاهترج الكبير الثمر ⊙ خرق الاوراق مفلطحة


مستطيلة رحمة. الراسم مندمج قصير. السبلات رحمة خطية مدببة اضيق كثيراً من التويج وثلاثة طولاً. الفلوس اقصر قليلاً من الزنيدة المثمرة القليل الانفراج. الثمر كبير كروي درني مغضن - الربيع - يبروت. حاصبيا. جبل الكرمل

١١. *F. Judaica*, Boiss. الشاهترج اليهودي ⊙ خرق الاوراق مستطيلة مفلطحة. السلات

مستطيلة ومجعد حادة صغيرة الاسنان القاعدية أضيق كثيراً من التوريج وهي أربعة طولاً. الفلوس نصف الزائدة المثمرة المنقصة طولاً. الثمر منضغط حاداً المحزوم كالأل الطرف درني مغضن - الربيع - ساحل سورية وفلسطين البحري وإسافل الجبال. الاسكندرية

الرتبة السادسة الصليبية. CRUCIFERÆ.

الأزهار غالباً قياسية. السبلات ٤ وغالباً ساقطة. الثلاث ٤ صليبية الترتيب. الاسدية ٦ رباعية القوة. المبيض مركب من ثمرتين ذوو غرقة أو غريفتين. الثلم واحد واللمة ذات فصين أو بسيطة. البزور عديدة على الفالب معلقة على مشيات جانبية. الثمر خرنوبي أو خرينبي أو ذوو غرقة واحدة غير شاقة أولومنت مفصل بجواجز مستعرضة - أعشاب أو أشجار عصيرها حريف أوراقها غالباً مترادفة بلز ذنبات



مهرح الشكل ١٢. (ب) زهرة من المحردل. (ت) الاسدية الرباعية القوة والمدة مكبرة. (ث) خرنوبات من الأربس الهرجي فتوى واحدة منها متعوجة والبزور معلقة بالمحوافي. (ح) واحدة من البزور مقطوعة عرضاً يظهر دخالها اللفتان المحرفتان وحولها جناح. (خ) الجدين. (د) زهرة من المتور. (د) اسديتها الرباعية القوة. (د) راسيم من الدرايا الربيعي. (ز) خرنوبي مقطوعة عرضاً. (ز) واحدة من البزور مشقوقه عرضاً وفلتناه جامبة ن

الرتبة الأولى الخرنوبية. ELFEIO. الأثمار خطية أو مستطيلة شاقة على

طولها اوعلى كل الطول الآلثة (الآ في الاندريوسكيا ٩ والقليلة ٣٤ والكرخيرا ٢٥). المصاريع توازي الحاجر وتساويه عرضاً

السبط الاول . الأربسيات . *ARABIDEE* . الاثمار خطية الآ في انسانكا ١١ وبعض الجرجار ٢ . البرور في صف واحد الآ في الجرجار ٢ . الفلقتان حرفيتان وفي الجرجار جانبيتان

١ . *Matthiola* . الخرنوبيات طويلة . السمات قرنية . اعشاب صوفية بيضاء

٢ . *Cheiranthus* . الخرنوبيات رباعية الزوايا . فصا السمة منفردان . نجمات مستشبية

بشعر منشعب

٣ . *Nasturtium* . الخرنوبيات مستطيلة مستفحة . اعشاب خضراء ريشية الاوراق ازهارها بيضاء

او صفراء

٤ . *Nasturtiopsis* . الخرنوبيات اسطوانية مستفحة . اعشاب خضراء من بادية سينا واليه تشبه

السابق ذكره

٥ . *Barbarea* . الخرنوبيات رباعية الزوايا قليلاً . اعشاب سوفها رباعية الزوايا ازهارها صفراء

٦ . *Arabis* . الخرنوبيات مفلطحة ذات زوايا غير بارزة . اعشاب اوراقها الجذرية ملوقية

٧ . *Cardamine* . الخرنوبيات مفلطحة بلا اعصاب . الاوراق ريشية . الازهار بيضاء او ارجوانية

٨ . *Merettia* . الخرنوبيات اسطوانية منخبة . اعشاب صوفية او غنائية بيضاء مخضعة بالبادية

٩ . *Andreoskia* . الخرنوبيات خطية غير شافة ذات قرنتين منضغطة مجانة

١٠ . *Notoceras* . الخرنوبيات قصيرة . الاوراق كاملة . الازهار صغيرة بيضاء . اعشاب شبيهة

١١ . *Anastatica* . الخرنوبيات ذات اذبتين . الفروع خشبية حين الاثمار . اعشاب مخضعة بالبادية

او بجوارها

السبط الثاني . السسبيريات . *SISYMBRIEAE* . الخرنوبية خطية . البرور في صف واحد .

الفلقتان جانبيتان مستقيمتان او ملفتان معاً او مطبوقتان (وفي كورنيجيا ١٧ مطبوقتان)

✱ السمة ذات صفيتين

١٢ . *Hesperis* . صفين السمة منتصبتان

١٣ . *Malcolmia* . صفين السمة مجنعتان على هيئة مخروط راجعتان على القلم

١٤ . *Eremobium* . صفين السمة مجنعتان على هيئة مخروط غير راجعتين على القلم

✱ السمة جالسة او قصيرة النصين

† نباتات غير شبيهة وبلا هلب ملازم منشعب

١٥. *Sisymbrium*. الخرنوبية خطية اسطوانية. المصاريع ذات عصب ١-٢. الاوراق ريشية

١٦. *Alliaria*. كالسابق ذكره الآن الاوراق كlobية قلبية بيضبة

١٧. *Conringia*. الخرنوبيات طويلة. الاوراق الساقية مستطيلة كاملة قلبية معانقة. الازهار كبيرة صفراء

†† نباتات شبيهة ذات هلب منشعب ملازم

١٨. *Erysimum*. الخرنوبيات رباعية الزوايا او اسطوانية. السبلات الجانبية ذات تحدب قاعدي

السبط الثالث. البراسيكيات. *BRASSICÆ*. الخرنوبية خطية او مستطيلة (وفي كرخنبرا

٢٥ مستديرة. الفلقتان مطويتان

* الخرنوبية خطية

† البنور في صف واحد بلا جناح. الازهار بيضاء او صفراء

١٩. *Brassica*. المصاريع ذات عصب واحد.

٢٠. *Sinapis*. المصاريع ذات ٢ اعصاب

†† البنور في صنين بلا اسنجة. الازهار صفراء او ارجوانية

٢١. *Diploxia*. المصراع ذو عصب واحد. الازهار صفراء

٢٢. *Moricandia*. المصراع ذو عصب واحد وثلاثة اعصاب مضخمة. الازهار ارجوانية

*** الانمار مستطيلة او مستديرة ذات منقار

٢٣. *Ernen*. الثمر مستطيل ذو منقار طويل اقل من المبيض عرضاً

٢٤. *Savignya*. الثمر اهليلجي متعق. المصاريع قرطاسية. الفلم سجلي

٢٥. *Carrichteria*. الثمر مستدير تقريباً. المنقار وري. المبيض ذواربع غرغرات في كل

منها بذرة

الرتبة الثانية الخرنوبية. *SILICULOSÆ*. الثمر جربينية تنشق على طولها

اولى قرب قمته او غير شاذة (اما ثمر الريبكوتيا الخنجية ٢٦ والفرستيا الطويلة الخرنوبية ٢٧ والثنا ليمم الخيطي الورق ٢٦ والكمينا الشاذ ٢٧ فخطي)

١ المصاريع مفلطحة على موازاة المحاجر او غير مفلطحة

السبط الرابع. الاليسينيات. *ALYSSINÆ*. الخرنوبية بيضبة او اهليلجية او مستديرة او

مستطيلة والبروري في صنفين . الفلفتان حرفيتان

* الأثمار كبيرة اهليلجية او خطية واحياناً خيلية

٢٦. *Ricotia* . الأزهار مفلحة ذات برزتين الى ٧ غير مجتمعة . الاوراق ريشية . الأزهار ارجوانية

٢٧. *Furcraea* . الأثمار اهليلجية او خطية . البرور مجتمعة . الشعر متشعب . الأزهار صفراء

٢٨. *Fibigia* . الأثمار مستديرة او اهليلجية . البرور عريضة الجناح . الشعر كوكبي

* * الأثمار صغيرة مستطيلة او بيضية او مستديرة

٢٩. *Aubrietia* . الأثمار مستطيلة متفخمة . نباتات صوفية اوراقها بيضية مقلوبة ازهارها ارجوانية

٣٠. *Coluteocarpus* . الثمر قرطاسي متفخ . البرور اقل من ٨ وهي بلا اجنحة

٣١. *Koniga* . الثمر مستدير تقريباً مفلطح . الحاجر شبكي

٣٢. *Alysum* . الثمر مستدير او يضي مفلطح . البرور غالباً ١ في كل غرقة واحياناً غير

محدودة العدد

٣٣. *Draba* . الثمر مستطيلي مفلطح . البرور عديدة بلا اجنحة . اعشاب حزامية يتلائها كاملة

٣٤. *Erophila* . مثل السابق ذكره الا ان البتلات ذات فصين او خرفتين

٣٥. *Cochlearia* . الثمر مستدير . اعشاب ملساء اوراقها لحمية في نوعنا الواحد

السبط الخامس . الكهلينيات . CAMELINEAE . الأثمار مستطيلة او بيضية او بيضية مقلوبة

او كروية . البرور في صنفين . الفلفتان جانبيتان

* الأثمار مستطيلة

٣٦. *Leptaleum* . السبلات والبتلات خطية . اعشاب صغيرة اوراقها خطية

* * الأثمار صغيرة متفخمة

٣٧. *Camellina* . الخرنبيبات بيضية مقلوبة ذات منقار

ب . المصاريع مفلحة تلتصق بمخالفنا الحاجر

السبط السادس . الليدينيات . LEPIDINEAE . الثمر قصير . المصاريع زورقية . الفلفتان

جانبيتان او مطويتان او ملتفتان معاً

* المصاريع بلا اجنحة

٣٨. *Capsella* . الأثمار كثيرة البرور بيضية مقلوبة او مستطيلة

٣٩. *Lepidium* . الأثمار ذات برزتين او ٤

* * المصاريع مجتمعة الظهر والقة

٤٠. *Ethionema*. الثمر مستدير زورقي

٤١. *Schouwia*. الثمر بيضي مستدير مقلطح

السبط السابع. الثلاثسبيات. *THLASPIDIÆ*. مثل المتقدم ذكره الآت الفلتان

حرفتان

* الخرينبيات مستديرة نوامية

٤٢. *Biscutella*. أعشاب سنوية عفاية ذات ازهار صفراء

* * الخرينبيات مستطيلة أو اسفينية مقلوبة أو بيضية مقلوبة أو قلبية مقلوبة

٤٣. *Heldreichia*. الخرينبية اسفينية مقلوبة عريضة. الأوراق لحمية مقلوبة

٤٤. *Thlaspi*. الخرينبية بيضية مقلوبة مفروضة القبة. البتلات متساوية الآ في الثلاثسبي

الاناضولي. التزهير راسي

٤٥. *Iberis*. الخرينبيات كما في المتقدم ذكره. البتلات زوجان مختلفا الحجم. الازهار صبوانية

٤٦. *Carpoceras*. الخرينبيات مثلثة مقلوبة ذات قرتين

السبط الثامن. السنبياريات. *SENEBIERIÆ*. الثمر مولف من جويزين غير

شاقبتين في كل منها بذرة وهما تنفصلان من المحاجر عند النضج

٤٧. *Seneciera*. المجوزيات. مشبكة السطح

السبط التاسع. الايساتيات. *ISATIDÆ*. الثمر غير شاق وغير منفصل وقد تكون جويزية

مصحفة أو غير مصحفة ذات غرينة واحدة وبذرة أو ٢ أو ذات غرينتين أو ٤ في كل منها بذرة. ازديدات دقيقة

منعقنة في الانمار على الغالب

* الانمار مصحفة

+ الفلتان حرفتان. الانمار مستديرة

٤٨. *Peltaria*. الانمار كبيرة. الاسدية بلا معلقات

٤٩. *Clypeola*. الانمار صغيرة. الاسدية ذات معلمات قاعدية

+ الفلتان جانبيتان

٥٠. *Isatis*. الانمار مستديرة أو مستطيلة أو خطية قرنية أو عظمية ذات حوافي سنجانية أو

قرطاسية

+ + الفلتان مقلوبتان طولاً

٥١. *Boreava*. الاثمار بيضية قشرية ذات ٤ اجنحة

* * الاثمار بلا اجنحة

† الفلتان جانبيتان مستقيمتان او ذات غضون مستعرضة

٥٢. *Neslia*. الاثمار صغيرة كروية مشبكة السطح. القلم محزري

† † الفلتان ذات غضون طولية

٥٣. *Texiera*. الاثمار كروية. الغلاف المتوسط اسفنجي. الغلاف الباطن عظمي

٥٤. *Calepina*. الاثمار صغيرة مستطيلة مغالطة سنية السطح

٥٥. *Schimpera*. الاثمار صغيرة بيضية منحرفة ذات منقار منحرف سيني

٥٦. *Myagrum*. الاثمار قيثارية تقريباً. القلم قصير. الثريقات ٣ فالمتوسطة منها مثمرة

٥٧. *Euclidium*. الاثمار صغيرة ذات غريقتين. درز المصراع غير الشاق واضح

٥٨. *Ochthodium*. الثمر صغير رباعي الجوانب تقريباً. الروايا خشنة. القلم مفقود

٥٩. *Bunias*. الثمر رباعي الجوانب محبب ذو منقار و ٤ غريقات

٦٠. *Zilla*. الثمر يضي هري قشري ذو منقار وغريقتين. اعشاب شوكة بجها الجبل

الرتبة الثالثة اللومنتية. *LOMENTACEÆ*. الاثمار قصيرة او طويلة منتصبة او

منقارية من الانتصاب مفصلة بمحاجر مستعرضة

السيط العاشر. الكاكيليات. *CAKILINEÆ*. الثمر مفصل فالتفصيلة السفلى غير شاقة

او شاقة والفواصل العليا شاقة. الفلتان حرفيتان او مطويتان

* التفصيلة السفلى غير شاقة

٦١. *Crambe*. التفصيلة السفلى زبدية والعليا كروية

٦٢. *Erapistrum*. التفصيلة السفلى خالية او ذات برزتين او ٣. العليا مضلعة او غير متساوية

ذات بذرة واحدة

٦٣. *Edidesmus*. مثل المتقدم ذكره الا ان التفاصيل متساوية تقريباً

٦٤. *Cakile*. التفصيلة السفلى مزدوجة ذات غريفة واحدة والعليا سيفية ذات بذرة واحدة

٦٥. *Elaeagnocarpus*. اللومنت طويل. كل واحدة من تفصيلتيه ذات برزتين الى ٦

٦٦. *Thellonea*. مثل المتقدم ذكره الا ان التفصيلة العليا تستدق الى منقار متلف

** النصفيلة السفلى شاقة ذات مصراعين

Erucaria. ٦٧. النصفيلة السفلى اسطوانية والعليا كروية او مستطيلة

السبط الحادي عشر. الرَفْنِيَّات. RAPHAÑE E. الثمر غير منصل غير شاق اسطواني وقلادي ذو غريفة واحدة وبزور عديدة او غريفات عديدة مصطنعة صغين تنصل اخيراً. الفلتنان اطويتان او جانبيتان

* الثمر ذو غريفة و٢ بزور الى عدد غير محدود او عدة غريفات بعضها فوق بعض في كل منها بذرة

Raphanus. ٦٨. الثمر اسطواني او مخروطي او قلادي. البزور كروية

Anchonium. ٦٩. الثمر مخنق او اسطواني. البزور قليلة مستطيلة عريضة

** غريفات الثمر المخنق مصطنعة صغين ذات بذرة واحدة

Chorispora. ٧٠. القلم طويل

Sterigma. ٧١. القلم قصير

١ المشور MATTHIOLA, R. B.

الكأس متصبة محدبة القاعدة. التلات ذات مغالب. الخرنوبات منضغطة ونادراً اسطوانية ضخمة الحاجز. فصا السمة راجمان. البزور في صف واحد مضغوطة - اعشاب صوفها متفرع او كوكبي ازمارها بنفسجية او صفراء مكيدة او مزرق

* معبرة

M. crassifolia 1 Damascena 2 Arabica 3

** سنوية

M. tricuspidata 4 humilis 5 bicornis 6 asper 7 oxyceras 8 livida 9

M. crassifolia, Boiss. et Gaill. 1. المشور الضخم الورق 2 ابيض الحريف المبادي.

الاوراق مستطيلة كالة الاجوان او كاملة. الزينة نصف الكأس طولاً الى ١/٢. التلات بنسبية. الخرنوبات طويلة ضخمة ملازمة الصفوف. السمة اقل عرضاً من الخرنوبية بثليل - الربيع - بقرب شاطئ بيروت وصيدا

pinnatifida, Post. ب. الريشي المخرق. الأوراق السفلى ريشية المخرق. الزيدات ربع

الكاس طولاً - يبروت

٢. *M. Damascena*, Boiss. المثنور الدمشقي 24 الصوف لبادي فروي. السوق ضخمة

بسيطة أو متفرعة من القاعدة. الأوراق بيضية مستطيلة خليجة أو ذات فصين أو كبيرة على كل جانب.

البتلات صفراء مكعدة. الخرنوبية طويلة رمادية صوفية - الربيع - ناول كلسية قرب دمشق

٣. *M. Arabica*, Boiss. المثنور العربي 24 صوفي مستشيب كثير

السوق المتفرعة من القاعدة اليابسة. جميع الأوراق رحيمة خطية كاملة. الأزهار

جالسة. البتلات خطية رحيمة مزرقه مكعدة. الخرنوبيات منفرجة زغبية مخنية

معوجة. السبة بيضية أعرض قليلاً من الخرنوبية - الربيع - اماكن حجرية في

طورسينا

٤. *M. tricuspidata*, L. المثنور الثلاثي الانياب ٥ لبادي

مستشيب متفرع. الأوراق خليجة ريشية المخرق مستديريتها. الزيدة ثلث الكاس

طولاً. البتلات بيضية مقلوبة. الخرنوبيات منفرجة اسطوانية لبادية. السمة مخززية

مجهزة عند قاعدتها بقرنين مثلها طولاً أو أطول منها - الربيع - شواطئ

سورية وفلسطين

٥. *M. humilis*, D.C. المثنور السافل ٥ رمبادي لببيدي واطى. خرنوبية المثنور الثلاثي

الانياب

الأوراق خطية رحيمة مسننة أو ريشية المخرق. الأزهار جالسة. البتلات بيضية

مقلوبة. الخرنوبيات يابسة اسطوانية. السمة مخروطية. القرنان منفرجان مثلثان مثل قطر الخرنوبية

طولاً أو أطول منه - الربيع - الرمل قرب شواطئ بحرية مصر

٦. *M. bicornis*, Sibth. المثنور ذو القرنين (يابان مثنوي) ٥ رمادي الساق متفرعة.

الأوراق مستطيلة رحيمة ريشية المخرق والعليا منها خطية كاملة. الأزهار جالسة تقريباً. البتلات مستطيلة

بيضية مقلوبة. الخرنوبيات اسطوانية رمادية. السمة قصيرة جدًا. القرنان افتيان أو متجهان الى الاعلى

وها ٤ أو ٥ أضعاف قطر الخرنوبية طولاً - مزارع عينتاب والدمس

٧. *M. aspera*, Boiss. المثنور الخشن ٥ خشن ذو شعر متفرع مخضر. الساق واطى.

الأوراق مستطيلة رحيمة كالة مضحلة الاجوان. الأزهار جالسة. البتلات مستطيلة ملوقية. الخرنوبيات

اسطوانية منفرجة يابسة. السمة مخروطية مستطيلة كثيراً أو قليلاً. القرنان منفرجان أو متصبان ضعف

قطر الخرنوبية طولاً. - الربيع - بين مارسابا وبحر لوط

٨. *M. oxyceras*, D.C. المثنور الحاد القرن (قُرَيْنة) ٥ الزغب قصير مستشيب



N. Niloticum, Boiss. ٢ . الجرجار النيلبي 24 الأوراق قبيّارة ريشية قطعها مستطيلة كبيرة الفصوص فالفصوص العليا متصلة . الأزهار صغيرة . البتلات بيضاء وردية مستطيلة خطية أطول من الكأس . الخرنوبات خطية منتفخة مستدقة الطرفين ، الزينة أطول قليلاً من قطر الخرنوبية - الدثاء والربيع - أرياف مصر العليا

N. palustre, Leyb. ٣ . الجرجار المستنقي 24 الأوراق السفلى قبيّارة والعليا لاذنية القاعدة ريشية قطعها مستطيلة مسنة . الخرنوبات أقصر قليلاً من الزينات المنفرجة ، مستطيلة منتفخة حموية - الربيع - ذالية مصر

N. sylvestre, L. ٤ . الجرجار الاجسي 24 ام الجذور زحافة . السوق متفرعة . الأوراق ريشية النص او التنصل قطعها مستطيلة اورحية وفي الأوراق العليا كثيراً ما تكون خطية . الخرنوبات خطية مثل الزينة طولاً او أطول منها - الصيف - لبنان

N. macrocarpum, Boiss. ٥ . الجرجار الكبير الثمر 24 امس . ام الجذور ضخمة والسوق كثيرة متشعبة . الأوراق الجذرية طويلة الريشات مستطيلة كاملة او قبيّارة والساقية ذات اذينات ومقسومة الى خرق خطية كاملة . الراسم المثر متعرج . الخرنوبات طويلة (٢.٠٣ متر الى ٢.٠٤) خطية منضغطة ٤ - ٥ اصعاف الزينة طولاً وهي مستدقة الى قلم طويل - حزين - عين آتى . بين حاصبيا وراشيا

٤ الجرجير *NASTURTIOPSIS*, Boiss.

الكأس متساوية القاعدة . البتلات كاملة منفرجة الصفيحة . الخويطات مستقلة بلا سنية ومتسعة من الاسفل . الفديدتان المشيمتان طويلتان نصفهما التمة والمصراعمان نصفاً حويين . السمة غير مقسمة . الخرنوبية اسطوانية منتفخة - اعشاب مخفضة ازهارها صفراء وشعرها بسيط

شكل ١٥



N. Arabica, Boiss. ٥ . الجرجير العربي ٥ منصاعداً ومتكى غير كثيف الرغبة باهت الخضرة . الأوراق الجذرية ذات رجيلات والجميع مستطيلة مستدقة القاعدة كالة الاسنان او مشطية ريشية . الخرنوبات مثل خرنوبية الجرجير العربي زيناتها طولاً والزينات شعريّة منفرجة مخنية الى الاعلى . السمة جالسة . البزور في صنفين - الربيع - بادية سينا واليه

BARBAREA, R. Br.

٥ البربريا

الكاس متعصب تقريباً متساوية القاعدة . البتلات ذات مخالب . الصفائح كاملة . الخرنوبية رباعية الزوايا محزومة المصاريح او مضلعة . القلم قصير . السمة مفروضة قليلاً . البزور في صف واحد مستطيلة غير محرفة - اعشاب ازهارها صفراء

B. plantaginea, D. C. البربريا البلانجنية ① الاوراق السفلى مستطيلة مسنة او

قشارية قليلاً وفصوصها الجانبية صغيرة . الاوراق العليا مستطيلة مسنة . الراسيات مندججة قبل الاجسام . الخرنوبيات ٢٠٢ متر او اكثر طولاً نحيلة منفرجة قليلاً منسية . القلم طويل - الصيف - الجبال قرب عيتاب . لبنان

B. Sicula, Presl. البربريا السييلية . الاوراق السفلى قشارية والفص الاخير

بيضي والفصوص الجانبية صغيرة او مفردة . الاوراق الساقية ريشية منفصلة الى قطع خطية . الراسم مسنسل . الخرنوبيات منفرجة قصيرة دقيقة معنّدة متنبهة بنم مثل عرضها طولاً شكل ١٧ - الربيع - راشيا



B. minor, C. Koch. البربريا الصغرى 2٤ مستلس . ام الجذور

افقية . الاوراق الجذرية صغيرة بيضية مستطيلة كاملة او مضلعة الاجوان . الساقية طويلة الاذنبات القاعدية محروقة ريشية او قشارية . العليا غير منقسمة مسنة .

الخرنوبيات منفرجة ٢٠١٥ متر طولاً . القلم مثل عرضها طولاً - الصيف - خرنوبية البربريا الصغرى سواق لبنان والجبل الشرقي والبقاع

٦ الاريس ARABIS, L.

الكاس متعصب متساوية القاعدة او ذات حدين . البتلات ذات مخالب . السمة غير منقسمة او مفروضة . الخرنوبية جالسة خطية منضغطة ومصاريحها مفلطحة او محدبة . البزور في صف واحد ونادراً في صفين - اعشاب ازهارها بيضاء او بنفسجية

* البزور بلا اجنحة او ذات اجنحة صغيرة جداً

† سنوية

٤ Ancheri ٣ auriculata ٢ Montbretiana ١ verna A.

† † محولة او معمرة

A. laxa o *sagittata* ٦ *albida* ٧ *aubrietoides* ٨

** البنور ذات الجحفة عريضة

A. turrita ٩

١. *A. verna*, L. الأريس الربيعي ٥ متفرع الغناء. الساق بسيط او قليل الفروع. الاوراق

مسننة والجذرية منها بيضية مقلوبة. الساقية بيضية قلبية القاعدة. الراسيم قليل الازهار. الزنيدة اقصر من الكاس. الازهار بنفسيحة. الخزنوية متصببة منضغطة مثل زنديها الضخمة عرضاً - اول الربيع - ساحل سورية البحري وجبالها وفلسطين

٢. *A. Montbretiana*, Boiss. الأريس المونتبريماني ٥ متفرع الغناء. الساق بسيط.

الاوراق صغيرة الاسنان والجذرية منها ملوقة مستطيلة والساقية سهبية القاعدة بيضية مستطيلة. الزنيدة اقصر قليلاً من الكاس. الازهار صغيرة بيضاء. الراسيم المثر طويل مستقيم. الخزنويات طويلة منفرجة اعرض قليلاً من الزنيدة مقلطحة معقدة قليلاً - الربيع - لبنان والجبل الشرقي وجبل الشيخ

٣. *A. auriculata*, Lam. الأريس الاذنية ٥ متفرع الغناء. الساق متفرع. الاوراق

غير منتظمة الاسنان والجذرية منها مستطيلة والساقية قلبية سهبية القاعدة بيضية مستطيلة. الزنيدة اطول من الكاس. الازهار صغيرة بيضاء. الراسيم المثر منفرج. الخزنويات منفرجة اعرض قليلاً من الزنيدة. البنور محاطة بخط - الربيع - الجبل الشرقي وجبل الشيخ. البلقاء

Sinaica, Boiss. ب السيناي. اصفر وادق من الرمز - وادي الاربعين في سينا

٤. *A. Aucheri*, Boiss. اريس أوشر ٥ مستشيب بالشعر المتفرع. الاوراق مسننة مستطيلة.

السوق قليلة الفرع. الزنيدة اقصر من الكاس. الازهار صغيرة بيضاء. الراسيم المثر طويل مسترسل. الخزنويات منفرجة قليلاً منفرقة الغناء مثل الزنيدات الضخمة غلظاً - الربيع - المزارع من عيتاب الى دمشق

٥. *A. laxa*, Sibth. et Sm. الأريس المسترسل ٥ الساق عال متفرع. الاوراق الجذرية

قيثارية كالة متفرعة الزغب وقصيرة. الساقية مستطيلة حادة كاملة عريضة الاذينات كالتها. الراسيمات مندبجة. البتلات بيضاء. الخزنويات ٦ - ٨ اضعايف زنديها طولاً مصطنة على جانب واحد منفرجة ذات اربع زوايا. القلم طويل. البنور محرفة قليلاً - الربيع - الجبل الاقرق

٦. *A. sagittata*, Bertol. الأريس السهبي ٥ غفائي. الاوراق الجذرية مستطيلة مسننة.

الساقية منفرجة قليلاً مستطيلة قلبية سهبية القاعدة اذنياتها منفرجة. الخزنويات متصببة خطية معقدة. البنور ضيقة الحواجب - اول الصيف - لبنان

A. albidia, Stev. ٧ ، الأريس المبيض 2٤ مستقيم . الساق مخفض بسيط أو قليل التفرع .
الأوراق المجذرية بيضية مقلوبة كالة . الساقية بيضية قلبية معانقة قليلة السنينات . البتلات بيضاء كبيرة
ضعفا الكاس ٢٠ أضعاها طولاً . الصفيحة بيضية مقلوبة تستدق قاعدتها فجأة . الخرنوبيات معقدة
مفرجة قليلاً . البنور ضيقة الحواجب - الصيف - تحت أجرو لبنان . نوع أزهارها أكبر من سائر
الأنواع الشرقية

umbrosa, Boiss. ب. القبي . مخضر . السوق طويلة غضة . أسنان الأوراق منفردة أو مضحكة

— جبة لبنان . بلدان وجوارها

thyrsoides, Boiss. ت. السماقي . مخضر قزم . الأوراق صغيرة قليلة الأسنان . الراسبات

مندمجة . الخرنوبيات قصيرة متصبه — ظهر الفضيض

brevifolia, Boiss. ث. القصير الأوراق . لبادي أشيب . السوق حزمة قصبة . الفروع

قصيرة . الأوراق صغيرة قليلة الأسنان . الخرنوبيات متصبه — لبنان والجبل الشرقي

Billardieri, Boiss. ب. بليارديار . مثل المنادم ذكره الآن الأوراق ذات سنّ أو سنين

والخرنوبيات طويلة مفرجة — صوفضاع . لبنان . الجبل الشرقي

A. aubrietoides, Boiss. ٨ . الأريس الشبيه بالآوبرياتيا 2٤ لبادي مستشيب أكثر

أو أقل أو أخضر مخفض حزمي . الجذوع قصبة . الأوراق صغيرة فالسلي منها بيضية مقلوبة كالة قليلة الأسنان

كالتها . الساقية بيضية قلبية القاعة معانيتها حادة ذات أسنان حادة . الراسم قصير قليل الأزهار .

البتلات أرجوانية ثلاثة أضعااف الكاس طولاً ومغلها منبثق والصفيحة بيضية مقلوبة . الخرنوبيات طويلة

متصبه معقدة . البنور ضيقة الحواجب — الصيف — زحلة

A. turrita, L. . الأريس البرجي (انظر شكل ١٢ . ث ج ح) ⑤ متفرع الرغييب . الساق

متصب بسيط تقريباً . الأوراق صغيرة الأسنان والمجذرية منها اهليجية مستدقة إلى الرجلة والساقية مستطيلة

قلبية معانقة كالة الاذينات . الراسم ذو فلولس والأثمار مصطفة على جانب واحد . الزناد متصبه في

الاول ثم معقنة . الخرنوبيات طويلة مفلطحة معقدة ضخمة المحافة . البنور عريضة الجناح — الربيع —

جبل الكام

٧ الكرذمينة CARDAMINE L.

الكاس متساوية القاعة متصبه أو مفتوحة . البتلات ذات مخالب . الخرنوبيات خطية أو رحيمة

منضغطة والمصاريع ملفطة عادمة الاعصاب فاتحة هرونها. السمة بسيطة تقريباً - اعشاب سنوية او معمرة ازهارها غير صفراء

١. *C. hirsuta*, L. الكردمينة العفائية ① امس في اقليمنا. الاوراق ريشية ذات زوجين الى ٤ من الوريقات. وريقات الاوراق الجذرية مستديرة بيضية ذات رجليات والانتهائية منها اكبر من الجانبية. وريقات الاوراق العليا خطية طويلة. الازهار صغيرة يعلوها الخرنوبيات غير الناضجة المنتصبة. القلم اقصر من عرض الخرنوبيات - الربيع - مزارع سورية وجوانب طرقها

٢. *C. pratensis*, L. الكردمينة المرجية 24 ام الجذور تكاد لا تحمل ستولونات. الساق منقط. الاوراق ريشية. وريقات الاوراق الجذرية مستديرة بيضية والانتهائية منها اكبر من الجانبية وكوية. وريقات الاوراق الساقية خطية كاملة. الازهار وردية اللون. الخرنوبية منتصبة. القلم ضخم مثل عرض الخرنوبية طولاً - الربيع - مزارع مصر قرب القاهرة

٣. *C. uliginosa*, M. B. الكردمينة الرطبة 24 ام الجذور ذات ستولونات. الساق مثلم. الاوراق ريشية ذات ٥ ازواج الى ٧ كاملة الوريقات او زاويتها. وريقات الاوراق السفلى بيضية او مستديرة وذات رجليات. وريقات الاوراق العليا مستطيلة. الازهار صفراء كبيرة الانتيرات. الخرنوبيات يابسة. القلم ضخم مثل عرض الخرنوبية طولاً - الصيف - تحت جرد لبنان وشرقها الى الدجلة

٤. *C. Graeca*, L. الكردمينة اليونانية ① امس او قليل الهديات. الاوراق ريشية وريقاتها بيضية منقصة او منضغطة ذات رجليات والانتهائية منها اسنينة. الخرنوبيات منتبهة بقلم مزدوج اطول من عرضها ويحزم على الجانبين - الربيع - غابات صخرية في الجبل الاقصر

الرَّحْمِي MORETTIA, D.C.

الكاس منتصبة متساوية القاعدة. البتلات مستطيلة خطية كاملة. الاسدية مستقلة عادمة الاسنان. الخرنوبية قصيرة اسطوانية رباعية الزوايا. القلم قصير. السمة ضخمة القاعدة متشعبة - اعشاب معمرة تنصلب اخيراً وهي منفرعة ملبسة صوفاً كوكبياً. الازهار يضاء وردية باهتة

١. *M. Philaena*, Del. الرحمي الفيلاني 24 الصوف قصم خشن سريع الانفصال. الساق ضخم متصاعد. الاوراق قصيرة. الرجليات مستطيلة ضخمة الاجوان. مخالب البتلات اقصر من الكاس الحشنة. الخرنوبيات ١٢ م. الى ١٨ م. طولاً رباعية الزوايا منحنية قليلاً الى الداخل منفرجة قليلاً - الربيع - اماكن صخرية في بادية مصر العليا. وربما هوبان من الآتي شرحه

٢. *M. caulescens, Boiss.* الرحي المشيب (وَرَاة. سَبَّة) ٢٤ لبادي مشيب
مستلق. الاوراق قصيرة الرجيلات يضية مستطيلة كاملة ذات طي عند الضلع المتوسط. مغالب
البتلات مبثقة قليلاً. الخرنوبيات مستقيمة اسطوانية اقل من ١.٠ سم طولاً - الربيع - بادية
سينا واليه
repanda, Post. م.ب الجولي. الاوراق السفلى جونبة - مع الرمز

٩ الاندر يوسكيا *ANDREOSKIA, Reichenb.*

الكاس متصبه متساوية القاعدة تقريباً. البتلات مستطيلة. الاسدية مستقلة عادمة السن ولا ثمرات
يضية. الخرنوبيات خطية غير شاقة منضغطة محببة اسفنجية ذات قرنين. القلم اسطواني. السمة
رأسية - اعشاب سنوية غضة اوراقها ريشية ازهارها بيضاء صغيرة راسبها المسرة طويلة مسترسلة
A. Cardamine, Reckb. الاندر يوسكيا الكرد امينة ٥ املس. قاعدة الرجيلة محبزة
على كل من جانبيها باذينة كبيرة نصف دائرية. قطع الاوراق ٤ ازواج الى ٥ يضية مستطيلة كانه
الثرافات والانتهائية منها اكبر قليلاً من البقية وذات ٢ فصوص الى ٥. نرون الخرنوبيات رحمية اقصر
قليلاً من القلم - الربيع من طرابلس الى بتيعة حسن

١٠ النوتوسراس *NOTOCERAS, R.Br.*

الكاس متساوية القاعدة. البتلات مستطيلة خطية. الاسدية مستقلة عادمة الاسان. الاثرات
بيضية مقلوبة. الخرنوبية مستطيلة خطية. المصراعان محبزان وينتهي المحبوز بمحبة قرنية. القلم نحيل
قصير. السمة رأسية - عشب. مستلق على هيئة الالوسون مشيب بشعر ملازم مشعب. الازهار صغيرة
يضية

N. Canariense, R.Br. النوتوسراس الكناري ٥ الاوراق كامنة مستطيلة خطية.
القرون نصف عرض الخرنوبية طولاً - الربيع - سينا ومارسابا وشرقها

١١ الانستاتكا *ANASTATICA, L.*

الكاس متصبه متساوية القاعدة. البتلات بيضية مقلوبة ذات مغالب. الاسدية عادمة الاسان.

الخريشبيات بيضية كروية متخفة شاقة وكل غريفة مجهزة عند قمتها بمعلقة مستعرضة اذينية ومنفصلة الى يمينين بمجانب مستعرض وجميع البزور في بيت واحد منها. الحاجزين الغريفتين ضخيم. القلم مخزري والسمة غير واضحة — اعشاب قزمة متشعبة من عنق متفرع مستقلة قصيرة الراسيات ازهارها بيضاء صغيرة. النبات المثمر متصلب خشبي تنجمع فروع من الاعلى الى كرة. الثمر مستمر
A. Microchuntina, L. . الانساتكا الاريجية (ورد اريحا) ⊙ مسنشب بشعر كوكبي. الاوراق مستطيلة جوية مسندقة الى رجيلة والزهرة منها صغيرة. القلم اطول من الخرنوبية — الربيع — ساحل اريحا وبادية التيه وسينا ومصر

١٢ المسپرس *HESPERIS, L.*

الكاس متصبية ذات حدتين. الپتلات ذات مخالب. الاسدية مستقلة. الخرنوبيات طويلة مغلطمة واسطوانية. السمة ذات صفيحتين متصبتين. الحاجر مشتبك — اعشاب معمرة او محولة ازهارها ارجوانية او مزرقه مكدة

* الازهار ارجوانية

١ *H. Kotschyana, Fenzl.* . المسپرس الكوتشياني 2f مسنشب بشعر متفرع. الاوراق السفلى مستطيلة والساقية مستطيلة رحمة وجميعها مسنة. الزينة اقصر قليلاً من الكاس الطويلة العفاء. محلب الپتلات طويل منبثق وصفيحتها ارجوانية باذنة اهليلجية ضيقة. الخرنوبية ملساء قصيرة — الصيف — لبنان بقرب امدن

٢ *H. matronalis, L.* . المسپرس الامي ⊙ متفرع الزغب. الساق عال عنفودي. الاوراق بيضية رحمة مدبية مسنة. الزينة اطول من الكاس. محلب الپتلات منبثق قليلاً وصفيحتها بيضية ملقوبة. الخرنوبيات منفرجة خشنة طويلة متعرجة نحيلة — الصيف
runcinata, Boiss. . ب الكلابي. غددي. الاوراق السفلى احياناً قيثارية الفاعة — ميلان
 * * الازهار مزرقه مكدة

٣ *H. pulmonarioides, Boiss.* . المسپرس الشبيه بالپلموناريا 2f مجهز بزغب قصير غددي وهلب منفرج. الاوراق السفلى ملقوبة ذات رجيلة والساقية والزهرة معانقة مستطيلة رحمة كاملة. الزينات مثل الكاس طولاً منفرجة بعد الابتسام. صفائح الپتلات مستطيلة خطية. الخرنوبيات مستمسة رباعية الزوايا مثل الزينات عرضاً — الصيف — من حلب الى بلودان وشرقها
H. secundiflora, Boiss. et Sprun. . المسپرس الجانبي الزهر 2f لحوي منفرج

الهلل ايضاً . الاوراق السفلى خليجية ريشية الخرق . الساقية جالسة مستطيلة رحمة مسننة القاعدة .
الراسيات مائلة الى جانب . الزينة اقصر قليلاً من الكاس . صفحة البتلات مستطيلة خطية . الخرنوبيات
منفرجة لمساء او خشنة معتدة قليلاً - الربيع - البلقاء

II. *pendula*, D. C. ٥ . المسهرس المدلى 2f قصير الزغب الغديدي وطويل الهلل المنفرج .

الاوراق السفلى كلابية قيثارية والساقية جالسة رحمة مثثة حادة الاسنان . الراسيات مسترسلة مائلة الى
الى جانب والازهار جالسة تقريباً . الصفحة مستطيلة رحمة . الخرنوبيات طويلة اسطوانية معتدة قليلاً ملبسة
هلباً اقصر من عرض الخرنوبية - الصيف - مدلى من صخور لبنان والجبل الشرقي

II. *podocarpa*, Boiss. ٦ . المسهرس الساقية الشمر 2f متفرق العفاء من الاسفل .

الاوراق رحمة ضيقة كاملة او مضطحة السنينات . الزينات نصف الكاس حولاً . البتلات مسطوية .
الخرنوبيات لمساء لماعة اسطوانية مستدقة القاعدة - الربيع - سورية . نادر

١٣ الملكومية *MALCOLMIA*, R. In.

الكاس منتصب متساوية القاعدة او ذات حدين . البتلات ذات مخالب . الاسدية مستدقة ونادراً
الطول منها متحدة قليلاً ازواجاً . الخرنوبيات طويلة اسطوانية مستدقة الى قلم مخروطي واسطوي .
السمه ذات صفيحتين اوراسية - اعشاب سنوية ازهارها وردية او بيضاء وفي الشجيرة بالكورنيجيا صفراء
* الخرنوبيات سريعة الانشقاق . القلم اسطواني . السمه كاله

M. pulchella 1 *pygmaea* ٢

* * الخرنوبيات بطيئة الانشقاق او غير شاقة تقريباً . القلم مستدق مخروطي والسمه حادة

M. Africana ٣ *Zachlensis* ٤ *tortulosa* ٥ *aculeolata* ٦ *maritima* ٧ *Chia* ٨

crenulata ٩ *conringioides* ١٠

II. *pulchella*, D. C. ١ . الملكومية الظرفية ٥ مخض دقيق السوق متعدداه . الاوراق

مستطيلة بيضية مقنونة مضطحة الاجوان . الزينة ضعف الكاس طولاً واكثر . البتلات بيضية مقنونة
وردية غامقة . الخرنوبية مخبلة لمساء . القلم ضعف عرض الخرنوبية طولاً واكثر - الربيع - اماكن رملية
في ساحل سوريا وفلسطين البحري . بادية سينا - تدارج الاوراق الى ما في الآتي ذكره

pinnatifida, Post. ب . المخروقة الريشية ٥ الاوراق مخروقة ريشية . كل النبات اكبر

من الرمز - الرمال بقرب يافا

III. *pygmaea*, D. C. ٣ . الملكومية البخرية ٥ قزم نخيل السوق ومتعددها . الاوراق

متفرقة الشعر صكوكيئة مستطيلة خطية خليجية ريشية صغيرة. البتلات بيضية مقلوبة وردية باهتة. الخرنوبيات نجيلية ملساء. القلم ضخم متشعب القبة وإطول قليلاً من عرض الخرنوبية - الربيع - بادية سينا - شاطئ مصر الشمالي

M. Africana, L. ٣. الملكوميا الأفريقية ⊙ متفرق الهلب وبسيطة أو متشعبة. الأوراق مستطيلة مدبنة حادة. الزنيدات أقصر من الكاس. البتلات بيضية مقلوبة مستطيلة ضعفا الكاس طولاً. الخرنوبيات رباعية الروايا تقريباً منفرجة خشنة عفائية. السمة حادة منحرفة مثل عرض الخرنوبية طولاً أو أقصر منها - الربيع - اماكن رملية في بادية سينا

M. Zuchlensis, Post. ٤. الملكوميا الزحلولية ⊙ منخفض متفرق الهلب. الأوراق مستطيلة خطية ريشية مخروقة أو كلابية الاسنان. الزنيدات نصف الكاس طولاً. صفائح البتلات الوردية بيضية مقلوبة. الأزهار أصغر قليلاً من أزهار الملكوميا الظرفية. الخرنوبيات **** - الربيع - رحلة

M. torulosa, Desf. ٥. الملكوميا المعقدة ⊙ منفرع الشعر متفرج الهلب. الأوراق مستطيلة ريمية ضيقة مدببة حادة الاسنان أو مشطية ريشية الخرق. الأزهار جالسة تقريباً. البتلات صغيرة بيضاء مستطيلة. الخرنوبيات قصيرة الغشاء خشنة معقدة مستقيمة أو منحية قليلاً. السمة قصيرة كالة مفروضة - الربيع - مزارع من الشام الى غزة وبادية التيه

contortuplicata, Boiss. ب. المتعوي. الخرنوبيات متبوية - مع الرز في فلسطين
leiocarpa, Boiss. ت. الاملس الثمر. الغشاء متفرق. الخرنوبيات ملساء. اسنان الأوراق

مضاعفة - بادية تدمر والتيه

M. aculeolata, Poiss. ٦. الملكوميا الأبيرية ⊙ املس قزم. الأوراق لحمية مستطيلة كالة الخرق الريشية أو قيثارية. الراسم ذوزنرة الى ٥. الزنيدة أقصر من الكاس. البتلات وردية مستطيلة خطية ضعف الكاس طولاً. الخرنوبيات منفرجة أو منكسة اسطوانية مخططة منعقبة الأبيرات مستدقة القمة. السمة ضخمة مجذومة ذات فصين - الربيع - مزارع بادية سينا

M. maritima, L. ٧. الملكوميا البحرية ⊙ ملازم الشعر متفرعة. الأوراق بيضية مقلوبة كاملة تقريباً. الزنيدات نصف الكاس طولاً. الراسيات المثمرة مستقيمة غير متضخمة. الخرنوبيات نجيلية مستقيمة ملبسة شعراً متشعباً. القلم أطول أضعافاً من عرض الخرنوبية - الربيع - جزيرة رودا في مصر

M. Chia, Lam. ٨. ملكوميا شيو ⊙ ملازم الزغب متشعبة. الأوراق بيضية مقلوبة أو بيضية مقلوبة مستطيلة كاملة أو مضحكة الاسنان. الزنيدة أقصر من الكاس. الخرنوبيات منتصبية تقريباً طويلة ملبسة شعراً طويلاً متشعباً. القلم أطول من عرض الخرنوبية - الربيع - الساحل البحري والجبال الى ١٢٠٠ متر في سورية وفلسطين ودمشق

١. *M. crenulata*, DC. الملكوميا الشريوية © قصير الحبلبات الخروطية المتفرقة أو مستطيل. السوق متعددة بسيطة. الاوراق كالة الشراغات والسفلى منها مستطيلة مستدقة الى رجلة والساقية مستطيلة رمية حادة الازديتات. الزينة ثلث الكاس اونها طولاً. الخرنوبيات ملساء منفرجة طويلة يابسة ضخمة. السمة منفرجة الفصين - الربيع - حنول مبروكة من حلب الى القدس

١٠. *M. conringioides*, Boiss. الملكوميا الشيبية بالكورنجيا © قزم قصير الحبلبات. الاوراق الجذرية مستطيلة بيضية ملووة مستدقة القاعدة جالسة قريباً. العليا قصيرة الازديتات حادة السنينات. الثلاث صفراء ذات صفحة مثنفة مستطيلة كاملة. الخرنوبيات منفرجة او منعقفة طويلة يابسة مستدقة الى قلم اسطوانى منشعب القمة - الربيع - مزارع دمشق والجبل الشرقى الى علو ١٢٠٠ متر والباق وزحلة

١٤ الغبيشي *EREMOBIMUM*, Boiss.

الكاس منتصبه مستبرمة مدة. الثلاث خطية ملووة كاملة. الخرنوبية خطية معقدة. السمة منشعبة مقعزة الفصين غير راجمة. البرور كروية تقريباً عريضة الحوافي - اعشاب سنوية منسجبة بشعر كوكبي ملازم ازهارها صغيرة وردية

E. lineare, Del. الغبيشي الخطي © السوق متصاعدة او مستلقية منفرجة. الاوراق جالسة خطية مستطيلة وخطية كاملة كالة. الخرنوبيات قصيرة الزينات منفرجة قليلاً مستدقة الى قلم اقصر قليلاً من عرضها - الربيع - الرمل. شاطئ سورية وبادية اثيه ومصر

١٥ السببريوم *SYMBRIMUM*, All. Ped.

الكاس منتصبه او منفرجة متساوية القاعدة على الغالب. الثلاث ذات مخالب. الاسدية مستقلة. الخرنوبيات طويلة اسطوانية. القلم اسطوانى او مفقود. السمة راسية او مضحلة الفصين - اعشاب ازهارها غالباً صفراء وتنادراً يضاء ارجوانية

* المصاريع ذات عصب واحد

S. pumilum, Steph. ١. السببريوم المنخفض © قصير الزغب متفرع. الاوراق مستطيلة او بيضية ملووة والجذرية منها خليجية مسنة اوريشية الخرق والساقية مسنة. الازهار صغيرة مصفرة. الخرنوبيات منفرجة زغبية مخبئة قليلاً الى الاعلى منضغطة قصيرة الزينة. القلم قصير. المصاريع احادية

العصب - الربيع - حلب الى بادية النيه

Post. *depsupertatum*, ب. المتفرق. قزم. الاوراق مضطحة السنينات - سور القدس

٣. *S. nudum*, Belang. السببريوم يوم العاري ٥ الاوراق، متفرقة الغطاء وجميعها جذرية صغيرة

مستطيلة كاملة او مسننة قليلاً. الجرائد مخفضة. الزنيدات اقصر قليلاً من الكاس وحين الإثمار مثل الخرنوبية قطراً. الازهار صغيرة صفراء باهتة. الخرنوبية منتصبه رباعية الزوايا تقريباً - الربيع -

Boiss. *brachycarpa*, ب. القصير الثمر. الخرنوبية ٢٠١ متر الى ٢٠٥ طولاً. المصارع

ذات عُصَبَات - لبنان

٤. *S. Schimperii*, Boiss. سببريوم يوم شمير ٥ قزم رمادي ذو زغب قصير. الاوراق

ثنائية الخرق الرشي فصوصها صغيرة مستطيلة كاله. الراسيم قليل الازهار الصغيرة الوردية الباهتة. الكاس منفرجة. الخرنوبيات قصيرة الزائدة ضخمة طويلة منفرجة غفلة قليلاً كوكية الزغب. الفلم

قصير - الربيع - بين الحصى في بادية سينا

٤. *S. Sophia*, L. سببريوم يوم صوفيا ٥ رمادي الزغب او مستطلس. الساق منفرج

النروع. الاوراق ثنائية التفصيل الرشي او ثلاثية قطعها مستطيلة خطية حادة. الراسبات كثيرة الازهار الصغيرة صفراء. الكاس مفتوحة. الخرنوبيات ضعف زينداتها طولاً الى ٤ اضعاف ذلك نخلة

منفرجة مغنية الى الاعلى معتد قليلاً - الصيف - اماكن رملية. كثير الوجود في سورية وفلسطين

* * المصارع ذات ١٣ اعصاب

٥. *S. Columnae*, Jacq. سببريوم يوم العبود (اي جبل طارق) ٥ ناعم الغطاء من الاسفل

متفرقة. الاوراق كلالية ريشية قطعها مسننة ذات اذينة متصاعدة عند قاعدتها وفي الاوراق السفلى بيضية مستطيلة وفي العليا رحجة. الازهار كبيرة صفراء. الكاس منطبقة. الخرنوبيات منفرجة طويلة

ملساء او قصيرة الغطاء - الربيع - المزارع من حمص الى دمشق ولبنان

٦. *S. Pannonicum*, Jacq. السببريوم يوم البانوني ٥ عال منفرج الغطاء متفرقة او امس.

الاوراق السفلى كلالية ريشية قطعها مسننة ذات اذينة متصاعدة عند قاعدتها. العليا ريشية قطعها خطية. الازهار كبيرة صفراء. الكاس مفتوحة. الخرنوبيات طويلة يابسة منفرجة كاله ملساء - الصيف -

المزارع والدروب من حلب الى بعلبك ودمشق وشرقيها

Boiss *rigidulum*, ب. القليل اليبوسة. (السليخة). قزم. يخرق الاوراق العليا صغيرة

- بادية سينا

٧. *S. crysimoides*, Desf. السببريوم الشبيه بالاريسوم (الحقة) ٥ مستطلس.

الأوراق كلابية قيثارية قطعها بلااذينات. الأزهار صغيرة صفراء. الكاس مفتوحة قليلاً. الخرنوبيات قصيرة الزينات منفرجة بإسة مستدقة القمة. القلم أطول من عرض الخرنوبية - الربيع - أودية سينا *S. Irío, L. ٨*. سببريوم إيريو © عالم الملس. الأوراق كلابية قطعها مسننة بلااذينة. الأزهار صغيرة. الكاس مفتوحة قليلاً. الخرنوبيات ملساء منفرجة قليلاً ٤ اضعاف الزينة طولاً إلى ٥ وهي تملأ الأزهار. القلم قصيراً ومفقد. - جوانب الدروب. عام في سورية وفلسطين

S. Damascenum, Boiss, et Guill. ٩. السببريوم الدمشقي © منفرد الرغب منعقة. الأوراق السفلى قيثاوية كلابية قطعها ذات سنينات والسفلى منها ذات اذينة صغيرة على الحافة السفلى. الأزهار متوسطة الحجم. الكاس مطبقة. الخرنوبيات خشنة. منفرجة قليلاً ٦ اضعاف الزينات طولاً إلى ٨. القلم مجذوم القمة اضيق قليلاً من الخرنوبية - الربيع - حقل دمشق ووادي قنوبين

S. Lerschl, L. ١٠. سببريوم ليرشليوس © منفرج العناء او منعقة. الأوراق قيثارية كلابية قطعها مخروقة او مسننة عادمة الاذينات القاعدية. الأزهار كبيرة ٢.١ متر طولاً. الكاس منفرجة. الخرنوبيات نحيلة الزينة منفرجتا لانعلو الرأسيم. القلم قصير جداً. السبة ذات فصين - الربيع - جوانب الطرق وإماكن متروكة عنتاب وشاليلها وشرقها

S. officinale, L. ١١. السببريوم المخزني (النجيلة) © مشعر. الأوراق كلابية وقطعها زوجان إلى ٣ بيضية مستطيلة مسننة. الأزهار صغيرة. الخرنوبيات مخزنية ملازمة الفقار. أنه مخروطي - الربيع - جوانب الطرق. عام

S. runcinatum, Lag. ١٢. السببريوم الكلابي © مستطلس. الأوراق كلابية حادة الأسنان. الأزهار صغيرة منفردة تقريباً. الخرنوبيات بإسة منحنية إلى الأعلى قليلاً. منفرجة قليلاً - اسطوانية. القلم قصيراً سطواني - الربيع - الدروب من حلب إلى بادية سينا *villosum, Boiss*. ب. الوبري. وبري حتى الخرنوبيات - جبل قصبون بقر دمشق

١٦ الألياريا *ELIARIA, Adans.*

الكاس منتصب. البتلات بيضاء ذات مخالب. الخرنوبيات اسطوانية ذات ٣ اعصاب. الحاجر شفاف وخلاياه طويلة. البزور مستطيلة مخططة طولاً - اعشاب سنوية ازهارها بيضاء

A. officinalis, D. C.. الألياريا المخزنية © املس الآ القاعة وهي وبرية قليلاً. الساق عالي يابس. الأوراق السفلى كلابية كبيرة الخجان الشرافية والعليا قلبية بيضية حادة الامنان. الراحات

بلا اوراق. الخرنوبيات طويلة حادة منفرجة قليلاً اطول اضعافاً كثيرة من الزينة الضخمة. النلم قصير
— الربيع — الجبل الاقصر وشمالية

١٧ الكورنجيا *CONRINGIA*, Reichenb.

الكاس منتصب متساوية القاعدة او ذات حدتين. البتلات ذات مخالب. الخرنوبيات طويلة
منفلطحة او ذات اربع زوايا حادة والمصاريع ذات عصب ١ الى ٢. البزور في صف واحد مستطيلة بلا
حواف — اعشاب سنوية غير ملساء اوراقها الساقية اذنية معانقة ولا ازهار صفراء كبيرة
١. *C. Orientalis*, L. الكورنجيا الشرقية ☉ عال. الاوراق مستطيلة. الخرنوبيات
منفرجة رباعية الزوايا مستدقة الى قلم نحيل اطول قليلاً من عرضها. السمة صغيرة رأسية مفروضة.
المصاريع محززة قليلاً ذات عصب واحد. البزور خشنة — الربيع — بيروت. الجبل الشرقي
٢. *C. elovata*, Boiss. الكورنجيا الدبوسية ☉ منخفض. الاوراق اهليجية. الخرنوبيات منفرجة
قليلاً اسطوانية. المصاريع غير قياسية الورد. النلم دبوسي ضخيم اطول من عرض الخرنوبية. السمة
متشعبة مجنبة الفصين. البزور مستطيلة ملساء — الربيع — ارض بور ووزارح من عيتاب الى راشيا

١٨ الاريسوم *ERYSIMUM*, L.

الكاس منتصب متساوية القاعدة او ذات حدتين. البتلات ذات مخالب. الخرنوبيات رباعية
الزوايا او منفلطحة او اسطوانية. المصاريع ذات عصب واحد غالباً محززة. البزور مستطيلة ونادراً
منضغطة. السمة رأسية مفروضة او ذات فصين — اعشاب ازهارها صفراء اورجوانية شعرها ملازم متشعب
او متفرع

* سنوية

F. repandum | *tenellum* ٢

* * محمولة

F. uncinatifolium ٣ *Smyrnæum* ٤ *verrucosum* ٥ *scabrum* ٦ *geniocalon* ٧

*** معرفة


F. crassipes ٨ *purpureum* ٩

١. *F. repandum*, L. الاريسوم الجبوتي ☉ مخضر. قابل الزغب الثلاثي الشعب بين الثنائي

الشعب . الأوراق رحيمة جوية مسننة مستعدة القمة على الغالب . الأزهار صغيرة . الخرنوبيات منفردة قليلاً معدة غالباً قصيرة الزيدة . القلم ضخ مثل عرض الخرنوبية طولاً أو أطول منه . السمة مفروضة - آخر الربيع ولول الصيف

شكل ١٧

rigidum, Boiss. ب . اليابس . الخرنوبيات



اضخم ما في الرمز واقصر ملازمة الغناء - لبنان والجبل الشرفي الى البقاء

خرنوبية الأريسموم الجولي . ب . اليابس

٣ E. tenellum, D.C. الأريسموم النحيل © مخضر . الزغب ثنائي الشعب . الساق

منخفض متفرع . الأوراق خطية طويلة جوية مسننة . الأزهار متوسطة جالسة تقريباً . الخرنوبيات غير الناضجة ملازمة الشعر مستشبية . السمة ذات فصين طويلين منفرجين - الربيع - بين حلب والموصل

٤ E. uncinatifolium, Boiss. et Huet الأريسموم الشصي الورق © مستشيب كثير

السوق المنخفضة . الأوراق مستدقة القاعدة والجذرية منها متراكمة مستطيلة رحيمة كلابية مسننة والبنية خطية رحيمة متباعدة الاسنان أو كاملة قمبتها شصية مخنية . الأزهار متوسطة . الزيدة نصف الكأس طولاً أو اقصر من ذلك . الخرنوبية رباعية الزوايا . القلم ضخ والسمة غير ضخمة - الربيع - عينتاب وبشر وشالها

٤ E. Smyrnæum, Boiss. et Bal. الأريسموم الازميري © اخضر . السوق عقنودية من

الاعلى كثيرة الأوراق . الأوراق المنحلي . مستطيلة كلابية أو مسننة . العليا خطية عريضة مسننة أو كاملة عقفاء القمة . الزيدات أطول من الكأس قليلاً . الأزهار متوسطة . الخرنوبيات منفردة قليلاً مستدقة الى قلم مثل عرضها طولاً . السمة مجذومة ضخمة قليلاً - الربيع - راشيا

٥ E. verrucosum, Boiss. et Gaill. الأريسموم الثولولي © اخضر . الساق طويل ذو

زوايا مخطط متفرع من الاعلى . الأوراق مستطيلة كاله جوية مسننة مستدقة القاعدة . الأزهار متوسطة . الزيدة نصف الكأس طولاً . الخرنوبيات منفردة قليلاً ضخمة قليلاً يابسة مخنثة برغب مستشيب وثاليل . السمة جالسة مجذومة - الصيف - جبل الشيخ

٦ E. scabrum, D.C. الأريسموم الحرش © مستشيب . الساق بسيط منخفض منتصب .

الأوراق الجذرية مستطيلة كاله قليلة السنينات مستدقة الى رجلة . الساقية خطية رحيمة حادة . الراسم المنقر قصير . الخرنوبيات جالسة تقريباً متصبه حادة الزوايا الأربع درنية خشنة وذات زغب مستشعب . القلم مخروطي خيطي أطول من عرض الخرنوبية - الديف - لبنان

٧ E. goniocaulon, Boiss. الأريسموم الزاوي الساق © اخضر . زغب الساق والثغور

متشعب وزغب الاوراق كوكبي. الساق عالم ضخيم عنقودي الفرع ذوروايا. الاوراق المجذرية طويلة
الرجلات ريشية الخرق اوقشارية. الساقية مستطيلة او رحمة حادة السينات ونادراً كاملة. الازهار
متوسطة. الزينة اقصر من الكاس. الخرنوبات ٠.٢ متر الى ٠.٣ طولاً اسطوانية رباعية الزوايا مخننية
او ملتوية ملبسة زغبياً كثيفاً. القلم دقيق ضعف عرض الخرنوبية طولاً - الصيف - صخور جبل اللكام
ولسان - نوع كثير التباينات المختلفة المنظر

brachycarpum, Boiss. ب. القصير الثمر. الخرنوبات ٠.١ متر طولاً وهي بارزة الزوايا

- الجبل الاقرب وفي الميزاب

longisiliquum, Post. ث. الطويل الخرنوبية. الخرنوبية نخلة ٠.٤ متر طولاً - الجبل

الشرقي، دوما

strictum, Post. ث. المتيسب. الخرنوبات يابسة ٠.٢ متر طولاً ملازمة الفقار - الجبل

فوق المعاصر في لبنان. يشبه السمبريوم الخرنوبي في هيئة راسه والثمر

minus, Boiss. ج. الاصفر. الاوراق الساقية كاملة - لبنان والجبل الشرقي من علو ١٢٠٠

متر الى ١٥٠٠

٨. E. crassipes, C.A. Mey. الاريسوم الضخم الرجل 2f اشيب ضخيم الجذع كثير السوق

النخلة اليابسة. الاوراق خطية ضيقة كاملة. الازهار صغيرة جالسة تقريباً. الخرنوبات منفرجة شبيهة

مثل زبدانها القصيرة عرضاً. القلم مثل الخرنوبية عرضاً واقصر من عرضها. السمة مفروضة - الربيع -

اماكن محجرة من جبل طوروس الى القدس والبلقاء

٩. E. purpureum, Auch. الاريسوم الأرجواني 2f مستشيب. الجذوع متكئة نجيبية .

السوق عشبية متصاعدة مخفضة. الاوراق ضيقة خطية والسفل منها كلابية ريشية الخرق والعلوا مسننة او

كاملة. الازهار متوسطة قصيرة الزينات أرجوانية. الخرنوبات منفرجة شبيهة. الزينة ضخمة قليلاً .

القلم مستدق ضعف عرض الخرنوبية طولاً. السمة متشعبة - الربيع - اماكن صغيرة في لبنان والجبل

الشرقي ودمشق

١٩ البراسكا BRASSICA, L.

الكاس متساوية. البتلات كاملة ذات مخالب. الخرنوبات خطية اسطوانية مصاريها ذات عصب

واحد واوردة متفمة. البذور كروية. الفلقان مطويان ذات فصين - اعشاب او نجيلات ازهارها بيضاء

او صفراء

١. E. nigra, L. البراسكا السوداء (الخردل الاسود) © قصير العناء. جميع الاوراق

ذات رجيلات والسفل منها قيثارية منصصة مسننة والعليا رجمية كاملة. الراسيات عريانة. المخروبيات ملازمة القنارنجية رباعية الروايا. البزور صغيرة الاسناخ - الربيع - جوانب الطرق. كثير الوجود (*Sinapis nigra*, L.)

٣. *B. bracteolata*, F. et M. البراسكا الفلسطينية @ امس. جميع الاوراق ذات رجيلات والسفل منها قيثارية قطعها الجانية زوج اوزوجان والانتائية كبيرة مستطيلة غير منتظمة النصوص القاعدة. الاوراق العليا مستطيلة خطية كاملة. الراسيات احياناً ذات اوراق. المخروبيات متبسة رباعية الزوايا ضخمة. البزور مغضنة -- الربيع -- قرب القاهرة

٤. *B. rapa*, L. البراسكا الرابا (الشجر. اللفت) @ عشبي. الاوراق الجذرية خشنة أكثر اوراق خضراء قيثارية والعليا يضيعة مدببة قليلة، معانقة القاعدة. الراسيات باقية قبل الانقسام. المخروبية طويلة المنقار - الربيع - فالت من البساتين وليس وطنياً

٥. *B. napus*, L. البراسكا النابوس @ عشبي اغبر اماس. الاوراق الجذرية قيثارية والعليا مستطيلة غير منتظمة الاسنان متسعة القاعدة معانقة قليلاً. الراسيات مسننة طويلة قبل الانقسام. المخروبيات مستدقة الى مشار طول - الربيع - مزارع سورية

٦. *B. deflexa*, Boiss. البراسكا العفناء @ الساق متفرع لحوي القاعدة. الاوراق عنائية والسفل منها مستطيلة رجمية غير متساوية النصوص مسننة والعليا ختية رجمية. البزور حنارة باهنة اطول من الكاس العفائية والصوفية. المخروبيات منعنة طويلة نحية مدببة. المتناقص كمال احول من عرض المخروبية وقاعدته ذات بزور - الربيع - حلب الى دمشق ودور

٧. *Tournefortia*, Gou. براسكا تورنفورت @ الاوراق الجذرية

وردية النظام عنائية كلابية قيثارية مسننة اسنخ. ساقية قوية خدية. البزور حنارة باهنة. المخروبيات منفرجة أكثر من ضعف الزائدة طولاً. المنقار طويل مستدق ذو بزرة عند قاعدته وهو نصف بقية المخروبية طولاً. مستدق - الربيع - شوانس سورية وفلسطين. القطر المصري. يختلف طول المخروبية من ٢.٢ متر الى ٢.٤

٨. *Brassicacraenum*, Boiss. et Haussk. البراسكا الخشنة الكاس

@ مستمسك من الاعلى ومتفرق الشعر من الاسفل. الاوراق ذات رجيلات مستطيلة نحية

قيثارية ذات فصوص حادة السنينات. الاوراق العليا رجمية حادة الاسنان. الراسيات طويلة بعد الانقسام. الاوراق طويلة الزوائد كبيرة. السلات هليئة. البزور لينة. البزور اللون ضعف الكاس طولاً وأكثر. المخروبيات منفرجة. التلم اسطوانى - الربيع - بساتين حلب (*Brassicacraenum lasiocalyceum*, Boiss. in Fl. Or.)



٨. *B. adpressa*, Monch. البراسكا الملازمة الثبر ⊙ غفائي مستطيب. الساق عالٍ
متفرع. الاوراق الجذرية قيثارية والساقية قليلة مستطيلة خطية. الخرنوبيات قصيرة ضخمة ضخمة الزائدة
ملازمة الفئار معقنة ذات اوردة منغمة بجانب العصب. المنقار مستقيم او منحني الى الانسية. البزور
ضخمة - الربيع - المزارع. عام في سورية وفلسطين. (*Hirschfeldia adpressa*, in Boiss. Fl. Or.)

٢٠. الخردل SINAPIS, L.

الكاس متساوية. البتلات كاملة ذات مغالب. الخرنوبيات اسطوانية او مضغطة مجانبية مصاربعها
ذات ٢ اعصاب. البزور كروية في صف واحد

١. *S. juncea*, L. الخردل الاهلي (الكبر) ⊙ املس. الاوراق السفلى مستطيلة
رحمية مسننة واحياناً قيثارية والعليا ضيقة رحمية خطية او مسننة. البتلات منفرجة. الخرنوبيات متضبة
ضخمة معقنة طويلة المنقار وهو عادم البزور مخزني الطرف - الشتاء - ارض الصعيد في مصر - بزور
لاجل الزيت

شكل ١٩



٣. *S. arvensis*, L. الخردل المحتلي ⊙ غفائي أكثر اوراق. الاوراق
رحمية بيضية او غير متساوية الأسنان والجذرية منها قيثارية او ملوقة مسننة.
الكاس منفرجة. الخرنوبيات تحيلة ملساء متضبة معقنة. القلم منقاري مثل الخرنوبية
طولاً او اقصر منها. الاعصاب بارزة - الربيع - المزارع. عام في سورية وفلسطين
- نوع كثير التباين في هيئة اوراقه ونموه سوقه بسيطة وكثيرة الفرع
Orientalis, Boiss. ب. الشرقي. الخرنوبيات متعقنة اللحية - مزارع

سورية وشمال فلسطين

خرنوبية الخردل

المحتلي (الرمز)

Mesopotamica, Boiss. ت. بين النهرين. الخرنوبيات ضخمة

قصيرة. المنقار مثلها طولاً تقريباً. بيروت. بين النهرين

pinnata, Post. ث. الريشي الورق. الاوراق الساقية السفلى ريشية مستطيلة الفلج

مسننتها - صرد

٣. *S. Allionii*, Jacq. خردل أليونني ⊙ املس. الاوراق ريشية التفصيل مخروقة اومسننة الفلج. الكاس منفرجة. الخرنوبيات ملساء قصيرة بيضية او بيضية مستطيلة متفتحة. القلم مستدق
مثلها طولاً تقريباً

genuina, Boiss. ١. الحقيقية. الخرنوبيات مستوية السطح - مزارع بر مصر

شكل ٢٠



خرنوبية الخردل الأبيض

ت. ب. المستنق. الخرنوبيات مشتبكة الأعصاب. *turgida*, Boiss.

— مع الرمز

٤. *S. alba*, L. الخردل الأبيض ⊙ الساق لحمي. الأوراق

وعشبية وبشية التفصيل قطعها قليلة النقص غير متساوية الأسنان والأسنان العليا متحدة. الكاس منفرجة. الخرنوبيات منفرجة اسطوانية معقدة كثيفة الغشاء. الفلم طويل سفي راجع على الخرنوبية ذو برز عند قاعدته — الربيع — جوانب الطرق وإماكن مهلة في سورية وفلسطين

٢١ الدبلوتكسس *DIPLLOTAXIS*, D. C.

الكاس منفرجة متساوية. البتلات ذات مخالب. الخرنوبية خطية اورمجة خطية منفلطة قليلاً على الظهر والمصاريع ذات عصب واحد. البروريضية او مستطيلة منفلطة ثنائية الاصطناف — اعشاب متصببة متفرعة ازهارها صفراء او وردية

١. *D. viminea*, L. الدبلوتكسس العُشْبِي (المُجْرِيحِي) ⊙ قليل الهليلب متعقبة. كثير السوق العشبية الشبيهة بالجرائد. أكثر الأوراق جذرية خليجية قيثارية خرقها قصيرة كالة. الزنيدات اقصر من الزهرة. الزهرة صفراء. الفلم مثل عرض الخرنوبية طولاً او اطول منه قليلاً — الربيع — جوانب الطرق في سورية وفلسطين

ب. ب. *integrifolia*, Boiss. الكامل الأوراق. الأوراق كاملة او شرافية قليلاً — مع الرمز

٢. *D. Harra*, Forsk. الدبلوتكسس الحَرَّة (حَرَّة الجبال) ⊙ لحمي ونادراً مستهلس.

السوق متفرعة وكثيراً ما تكون صلبة القاعة. الأوراق بيضية مقلوبة كبيرة الأسنان. الزنيدات طويلة منعكسة. الزهرة صفراء. الخرنوبيات ذات سويقات هي مثل عرض الخرنوبية طولاً. السمة جالسة تقريباً ذات فصين — الربيع — أماكن جافة. من دمشق الى بادية النية وسينا وذالية مصر

ب. ب. *B. glabra*, Post. الاملس. الأوراق مستطيلة متباعدة الأسنان. قرب دمشق

٣. *D. eruroides*, L. الدبلوتكسس الشبيه بالأروكا ⊙ منعطف الهليلب. السوق عشبية

متفرعة عالية. الأوراق كلالية قيثارية مسننة. الزنيدات اطول قليلاً من الازهار قبل الابتسام. الازهار وردية. الخرنوبية منتهية بقلم ضخ ثنائي الفصوص مثل عرضها طولاً — الربيع — مزارع سورية وفلسطين الى حدود البادية

٤. *D. acris*, Forsk. الدبلوتكسس الحَرِيْف (الشَّقِيْر) ⊙ مستهلس او قليل الغشاء.

السوق منخفضة ضخمة. الأوراق مستطيلة أو بيضية مقلوبة ككالة مسنة. الأزهار وردية كبيرة. الزينات أطول قليلاً من الزهرة. الخرنوبيات قصيرة السويقات منتصبه خطية عريضة. السمة جالسة مجذومة - الريح - بادية التيه وسينا ومصر

٢٢ الموريكنديا MORICANDIA, D. C.

الكأس منتصبه ذات حدين عند قاعدتها. البتلات ذات مغلب و صفيحة بيضيه مقلوبة كاملة. الخرنوبية خطية مفلطحة ظهراً أكثر وأقل والمصاريع مفلطحة أو محزومة أو متعددة الاعصاب. البزور مصطلة صفاً أو صفين مفلطحة. الفلتان مطويان - اعشاب ملساء ازهارها عريضة بنفسجية

١ *M. sinica*, Baiss. الموريكنديا السينوية (البقي. خصيان الجبل) ٢٤ أو ٢٥
الأوراق كبيرة ٦ ستمترات طولاً إلى ٨ كاملة كالة والسفلى منها مستطيلة مستدقة القاعدة والساقية بيضيه قلبية القاعدة اذينتها. البتلات باهته. الخرنوبية مفلطحة رباعية الزوايا والسمة راسية جالسة تقريباً. البزور مستطيلة - الريح - بادية سينا

٢ *M. dumosa*, Boiss. الموريكنديا الغيا. (الحبيبة) ٢٤ الأوراق صغيرة (ستيميران أو أقل طولاً) والسفلى والتي على الأغصان العاقرة جونية مسنة مستدقة اسنينة القاعدة. والساقية قلبية القاعدة قصيرة الاذينات. الخرنوبية مفلطحة رباعية الزوايا ضيقة. القلم أطول قليلاً من عرض الخرنوبية. المصاريع محزومة احادية العصب. البزور بيضيه - الريح - بادية التيه

٣ *M. clavata*, Boiss. et Reut. الموريكنديا الدبوسية ٢٥ الساق منخفضة ضخم متعرج متشعب من القاعدة. الأوراق ثنائية التفضيل الريشي قطعاً اسطوانية لحبية كاملة او ذات فصين الى ٣. الخرنوبيات منتصبه. القلم مفاري متسع يضي اسفنجي من الناخل. المصاريع مضطحة الاعصاب الثلاثة. البزور بيضيه - الريح - بوادي التيه وسينا ومصر

٢٣ الأروكا ERUCA, D. C.

الكأس متساوية منتصبه. البتلات ورديه كاملة او مخرومة. الخرنوبية خطية او مستطيلة والقلم سفي والمصاريع محدبة ذات عصب واحد. البزور كروية مفلطحة قليلاً مصطفة صفين اوصفاً واحداً - اعشاب متفرعة منتصبه ذات ازهار ارجوانية باهته اوصفراء بنفسجية الاوردة والخرنوبيات ملازمة الفشار

شكل ٢١

١. *E. sativa*, Lam. الأروكا المزروعة © طبعي عفائي أكثر أو أقل .

الأوراق قشيرية وخرفها مسنة حادة . الثلاث يضيبة مقلوبة بنفجية الأوردة .
الخزنيوات مستطيلة منقارها نصفها طولاً . البزور صغيرة - الربيع - مزارع سوريا
وفلسطين

٢. *hirta*, Post. ب . العفائي . الثمر عفائي - غرطة دمشق

٢. *E. Cappadocica*, Reut. الأروكا الكبادوقية © مستحسن . خزنيوة الأروكا

الأوراق ريشية القص فالقطع كالة منصصة مسنة الفاعة . الثلاث كبريتية مكدة (البزور) (الوز)
الأوردة مخرومة قليلاً . الخزنيوة ملساء مستطيلة ومنقارها ثلثها طولاً . البزور كبيرة - الربيع - المزارع
بون حماه وتدمر

٢٤ القليقلة SAVIGNA, D. C.

الكاس متصببة متساوية . الثلاث ذات مخالب كاملة . الخزنيوة قصيرة السويقة طويلة الزينة
منتفجة اهليجية ثنائية الغريقات قرطاسية المصاريع . السمة بسيطة . البزور متعددة ثنائية الاصطناف مججمة
- اعشاب لرجة ملساء او قليلة الغناء سوقها منشعبة التفرع من
شكل ٢٢



ثمر القليقلة المصرية

الفاعة ازهارها صغيرة وردية باهنة

S. Aegyptiaca, D. C. القليقلة المصرية (الحلاوة)

© مخفض . الأوراق لحمية قليلاً والسفلى منها يضيبة مستطيلة مسنة
مستدقة الى رجيبة والعليا خطية ريشية او كاملة . الراسيات المتمرة
قصيرة - الربيع - بادية التيه وسينا ومصر

٢٥ الكرختيرا CARRICHTERA, D. C.

الكاس متساوية متصببة . الثلاث ذات مخالب كاملة . الاسدية مستقيمة . الخزنيبيات يضيبة
كروية . الفلم ورفي . الغريقات ذات ٤ بزور - اعشاب سنوية مخفضة يتلائها يضاء مصفرة ذات
اوردة بنفجية

C. Vellæ, D. C. كرختيرا فلا © املس او قصير الغناء متصبب من عنق متفرع . الأوراق

ثنائية التفصيل الريشي قطعها خطية قصيرة . الراسيات مقابلة الأوراق طويلة . الخزنيبيات احول من
الزيادات المنعقة . المصاريع ذات ٢ اعصاب لموية واقصر من الفلم - من حلب الى الاسكندرية

٢٦ الريكونيا *RICOTIA*, L.

الكاس ذات حدين. البتلات ذات مخالب وصفيحتها قلبية مقلوبة او مفروضة. الخويطات عادة السنينات. الثمر جالس مفلطح اهليلجي او خطي احادي القرينة لزوال الحاجر. المصاريع قرطاسية. الحاجر زجاجي مشبك. السمة ذات فصين متقاربين. البزور مصطفة صفًا واحدًا مفلطحة غير منحنية — اعشاب سنوية لمساء او قاعدتها قليلة الغناء ازهارها وردية والزينة المثرة عتفاء

شكل ٢٢



خريبيبتان من الريكونيا اللوناريا

١. *R. Lunaria*, L. الريكونيا

القمرية ☉ الاوراق ثنائية التقسيم الريشي او ثلاثية. خرقها يضيعة مفصصة. البتلات قلبية مقلوبة. الراسيات المثرة طويلة والاثمار مرتبة على جانب واحد. الخرنوبيات ٢ اضعاف الزيدات طولاً مستطيلة اهليلجية ذات برتين الى ٤. القلم

قصر راسي — الربيع — اماكن محجرة في سورية وفلسطين

٢. *R. sinuata*, Boiss. et Held. الكريوتيا الخليلجية ☉ الاوراق ثنائية التقسيم الريشي

قطرها ذات رجلاات ويضعة اسنينية كبيرة النصوص. الاوراق العليا خطية. البتلات مفروضة. الخرنوبيات ٦ اضعاف الزيدة طولاً حادة وطولها ٧ اضعاف عرضها الى ٩ وهي مخنفة خليلجية بين البزور والبزور ٧-٨. القلم ثلث عرض الخرنوية طولاً — الربيع — ييلان

٢٧ الفرسيتيا *FAIRSETIA*, Turra.

الكاس متساوية القاعدة. البتلات ذات مخالب وصفيحة مستطيلة خطية. الخرنوية مستشبية خطية مفلطحة او اهليلجية. السمة ذات فصين. الحاجر احادي العصب ومتفرع الاوردة. البزور مفلطحة عريضة الاخمجة — اعشاب او نجيات هلبها متشعب ملازم ازهارها ارجوانية

١. *F. longisiliqua*, Decaisne. الفرسيتيا الطويلة الخرنوية 24 رمادي مخضر نجسي

القاعدة. السوق عالية منفرعة صلبة. الاوراق قليلة العدد خطية خطية طويلة كاملة. الراسيات قليلة الازهار مسترسلة. الخرنوبيات محمولة على زيدات مثل عرضها طولاً وطول الخرنوبيات ٨ اضعاف عرضها الى ١٠ وطول القلم كعرض الخرنوية. والسمة ثنائية الفصوص — الربيع — بادية ارض الصعيد

شكل ٢٤

٢. *F. Egyptiaca*, Turra. الفرسيثيا المصرية (الجرباع) ٢٤

اشعب كثير الفروع الثليلة الانفراج. الاوراق خطية كاملة. الخرنوبيات اطول من الزردة المنقصة اهلجية وطولها ٢ اضعاف عرضها الى ٤ (٢٠١٥ متر الى ٢٠٣). القلم قصير. السمة راسية. الغريقات ذات ٨ بزور الى ١٢ - الربيع - بادية سيناء ومصر

ovalis, Post. ب. العدسي. اقل علواً من المتقدم ذكره. الخرنوبيات خرينبية الفرسيثيا المصرية اهلجية ٢٠١ متر طولاً. السمة قصيرة - مع الرمز (*P. ovalis*, Boiss)

٢٨ الفيجيا *FIGIA*

الكاس ذات حدين عند قاعدتها. البتلات ذات محلب وصفحية مستطانية كاملة. الاسدية بلا سنيئات او اقصر مجهزة بسنية. الغديئات المصراعية توأمية والمشيبة مضحكة. الخرينبيات عفائية مستديرة او اهلجية مفلطحة ثنائية الغريقات. المحاجر ذو عصب غير واضح بلا اوردة. السمة صغيرة راسية. البرور مصطنة صين مفلطحة عريضة الاجنحة - اعشاب معمرة او نجيلات ملبسة لباداً كوكياً. الازهار راسية سنبلية صفراء

شكل ٢٥

١. *F. clypeata*, L. الفيجيا الجيوبية ٢٥ الاوراق

الجذرية مستطيلة جونية او كاملة مستدقة الى رحيلة والسافية مستطيلة خطية يابسة. الخرينبيات اهلجية خشنة ذات زغب كثيف قصير. القلم ربع عرض الخرينبية طولاً. الاجنحة اضيق من البرور - الصيف - اماكن صخرية من عيذاب الى لبنان وساحل دمشق

ب. *rostrata*, Post. ذو المنقار المنقار نصف عرض

الخرينبية طولاً - لبنان. الجبل الشرقي. القدس

(*F. rostrata*, Schenk.)

(١) خرينبية الفيجيا الجيوبية (٢) تلك بعد

٢. *F. macroptera*, Ky. الفيجيا الكبيرة الجناح سقوط المصراع فرى فيه بزور محميان

مفلتان بجملها السريدين

٢٥ الاوراق كاملة والجذرية منها مستطيلة ذات رجلات

والمحاقية خطية رحية. الخرينبيات يضة عريضة مخشنة بشعر كوكبي كثيف قصير. القلم ربع عرض

الخرينبية الى سدس طولاً. الغريقات ذات ٥ بزور الى ٦ والاجنحة متباها عرضاً او اعرض منها -

الصيف - جبل الكام

٣. *F. obovata*, Boiss. النيجيا البيضاء المقلوبة 24 قرم. الأوراق كاملة والجذرية منها ذات رجليات ومستطيلة مقلوبة والبقية خطية. الراسم قليل الأزهار. الخريبيبات بيضية مقلوبة مخشنة بصوف كوكبي. القلم قصير. الغريبات ذات ٣ بزور إلى ٥. الاجنحة اضيق من البزور - الجرود فوق بلودان

٤. *F. eriocarpa*, D.C. النيجيا الصفوية الشمر 24 الأوراق السفلى مستطيلة رمحية مسننة ارجونية والساقية مستطيلة خطية. الخريبيبات اهليلجية لبادية ذات قلم قصير. الغريبات ذات ٨ بزور مثل اجنحتها عرضاً - الصيف - صوفضاغ. الجبل الشرقي بقرب دمشق

٢٩ الاوبرياتيا *AUBRIETIA*, Adans.

الكاس منتصبة ذات حدين عند قاعدتها. البتلات ذات مخالب والصفحة كاملة او مفروضة. الخويطات متسعة مخمجة والقصيرتان منها مجهزتان بسن. الغدد ذات المصراعية ثنائية متحدة احياناً منعقة القاعدة. الخريبيبة مستطيلة. البزور مصطفة صفين - اعشاب حزامية معبرة قصيرة الزغب متفرعة. الازهار ارجوانية

A. Libanotica, Boiss. الاوبرياتيا اللبنانية 24 مستشيب. الأوراق مستطيلة ذالية ذات سن واحد من كل جانب او كاملة. الراسبات المقرمة متعرجة. الزينة المقرمة طويلة متعرجة - الصيف - جرود لبنان ونحمت جرود ولبناع

٣٠ الكوليوتيو كريس *COLUTEOCARPUS*, Boiss.

الكاس منتصبة متساوية القاعدة. البتلات ذات مخالب وشفحة كاملة. الاسدية مستقلة عادية الاسنان. الغدد ذات تحت المبيض منقودة. اللحة راسية. الخريبيبات قرطاسية متفخمة بيضية مشتبكة الوردية. الحاجز غير كامل. قاعدة الحبل السري صفحة ملتصقة بالحاجز. البزور ٨ او اقل بلا اجنحة - اعشاب حزامية ملساء منخفضة يضاء الازهار تشبه الثلاثية

C. reticulatus, Lam. الكوليوتيو كريس المشتبك 24 الأوراق يابسة والجذرية منها وردية النظام مستدقة القاعدة خطية مستطيلة اسنانها حادة ٢ - ٤ على كل جانب والساقية كاملة بيضية او مستطيلة حادة. الراسم راسي قبل الإثمار ثم مستطيل. الخريبيبة ملساء مستدقة القاعدة والراس. القلم خيطي - الصيف - لبنان حول الارز. قرب بلودان. جبل قسبيون

٢١ الذحيان KONIGA, A. lins.

الكاس متساوية منتصبة. البتلات كاملة بيضاء. الاسدية بلا اسنان. الغديسات المصراعة والمشيحية نأمية خيطية. الخربنبيات مفلطحة. البرور ذات حوافي - اعشاب سنوية او شجيرات مجهزة برغب متشعب

١. *K. maritima*, L. الذحيان البحري 2. فضي متصلب القاعدة كثير الحوق مستقيمة. الاوراق خيطية رحيمة حادة. الخربنبيات ملساء او قليلة الزغب المتشعب مفلطحة بيضية. النلم قصير. الغريقات ذات بذرة واحدة - الربيع - بقرب الاسكندرية. ومزروع في الجبائن لحسن منظره ورائحه ٣. *K. Lybia*, Viv. الذحيان اللبي ٤. مستشيب مستلق. الاوراق خيطية رحيمة كالة. الراسيات ذات فلوس عند قاعدتها. السلات خالدة تقريباً. الخربنبيات ٤٠٠٥ متر طولاً مفلطحة بيضية مجهزة بهلب متشعب. الغريقات ذات ٤ برور الى ٥ - الربيع - بادية اثية ٥. *K. Arabica*, Boiss. الذحيان العربي ٦. مستشيب مستلق. الاوراق مستطيلة ملوقة كالة مستدقة الى رجليه. الراسيات ذات فلوس عند قاعدتها. الخربنبيات ٢٥٠٣ متر طولاً مفلطحة قليلة الزغب متشعبة اهلجية مستديرة. الغريقات ذات بذرة او ٢ - الربيع - حدود فلسطين الى بادية الاسكندرية

٢٢ الألوسون. الألبسم ALEYSUM, L.

الكاس منتصبة متساوية الناعدة. البتلات كاملة او مفروضة صفراء او صفراء باهنة وليست بيضاء. الاسدية مجهزة بجناح ينتهي بسن او بمعلقة قاعدية ونادراً بلا سن او خيطية. الخربنبيات بيضية مستديرة او اهلجية. البرور من ١ - ٦

* الخربنبيية مفلطحة او محدبة الى الغريقة ذات بذرة واحدة. الحويضات مسننة
† معرة. برصاع او مسننية

١. *alpestre* ٢. *condensatum* ٣. *constellatum* ٤. *argenteum* ٥. *crenatum* ٦. *criophyllum* ٧. *Cassium*

† + حويطة

٧. *Cassium* ٦. *criophyllum* ٥. *argenteum* ٤. *constellatum* ٣. *condensatum* ٢. *alpestre* ١.

* الخربنبيية محدبة والغريقات ذات برورين. الحويضات مسننة او ذات معلقات

† معرة

١ الخويطات الطويلة مسنة أو مجهزة بجناح مجذوم

A. montanum ٨ *præcox* ٩ *suffruticens* ١٠ *lepidotum* ١١

ب. الخويطات الطويلة بلا اسنان فالجناح مستدق تدريجاً

A. Mouradicum ١٢ *tetrastemon* ١٣

† † منوية

A. macrostylum ١٤ *minimum* ١٥ *umbellatum* ١٦ *marginatum* ١٧

Szowitsianum ١٨ *strictum* ١٩

*** الخربنبيات محدبة والغريئات ذات برزتين. الخويطات مخرزة بلا اسنان

A. Damascenum ٢١ *dasycarpum* ٢٢ *calycinum* ٢٣ *homalocarpum* ٢٤

**** الخربنبيات مقلحة والغريئات ذات ٤ بزور الى ٦. الخويطات ذات اسنان

A. linifolium ٢٥ *menicoides* ٢٦ *aureum* ٢٧

١ *A. alpestre*, L. الألوسون الجردى 2٤ مخفض عشبي أو نجسي القاعدة. الاوراق بيضبة

مقلوبة أو مستطيلة والعليا منها رمحية خطية احياناً. البتلات بيضبة مقلوبة وحياناً مفروضة. الراسيات

المثمرة طويلة مندمجة. الخربنبيات مقلحة بيضبة مقلوبة والنم أكثر من نصفها طولاً - الصيف - قم

لبنان والجبل الشرقي - كثير الثبان والخربنبيات اهليجية او بيضبة وقد يعادل القلم الخربنبية طولاً

genuinum, Boiss. الحقيقي. ملازم الغطاء عشبي. الجذوع نحيلة قصيرة مستقيمة. الخربنبيات

اهليجية - لبنان فوق الارز

minutiflorum, Boiss. ب. الصغير الزهر. الاوراق ملوقة. الزهر صغير جداً. النلم

اطول من الخربنبية - قمة جبل صنين

suffruticens, Boiss. ت. النجيسي. السوق متصاعدة من جذع خشبي. الاوراق مستطيلة

- قمة الجبل الشرقي

٢ *A. condensatum*, Boiss, et Hausk. الألوسون المندمج 2٤ مخفض ٢٨ متر. السوق

متصلبة القاعدة متصاعدة. الاوراق مستطيلة بيضبة مقلوبة كالة مستدقة الى رحيلة. الازهار كبيرة.

البتلات بيضبة مقلوبة. الراسيات المثمرة صبرانية كورنبية. الخربنبيات نخالية مقلحة اهليجية مستدقة

القاعدة كالة الطرف والنم نصفها الى ثلثها طولاً - الصيف - قم جبال شمالي سورية

A. constellatum, Boiss, ٢٥ الألوسون المكوكب 2٤ عال ٤٥ متر الى ٧٥. السوق

عشبية متفرعة كورنبية عنفودية والنروع طويلة نحيلة عصوية منفرجة قليلاً. الاوراق مستطيلة ملوقة

طويلة الرحيلة، الثلاث بيضية مقبولة لونها كلون مع البيض. الراسيات المثمرة صوبانية، الخريبيبات اهليجية مستدقة الطرفين، والفلم ثلثها طولاً. البنور بلا اجمحة - الصيف - صوب صايف

٤. A. argenteum, Wittm. الالوسون الفضي 2٤ عال ٢٠ متر الى ٦٠ متر كثير السوق المشية الكورنية. الاوراق بيضية مقبولة مستطيلة او رحبة، الثلاث بيضية مقبولة، الراسيات المثمرة كورنية الخريبيبات بيضية او مستديرة او مجذومة قليلاً والفلم مثلها طولاً او اقصر منها قليلاً. البنور عريضة الاجمحة - الصيف - اماكن صخرية من جبل الاكام الى لسان

٥. A. crenulatum, Boiss. الالوسون الشريفي ٢٥ نجيبي ٥٠ متر، اوراق المربع العاقرة خطية مندمجة. السوق كورنية عنقودية اوراقها خضراء خطية مستطيلة. الثلاث مبروصة، الراسيات المثمرة مندمجة تكاد تكون صوبانية. الزوائد شعيرة متعرجة، الخريبيبات قليلة اغنية بسية مستديرة مفروضة غشائية الحوافي شرافيتها. البنور ضيقة الحوافي - الصيف - الجبل الاقارع

٦. A. eriophyllum, Boiss. et Hausskn. الالوسون الصوفي الورق ٢٠ سوق السدة بساء لبادية قصيرة وفي السنة اثنان فطول. الاوراق بيضية متناوبة مستطيلة منفرقة خضراء زينة الزغب متفرعة. الزهر كورني كثير الفروع. الراسيات المثمرة مندمجة قصيرة. الخريبيبات بيضية مقبولة اهليجية ذات زغب كوكي والفلم ثلثها طولاً - الصيف - جبل اسنام

شكراً



٧. A. Cassium, Boiss. الالوسون الاقاعي 2٤ احصر منفرق الغطاء الكوكبي. الساقي عال كثيف الاوراق كورني مندمج من الاعلى. الاوراق مستطيلة ومستطيلة او رحبة، الثلاث نحية النون مفروضة، الخريبيبات مستطحة بيضية مقبولة قليلة الغطاء والفلم نصفها طولاً او اقل - الصيف - جبال شالي سورية

٨. A. montanum, L. الالوسون الجبلي 2٤ منشيب أكثر

اواقل، الفروع متصاعدة عشية او نجيبة الماعلة. الاوراق بيضية متناوبة، طرف راسم، البنور اقاعي مستطيلة او مستطيلة خطية، صفحية الثلاث الصفراء مبروصة ضعف الكس طولاً، الراسيات المثمرة صول أكثر اواقل، الخريبيبات مبرصاء أكثر اواقل مستديرة والفلم مثلها طولاً، البنور صيتية او اجمحة او عادية - الربيع - الجبل الاقارع وتحت جرد لسان

٩. A. praecox, Boiss. الالوسون المبكر 2٤ ابرص، الفروع متصاعدة قصيرة، الاوراق بيضية او مستطيلة، الثلاث مبروصة، الراسيات المثمرة طويلة، الخريبيبات مستطبة كبيرة مبروصة - واحد - المصراعين منمخ، البنور كبيرة بلا اجمحة - الربيع - الجبال بين عتبات ومرشش

١٠. A. suffruticosus, Boiss. الالوسون التجبيسي 2٤ منشيب ارض، الفروع مستطبة

قصيرة متعرجة. الأوراق مستطيلة خطية. الثلاث كاملة. الخرنبيبات بيضية برصاء قليلاً. الزرور بلا اجنحة - الصيف - جرود شمالي سورية

١١. *A. lepidotum*, Boiss. الألوسون الابرس ٢٤ منخفض ابرص فضي لماع حرمي. الفروع عشبية. الأوراق كثيفة بيضية اهليجية. الثلاث مفروضة. الراسيات المثمرة قصيرة صوانية. الخرنبيبات بيضية مستديرة نحالية والقلم ثلثها طولاً. الزرور محرفة - الصيف - قمة صدين. نادر

١٢. *A. Mouradicum*, Boiss. et Bal. الألوسون المرادي ٢٤ ابرص مبيض نحجي. الفروع مستقيمة او متصاعدة. الأوراق مستطيلة ملوقة. الثلاث بيضية مقلوبة اسفينية كاملة. الراسيات المثمرة قصيرة. الخرنبيبات لمساء بيضية مستديرة متفخمة المصراع الواحد والقلم اقصر منها قليلاً - جرود لبنان فوق الارز

١٣. *A. tetrastemon*, Boiss. الألوسون الرباعي الاحدية ٢٤ ابرص ومن الاعلى لبادي عفاي. السوق منخفضة. الثلاث باهتة مستطيلة اسفينية مفروضة. الراسم المشر قصير. الزينات يابسة. الخرنبيبات برصاء بيضية مخرومة قليلاً وقلها مثلها طولاً - الصيف - جبال شمالي سورية

latifolium, Boiss. ب. العريض الورق. الأوراق اهليجية مستطيلة - جبل صدين

١٤. *A. macrostylum*, Boiss. et Huet. الألوسون الكبير القلم ٥ مستشيب خشن منفرع الزغب منفرج. الفروع قصيرة مستقيمة او متصاعدة. الأوراق بيضية مقلوبة او مستطيلة. الثلاث كاملة صفراء مبيضة. الخرنبيبات منفرجة الزائدة او منعقتها كبيرة بيضية خشنة والقلم اقصر منها قليلاً. الزرور بلا جناح - الربيع - جبال شمالي سورية. بلودان

١٥. *A. minimum*, Willd. الألوسون الاصغر ٥ ابرص مستشيب قزم متفرع العنق. الأوراق مستطيلة خطية. الثلاث خطية مفروضة باهتة. الراسم المشر طويل مندمج. الخرنبيبات منتصبية الزائدة مستديرة مخرومة. القلم سدسها طولاً. الزرور ضيقة الحافات - الربيع - مزارع حلب

١٦. *A. umbellatum*, Desv. الألوسون الصواني ٥ مستشيب ملازم الزغب حرشة منفض ذو عنق متفرع والفروع بسيطة تقريباً. الأوراق خطية او خطية مستطيلة. الثلاث باهتة خطية مفروضة. الراسيات المثمرة صوانية مندجمة. الخرنبيبات حرشة بيضية كالة والقلم ثلثها طولاً. الزرور ضيقة الحوافي - الربيع - شمالي سورية

١٧. *A. marginatum*, Steud. الألوسون المحرف ٥ رمادي قزم من عنق متفرع. الأوراق مستطيلة ملوقة كالة والاعلى منها تعلو الراسم وتغلغ. الازهار صغيرة. الثلاث باهتة خطية اسفينية. الراسم المشر قصير يضي. الخرنبيبات متراكمة تقريباً برصاء بيضية مخرومة. السمة جالسة تقريباً. الزرور بلا جناح - الربيع - اماكن صخرية في بادية مينا

١٨ *A. szowitsianum*, F. et M. الالوسون سوفشيس © فزم مستشيب ملازم الرغب اورمادي
مخفض . الفروع متصاعدة من عنق متفرع قصيرة بسيطة . الاوراق مستطيلة خطية . الثلاث صفراء
مبيضة خطية اسفينية . الخريبيات متراكبة تكون سنبلًا طوله ٢٠٢ متر الى ٢٠٣ وهي بيضيه كامله .
القلم قصير - الربيع ولول الصيف - قرب حلب ودمروحت جرد لبنان والجبل اشرفي
١٩ *A. strictum*, Willd. الالوسون المثيبس © عال مستشيب . السوق متعددة
متصاعدة متفرعة . الاوراق مستطيلة خطية عريضة كاله . الثلاث مستطيلة رحيمة صفراء باثمة . الراسيات
المثمرة طويلة (٢٠٦ متر طولاً) اسطوانية . الخريبيات متراكبة الى الاعلى منفرجة العناء وبه كاله .
القلم قصير مخروطي . البزرة ضيقة المحافة - الربيع - جبال شمالي سورية



٢٠ *A. campestre* L. الالوسون الساحلي © رمادي او مصفر .
السوق متعددة متصاعدة . الاوراق رحيمة مقلوبة ملوقيه او مستطيلة رحيمة . الثلاث
متشعبة اطول قليلاً من الكاس . الزيدات منفرجة قليلاً . الخريبيات مستديرة .
القلم قصير . البزرة ضيقة المحوافي - الربيع
١. *genuinum*, Boiss. الحقيقي . اشعة زغب الخريبيه قصيره -

المزارع . كثير الوجود

راسم رمادي
الالوسون ساحلي
الحقيقي

hirsutum, Post. ب . العفائي . طويل الزغب الكوكبي . زغب
الخريبيه طويل الاشعة مزوج بهلب ناشي من درن - المزارع - كثير الوجود
مع الرمز (*A. hirsutum*, M. B.)

٢١ *A. Damascenum*, Boiss. et Gaill. الالوسون الدمشقي © رمادي محصب .
الفروع بسيطة من عنق متفرع . الاوراق مستطيلة رحيمة . الثلاث متشعبة اطول قليلاً من الكاس .
الراسم المتمر قصير . الزيدة متصبه . الخريبيات برصاء بيضيه والنم ربعها طولاً - الربيع - مزارع
حول دمشق

٢٢ *A. dasy carpum*, Steph. الالوسون العفائي الثمر © مخفض رمادي .
كامله بيضيه مقلوبة قليلة المحدة . الراسيات مندمجة . السلالات ساقطة اخيراً . الثلاث خطية : ثمرها
الخريبيات عفائية اهليجية محدبة . القلم مثلها طولاً - الربيع - دير عطية شمالي دمشق

٢٣ *A. calycinum*, L. الالوسون الكاسي © متصب اشيب . الاوراق السلي بيضيه
مقلوبة والبقية رحيمة . الراسم بسيط مستطيل اخيراً . السلالات مستمرة . الثلاث خطية : ثمرها الخريبيه
زغبية مستديرة مخروطية مقلطحة المحافة محدبة المركز . السبه جالسه . البزرة ضيقة المحوافي - الربيع -

جبل قصبون بقرب دمشق

٢٤. *A. homalocarpum*, F. et M. الالوسون السفلح الشمر ① رمادي مخفض (٢٠٤ متر إلى ٢٠٦) متفرع من القاعدة. الأوراق رحيمة. الأزهار صغيرة. البتلات ملوقية اسفينية صفراء اقصر من الكاس. الراسم المثمر طويل. الخريبيية ملساء اطول من زبدتو المنفرجة مستديرة قليلة الالتفاح. القلم خطي خمسه طولاً. البنور ضيقة الحافة - الربيع - جبل سينا

٢٥. *A. linifolium*, Steph. الالوسون الكفاني الورق ① مسنشب. الأوراق خطية. البتلات باهتة خطية اسفينية مخرومة مثل الكاس طولاً تقريباً. الخريبييات بيضية اهليجية قصيرة القلم. الغريقات ذات ٢ بزور إلى ٦ عادمة الاجنحة - الربيع - اماكن جافة قرب بتماس وعيتاب. بادية العرب بقرب فلسطين

٢٦. *A. menticoides*, Boiss. الالوسون الشبيه بالميوكوس ① مسنشب ملازم الغشاء. الأوراق خطية مخززية. البتلات بيضية مقلوبة صفراء ضعف الكاس طولاً تقريباً. الخريبييات بيضية اهليجية قصيرة القلم ذات ٤ بزور عادمة الاجنحة - الربيع - دمشق وشمالها وشرقها

٢٧. *A. anreum*, Fenzl. الالوسون الذهبي ① مسنشب. الأوراق مستطيلة خطية. البتلات ليمونية اللون مستطيلة ملوقية مخرومة ضعف الكاس طولاً. الخريبييات بيضية والقلم نصفها طولاً. الغريقات ذات ٢ بزور إلى ٤ عادمة الاجنحة - الربيع - الكروم من حلب الى القدس

٣٣ الدرابا DRABA L.

الكاس منتصبة متساوية القاعدة. البتلات كاملة او مخرومة. الغديبات المصراعية توأمية. الخويطات مستقلة عادمة الاسنان. السمة راسية. الخريبيية بيضية او اهليجية منضغطة او منتفخة. المصاريع بلا عصب. الحبل السري مستقل. البنور غالباً عديدة مصطفة صفير وعادمة الحوافي - اعشاب سنوية او معمرة حزمية على الغالب يضاء الازهار او صفراً وما غير منتسبة الاوراق

١. *D. oxycarpa*, Boiss. الدرابا الححاد الشمر 2٢ حزمي مندج. الاوراق خطية عريضة حادة. الجرائد قصيرة خملية. البتلات صفراء غامقة. الاسدية اقصر من الدوج قليلاً. الراسم المثمر صبوراني. الخريبييات عنائية خشنة منتفخة مستطيلة مدببة. القلم نصفها طولاً او أكثر - الصيف - جرود لبنان والجبل الشرقي وتحت جرودها

٢. *D. vesicaria*, Desv. الدرابا المثانية 2٢ وسادسي مندج. الاوراق متراكبة تحت السوق مستطيلة رحيمة. الزغب المنفرع مزوج بهلب قليل بسيط. الجرائد قصيرة وبرية. البتلات

صفراء باهنة . الاسدية نصف التويج طولاً . الرأس مسترسل قليلاً . الخربنبيات قصيرة الصفراء بيضبة
كالة واحدة قليلاً متفخمة . الفلم قصير - الصيف - قم لبنان والجبل الشرقي

٣٤ الأروفيلا *EROPHILA D. C.*

الكاس متضبة متساوية القاعدة . الثلاث منشعبة بيضاء . الخويطات مستقلة عادة الاسنان .
الخربنبيات بيضبة مستطيلة أو خطية - اعشاب سنوية أوراقها صغيرة وردية النظام . الجرائد قرمة
عادة الأوراق . الأزهار صغيرة بيضاء

* البزور ٧-٨ في كل غرينة

E. minima, U. A. M. ١ . الأروفيلا الصغرى ⊙ الأوراق خطية كاملة أو مسندة بسيطة
الزغب . الثلاث اقل من ضعف الميلاط طولاً . الجريدة قصيرة . الخربنبيات اهليلجية متفخمة قليلاً -
الربيع - زارع لبنان ودمشق

* * البزور ١٦ - ٢٤ في كل غرينة

F. praecox, Stev. ٢ . الأروفيلا المبكرة ⊙ الأوراق مستطيلة أو اهليلجية مسندة القاعدة
قليلة الاسنان متفرعة الزغب . الثلاث ضعف الكاس طولاً . الخربنبيات بيضبة مقبلة مستديرة .
الربيع - دمشق

F. vulgaris, D. C. ٣ . الأروفيلا الاعتيادية ⊙ . مثل المتقدم ذكره إلا أن الخربنبيات
مستطيلة اهليلجية - الربيع - دمشق . راشيا . ويرج انه تايين من المتقدم ذكره

F. scutellaria, Boiss. et Bal. ٤ . الأروفيلا الهليلجية ⊙ الأوراق مستطيلة . عبيبة طويلة
الرجلة قليلة الزغب بسيطة . الثلاث ضعف السلات طولاً أو أكثر . الخربنبيات اهليلجية مسندة
الطرفين - الربيع - ساحل سورية البحري واسفل جبل لبنان

٣٥ الكوكلياريا (حشيشة الملاحق) *COCHLEARIA L.*

الكاس منفرجة متساوية القاعدة . الثلاث كاملة . الاسدية بلا اسنان او مغلقات ومستقيمة او ذات
ركبة من الاعلى . السمة غير منقسمة . الخربنبيات مسندة او اهليلجية . المصاريح متفخمة أكثر او اقل .
البزور في صف واحد - اعشاب احادية الاثمار او معمرة . لساء بيضاء . الأزهار
C. crassifolia, Post. ١ . الكوكلياريا المتفخمة الأوراق ⊙ او السوق حزمة كثران

اقل بسيطة ٢٠٢ متر الى ٢٠٦ علماً. الاوراق لحية والجذرية منها بيضية مقبوبة ملوقة مستدقة الى رجبلة والساقية بيضة مقبوبة كالة معانة قليلاً. الخريبيبات اهليلجية رجمية. الثلم ثلث الخريبيبية طولاً. البزور بيضة مقبوبة - آب وابلول - ظهر النضيب

٣. *C. velutina*, D. C. الكوكلياريا النخيلية ⊙ مستشيب. الاوراق الجذرية مستطيلة رجمية مسننة اوريشية التفصيل. الخريبيبية بيضية اهليلجية ضعفا الزيدة الخيطية طولاً واكثر. الثلم قصير - الربيع - تلؤل كسبة بقرب حلب (*Ohrysochamela velutina*, D. C.)

٢٦ التليوم *LEPTALEUM*, D. C.

السبلات خطية مقبوبة متساوية القاعدة. الپتلات خطية. الاسدية الطويلة لمنحمة زوجين واثنتان فقط. الخرنوبية غير شاقة تقريباً مفلطحة قليلاً والمصاريع ذات عصب واحد مشبكة الوردية. البزور مصطفة صنفين غير محرفة. فصا السمة مغمدان في مخروط صغير - اعشاب سنوية ازهارها بيضاء

٤. *L. filifolium*, D. C. التليوم الخيطي الورق ⊙ اماس قزم منشعب الفروع. الاوراق خيطية غير منقسمة اوريشية مفصلة الى قطع خيطية. الازهار جالسة ابضية. الپتلات ضعف الكاس طولاً

٢٧ الكملينا *CAMELINA*, Crantz.

الكاس متساوية القاعدة تقريباً. الپتلات كاملة مستطولية خطية متسعة تدرجاً من القاعدة الى القمة. الاسدية مستقلة عادمة الاسنان. الخريبيبية اجاصية او اسفنية او خطية قصيرة محززة الحوافي. المصاريع متفتحة صلبة فيها ممتدة الى الاعلى منتهية في قاعدة القلم. السمة بسيطة. البزور مصطفة صنفين ونادراً صنفاً واحداً - اعشاب سنوية ملحاء او متشعبة الزغب ازهارها صفراء واوراقها الجذرية مستطيلة رجمية والساقية رجمية سهية اذينية

١. *C. sativa*, L. الكملينا المزروعة ⊙ قليل الزغب. الاوراق كاملة او ذات اسنان صغيرة. السبلات ١/٢ الپتلات طولاً. الراسيات المثمرة قصيرة. الزيدة المثمرة ضعفا الخريبيبية او ٣ اضعافها طولاً. الخريبيبية مشبكة بيضية مقبوبة ضيقة الحافة. القلم ربع الخريبيبية طولاً واكثر. البزور ثلثية الزوايا - الربيع - يبروت

٢. *C. hi-pida*, Poiss. الكملينا اللحية ⊙ منفرج اللحية. الاوراق مسننة. الكاس لحوية ثلثا الپتلات طولاً. الراسيات المثمرة مستطيلة. الزيدات ضعفا الخريبيبيات طولاً واكثر. الخريبيبيات

بيضية مقلوبة مفلطحة قليلاً ملساء عريضة المحافة . القلم مثلها طولاً تقريباً - الربيع - من تدمر الى بعلبك وشرقهما

٢. *C. lasiocarpa*, Boiss. et Bl. الكلينا الحشر الشمر ① عثاني . الاوراق كسامة قليلة الاسنان . الكاس لحوية ¼ الثلاث طولاً . الراسيات الثمرة طوية . الزبدات باسنة اقل من ضعفي الثمرينبيية طولاً . الثمرينبييات بيضية اهليجية عثانية اقصر من قلبها - الربيع - بين حماه وتدمر . قلدون

٤. *C. anomala*, Boiss. et Haussk. الكلينا الشاذة ② من الاسفل منترج الزغب منترعة . الاوراق كاملة تقريباً . الساق منترع . السيلات قليلة الغفاء . البتلات صفراء مبيضة . الراسيات الثمرة مستطيلة . الثمرينبيات ثلاثة اضعاف زبداتها اليابسة طولاً خطية اسطوانية اعرض قليلاً عند القمة . القلم ثلاثة اضعاف عرض الثمرينبيية طولاً - الربيع - قرب حارارن في شمالي سورية

٣٨ الكيسلا CAPSELLA, L.

السيالات متساوية القاعدة . البتلات بيضية مقلوبة كاملة . الاسدية بلا اسنان . الثمرينبيية مثلثة مقلوبة مخرومة او بيضية كاملة والمصاريع زورقية بلا اجنحة . الغريفات كثيرة البزور - اعشاب سنوية كاملة الاوراق او مفصصتها والجذرية منها وردية النظام . الازهار بيضاء



ج

ح

١. *C. Bursa-Pastoris*, L. الكيسلاً كف الراعي ① الاوراق الجذرية كلابية والساقية ذات اذينات . الكاس ثلثا التموج طولاً . الثمرينبييات قلبية مقلوبة وضلعها السفلي اطول من العلوي - الربيع - عام غير منقسمة اوريشية التفصيل اهليجية اورمحية القطع . الازهار صفيرة . الثمرينبييات بيضية كالة او مجذومة - الربيع - الاسكندرية

ب. *integrifolia*. الكامل الاوراق . الاوراق كاملة مستطيلة الزاوي مكبرة ضعفين . ج. نلك مشقوقة على الحاجر حادة او قليلة التفصص - حسرون

٣٩ الليديوم LEPIDIUM L.

الكاس متساوية القاعدة . البتلات كاملة . الاسدية ٤ او ٢ مستقلة وجميعها بلا اسنان . الثمرينبيية

مستديرة تقريباً أبيضية أو اهليلجية ثنائية الغريبات شاذة والمصاريع عادمة الاجنحة أو مجنحة. الغريبات ذات بويضة أو بويضتين

* الخرينبيات بيضية أو مستطيلة مفروضة القبة مجنحة المصاريع

L. sativum | *spinescens* | *cornutum* | *oxyotum* ٤

** الخرينبيات بيضية عرضاً أو اهليلجية وغالباً قلبية القاعدة كاملة القبة غير مجنحة المصاريع

L. Draba ٥ *crassifolium* ٦ *latifolium* ٧ *graminifolium* ٨

*** الخرينبيات اهليلجية مخرومة القبة. المصاريع جزئية مجنحة قليلاً عند القبة

L. perfoliatum ٩

١. *L. sativum*, *L.* اللبديوم المزروع ٥ الساق منتصب بإس عنقوديه. الأوراق

المجذرية غير متساوية التفصص أو الخرق الريشي الاحادي أو الثنائي والساقية خطية غير منتسبة. الراسم الزهري طويل. الزنيدات باسبة. الخرينبيات مستديرة بيضية مفروضة ضيقة الاجنحة. القلم مثل عمق الفضة طولاً - الربيع - مزروع وفالت من المزارع. كثير الوجود

٢. *L. spinescens*, *D. C.* اللبديوم المستشيك ٥ اماس. الساق عالٍ ضخم مبيض

متشعب التفرع. الأوراق السفلى ريشية التفصيل قطعاً خطية مستطيلة والعليا خطية مسننة أو كاملة. الراسيات مستطيلة اخيراً باسبة والفنار مستشيك. الزنيدات باسبة. الخرينبيات بيضية مفروضة ضيقة الجناح والقلم معادل الفضة طولاً - الربيع - اماكن رطبة في سورية وفلسطين

٣. *L. cornutum*, *S. et S.* اللبديوم القرني ٥ الساق منتصب بإس الثروع قصيرها.

الأوراق السفلى ريشية التفصيل قطعاً ضيقة حادة والعليا رمحية خطية كاملة تقريباً. الراسيات ابطية وانتهائية مستطيلة وفي الاثمار مستشيكية. الخرينبيات ملازمة الفنار مستطيلة ذات جناح عريض وهي تشعب عند قمتها الى فصين مستطيلين. القلم قصير - الربيع - مزارع سورية

٤. *L. oxyotum*, *D. C.* اللبديوم الحاد الاذينة ٥ قزم منفرج العناء قصير. السوق

منحنية قصيرة. الأوراق المجذرية ذات رجيلات وبوضية كسامة أو مسننة خلية القاعدة والساقية صغيرة مستطيلة اذينية طهرية. الخرينبيات صغيرة زغبية مستدقة القاعدة مستديرة مجذومة القبة ضيقة الجناح من الاعلى. القلم نصف الخرينبية طولاً - الربيع - سورية

٥. *L. Draba*, *L.* اللبديوم الدرابا ٤ زغبى. الساق منتصب كورني التفرع. الأوراق

بيضية أو مستطيلة رمحية جونية أو مسننة والمجذرية منها مستدقة الى رجيلة والساقية سهمية معانقة. الخرينبيات منتفجة اعرض من طولها قلبية القاعدة والقلم ربعا طولاً - الربيع - المزارع. كثير الوجود في سورية وفلسطين

Chalepense, Post. ب. الحلبي. الخربيبات بيضة حادة الطرفين. الاوراق مستطيلة

رعية - المزارع. كثير الوجود في سورية وفلسطين (L. Chalepense, L.)

L. crassifolium, W. K. ٦. اللبيوم الضخم الورق 2٢ تنفخض. املس اوزغبى .

العنق ليفي. الساق منشعب عنقودي كورني. الاوراق لحمية والحذرية منها ذات رجيلات وبيضة كاملة او قليلة الاسنان والساقية متصاعدة رعية سمية. الخربيبات بيضة او اهليلجية مشبكة. السمة جالسة تقريباً - الربيع - مرج دمشق

L. latifolium, L. ٧. اللبيوم العريض الورق 2٢ عال املس اوزغبى. الساق

عنقودي. الاوراق مستطيلة رعية حادة كاملة او ذات سنينات السفلى منها ذات رجيلات والبقية مستدقة القواعد. الخربيبات صغيرة مستديرة بيضة او اهليلجية لمساء اوزغبية وقد تكون مخرومة القاعدة. السمة جالسة - الربيع - المستنعات. عام في سورية

L. crassifolium, L. ٨. اللبيوم النجيلي الورق ٢٠ او ٢٢ عال متفرع. الاوراق السفلى

والوراق السوق السنوية ذات رجيلات ومستطيلة ملوقة شرافية او مقصودة الناعمة. الساقية العليا خطية غير منقسمة. الراسيات المثمرة مستطيلة. الخربيبات صغيرة بيضة حادة. السم قد ير .. الربيع - انطاكية الى حص وشمالها

L. rostratum, L. ٩. اللبيوم المشقوق (٢) الساق منشعب عنقودي كورني. الاوراق

السفلى ثلاثية التفصيل الريشي قطعها مستديرة حادة العليا قليلة معانة كاملة. الازهار صفراء موهضة. الراسيات المثمرة مستديرة. الخربيبات مستديرة كبيرة متشعبة الجناح من الاعلى قد ير السم - الربيع - البقاع ودمشق الى حص وشمالها

٢٠ الايثيونيا

الكاس ذات حدين. البتلات كاملة. الاسدية الكبرى غالباً متحدة او مبرزة بسن مستقيمة او ملتفة زوجين. الخربيبات منفضة مجانبية قلبية مقلوبة بلا اجنحة ونادراً ذات غرنة واحدة غير شاقفة وغالباً ذات غريفتين والبويضات ١ الى ٣ - احتساب او ثغيبات ذات ازهار وردية او ارطوانية ونادراً بيضاء

من ممره حزين.

L. Douroei, Boiss. ١. الايثيونيا بوركوس 2٢ قزم. الاوراق مستدقة اناعنة متقابلة

بيضة مقلوبة. الازهار كبيرة وردية. الراسيات المثمرة صوانية. الخربيبات مستديرة اشطبية مستديرة

القاعدة والقبعة بعادها قلم قصير - الصيف - اماكن محجرة في جرود اكضاغ في شالي سورية
٣. *oppositifolium*, Labill. . الايثيونيا المتقابلة الورق 24 المجزوع قصبة .
 الاوراق لحمية مستديرة متقابلة سرحا الحوافي . الراسيات المثمرة صويانية . الخربنبيات اهليلجية بيضة
 مجذومة مفروضة القبة . القلم مثنى . الجبل السري ملتصق بقاعدة البزور - الصيف - قبة لبنان

* * * معبرة فجيية

٢. *Armenum*, Boiss. . الايثيونيا الارمنية ٥ السوق منتصب بسيطة مخفضة . الاوراق
 قصيرة خطية حادة . الازهار صغيرة . الراسيات المثمرة قصيرة . الخربنبيات بيضة مقلوبة كالة القاعدة
 مفروضة القبة والفرضة عريضة كالة . الاسفحة شرافية اعرض من القرينة . القلم اقصر من الفرضة -
 الربيع - الجبال بقرب عينتاب

٤. *coriifolium*, D. C. . الايثيونيا الكوريدية الورق ٥ السوق كبيرة قصيرة
 بسيطة ضخمة . الاوراق خطية او مستطيلة خطية . الازهار كبيرة . الراسيم المثمر قصير . الخربنبيات
 يابسة بيضة مستطيلة زورقية لسبب التفاف الجناح الكامل الضيق الى الاعلى . القلم اقصر كثيراً من
 عمق الفرضة الضيقة - الصيف - تحت جرود لبنان

٥. *stylisum*, D. C. . الايثيونيا القلبية ٥ السوق قليلة قصيرة . الاوراق بيضة رحيمة
 والسفلى منها قصيرة الرجيلات . الازهار مرتبة في رؤوس كبيرة . الراسيم المثمر مستطيل . المبيض يضي بكاد
 لا يكون مفروضاً . الجناح صغير الاسنان . القلم طريل . الخربنبيات * * - الصيف - جرود لبنان المتوسط
٦. *longistylisum*, Pos. . الايثيونيا الطويلة القلم ٥ السوق مستعيلة منتصب .
 الاوراق مستطيلة خطية كالة مخيانية . الازهار * * * . الراسيات المثمرة قصيرة . الخربنبيات مستديرة
 مفروضة . الجناح مغاطخ او قليل الالتفاف كامل . القلم اطول من الفرضة - الصيف - قبة الجبل
 شرقي دوما (الفغري)

٧. *cordatum*, Dcsf. . الايثيونيا القلبية ٥ السوق قليلة يابسة كثيفة الاوراق بسيطة
 تقريباً . الاوراق جالسة ذالية قلبية او مستديرة قلبية والسفلى منها متقابلة . الازهار كبيرة كبريتية . الراسيم
 المثمر مستطيل . الخربنبيات بيضة مجذومة مفروضة القبة والجناح جوفي متسع قليلاً من الاعلى اعرض
 قليلاً من القرينة . القلم كاخربنبيات طولاً تقريباً - الصيف - قرب ارز لبنان . الجبل الشرقي

* * * سنوية

٨. *cristatum*, D. C. . الايثيونيا العرفية ٥ الاوراق السفلى بيضة او مستطيلة ذات
 رجيلات والساقية حادة جالسة القاعدة قلبية . الازهار صغيرة وردية او بيضاء . الخربنبيات غالباً مخنطة

الهيئة فالسفلى احادية الغرينة صغيرة واحياناً مقنودة والبقية ذات غريتين بيضية مقلوبة. الجناح اعرض من الغرينة كبير المخرق والاسنان. القلم اقصر من عمق الفرسة المنفرجة - الربيع - مزارع طوبية من حلب الى القدس

٩. *E. heterocarpum*, J. Gay. الايثيونيا المختلفة الثمر ① الاوراق مستطيلة ذات رجلات والعليا منها قلبية القاعدة تقريباً. الازهار صغيرة. القلم اقصر من المبيض. الخريبيبات مخنطة الهيئة بعضها ثنائية الغريفات مستديرة. الجناح كامل اعرض من الغرينة والفرسة مغلقة. البقية ذات غرفة واحدة جرية الهيئة لاثفاف الجناح الى الداخل - الربيع - مزارع من حلب الى القدس

١٠. *E. intermedium*, Poit. الايثيونيا المتوسطة ② الاوراق مستطيلة رمحية والسفلى منها ذات رجلات والعليا جالسة قلبية القاعدة. الازهار متوسطة. الخريبيبات نوعان فالسفلى كروية ذات غرفة واحدة والعليا مستديرة ذات غريتين وجناح كامل او زاوي، القلم طويل - الربيع - الحقل قرب عيتاب

ورعا الانواع الثلاثة الاخيرة نباتات نوع واحد

١١. *E. campylopterum*, Boiss. الايثيونيا المغنية الجناح ③ اكثر الاوراق جالسة. الازهار متوسطة وردية باهتة. القلم اطول من المبيض. جميع الخريبيبات ذات غرفة واحدة جرية كروية مجنحة. الجناح ملتف الى الاعلى شرافي - الربيع - مزارع عيتاب وحلب

١٢. *E. Buxbaumii*, Fisch. ايتيونيا بقسبوم ④ الاوراق السفلى بيضية والساقية حادة قلبية القاعدة. الازهار صغيرة. جميع الخريبيبات مستديرة ثنائية الغريفات تكون سنبلًا متراكبًا ينسبه سنبل حشيشة الدنيار. الجناح اعرض من الغرينة. الفرسة عميقة مغلقة. القلم قصير - الربيع - مزارع شالي سورية

٤١ الشويا SCITOWIA, D. C.

الكاس متساوية. البتلات ذات مخالب والصفية بيضية مقلوبة. الخويطات عادة السنية. موصل الانثيين ممد الى الاعلى. الخريبيبات منضغطة مجنحة ثنائية الغريفات قلبية القاعدة مفروضة انثية منتبهة بقلم هرمي. المصارع قرطاسية مجنحة. البرور متعددة كروية مصدنة صفير - اعشاب سنوية متفرعة ازهارها بنفجية

S. Schimper, Jaub. et Sp. شويا شجير ① الاوراق الجذرية مستطيلة مستدقة القاعدة كاملة او جنوبية والساقية بيضية قلبية طويلة الاذينات حادة. الخريبيبات بيضية مستديرة والقلم حموي مثلها طولاً واقصر منها - الربيع - بادية سيناء

٤٣ اليسكوتولا BISCUTELLA, L.

السلالات متساوية او الجانبيتان محددتا القاعدة . البتلات بيضية مقلوبة كاملة ذات مخالب .
الاسدية مستقلة عادمة السنية . الخريبيية غير شاقة توأمية منضغطة مجانبية
والمصاريع مستديرة احادية البزرتنصل اخيراً من الففار - اعشاب
سنوية عفاثية على الغالب ازهارها صفراء

شكل ٢٩



B. Columnar, Ten. اليسكوتولا العمود (اي جبل طارق)
الاوراق الجذرية بيضية مقلوبة اسنينة كبيرة الاسنان والساقية رحيمة
مستطيلة وخطية - الربيع

genuina, Post. ١. الحقيقة . الاوراق الساقية قليلة العدد

متباعدة الاسنان - اماكن جافة في سورية وفلسطين

depressa, Boiss. ب . النخطة . فزم . السوق اطول قليلاً راسم اليسكوتولا العمود

١ . الحقيقة

من الاوراق - زحلة . بلودان . الاسكندرية

dentata, Post. ت . المسننة . لحوي . الاوراق الساقية اكثر عدداً ما في الرمز واسنانها

كبيرة حادة - جبل التريل بقرب طرابلس

٤٣ الهلدرنخيا FELDREICHIA, Boiss.

الكاس متساوية القاعدة . البتلات متساوية كاملة . الخريبييات مقلطة مجانبية توأمية قليلاً اهلجية
عرضاً مخرومة النمة غير مجعفة . الغريفات ذات بزرة واحدة . الحاجر خطي ضيق . البزرة منضغطة
غير محرفة - اعشاب جردية ازهارها بيضاء

EH. duplexrifolia, Boiss. الهلدرنخيا البيولثقرية الورق 24 ام الجذوردقيقة

زاحفة متفرعة القمة . السوق متشعبة الفروع . الاوراق لحبية مستغبرة مستطيلة ملوقة كاملة مستدقة
الى رجليه والعلبا خطية . القلم ربع الخريبيية طولاً - آخر الصيف - ظهر النضيب

٤٤ الثلاثسبي THELASPI, L.

الكاس متساوية القاعدة . البتلات متساوية اوزجان غير متساوين . الاسدية مستقلة عادمة
الاسنان . الخريبيية منضغطة مجانبية مستديرة وغالباً مخرومة . المصاريع زورقية بيضية - اعشاب سنوية

١. *T. brevicaulis*, Boiss. et Ky. الفلاسي القصير الساق ② قزم (٢٠٣ متر إلى ٢٠٦) الأوراق الجذرية صغيرة بيضية ذات رجيلات والساقية كاملة تقريباً بيضية معانقة حادة الأذنيات .
 الثلاث بيضاء مخرومة أطول من الكأس . الراسم المتمر راسي كثيف . الخريشبات مستديرة مستبكة
 الأجنحة . الفرضة مغلقة . السمة جالسة - الربيع - تحت جرد لبنان والجبل الشرقي
 ٢. *T. microstylum*, Boiss. الفلاسي الصغير القلم ③ أو ④ السوق كثيرة متصاعدة
 قصيرة . الأوراق كاملة تقريباً والجذرية منها بيضية ذات رجيلات والساقية معانقة طويلة الأذنيات
 حادتها . الثلاث وردية باهتة ضعف الكأس طولاً . الخريشبات قلبية مقلوبة ضيقة الفرضة . الجناح عصبي
 وقبته اعرض من الغرقة . القلم ربع عمق الفرضة طولاً - الربيع - الجبل الاقصر . لبنان قرب
 اهدن

٣. *T. perfoliatum*, L. الفلاسي المثقوب ⑤ الساق متفرع . الأوراق الجذرية بيضية
 مقلوبة ذات رجيلات والساقية معانقة طويلة الأذنيات . الثلاث ضعف الكأس طولاً . الراسم المتمر
 مستطيل . الخريشبات بيضية مقلوبة . الجناح بلا اعصاب مستدير اشعة . السمة جالسة - الربيع
 مزارع سورية وفلسطين

stylatum, Post. ب. القلمي . ذوتلم قصير - مع الزر
 ٤. *T. rotundatum*, Boiss. ت. المستدير الثمر . ذو خريشبات كبيرة مستديرة وندج عريض
T. Natolicum, Boiss. الفلاسي الانضوي (شَمْ مَوْرَة) ⑥ مثل المندم ذكره
 الآن القلم مثل عمق الفرضة طولاً تقريباً . والأزهار غالباً أكبر وغير متساوية الثلاث - الربيع - كثير
 الوجود في سورية وفلسطين

magniflorum, Post. ب. الكبير الزهر . غار متساوي الثلاث نالزوج الأطول
 أربعة اضعاف السبلات طولاً والافصر ضعفاً - جبال شالبي سورية ولبنان . الأزهار ٢٠٠٧٥ متر طولاً
 ٥. *T. violascens*, Schott. الفلاسي البنفسجي ⑦ مستدير . الأوراق الجذرية جوية
 بيضية مستطيلة مستدقة الى رجيعة والساقية كاملة حادة الأذنيات كثة . الثلاث أطول
 قليلاً من الكأس الأرجوانية . الانثريات ارجوانية مثل الثويج طولاً . الراسمات المتمر طوية مندحجة .
 الخريشبات مثثة مقلوبة منفرجة الزينة ضيقة الفرضة مستديرة الجناح . القلم نصف عمق الفرضة طولاً
 - الصيف - جبل بلان

٦. *T. densiflorum*, Boiss. et Ky. الفلاسي المندمج الثمر ⑧ مستدير . الأوراق الجذرية
 مسننة بيضية مستطيلة مستدقة الى رجيعة والساقية كاملة مستطيلة حادة الأذنيات معانقتها .
 الراسمات المتمر قصيرة مندحجة . الثلاث ضعف الكأس طولاً . الانثريات صدى . الخريشبات مثثة

مقلوبة اطول قليلاً من زبدانها المنفرجة ضيقة الفضة حادة الجناح . القلم نصف عمق الفضة طولاً -
الصيف - جبل ييلان

T. elegans, Boiss. ٧ . الفلاسبي الحسن ⑤ عال (٢٠ متر) مستغبر . الساق كورني .
الاوراق كاملة والجذرية منها (٢٠٦ متر طولاً) بيضيه مقلوبة مستدقة الى رجيعة طويلة والساقية بيضيه
كالة الاذنيات معانقها . البتلات بيضاء ضعفا الكاس او ثلثة اضعافها طولاً . الراسيات المثمرة مندحمة .
الخريشبيات مستطيلة قلبية مقلوبة عريضة الفضة . الجناح حاد اضيق من الغريفة . القلم نصف
عرض الخريشبية طولاً - الصيف - جبل ييلان

٤٥ الأيرس IBERIS, L.

الكاس متساوية القاعدة . البتلات غير متساوية وفي الازهار الخارجية شعاعية . الاسدية مستقلة
عادمة الاسنان . الخريشبيات منضغطة مجانبية يوضيه اويضيه مقلوبة والغريفات ذات بزرة واحدة .
المصاريع زورقية مجنحة الظهر - نجيحات واعشاب ازهارها صيوانية

I. Jordani, Boiss. ١ . ايرس جوردان ⑤ العنق متفرع . الفروع ضخمة متعرجة القاعدة
منخفضة متصاعدة . الاوراق ذات هليبا ابيض كاملة مستطيلة ملوقية . الازهار وردية متشعبة متراكبة في
صيوان مفلطح . الخريشبيات مجنحة في راسم صيواني بيضيه مقعرة قليلاً . الجناح ارجواني حاد اعرض
من قمة الغريفة . القلم اقصر من الفضة - الصيف - جبال سورية الشمالية . عين البيضاء قرب صنين
E. Taurica, D.C. ٢ . الأيرس الطوروسي ⑤ مخنض . متفرع العنق ملبس هليكات حلجية .
الاوراق خطية ملوقية كاملة او مسننة قليلاً . الازهار وردية باهتة متشعبة . الخريشبيات بيضيه مرتبة في
راسم قصير والزبدات منفرجة او مجنحة . الجناح حاد او كمال . القلم اطول من الفضة الضيقة -
الربيع - الجبل الاقرب وشالية

E. cernua, L. ٣ . الأيرس العنبري ⑤ قزم ذو هليبا ابيض . الاوراق رجيعة خطية ريشية
الخرق قصيرتها . البتلات قليلة التشعب بيضاء اطول من الكاس . الخريشبيات صيوانية ملساء بيضيه .
الجناح حاد ضعف القلم طولاً - الربيع - من حلب الى دمشق وشرقها

٤٦ الكر بوسرس CARPOURAS, Boiss.

الكاس متساوية القاعدة . البتلات متساوية كاملة . الاسدية مستقلة عادمة الاسنان . الخريشبيات
منضغطة مجانبية مثابة مقلوبة ذات قرنين . الفضة عريضة . المصاريع زورقية عادمة الاجنحة -

اعشاب ازهارها بيضاء اووردية

٤٦. *Oxyechinus*, Boiss. الكريوسرس الحاد القرن © عال (٦٠ مترًا وأكثر). الاوراق

المجدرية طويلة الزيدات مستطيلة والساقية مستطيلة مستديرة الاذينات عريضة. الثلاث ضعف الكاس طولاً. الخربيبات قصيرة مثثة مقلوبة. القرنان مثلثا القاعدة مخزبان نصف المخزوية طولاً. القلم اقصر من القرنين. البرور منقطة - الصيف - غابات الجبل الاقصر

٤٧ السنبارا *SENEBIERA*.

الكاس قصيرة متبسطة متساوية. الثلاث مستطيلة. الاسدية مستقلة عادمة الاسنان. الخربيبية مغلفة مجانبية ثنائية غبرشاقة ثنائية الغريفات. البرور كروية واحدة في كل غريفة - اعشاب سنوية او محولة فروعها منتشرة من العنق والراسيات مقابلة الاوراق والازهار صغيرة بيضاء



ب. راسم اثار السنبارا
ت. خربيبية
م. مكبرة صغيف

٤٨. *Coronopus*, L. السنبارا الكورونوبوس © الاوراق

عميقة المخرق الريشي والمخرق كاملة او مقصوفة. الخربيبات جالسة تقريباً كlobة عرضها أكثر من طولها وهي مشتبكة مغضنة مسنة الحوافي منتبهة بقلم هرمي - الربيع جوانب الطرق. كثير الوجود

٤٩. *Thlaspi arvense*, Del. السنبارا النيلية © الاوراق الجذرية ريشية

التفصيل مسنة النصوص والعليا خطية كاملة تقريباً. الخربيبات طويلة الزيدات صغيرة ذات غصون صغيرة وعرضها أكثر من طولها وهي تحدة السطح الواحد ومنقعة الآخر. السمة جالسة - الربيع - اماكن رطبة في مصر

٤٨ البلتاريا *PELTARIA*, L.

الكاس متبسطة متساوية. صفيحة البتلة يصبة مقنوبة كاملة. الاسدية مستقلة عادمة الاسنان. الخربيبية قصيرة السويقة قرطاسية مستديرة غبرشاقة احادية الغريفة مشتبكة الوردية خطية المحافة ذات بويصتين الى ٤ وغالباً ذات بزررة واحدة. القلم مفقود. السمة نقطية - اعشاب ملساء معمرة عالية كورنية ازهارها بيضاء. والخربيبات معلقة على زيدات منعقة خطية



ب. خربيبيتان من البلتاريا
ت. الصفيقة الورق

٥٠. *Peltaria officinalis*, D.C. البلتاريا الصفيقة الورق 24 الاوراق

المجدرية طويلة الرجالات بيضة وكثيراً ما تكون قلبية القاعدة والساقية مستدقة القاعدة خطية رحيمة - الصيف - آجام صغرية من جبال عيتاب الى لبنان والجبل الشرقي

٤٩ الكليپولا *CLYPEOLA, L.*

الكاس متساوية القاعدة. البتلات كاملة. الخريبيية مستديرة غير شاذة مفلطحة احادية الغرقة وانزهر. السمة مخرومة - اعشاب سنوية مستشبية بشعر كركبي ابرص ازهارها صغيرة صفراء والزيدات المثرة عفاة

شكل ٢٣



C. Jonthlaspi, L. الكليپولا الجونثلاسيي ⊙ الاوراق كاملة

مستطيلة ملوقة او خطية ملوقة. البتلات كالكاس طولاً. الخريبيية قرطاسية بسيطة العفاء. البزرة شاذة نصف عرض الغرقة. الجناح مفلطح كامل والسمة جالسة - الربيع - اماكن جافة في سورية وفلسطين

microcarpa, Post. ب. الصغيرة الثمر. الخريبييات بيضية مقلوبة

مستديرة نصف خريبييات الرز سعة واكثر منها خرماً - عند دير النجلي في طور سيناء باسم مثير من الكليپولا الجونثلاسيي (*C. microcarpa, Moris*)

C. echinata, Boiss. الكليپولا التوتوية ⊙ الاوراق مستطيلة خطية كاملة. البتلات

اطول قليلاً من الكاس. الخريبييات اهليجة مستديرة كالة توتوية العفاء الايته. القلم قصير - الربيع - من دمشق الى القدس والبلقاء وشرقيها

C. lappacea, Poiss. ٣ الكليپولا اللباسية ⊙ الاوراق مستطيلة ملوقة كاملة.

الازهار ثلثة اضماف ازهار النوع السابق خجماً والبتلات ضعف الكاس طولاً. الخريبييات اهليجة حادة. القلم طويل مثنق من العفاء الاالي - الربيع - الجبل الشرقي بقرب راشيا وزيدانة وبلودان. وربما هو تبائن من المقدم ذكره

٥٠ الأيسس *ISATIS, L.*

الكاس منبسطة متساوية القاعدة. البتلات متساوية كاملة. الخويطات مستقلة عادمة الاسنان. الخريبيية غير شاذة خطية ابيضية فطرية وظهرها مفلطح او ذو اضلاع كالة. الجناح محيط ارفي فطري او غشائي. السمة جالسة. البزرة واحدة معلقة - اعشاب احادية الاثمار او معمرة ازهارها صفراء واوراقها السفلى ذات رجيلات والساقية سهية. الزيدات المثرة منعكسة

I. latifolia, Stev. ١ الايسس العريض الخرنوبية 2 الاوراق كاملة والسفلى منها

مستطيلة ملوقة والعليا خطية رمحية. الخريبيية لساء او زغبية مستديرة بيضية او مستطيلة مستديرة

القاعدة واسفنجيتها كالة القبة ونادراً مستدقتهما. الجناح اعرض من الغريفة - الصيف - لبنان بقرب الارز والجبل الشرقي بقرب منشورة

٣. *E. glauca*, Auct. . الايتس الاغبر 24 اغبر. الساق ضخمة ينتهي بعنود متسع .
الاوراق ملساء كاملة والجذرية منها عريضة مستطيلة والساقية صغيرة خطية . الخرنبيبات قصيرة اللباد
اسفينية القاعدة خطية مستطيلة عرضها خمسا طولها وفي كالة او مجذومة مخرومة والغريفة غير مخرفة -
الربيع - قلدون

٤. *E. microcarpa*, J. Gay. . الايتس الصغير الشمر (١) امس . الاوراق الجذرية
مستطيلة كاملة تربيا والساقية رحيمة او مثناة عريضة الاذينات . الكاس ملساء . الخرنبيبات صغيرة
ليبيدية اهليلجية طولها ضعف عرضها وفي مستديرة القاعدة حادة القبة او كالتها .
الجناح متصل من الغريفة بثلث مضطرب - الربيع بادية سينا والتميه



حريفة - لبنان من
الايتس الحلي

٤. *E. Aleppica*, Scop. . الايتس الحلي (١) امس . الاوراق
الجذرية بيضية مقاربة مسننة او قيثارية تقريباً والساقية متصاعدة ذات اذبت
الخرنبيبات منعققة الغشاء خطية طولها 7-٧ اضعااف عرضها وفي مجذومة مخرومة
القبة . الغريفة خطية ضيقة يحددها خط على كل من الجانبين - الربيع - مزارع
سورية وفلسطين . كثير الوجود

٥١ البوريافا *Urtica dioica* L.

الكاس محدبة القاعدة مغرجة السمات . الثلات مستطيلة ملوقية ذات محالب . الحويضات عادية
الاسنان . الخرنبيبات جوزية صلبة غير شاقة بيضية رباعية . الاجنحة احادية البزرة . النظم راسي . البزرة
بيضية معلقة - اعتشاب سنوية امساء غبراء سوفها عنقودية كورنية اوراقها كمامة قاذية اذنية القاعدة
راسيها بلا فارس ازهارها منوطة صفراء باهتة

U. orientalis, Jaub. et Sp. . البوريافا الشرقية ٢٠-٢٠ متر الى ٢٦٠ . الاوراق
مستطيلة حادة . الخرنبيبة كريدتها الدقيقة المنفرجة طولاً وفي درنية مقعصة بين الاجنحة الكاملة منتبهة
بقلم هرمي رباعي الروايا نصفها طولاً - الربيع - حالب

٥٢ النسلي *Deschampsia* Desv.

الكاس متساوية القاعدة . الثلات كاملة . الاسدية عادية الاسنان . الخرنبيبة كروية مفلطحة

شكل ٢٤



قليلاً سفيفانية غير شاقة ذات بويضتين وذررة واحدة . السمة مخرومة . الزهرة معلقة — أعشاب سنوية متفرعة الغناء أوراقها الساقية سهبية وإزهارها صفراء

N. paniculata, L. . النسليا العنقودية ⊙ الأوراق مستطيلة رحيمة

كاملة أو مسننة . الراسيات المثمرة مستطيلة مندحمة . الزبدات متفرجة قليلاً نخيلة
ثلاثة أضلاع الخريشبية طولاً . عرض الخريشبيات أكثر من طولها وهي مشبكة
الأوردة وقلها حموي — الربيع — مزارع سوريا وفلسطين وشرقها

قسم من منتصف الراسم
المعمر من النسليا العنقودية

٥٣ التكسييرا *TEXIERA, Jaub. et S.*

الكاس متساوية القاعدة . البتلات مستطيلة ذات مخالب . الخويطات مستقلة عادمة الاسنان .

شكل ٢٥



الخريشبيات كروية سرحاء ملساء غير شاقة بشرتها غشائية وغلافها المتوسط ضم
استفجي والباطن قشري غير متساوي العرف . الزهرة الواحدة معلقة بيضية —
عشب املس اغبر ازهاره يضاء مصفرة

T. glastifolia, D. C. . التكسييرا الكلاستية الورق ⊙ منفرع

القاعدة . الأوراق السفلى جالسة مستطيلة رحيمة سهبية والجميع كاملة . الخريشبية
اقصر من الزبدية المعلقة النخيلة — الربيع — مزارع حلب الى زحلة ودمشق وشرقها
الخريشبيات التكسييرا
الكلاستية الورق

٥٤ الكليينا *CALEPINA, Adans.*

الكاس منفرشة متساوية . البتلات بيضية مقلوبة . الخويطات مستقلة عادمة الاسنان . الخريشبيات

شكل ٢٦



صغيرة بيضية قشرية غير شاقة مضحلة الاضلاع الاربع مشبكة احادية الغريفة
والقلم قصير منقاري . الزهرة معلقة — عشب سنوي ازهاره يضاء

C. Corvini, All. Ped. . كليينا كورفينوس ⊙ الأوراق المجذرية

قيثارية والساقية مستطيلة سهبية القاعدة حادة الاذنبات . البتلات اطول من
الكاس . الزبدات نخيلة منتصبة . طول الخريشبيات أكثر من عرضها — الربيع
— مزارع سورية وفلسطين وشرقها . كثير الوجود

راسم كليينا كورفينوس

شكل ٣٩



في كل غرقة - اعشاب سنوية يابسة متشعبة التفرع . الراسيات مقابلة الاوراق
والازهار صغيرة جالسة بيضاء

٥٨. *E. syriacum*, L. اليوكليدوم السوري ○ متفرع الزغب .

الاوراق مستطيلة رمحية كاملة او جوفية . الراسيات المنورة يابسة عتفاء قليلاً .
الخربيبات خشنة - مزارع وجوانب الطرق من حاب الى حمص وشرقيها

طرف راسم منظر من
اليوكليدوم السوري

٥٨. *OCHTHODIUM*, D. C. الاخطود يوم

شكل ٤٠



الكاس منفرشة متساوية . الثلاث مستطيلة ملوقة ذات مخالب .
الخويطات متسعة عادة الاسنان . الخربيبات سفيانية غير شاذة كروية
مكعبة درنية توتوية الزوايا ثنائية الغريفات عرضاً . القلم هرمي قصير .
الحاجز ضخم . البزور مفردة في الغريفات - اعشاب سنوية متفرعة ازهارها
صفراء

٥٩. *O. Egyptianum*, L. الاخطود يوم المصري ○ قليل العفاء

قصيره . الاوراق السفلى ريشية او قشائرية والعلوية رمحية كاملة . الراسيات
المنورة طويلة مسترسلة . الخربيبات مسمولة على زوائد متضاخمة
في ضعفها الخربيبات طولاً واكثر - الربيع - المزارع من حلب الى
القدس . الفطر المصري

راسم من الاخطود يوم المصري
الثمرة غير ناضجة

٥٩. البونياس *EUNIAS*, R. Br.

الكاس منتصب او منفرشة متساوية القاعدة . الثلاث مستطيلة ملوقة ذات مخالب . الخويطات
مستقلة عادة الاسنان . الخربيبات جوفية رباعية الزوايا بحفظة يضية رباعية الغريفات . القلم هرمي .
البزور مفردة في الغرقة معلقة - اعشاب ازهارها صفراء

شكل ٤١



ثم البونياس، الاروكاكو


٥٩. *E. Brucago*, L. البونياس الاروكاكو ○

الاوراق السفلى كلابية او خليجية مسنة . الكاس منتصب .
الحفظة الخربيبية عرقية مسنة - الربيع - مزارع وسياجات
شمالى سورية الى الشمال

٦٠ الصلة *ZILLA, Fork.*

الكاس متعصبة متساوية . البتلات مستطيلة كاملة طويلة المخالب . الخويصات مستتلة عادية

شكل ٤٢



الاسنان . الخريبيبات قشرية صلبة بيضبة كروية فلينية

قشرية ثنائية الفريقات عرضاً . الفلم مقاري صلب .

البنور مفردة في كل غرقة - نجيحات قنفذية قليلة

الاوراق منشعبة الفرع مستشبكة التمة ازهارها وردية

الصلة الشبيهة . *Z. myagroides, Fork.*

بالميكروم الأوراق السفلى مستحثة سريعاً مستطيلة

جرونية منقصة مستدقة الى رجيطة والفرعية قنية شوكتان من اعدله شبيهة بنورم سباحرة

مستطيلة خطية كالة . الخريبيبة ملساء او غير متساوية الاصلاخ او خشنة - اربع بادنة التيه

وسينا ومصر

microcarpa, Boiss. ب . الصغيرة الثمر . الثروع اكر كانة . الاوراق منقوصة .

الخريبيبات صغيرة - بحرية مصر وارض الصعيد

٦١ الكرامة *CRABBE, L.*

الكاس منفردة متساوية . البتلات بيضبة مقلوبة كامنة . الخويصات السوية ذات سن ثمت فتمها .

اللومطات غير شاقة والفصيلة السفلى زنبدة عادية البزرة والمليا كروية صلبة احادية الغرقة والفرقة .

السمت جالسة - اعشاب ونجيحات متسعة العنود ازهارها يضاء متوسطة

C. Orientalis, L. الكرامة الشرقية ٢٤ الساق املس . الاوراق سارمة العناء خشنة

مستطيلة رحيمة والسفلى منها غير منقصة والبقية غير متساوية المنقص الريتي . التنصبة السفلى الخريبيبة

مستطيلة قصيرة والمليا متوسطة كروية ملساء غير واضحة الاصلاخ الاربع - اربع - ثنائي سورية

Aucheri, Boiss. ب . أوشر (البحيرة) . الاوراق صوفية مستتية . اصلاخ انصيلة

العليا قليلة الوضوح - مزارع حلب الى الجبل الشرقي والبقاع

٦٣ الريستروم *APETRI M, Desv.*

الكاس مسترخية ذات حدين صغيرين . البتلات كاملة ذات مخالب . الخويصات عادية الاسنان .

شكل ٤٣



اللومنتات غير شاقة والتفصيلة السفلى منها مستطيلة اويضية مقلوبة والعليا بيضية مضلعة ذات منقار وبذرة واحدة - اعشاب مستطيلة ازهارها صفراء

R. rugosum, L. الريستروم المغضن ① الاوراق الجذرية قيثارية.

الزبدات المثمرة يابسة ضخمة مثل التفصيلة السفلى طولاً واقل منها غلظاً. التفصيلة السفلى من المخربنية مستطيلة والعليا بيضية عنائية او لمساء والفلم مثلها طولاً -

الربيع - مزارع سيرة

clavatum, Boiss. ب. دبوسي. التفصيلة السفلى بيضية مقلوبة

اثمار الريستروم المغضن

- مع الرمز

٦٣ الديدسموس *DIDESMUS*, D. C.

الكاس مستقيمة ذات حدين صغيرتين. البتلات بيضية مقلوبة ذات محالب. الخويطات مستتلة عادمة الاسنان. اللومنتات مستطيلة مخبائية غير شاقة ذات زوايا وانلام والتفصيلة الانتهاية هرمية. الزور كروية معلقة - اعشاب سنوية ازهارها بيضاء

D. Egyptianus, L. ١ الديدسموس المصري ② قليل الخشونة. الاوراق مستطيلة كالة

متباعدة الاسنان وبعض السفلى منها قيثارية. التفصيلتان رباعيتا الزوايا متساويتا الطول خشتان بين الاضلاع والانتهاية منها مستدقة الى منقار اقصر منها - الربيع - مصر

شكل ٤٤



D. tenuifolius, Sibth. ٢ الديدسموس النجيل الورق ③ عنائي.

الاوراق ريشية خرقها خطية قصيرة كاملة او مسننة. تفصيلنا اللومنت متساويتا الطول بيضيتان رباعيتا الزوايا مغضتان بين الاضلاع والانتهاية منها مستدقة

الى منقار اقصر منها قليلاً - الربيع - بيروت

ثمرتان من الديدسموس

D. foeniculifolius, Poir. ٣ الديدسموس النجيلي ④ حليبي زغبى. النجيل الورق

الاوراق ثنائية التفصيل الريشي خرقها خطية قصيرة الفصوص. التفصيلة السفلى اسطوانية اقصر من العليا وثلاثها غلظاً والعليا بيضية هرمية رباعية الزوايا. الفلم كالتفصيلة العليا طولاً - الربيع - فلسطين. بادية سينا

٦٤ الكاكية *CAKILE*, Tourn.

الكاس ذات حدين عند قاعدتها. البتلات بيضية مقلوبة ذات محالب. الاسدية مستتلة عادمة

الاسنان . اللومنتات ذات تنصهتين فالسفل منها مثلفة والعليا سنبية وكل منها ذو غريفة واحدة وبزرة واحدة . السمة جالسة - اعشاب ملساء سنوية لحمية بحرية ازهارها وردية
شكل ٤٥



C. maritima, Scop. الكأكيلة البحرية ☉ الاوراق ريشية

خرقها خطية كالة والنفصلة السفلى للومنت سرحاء - الريح - شاطئ البحر المتوسط

ثمرتان من الكأكيلة البحرية
integrifolia, Boiss. ب . الكأكيلة الورق . الاوراق ت . الاذينة

مسططية غير منسمة كاملة او خليجية مسنة - الاسكندرية

auriculata, Post. ت . الاذينة . النفصلة السفلى ذات اذيتين - شاطئ سورية

٦٥ الشلوة *ENARTHROCARPUS*, Labill.

الكأس متساوية البتلات مستطيلة ذات محالب . الخويطات مستقلة عادة الاسنان . اللومنتات مستطيلة اسطوانية او مفلطحة غير شاقة والنفصلة السفلى قصيرة ذات غريفة الى ٣ احادية انزور غالبا والعليا مخنقة بين الغرينات والغرينات احادية انزور - اعشاب سنوية متفرعة اوراقها السفلى قيثارية والعليا متصاعرة مسنة وازهارها صفراء ارجوانية الورد

E. arenatus, Labill. ١ . الشلوة المقوسة ☉ ملازم الغناء . الزنيدات السفلى ذات فلوس .

الازهار كبيرة . اللومنت ملازم الخشونة اسطوانية معقد مخن طويل المنفار . النفصلة السفلى قصيرة او مفقودة احادية البزرة او عادمها - الريح - شاطئ سورية ولبنان

شكل ٤٦



E. lyratus, Forsk. ٢ . الشلوة القيثارية

(ابو قرن) ☉ ملازم الغناء . اكثر الزنيدات ذات فلوس .

الازهار صغيرة . اللومنت طويل ملازم المنفار ومنفرج

مضجل العقد قصير المنفار والنفصلة السفلى ذات

برزين - الريح - راس بيروت حيث هو عرضي .

مزارع مصر

لومنت الشلوة المخنقة ب . النفصلة السفلى .

E. stragulatus, Boiss. ٣ . الشلوة المخنقة ت . الفلوس . ث . الم . ر

(اليا صعيد) ☉ لحوي ولا سجا من الاسفل . اكثر الزنيدات ذات فلوس . الازهار كبيرة . اللومنت ملازم

الخشونة مخن منته بمقار طويل مفلطح ومعد والتفصيلة السفلى طويلة ذات بذرة او بررتين - الربيع -
مزارع بادية النيه ومصر

٤. *E. pterocarpus*, Pers. الشلوة العجيج الثمر ○ قليل الخشونة . أكثر الزنيدات
ذات فلولس . الأزهار متوسطة . اللومنت خشن مخن منته بمقار طويل مفلطح محيتم غير معد ذي
جناح من الاسفل . التفصيلة السفلى قصيرة بلبلية احادية البذور - الربيع - مزارع مصر

٦٦ الهصونيا *HIUSSONIA*, Boiss.

الكاس ذات حدين عند قاعدتها . البتلات خطية مستطيلة ذات محالب . الخويطات عادية
عامة الاسنان . اللومنت اسطواني خطي ذات تفصيلتين والتفصيلة السفلى ذات غريفتين في كل منها
بذرة والعليا كثيرة الغريفات منتهية بمقار طويل

H. uncata, Poiss. الهصونيا الشصية ○ قليل الغناء من الاسفل واملس من الاعلى .
الاوراق احادية التصيل الريشي او ثنائية والقطع خطية كاملة او مسننة . الراسيات المثمرة مستطيلة .
المنفارشصي - الربيع - بادية النيه وسينا

٦٧ الأروكاريا *ERUCARIA*, Gært.

الكاس متصبه متساوية القاعدة . البتلات بيضيه منلوبة ذات محالب . الخويطات عادية الاسنان .
اللومنت ثنائي التفاصيل فالتفصيلة السفلى اطول من العليا ثنائية الغريفات والعليا كروية او ذات منفر
سفي وغريفة الى ٢ في كل منها بذرة واحدة - اعشاب سنوية متفرعة ريشية الاوراق بنفسجية الأزهار

١. *E. Aleppica*, Gært. الأروكاريا المحلية ○ املس عال . خرق الاوراق السفلى خطية
او مستطيلة وخرق الاوراق العليا طويلة . البتلات ضعف الكاس طولاً . الراسيات المثمرة طويلة
مندمجة . اللومنت ١.٠ متر طولاً وتصيلته السفلى اسطوانية ذات عدة بزور والعليا مستطيلة محيضة قليلاً
ذات بذرة واحدة واللم مخزوي . مثلها طولاً تقريباً - جوانب الطرق في سورية وفلسطين وبادية سينا
puberula, Boiss. ب . الزغبية . زغبى - بين القدس وعين السلطان

latifolia, Boiss. ت . العريضة الورق . خرق الاوراق السفلى اعرض مما في الرمز -

حلب . بيروت . مصر

polysperma, Boiss. ث . المتعددة البذور . تفصيلة اللومنت العليا ذات بزور متعددة

ومثل السفلى طولاً واطول منها

٢. *E. microcarpa*, Boiss. الأروكاريا الصغيرة الثمر ○ حليبي عفاني . خرق الاوراق

السفل متفرجة على زاوية قائمة لحمية كثيفة ريشية. خرق الأوراق العليا خطية كاملة. الثلثات ضعف الكاس طولاً. الراسيات المتفرجة مستطيلة مندمجة. اللومنت ٢٠٠٢٥ متر طولاً منتصب متفرج الملس أو خشن مخطط مثل وتنصيلة السفلى منفلجة بجانب معتدة ذات عدة بزور والعليا نصفها طولاً بيضية محدبة ذات بزرقة واحدة ومكثلة بقلم مثلها طولاً - الربيع - بادية النيه بقرب فلسطين. بين ماري سابا وبحر لوط - بادية مصر

major, Post. ب. الكبوى. عال (٤٥ متر). اللومنت أكبر قليلاً مما في الرمز - بادية النيه E. crassifolia, Forsk. ٢. الأروكاريا الضخمة الورق © الملس. خرق الأوراق السفلى مستطيلة خطية أو خطية كاملة أو قليلة الأسنان. الثلثات ضعف الكاس طولاً. اللومنت ٢٠١ متر طولاً أو أكثر منعطف ثم متفرج منتصب مخطط قليلاً وتنصيلة السفلى قصيرة اسطوانية ذات بزور عديدة والعليا محزومة قليلاً أكثر ضخامة من السفلى وأطول منها غير معتدة والمتفرق قصير منفلج - الربيع - بقرب اهرام مصر

٦٨ الفجل RAPHANUS, L.

الكاس منتصب ذات حدين. الثلثات طويلة المخالب كالة أو مخروطة. الخويطات مسننة عادية الأسنان. اللومنت مخروطي أو اسطواني والفصيلة السفلى بلبلية عنية أو مضحمة والعليا مستطيلة وغريفاً بها مصطفاً صفّاً طولياً. البزور كروية معلقة - أعشاب سنوية أو مستعمرة أوراقها السفلى قيثارية وأزهارها صفراء أرجوانية الأوردة

R. sativus, L. ١. الفجل المزروع © ألس أو قليل الحلبات. الأوراق السفلى قيثارية والعليا محبة مسننة. الأزهار بنفسجية. اللومنت متفرجة والفصيلة العليا مستطيلة مخروطية متنفخة ملساء أطول قليلاً من مفارها - الربيع - فالت من البسانين

R. pugioniformis, Bois. ٢. الفجل النخجري © حليبي خشن. الأوراق السفلى قيثارية وقطعها المجانية صغيرة مثثة والانتهاية كبيرة بيضية مستطيلة والأوراق العليا مستطيلة خطية. الأزهار بنفسجية. اللومنت يابسة خشنة ملازمة الحلبات والفصيلة العليا مخروطية اسطوانية ذات غريفتين. المتفرقة ثلاثة أضعاف الجزء المتضمن البزر طولاً - آخر الربيع - أماكن عشية في الجبل الشرقي. حاصبيا. الجليل

R. raphanistrum, L. ٣. الفجل الفجيلي © حراش. الأوراق قيثارية والعليا مستطيلة خطية. الأزهار وردية باهتة أو صفراء وردية. تفصيلة اللومنت العليا فلادية مضطعة. القلم ٣ أضعاف الغرقة العليا طولاً إلى ٤ - الربيع - مزارع سورية وفلسطين. كثير الوجود

شكل ٤٧



لومنت الفجل الفيلى

interruptus, Post. ب. المتقطع . بعض غريقات اللومنت خالية من البزور وقد لا يكون بزراً إلا في التفصيلة السفلى وربما يحول هذا التباين بين هذا النوع والفجل اللاندرا (*Il. Landra*) - يروت . نادر

٤. *R. Aucheri*, Boiss. . فجل اوشر ① مخشن بشعر منعطف .

الأوراق قبنارية او غير منعسبة والعليا خطية . الأزهار كبريتية غير وردية . اللومنت قصير الزنيدة منعطف الشعر حرشه مستدق القاعدة قليل الضخامة . المنشار قصير - الربيع - مزارع بقرب صيدا . بين راشيا وحاصبيا وشرقها

glaber, Post. ب. الاملس . اللومنت املس . الزنيدة قصيرة منتصبة قبل النضج (ولم ازل اثاراً ناضجة) - قلدون شمالي دمشق

٦٩ الانخونيوم ANCHONIUM, D. C.

الكاس منتصبة ذات حدين عند قاعدتها . البتلات ذات مخالب . الاسدية الكبرى مفردة ازواجاً . اللومنت مضحل التفصيلة السفلى اسطوانى مخروطى مستدق الى قلم منقاري . الغريقات ٢-٦ مرتبة ازواجاً . المحاجر ضخيم . السبة ضخمة ذات فصين . البزور مستطيلة ضخمة - اعشاب معمرة جردية كوكبية الصوف

A. Billardieri, D. C. . انخونيوم بلياردبير ٢٤ اخضر سنجاى غديدي متفرع . الأوراق الجذرية مستطيلة مستدقة الى رجيعة مضحلة الاسنان الجعونة . الراسيات طويلة مسترسلة . الأزهار ذات فلوس . البتلات ارجوانية اطول قليلاً من الكاس . اللومنت منتصب غديدي حرش مستطيل رمحي مستدق الى قلم طويل - الصيف - جرود لبنان وتحت جروده والجبل الشرقي

٧٠ الخورسپورا CHORISPORA, D. C.

شكل ٤٨



الكاس منتصبة ذات حدين عند قاعدتها . البتلات ذات مخالب . الاسدية مستتلة عادمة الاسنان . اللومنت مستطيل اسطوانى طويل المنشار غريقات متعددة مصطفة صفين احادية البزور وترادف الغريقات الملائكة بالفراغة على الغالب . السمة غير واضحة صغيرة الفصين - اعشاب سنوية ارجوانية الأزهار

C. Syriaca, Boiss. . الخورسپورا السورية ② غديدي . الأوراق السفلى قبنارية والعليا صغيرة الاسنان . الأزهار كبيرة . اللومنت ضخيم اسطوانى قليل الاختناق مضغن منعطف الحمايات . القلم مثله طولاً - الربيع - ارض المحوارة من

لومنت الخورسپورا السورية

حلب وتدمر الى دمشق والجبل الشرقي والقدس

٧١ الستركا STERIGMA, D. C.

الكلس منتصب متساوية القاعدة. البتلات ذات مخالب. الاسدية الكبرى مخددة ازواجاً. اللومنت طويل اسطوانى قليل التعقد لبي من الداخل. الثريقات مرتبة ازواجاً ذات بزررة واحدة. فصا السمة منفرجان. البزور مستطيلة ضخمة - اعشاب احادية الاثمار صفراء الازهار كوكبية الصوف *S. sulphureum, Russ.* . الستركا الكبرى ^١ مسننية. الاوراق السفلى مستطيلة رحيمة كلاية والعليا مسننة او كاملة. الزبدة كالزهرة طولاً. اللومنت ضخيم اشيب غير غديدي مسندق الى قلم قصير. فصا السمة قصيران - اول الصيف - ارض الحوارة من حلب الى دمشق ورأس بعلبك

الرتبة السابعة الكبرى CAPPARIDEAE.

الازهار قياسية او غير قياسية. السبلات ٤ - ٥. البتلات ٤ او مفنودة. الثقت قصيرا ومستطيل الى غمد. الاسدية ٤ - ٦ او غير محدودة مندغمة في قاعدة الثقت او قنوة. المينس جالس او ذوسونقة ومشمئين جلاريتين وبزور متعددة او بزررتين. اثمر جيب شاق ذو مصراعين او عنبية غير شاقة. البزور بلا البيومن - اعشاب او ثمرات او اوراقها غالباً مترادفة

السيط الاول الكليومات CLEOMEAE. الثمر جيب

١. *Cleome*. الجيب شاق ذو بزور متعددة

٢. *Dipterygium*. الجيب غير شاق ذو بزررة واحدة

السيط الثاني الكبريات CAPPAEAE. اثمر لحي غير شاق

٣. *Mærua*. الكلس قمعية. الثقت مبطن قعر الكلس مطول الى منتصفها

٤. *Capparis*. الكلس منفصلة الى ٤ قطع. الثقت قصير

١ الكليومه CLEOMEAE.

الكلس ذات ٤ فصوص ساقطة. البتلات ٤ مندغمة تحت المبيض. الاسدية ٤ او ٦ او غير محدودة. الثقت نصف كروي او مستطيل. الجيب جالس او ذوسونقة ثنائي المصارع كثير البزور

تنفصل مصارعة اخيراً من المشيمات - اعشاب او نجيلات
* التخت مستطيل الى ففار . صفوف اعضاء الزهر متباعدة . الاسدية متحدة القاعدة

C. pentaphylla ١

* التخت قصير . صفوف اعضاء الزهر متقاربة . الاسدية مستقلة القاعدة

† الاوراق مركبة

C. Arabica ٢ *ornithopodoides* ٣ *brachycarpa* ٤

† † الاوراق بسيطة

C. papillosa ٥ *Kotschyana* ٦ *trinervia* ٧ *droserifolia* ٨ *chrysantha* ٩



الشكل ٤٩ *C. pentaphylla*, L. ١

الخماسية الورق (المُنْتَنَة) ⊙ الاوراق المتوسطة
خماسية الورينات اهليلجتها مستطيلتها والزهرية
متراكمة جالسة تقريباً ثلثية الورينات صغيرة . البتلات
بيضية متوازية ٤ اضعاف الكاس طولاً . الاسدية
مندمجة في منتصف حامل المبيض . الثمر خرنوبي خطي
اطول من سويقه - الربيع والصيف - مزارع مصر

شكل ٤٩ . زهرة الكليومة الخماسية الورق . ب . الزنيدة . ت . الكاس . ث . البتلات . ج . الاسدية . ح المدقة
شكل ٥٠



ثمر الكليومة الخماسية الورق

C. Arabica, L. ٢ . الكليومة العربية . (الزرقرة . امرميل) (شكل ٥١) ⊙ متصب

غديدي زغبي . الاوراق ذات رجيلات وثلاث ورينات مستطيلة خطية والزهرية بسيطة . الاسدية
٦ . الخرنوبيات مدلاة مستطيلة خطية . البنور صوفية - الربيع - بادية سيناء ومصر

شكل ١٥

**٣. C. ornithopodoides, L. الكليومة الشبيهة**

بالاورنثوپوس ٥ متصّب غديدي زغبي. الاوراق نفلية وريقاتها خطية والزهرية صغيرة بسيطة. الخرنوبيات منعقفة خطية مفردة مغطاة حلمية غديدية ذات سويقة. البرور لمساء - الربيع - عنتاب

٤. C. brachycarpa, Vahl. الكليومة القصيرة الثمر

او ٢٤ غديدي. العنق متفرع. الاوراق ذات رجيلات وثلاث وريقات فحمة بيضية مستطيلة والزهرية ثلثة الورقات او بسيطة بيضية او مستطيلة - الربيع - بادية سينا بقرب البحر الاحمر

٥. C. papillosa, Steud. الكليومة الحليمية ٥ متصّب ب. حرنوبية الكليومة العربية.

متفرع مخشن مجليات يضاء مخروطية. الاوراق قلبية التناعدة بيضية ت. ورقة زهرية ذات عصب واحد والسفلى منها ذات رجيلات. الخرنوبيات منفرجة عادية السويقات خطية اسطوانية لمساء وقد تكون مخنبة وطولها ٢.٣ متر وعرضها ٢.٠٣ متر - الربيع - مصر

٦. C. Kotchyana, Boiss. الكليومة الكوتشانية ٢٤ اغبر ومن الاسفل امس. الاوراق

طويلة الرجيلات بيضية كالة ذات ثلثة اعصاب. الخرنوبيات منعقفة قصيرة السويقات خطية ملوقة لمساء - الربيع - الجبل الايض بين حماه وتدمر

٧. C. trinervia, Fresn. الكليومة الثلاثية الاعصاب ٢٤ مخشن بغديدات صفراء ذات

سويقات. السوق متصبة من عنق متفرع. الاوراق طويلة الرجيلات بيضية حادة ثلثة الاعصاب. الخرنوبيات منعقفة قصيرة السويقات خطية غديدية - الربيع - شمالي بحر لوط. بادية التيه وسيا ومصر

٨. C. droserifolia, Del. الكليومة الدروسيرية الورق ٢٤ مُستَرَق بغديدات

صفراء ذات سويقات. الاوراق مستديرة وكلبية ثلثة الاعصاب. الازهار طويلة الزنيدات منفردة في الاباط العليا. الاسدية ٤. الخرنوبيات متصبة الزنيدة مستطيلة اسطوانية ٠.١ متر طولاً حادة غديدية - الربيع - بادية سينا ومصر

٩. C. chrysantha, Decaisn. الكليومة الذهبية الزهر ٢٤ غديدي. الثروع طويلة

متعرجة. الاوراق قصيرة الرجيلات بيضية حادة احادية العصب من الاسفل. الازهار منفردة في الاباط العليا طويلة الزنيدات. الاسدية ١٠-١٤ الخرسية ٠.٠٣ متر طولاً منعقفة الزنيدة بيضية غديدية - الربيع - بادية سينا

٢ الديترجيوم *DIPTERYGIUM, Decaisne.*

الكأس رباعية الفصوص الساقطة أخيراً. البتلات ٤ مستطيلة وحمية قصيرة المخالب. الاسدية ٦ متساوية الطول. المبيض جالس رباعي الاجنحة عرقها والجنحان المقدم والخلفي اصفر من الآخرين وعن قريب يتلاشيان. والمبيض غريفة واحدة وبويضة ١ أو ٢. الحبيب غير شاق يخفي في محاط بجنجاس سري الوجهي احادي البذر - نجمة كثيرة الفروع ودالية اوراقها صغيرة غير منقسمة ازهارها بيضاء صغيرة محمولة على راسيات طويلة مسترسلة

D. glaucum, Decaisne. الديترجيوم الاغبر ٣ الملس . الاوراق قليلة قصيرة الرجلات يضيئة وحمية حوية . البتلات ضعف الكأس طولاً تقريباً . الخربيبات حادة ٢٠٠٣ متر طولاً . السمة جالسة - الخريف - بادية ارض الصعيد على شاطئ البحر الاحمر

٣ الميروا *MERUA, Forsk.*

الكأس قمعية ذات ٤ فصوص ساقطة . البتلات مفردة او ٤ مندغمة في حجرة الكأس . الثغث مبطن اسفل الكأس حتى منتصفها متقرص مخرم . الاسدية غير محدودة متعددة عند القاعدة بمائل المبيض الطويل السويقة الكثير البويضات . العنبيبة اسطوانية معقدة متعددة الغريفات الاحادية البذر - انجم سرحاء اوراقها بسيطة

M. uniflora, Vahl. الميروا الاحادية الزهر ٣ الفروع طويلة عصوية . الاوراق قصيرة الرجلات صغيرة (٢٠٠٥ متر طولاً) مستطيلة حمية قصيرة الغفاء . الزنيدات ابضية منفردة اقصر من الاوراق - الربيع - بادية سينا والى الجنوب

٤ الكبر *CAPPARIS, L.*

الكأس رباعية الفواصل . البتلات ٤ متراكبة في الصيف . الثغث قصير . الاسدية مستنلة . المبيض طويل السويقة . العنبيبة كروية او يضيئة مقلوبة كثيرة البذر - انجم او شجيرات بسيطة الاوراق سرحاء او شوكية

* الاسدية ٨ - ١٥

C. Sodada, R. Br. ١ الكبر الكبر الصودادا . ب . زهرة . ت . المبيض المحبوس على سويقة

الصودا ث الفروع طويلة مخبئة منفرجة المخرايعب . الاوراق صغيرة خطية ملتفة الجوافي حسكية القبة ساقطة قبل الانساق . الشوك الذي في قصير منفرج . الازهار ١-٢ في كل ابط قصيرة الزبدات . الثلات بيضية حبراء اطول قليلاً من الكاس . العنية كروية نصف سويتها طولاً - الربيع - اسبوط الى اسوان

** الاسدية كثيرة العدد

٢ C. spinosa, L. (الكبار) ث مدلى غالباً من الصخور او الجدران

شكل ٥٢



الكبر الشوكي . ب . اسنثيب

والفروع مستطيلة متكئة . الذنبات شوكية شصية او مستقيمة زنادراً هليبة ساقطة . الاوراق مستديرة او بيضية . الزبدات كالاوراق طولاً او اطول منها . السبلات متساوية الطول تقريباً . العنية بيضية مقلوبة مستطيلة - الربيع -

genuina, Boiss. ا . الحقيقي . امس .

الاوراق مستديرة مخرومة قليلاً . الذنبات شصية والازهار كبيرة - يسمون

canescens, Cosson. ب . اسنثيب .

زغبى اكثر اواقل . الاوراق بيضية او هليبية حموية او مستشكة . الذنبات شصية . الازهار كبيرة - صخور

وجدان . كثير الوجود في سورية وفلسطين

glauc, Post. ت . الاغبر . مستغر الذنبات طويلة مستدقة - رحلة . بانباس

Egyptia, Boiss. ث . المصري . اللصف . امس او زغبى . الفروع صلبة . الاوراق لحمية

مستديرة غبراء كالة او مخرومة ذات حرك وبدون . الازهار متوسعة - طرابلس . تالي بمر لوط . بادية سينامصر

parviflora, Boiss. ج . الصغير الزهر . مسنثيب او خلى . الفروع نحيبة يابسة . الاوراق

صغيرة بيضية مستطيلة او مستديرة غالباً حادة شوكية القبة . الازهار ثنت اذهار الخنفي اتساعاً - دمشق

galeata, Frsen. د . الكبر الخوذى . (اللصف) ن اغبر امس . الفروع قصيرة

متصبه . الذنبات شوكية شصية . الاوراق طويلة بيضية لحمية كالة حموية غالباً . الزبدات كالورقة طولاً او اطول منها . السلة العليا كبيرة خوذية . العنية بيضية مقلوبة مستطيلة - الربيع - بادية سينا

الرتبة الثامنة الخزامية RESEDACEAE, D. C.

الأزهار غير قياسية. الكاس مستمرة ذات ٤ أقسام إلى ٨ ونادراً ذات قسمين. التويج ذو ٤ بتلات إلى ٨ أو مقنود. البتلات منفصلة مندغمة تحت المبيض في قرص جانبي وهي جالسة أو ذات سويقة. الأسدية ٢-٤ متحدة في أنبوبة ملتصقة بمحمل المبيض ونادراً مستقلة. المبيض جالس أو ذو سويقة فاما أن يُولف من ٢ ثميرات إلى ٤ متحدة في غرينة واحدة أو من ٥ ثميرات إلى ٦ مستقلة. البويضات متعددة مندغمة في مشيمات جلدية أو قاعدية. الثمر جيب أو عتيبة

القرظة OCHRADENUS, Del.

الأزهار عادية البتلات. السبلات ٥-٦. جانب القرص العلوي منفرد مجذوم من الامام. الأسدية ١٠-١٥. المبيض ثلاثي الاسنان. الجيب عنبى - نجمة مشبكة الفروع يابسها مستطيكهما قليلة الاوراق المحطية المخزنية الساقطة. الأزهار ذات فلس واحد مرتبة على هيئة سنبل
O. haecatur, Del. القرظة العنبية الأزهار قصيرة الزينات. الجيب يضي كروي - الربيع - بادية سينا ومصر

الخزام RESEDA, L.

الأزهار ذات ٤ سبلات إلى ٨ و ٤ بتلات إلى ٨. البتلات العليا أكبر من السفلى منقمة الصفيحة. الجانب العلوي من القرص منفرد. الأسدية ١٠ إلى ٤٠. المبيض ذو ٢ اسنان إلى ٤. الجيب منتوح القمة ذو ٢ زوايا أو ٤ - اعشاب احادية الإثمار ونادراً معمرة متفرعة اوراقها نادراً كاملة وغالباً ثلاثية المنشأ احادية التركيب أو ثنائية أو ثلاثية اوريشية احادية التركيب أو ثنائية. الأزهار ذات فلس واحد مرتبة على هيئة راسم

* الاوراق ريشية. الأزهار ذات ٥ أقسام. الجيب ذو ٤ اسنان. الاوراق ريشية

R. alba ١ propinqua ٢

* * الاوراق بسيطة او ثلثة المنشأ. الأزهار ذات ٦ أقسام إلى ٨. الجيب ذو ٢ اسنان

١ السبلات مستمرة

١ الجيوب كبيرة واخيراً مدلاة. البزور خشنه

R. Arabica ٣ Alopecuros ٤ Orientalis ٥ odorata ٦

ب الجيوب متصببة. البزور ملساء

R. lutea γ *Kahirina* A

† † السلالات ساقطة

R. stenostachya † *muricata* | • *pruinosa* | |

*** الأوراق بسيطة. الأزهار ذات ٤ أقسام. الجيب ذو ٢ أسنان

R. Luteola | †

١. *R. alba*, L. الخزام الأبيض ① عالٍ أملس أو قليل الحليجات. الأزهار كبيرة. الرأس

شكل ٥٤



كثيف. البتلات ضعف الكأس طولاً ثلثية الفصوص متساوين تقريباً. الزيديات
المشيرة أطول من الكأس. الجيب اهليلجي اسطواني - الربيع - مزارع وجنران
سورية وفلسطين

٢. *R. propinqua*, R. Fr. الخزام المتقارب ① منخفض أملس

جيب الخزام الأبيض

متفرع القاعة. الأزهار صغيرة جالسة تقريباً أو قصيرة الزيديات. الرأسيات
كثيفة ثم مستطيلة. البتلات أطول قليلاً من الكأس ذات ٣ فصوص متساوية
أو المتوسطة أقصر من الجانبيتين أو أضيق منها. الجيب قصير الزيدة بيضي مقارب مستطيل - الربيع -
سورية من تدمر إلى قاموغ الهرمل. بادية التيه وسينا ومصر

٣. *R. Arabica*, Boiss. الخزام العربي ① منخفض قليل الخالة. الأوراق السنلى كاملة

والبقية ثلثية المنشا قطعها خطية رمحية. الزيديات أطول من الكأس. السلالات بيضية مقلوبة مستطيلة.
البتلات أقصر من الكأس وخرقها بيضبة مقلوبة مستطيلة. الخويطات منسعة القمة. الجيب كروي
حاد الأسنان - الربيع - بادية التيه وسينا ومصر

٤. *R. Alopecuroides*, Boiss. الخزام الالوبيكيورس ① أو ② عالٍ متفرع طويل

الحليجات. الأوراق السنلى كاملة والبقية ثنائية المنشا الثلاثي وخرقها رمحية مستطيلة أو رمحية. الكأس
المشيرة غير متنامية. الزيديات أطول من الكأس مثل الجيب طولاً. الرأسيات طويلة كثيفة. خرق
البتلات الجانية ٧ - ٩. الجيب كبير بيضي مقلوب منتفخ - مزارع من الحولة إلى غرة

٥. *R. Orientalis*, Boiss. الخزام الشرقي ① حليبي خشن. السوق متكسكة أو متصاعدة.

الأوراق رمحية كاملة أو ثلثية الخرق. الزيديات أطول من الكأس ثم مستطيلة. الكأس المشيرة متنامية.
الرأسيات مسترسلة. خرق البتلات الجانية ماوقية. الجيب مستطيل بيضي - الربيع - مزارع ساحل
سوريا وفلسطين البحري

٦. *R. odorata*, L. الخزام العطر ① أو ٢ أماس أو قليل الخشونة منشتر متفرع حلو

الرائحة . الأوراق كاملة ملوقية والعليا نادراً متوصصة . الراسيات الزهرة قصيرة بيضية والزبدات ضعف الكاس طولاً . الكاس متنامية في الإثمار . خرق البتلات الجانبية سداسية الانقسام . الجيب يضي مغلوب كروي - الربيع والصيف - فالت من الجنائن . كثير الوجود

R. lutea, L. ٧ الخزام الأصفر ① حليبي خشن . الساق عالٍ متصاعد . الأوراق السفلى أحياناً كاملة والبقية ثلاثية المنشأ والنفط ثلثية المنشأ أوريشية . الراسيات الزهرة قصيرة ثم مستطيلة والفقرات امس . الزينة أطول من الزهرة . السبلات كالبتلات الصفراء طولاً . الجيب متصب يضي مستطيلي - الربيع - مزارع سورية وفلسطين
nutans, Boiss. ب . المنفص . الجيب منفص أو مدلى - يثين

R. Kahrina, Muil. ٨ الخزام القاهري ② امس . الأوراق السفلى والمتوسطة رحيمة ملوقية كاملة والعليا ثلثية المنشأ . الراسيات مسترسلة . الزبدات أطول من الزهرة . السبلات كالبتلات البيضاء طولاً تقريباً . المحرق الجانبية للبتلات العليا نصف بيضية عميقة النص . الجيب يضي مغلوب امس - الربيع - جبل المقطم برب القاهرة
Boissieri, Boiss. ب . بويسييه . سافل . الأوراق أكثر كلاًهما في الرمز . خرق الكاس مستطيلة ملوقية . ثم الجيب مفتوح - بين القاهرة وسويس

R. stenostachya, Boiss. ٩ الخزام الضيق الراسيم ③ متصب يابس التفرع حليبي خشن سنجابي . الأوراق السفلى والعليا كاملة خطية والمتوسطة ثلثية المنشأ خرقها خطية ضيقة . الأزهار جالسة تقريباً صغيرة مكتوبة سنبلاً . البتلات العليا مشقوق ثلثاً طولها الى ٩ خرق خطية ملوقية . الخويطات ساقطة . الجيب خشن يضي مغلوب مستطيلي - الربيع - بادية سينا

R. muricata, Presl. ١٠ الخزام التوتويوي ④ توتويوي يابس . الأوراق السفلى كاملة خطية رحيمة . البقية ثلاثية المنشأ خطية رحيمة . الأزهار قصيرة الزبدات نكس سنبلاً . البتلات العليا مشقوق نصف طولها الى ٧ خرق متساوية خطية ملوقية . الخويطات مستمرة . الجيب اهليبي امس - الربيع - شمالي بحر لوط . بادية سينا

R. pruinosa, Del. ١١ الخزام النحالي ⑤ خشن نحالي متفرع . الأوراق يابسة خطية رحيمة كاملة ونادراً ثلثية المحرق . الأزهار قصيرة الزبدات سنبلية الترتيب . البتلات العليا كثيرة المحرق فاحرقه المتوسطة أطول من البقية بيضية مغلوبة والجانبية صغيرة . الجيب حليبي اسطوانى دبوسي - بادية النبه وسينا ومصر

R. Luteola, L. ١٢ الخزام اللبوتويولا ⑥ عالٍ امس قليل الفروع يابستها . الأوراق خطية رحيمة وأحياناً مسننة اعلى قاعدتها . الأزهار جالسة تقريباً تكون سنبلاً طويلاً . السبلات مستمرة

الى ١٠ شاقعة على ظهر المصراع. المشيات محورية - نجيحات ازهارها بيضاء او ارجوانية عادمة الذنبيات
 C. villonum, L. ١. اللاذنم الوبري (الغبرة) ٥ الاوراق مغضنة اهليجية او بيضية مقلوبة
 وكثيراً ما تكون متموجة. الرجالات ولاسيا العليا منها متسعة القاعدة غدية. الازهار ٢-٥ صيوانية قمية
 ونادراً مفردة. السيلات متساوية تقريباً بيضية مدببة حرة. البتلات وردية صفراء القاعدة. القلم
 نحيل مثل المبيض طولاً ومثل الاسدية طولاً او اطول منها - الربيع - اماكن جافة في سورية وفلسطين
 genuinus, Boiss. ١. الحقيقى. ذووير منتصب بين الشعر الكوكبي

Oreticus, Boiss. ب. الاكرتي. قليل الوبر واكثر لزوجة من الحقيقى
 C. salviaefolius, L. ٢. اللاذنم القصعني الورق (عُجَيْر) ٥ ملازم الصوف الكوكبي
 والبسيط. الاوراق بيضية او مستطيلة مغضنة من الاعلى. الازهار مفردة او قمية صيوانية طويلة الزبدات.
 السجلات غير متساوية فالخارجية منها قلبية بيضية اكبر من الداخلية. البتلات بيضاء مخرومة. السمة جالسة
 - الربيع - اماكن جافة وذات النجم في سورية وفلسطين

الهليانثوم HELIANTHEUM, Pers.

السيلات ٥ ونادراً ٢. البتلات ٥. الاسدية متعددة والجميع ذات اثبات. الجيب ذو غرقة
 واحدة او غير كامل الغريفات اثلاث والمصاريع ٢- نجيحات او اعشاب ازهارها بيضاء او وردية او
 صفراء واوراقها ذات ذنبيات او عادمة

* السيلات ٢. الاوراق بلا ذنبيات. نجيحات

H. umbellatum ١

** السيلات ٥. الاوراق ذات ذنبيات

† سنوية

H. guttatum ٢ Niloticum ٢ salicifolium ٤ Egyptiacum ٥

‡ معمرة

H. ventosum ٦ Kabiricum ٧ Lippii ٨ lavandulaefolium ٩ vesicarium ١٠

Kotschyannum ١١

EH. umbellatum, L. ١. الهليانثوم الصيواني ٥ لرح. الاوراق جالسة خطية ملتفة

المحافظ صوفية من الاسفل. الازهار في صيوانات. البتلات بيضاء. الجيب مغلف بالكاس ثلث الزنبدة
 او نصفها طولاً. البزور مثثة درنية - الصيف -

Syriacum, Boiss. ب. السوري. متفرج الثمر. أعلى الورقة عناقى. الزيدات ضخمة.

السبلات لرجة جداً - تحت جرد لبنان

٥. *H. guttatum*, L. الهليناثوم المنقط ٥ منتصب متفرج العناء. الأوراق جالسة

مستطيلة رجمية أو خطية مستطيلة. والعليا ذات ذنبيات. الساق متفرع والراسيات ١ - ٥ مسترسلة مائلة إلى جانب. الزيدة ضعف الكأس طولاً أو أكثر. السبلات بيضية مشعرة والمخارجية منها أصغر من الداخلية. الحبيب صغير مغلف بالكأس - الربيع - رمال وأماكن نخبية في سورية

٦. *H. Niloticum*, Thb. الهليناثوم النيل ٦ متفرج العناء قصير. الأوراق مستطيلة

رجمية. الراسيات قصيرة مسترسلة. الزيدات ضخمة منفردة قليلاً أقصر من الكأس. الثلاث بيضية مقلوبة أسنينة. الحبيب تخفياني بيضي كروي أملس أقصر من السلات - ربيع - أماكن جافة في سورية وفلسطين

microcarpum, Cosson. ب. الصغير الثمر. الحبيب أصغر مما في الرمز أقصر قليلاً من

الكأس. قلدون. الجبل الشرقي

٧. *lasiocarpum*, Post. ت. الحوش الثمر. الحبيب قصير العناء مثل الكأس طولاً. الأوراق

ضيقة - شمالي فلسطين قرب الحولة

٨. *H. salicifolium*, L. الهليناثوم الصفصاف الورق (الدامين) ٨ عناقى.

الأوراق بيضية مستطيلة والعليا رجمية. الراسيات مسترسلة. الزيدات أفقية أطول من الكأس والأوراق الثلاث مستطيلة. الحبيب بيضي كروي معادل السبلات البيضية طولاً - الربيع - أماكن جافة في سورية وفلسطين وبادية التيه وسينا

٩. *H. Egyptiacum*, L. الهليناثوم المصري ٩ ملازم العناء. الأوراق ضيقة خطية

مستطيلة ملتفة الحافة قليلاً. الراسيات مسترسلة متعددية قليلاً. الزيدات نخبية. اتصر من الكأس وأخيراً عفاء. الثلاث اهليجية. السبلتان الخارجيتان عشيتان خطيتان ثلث الداخلية العشائية المثابة طولاً. الحبيب زغبى مغلف بالكأس - الربيع - رمال حلب والجبل الشرقي وفلسطين وشرقيها. مصر

١٠. *H. ventosum*, Boiss. الهليناثوم الريحى ١٠ مشبك الثمر كوكي الثمر محصر.

الأوراق اهليجية مستطيلة ملتفة الحواف. الراسيات ذات زهرة إلى ٣. الزيدات نصف الكأس طولاً وأخيراً منعقة. السبلات الخارجية نصف الداخلية البيضية طولاً - قم جبل اتيه

١١. *uniflorum*, Post. ب. الاحادي الزهر (الزعر). الأزهار منفردة. الفروع المنيعة يضاء

مستمرة - صرايط الحادام

١٢. *H. Kahiricum*, Del. Y الهليناثوم القاهري ١٢ مشتبب بشعر كوكي وسيط. الثمر

شكل ٥٥



منفرجة الاوراق مستطيلة ورحمة ملتفة الحوافي . الراسيات مسترسلة قصيرة .
الزنبذات مثل الكاس طولاً واقصر منها منفرجة ثم عفاء السبلات الخارجية
اقصر قليلاً من الداخلية المستطيلة الرحمة - الربيع بادية التيه وسينا ومصر
H. Lippii, L. ٨ . هليانثوم ليپيوس ث سنجابي ذو شعر كوكبي .
الفروع شجيلة متشعبة . الاوراق ملتفة الحوافي اهليلجية او خطية . الراسيات
مسترسلة او كثيفة . الازهار جالسة او قصيرة الزنبذات . السبلات الخارجية
اقصر من الداخلية البيضية الحادة - الربيع والصيف -
ellipticum, Boiss, ١ . الاهليلجي . الاوراق اهليلجية او اهليلجية
رحمة . الازهار والحبوب اكبر ما في الرمز - رمال شواطئ سورية وفلسطين . راسم الهليانثوم القاهري
بادية التيه وسينا ومصر

Ehrenbergii, Boiss. ب . اهرنبرغ . الفروع قليلة الشعب - بادية مصر
micranthum, Boiss. ت . الصغير الزهر . (القديم . الرغز) . الفروع باسمة وبعضها
بيضاء ميتة . الاوراق متنوعة . الازهار والحبوب اصغر ما في الرمز - بادية التيه وسينا
H. lavandulifolium, Lam. ٩ . الهليانثوم الشننبي الورق ث ابيض ملازم الرغبة
كوكبيه . الفروع منتصبه . الاوراق مستطيلة رحمة او خطية ملتفة الحوافي . الراسيات مندجبة مائلة الى
جانب هرمية والعليا منها اوقاناً ملتفة المنشا . السبلات الداخلية مستطيلة رحمة حادة - الصيف - تلؤلؤ
وجبال جافة في سورية وفلسطين . نادر

H. vesicarium, Boiss. ١٠ . الهليانثوم المثاني ث ملازم العفاء اشيب . الاوراق
خطية او خطية رحمة كالة ملتفة الحوافي . الذنبات خطية نصف الورقة طولاً تقريباً . الراسيات مسترسلة .
الزنبذات مثل الكاس طولاً . الثلاث ودية . الكاس المثمرة غشائية متفخمة . السبلات الداخلية
بيضية صوفية هلبية الاعصاب حمراؤها والخارجيتان صغيرتان جداً - الربيع - اماكن جافة في جنوبي
فلسطين وبادية التيه ومصر

H. Kotchyannum, Boiss. ١١ . الهليانثوم الكوتشاني ث هلي عناقلي مخضر . الفروع
مستقيمة والراسيات مطولة . الاوراق خطية رحمة ملتفة الحوافي . الذنبات ثلث الاوراق او نصفها طولاً .
الزنبذات اقصر قليلاً من الكاس . السبلات الداخلية بيضية مستطيلة هلبية لحوية والخارجيتان صغيرتان
جدلاً . البتلات صفراء . الزهرة ٢٠١٥ متر عرضاً - الربيع - اماكن جافة من حلب الى زحلة والجبل الشرقي
ودمشق وشرقها

الفيومانا FUMANA, Spach.

مثل المتقدم ذكره الآن الاسدية الوحشية قلادية الهبة بلا اشيرات - فحيات ازهارها صفراء

* بلا ذنبات

F. procumbens | *Spachii* ٢ *oligosperma* ٣

** ذات ذنبات

F. Arabica ٤ *glutinosa* ٥

١. *F. procumbens*, Dunal. الفيومانا المتكئة في الفروع متكئة ملازمة الزغب .

الاوراق مترادفة جالسة خطية ثلثة الزوايا ملساء متشابهة . الازهار ٢ - ٤ عند قم الفروع ابطية تقريباً .
الزنبقات مثل الورقة طولاً منعقة اخيراً - الصيف - نول جافة قرب عتبات

٢. *F. Spachii*, Gren. et Godr. فيومانا سباح في الفروع منتصبه . الاوراق مترادفة

جالسة خطية مثلفة لرجة والعليا قصيرة . الازهار مرتبة في راسيات ذات فلول عند قم الفروع . الزنبقات
ضعفا الوراق الى ٢ اضعافها طولاً منعقة اخيراً - الصيف - حلب

٣. *F. oligosperma*, Boiss, et Ky. الفيومانا القليلة البزرة غديسبه . الفروع

متصاعدة والاوراق خضراء ذات رجيلات وابرة متباعدة السنينات المنتهية بهلب شفاف . الاوراق
الزهري صغيرة . الراسيات انما تامة مسترسلة . الزنبقات متعكة اطول قليلاً من الجيب - الصيف
جبل يلان

٤. *F. Arabica*, L. الفيومانا العربية في الفروع متصاعدة . الاوراق قصيرة الرجيلات

خطية مستطيلة حادة والسفلى خطية متراكبة . الراسيات مسترسلة . الزنبقات اطول من الورقة قليلاً
منفرجة وقمها منحنية الى الاسفل . الجيب ذو ١٢ برة - الربيع - نول جافة في سورية وشامها

٥. *F. glutinosa*, L. الفيومانا اللزجة في الفروع متصاعدة . اكثر الاوراق متقاربة عنافية


لرجة ابيرة والزهرية قصيرة . الراسيات مسترسلة . الزنبقات هلمية منفرجة خديدة عنافية ضعف الكاس
طولاً . الجيب ذو ٦ برة - الربيع - ساحل سورية البحري واسافل لبنان . الاسكندرية

الرتبة العاشرة البنفسجية *Scutellaria*, D.C.


الازهار غير قياسية . السبلات ٥ مسترة . البتلات ٥ . الاسدية ٥ مندغمة في قرص تحت المبيض .

المبيض احادي الغرقة كثير البويضات المدغمة في المشيمات الثلاث المصراعية - اعشاب ونادراً
شجيرات

شكل ٥٦



شكل ٥٧



شكل ٥٦ ب. دات البنفسج السهي . ت . سداة . ث . سداة اخرى يرى فيها معلقة شصية . ح . مصراع من
المجيب . ج . المجيب بعد انشقاقه . شكل ٥٧ . ص . س . السيلات الخمس . ب ب ب ب ب ب ب ب السيلات

البنفسج *Viola*, L.

السيلات غير متساوية ذات ماميز قاعدية. التلة السفلى مخالفة للبقية وقاعدتها ممتدة على هيئة مهاز.
الخويطات متسعة. الانثريات مغمضة على هيئة طوق. المجيب منتفخ بمرونة مصاريح. الاوراق مترادفة
ذات ذنبيات

ك السمة راسية ملساء . معبرة

V. Libanotica | *odorata* | *sylvatica* γ

* * السمة جرية مشعرة الفاعة . سنوية

V. parvula ε *pentadactyla* ο *occulta* γ *modesta* γ *ebracteolata* λ

V. Libanotica, Boiss | البنفسج اللبناني 24م الجذور ضخمة والسوق متعددة حزمة
صلة. الاوراق ضخمة عنائية اسفينية الفاعة ونادراً تحت قلبينها بيضية حادة مسنة. الذنبيات ملساء
مستطيلة رحيمة قصيرة الكتشش. السيلات مستطيلة حادة. المهاز كال اطول من معلقات الكاس.

النبات باهتة . الجيب كروي لبادي - الصيف - جرود لبنان بقرب الارز
V. odorata, L. ٢ . البنفسج العطر 24 بلا سوق . ام الجذور معتدة . الاوراق بيضة عريضة
 كالة قلبية القاعدة وعلى السنولونات الصفيحة كلوية . الذنبات بيضة رحيمة ذات كشكش . الازهار غامقة
 اللون . السبلات كالة . المهاز كال . الجيب كروي زغبى - الربيع والصيف
gennina, Boiss. ١ . الحقيقي . الكشكش اقصر من عرض الذنبية - كسب
Dehnhartii, Boiss. م. ب . دينهارت . الكشكش اطول من عرض الذنبية - لبنان
suavis, Boiss. ت . اللطيف . الذنبات خطية رحيمة مثل طول كشكشها عرضاً - حلب ولبنان
V. sylvatica, Fries. ٣ . البنفسج الغامبي 24 املس . السوق متصاعدة . متفرعة . الاوراق
 قلبية بيضة صكوية والعليا مدببة قليلاً . الذنبات رحيمة حادة طويلة الكشكش كثيفة . الازهار باهتة .
 السبلات حادة . الجيب حاد املس - الصيف - لبنان ١٠٠٠ - ١٢٠٠ متر
 * الزنبدة ذات فلسين

V. parvula, Tin. ٤ . البنفسج الصغير ٥ حليمي قزم متفرع من القاعدة . الاوراق صغيرة
 مضحلة الشرافات والسلى منها مستديرة تقريباً او مستطيلة والعليا رحيمة . الذنبات ذات ٣ اقسام خطية
 او ٤ وانقسم المتوسط اطول قليلاً من البقية . السبلات . ثلثة رحيمة . التلات يضاء مزرقه القاعدة انصر
 من الكاس . المهاز اقصر من معلقات الكاس - الربيع - جبل أنغري فوق دوما . عينانيث .
 الجبل الشرقي

V. pentadactyla, Fenzl. ٥ . البنفسج الخماسي الاصابع ٥ منعطف الخشونة قزم متشعب .
 الاوراق كاملة او مضحلة الشرافات والجذرية مستديرة والباقية ملوقة مستطيلة . الذنبات متشعبة
 شعبتين والشعبة الانسية طويلة والوحشية قصيرة . السبلات رحيمة . التوتج ضعف الكاس طولاً . المهاز
 ضعف المعلقات الكاسية طولاً - الربيع - حلب

* الزنبدة بلا فلس

V. orcutta, Lehm. ٦ . البنفسج المستدير ٥ مخفض متفرع القاعدة حرش . الاوراق متباعدة
 الشرافات والسلى منها بيضة والعليا مستطيلة ملوقة او رحيمة . الذنبات كبيرة رحيمة ريشية . السبلات
 كبيرة متنامية حليمية هدية مستطيلة مدببة . المعلقات كبيرة تنحني المهاز . التوتج باهت اقصر من
 الكاس - الربيع - كسب . لبنان فوق ديمان

V. modesta, Fenzl. ٧ . البنفسج المحتشم ٥ املس او زغبى . السوق متعددة متصاعدة .
 الاوراق مضحلة الشرافات والسلى منها بيضة مستديرة والباقية مستطيلة رحيمة ورحيمة خطية والعليا حادة .
 الذنبات اصغر كثيراً من الاوراق خطية رحيمة كاملة او ذات سنينة على كل من جانبيها . السبلات غير

متنامية رحيمة حادة. التويج أزرق ضعف الكأس طولاً. المهاز أقصر من معلقات الكأس - الربيع - عند مصب نهر العاصي. غابات الجبل الأقرع

٨. *V. ebracteolata*, Fenzl. البنفسج العادم الفلوس ☉ قزم قصير الزغب. الأوراق

متباعدة الشرافات والسفلى منها بيضية مستديرة والبقيّة مستطيلة أو رحيمة أو خطية. الذنبيات قصيرة مستطيلة خطية ذات سن أو سنيّن على جانبي قاعدتها. الأزهار صغيرة. السبلات ملساء رحيمة ومعلقاتها أطول من المهاز. البتلات صفراء أطول قليلاً من الكأس - الربيع وأول الصيف - حلب عند القناة. يبلان. جرد لهنان وتحت جردود بقر باهدن وتنورين

الرتبة الحادية عشرة البوليغالية. POLYGALEÆ.

الأزهار غير قياسية. السبلات ٥ غير متساوية. البتلات ٢-٥ ملتحمة مع الأسدية في أنبوبة. الأسدية أحادية الخوة مستقلة من الأعلى أو متحدة في حزمتين متساويتين متقابلتين. المبيض ذو غريفتين في كل منهما بويضة. القلم بسيط. الثمر جيب ينشق على المصراع - أعشاب ونادراً أشجيات

البوليغالا POLYGALA, L.

السبلات مسننة والانتان الداخليتان أكبر من البقيّة جناحيّتان. التويج ذو ٢ بتلات والبتلة السفلى كبيرة حزمومية متضمنة الأسدية وعلى ظهرها عرف كثير الخرق. الانتيرات ٨ أحادية الغريفة تنفتح بواسطة مسامة. الجيب منضغط بعكس المحاجر. البزور عفاية

* سنوية

P. Monspelica ١ *eriotpera* ٢

** معيرة

P. spinescens ٣ *supina* ٤ *pruinosa* ٥ *Anatolica* ٦

١. *P. Monspelica*, L. بوليغالا جبل بيلمون ☉ السوق منفردة أو متعددة متصبة

بسطة تقريباً. الأوراق كثيفة خطية رحيمة مدببة. الراسيات طويلة انتهائية كثيرة الأزهار. السبلات الخارجية رحيمة. الأجنحة بيضاء مستطيلة ذات ٢ أعصاب وأوردة غير متفصّلة. الجيب قلبي مغلوب ضيق أمامس - الربيع - أماكن عشبية في سواحل سورية البحرية. راشيا. الندس

٢. *P. eriotpera*, D.C. البوليغالا الصفوية الجناح ☉ زغبى أو مستأس. السوق متصاعدة.

الأوراق خطية أو خطية مستطيلة كالأ. الراسيات قصيرة ابطيّة ذات ٤ أزهار إلى ٦. الأجنحة بيضية

مقلوبة غشائية او مستبسة . الجيب يضي مقلوب مخروم هدي - الربيع - رمال ارض الصعيد
 P. prinensis, Descl., ٣. البوليفالا المستبسة (المررد) ثمفرج الخبل مستبب.
 الاوراق صغيرة مستطيلة خطية . الراسيات انتهائية قليلة الازهار . السبلات مستطيلة غشائية ومتصف
 ظهرها غشائي . الاخضعة يضاء مستبسة يضية ذات مخالب قصير . المخزوم مخوذي ارجواني - ايار
 وحرمان - مخزوم جافة في بادية سينا

P. lupina, Schreb. ٤. البوليفالا المستبسة 2 غشائي . السوق متعددة خطية متبسة .
 الاوراق يضية مقلوبة كالة . الراسيات ذات ٥ ازهار الى ١٠ . الاخضعة يضية مقلوبة اقصر من التويج
 اعرض من الجيب ذات سوقة صغيرة . الثلات الجانبية مثل المخزوم طولاً . الجيب يضي مقلوب مفروض
 امس - الصيف - غابات انطاكية والجبل الاقارع ولبنان الى صيدا الى المشرق

P. pruinosa, Boiss. ٥. البوليفالا الغشائية 2 رمادي ناعم الزغب نجوي القاعدة متصاعد
 الفروع . الاوراق السفلى يضية والبقية اهليجية وخطية بسيطة . الراسيات مستبسة . السبلات الجانبية
 مثل الزينة طولاً . الاخضعة مثل التويج طولاً يضية مقلوبة مفرفة . الثلات الجانبية اقصر من المخزوم .
 الجيب اعرض قليلاً من الجناح قلبي مقلوب مخم امس - اول الصيف - الجبال حول عنتاب
 ومرعش وشمالها

P. Anatolica, Boiss. et Held. ٦. البوليفالا الانضوية 2 كبر السوق طولها
 متصفا . الاوراق السفلى اهليجية خطية والبقية خطية يابسة . الراسيات انتهائية طويلة مستبسة .
 السبلات الجانبية اطول من الزينة بارزة من قمة الراسم . الجناح اهليجي . الميص ذو سوقة مثله
 طولاً . الثلات الجانبية اطول من المخزوم قليلاً . الجيب قلبي مقلوب - الربيع - الجبل الاقارع
 وشرفه وشماله

الرتبة الثانية عشرة الفرנקينية FRANKENSCHE.

الازهار قياسية . الكاس مخدة السبل انوية . الثلات ٤-٧ ذات مخالب . الاسدية مخنثة اعداد .
 الميص احادي الغريبات والمشيمات جلارية خطية . التريضات مصطفة صلب . الجيب منشق على
 الصاربع - اعشاب اونجيات

الفرنكنيا

الكاس رباعية المخرق او خماسيها . الثلات ٤ - ٥ وردية . انم خيط منشق الى ٣ ، ٢ ، ١

٤. المجيب احادي الغرقة كثير البزور ذو ٣ مصارع الى ٥
 ١. *F. pulverulenta*, L. الفرنكينا المغبرة © حليبي . السوق مستلقية . الاوراق بيضية
 مقلوبة مغبرة من الاسفل . الازهار مرتبة قهراً متشعبة انتهائية متراكمة . الكاس ملساء - الربيع - السواحل
 البحرية في سورية وفلسطين ومصر وبادية القبة وسينا
 ٢. *F. hirsuta*, L. الفرنكينا العفائية 2 عفاي . السوق مستلقية ونادراً متصبية .
 الاوراق خطية او مستطيلة مهدية القاعدة ملتفة الحوافي . الازهار في قم متشعبة انتهائية - الربيع -
 ٣. *hispidula*, Boiss. ب . الحوية . الفروع والكاس هلبية . الازهار كبيرة . التزهير في -
 شواطئ سورية وبادية سينا ومصر
 ٤. *revoluta*, Boiss. ت . المثقة الاوراق . مثل الثباين المتقدم ذكره الان اللبس قصير
 مستشعب والفروع قصيرة متصبية والاوراق ضخمة قصيرة - الاسكندرية

الرتبة الثالثة عشرة السيلينية SILENEÆ.

الازهار قياسية . الكاس مخددة ذات ٥ اسنان او ٦ . البتلات ٥ - ٦ متردفة باسنان الكاس
 ذات مخالب ومحمولة غالباً مع الاسدية على حامل المبيض . الاسدية ضعف البتلات ونادراً مثلها عدداً .
 الانثريات ذات غريفتين . المبيض مستقل الى منتصفه او قاعدته ذو غريفتين الى ٥ مضحلة كثيرة
 البويضات او قليلها . المشيمة محورية . المجيب ذو سويقة كثر طولها او قل وهو احادي الغرقة ونادراً غير
 منشق ذو اسنان كالاقدام عدداً او ضعفها - اعشاب او نجيلات اوراقها متفابلة بلا ذنبيات

السبط الاول الفرنفليات DIANTHEÆ . البزور مجنبة وندبتها وجهية . الاقدام ٢ .
 الجنين مستقيم

١. *Velezia* . قاعة الكاس بلا حراشف . الفغار غير مطوّل . اعشاب سنوية متشعبة يابسة
 ٢. *Dianthus* . قاعة الكاس ذات حراشف . الفغار مطوّل الى حامل مبيض . اعشاب
 سنوية او معمرة

٣. *Tenica* . قاعة الكاس ذات حراشف . الفغار قصير . اعشاب سنوية او معمولة

السبط الثاني اللخنيات LYCHNIDEÆ . البزور ككلوية او كروية تقريباً والندبة
 جانبية . الجنين لولبي او محيط

* اعصاب الكاس الدرزية مفنودة . الاقدام ٢

*** الحراشف ١٠-١٦

D. Sinaicus ? pendulus ١٠ calcephalus ١١

١. D. multipunctatus, Ser. القرنفل الكثير النقط 24 ملمس أو زغبى أو خلى كثير

السوق وهي متصاعدة بسيطة أو متفرعة من الأعلى. الأوراق هدية القاعدة. الحراشف غشائية بيضية ذات سبل قصير. أعصاب أسنان الكاس غير ممتدة إلى أنبوبتها. الصفيحة وردية بيضية مقلوبة أسفينية مسننة - طول السنة - كثير الوجود في سورية وفلسطين

gracilior, Boiss. ب. الانحل. السوق غخيلة. الأعصاب قليلة الامتداد على الأنبوبة -

شالي سورية

axilliflorus, Boiss. ت. الابطي الزهر. الأزهار متراكبة عند التيم - لبنان

subnervis, Boiss. ث. العادم الأعصاب تقريباً. الكاس قليلة الأعصاب - لبنان

diffusa, Post. ج. المنتشر. السوق منفرجة مستطيلة أو متصاعدة. الأزهار صغيرة - جبل

منيطري. جبل الشيخ

٢. D. polycladus, Boiss. القرنفل الكثير الفروع 24 ملمس أو صوفي من الأسفل.

الفروع متعددة عالية متشعبة الفرع. الأوراق الساقية عريضة نوعاً ما الأزهار منفردة انتهائية. الحراشف غشائية بيضية قصيرة الحجم. أعصاب أسنان الكاس غير ممتدة إلى أنبوبتها. الصفيحة باهتة مستطيلة خطية صغيرة كاملة محرومة مستدقة القاعدة - الصيف - جبال شالي سورية. الجبل الشرقي

٣. D. pallens, Sibth. القرنفل الباهت 24 مستغبر مستطيل. السوق منتصب بسيطة أو

متفرعة. الأوراق مرتفعة الأعصاب خشنه الحوافي. الحراشف بيضية مستطيلة مستدقة ثلث الكاس طولاً. الكاس مخططة وإسنانها رمحية. الصفيحة أسفينية بيضية مقلوبة شرافية أو مسننة النمة - الصيف - شالي سورية. من البقاع إلى تدمر وشرقيها

٤. D. Judaicus, Boiss. القرنفل اليهودي 24 اغبر حلبي. السوق حزيمة احادية الأزهار

غالباً. الأوراق منعقفة مبرزة محزمية يضاء غشائية الحوافي والسفلى منها متراكبة قصيرة متسعة القاعدة. الأزهار كبيرة بعيدة قليلاً عن الأوراق العليا. الحراشف مستطيلة منتهية بناب اخضر منفرج. الصفيحة مستطيلة كاملة تقريباً - ابار - هضاب حارة بين القدس وعين السلطان

٥. D. floribundus, Boiss. القرنفل الوافر الأزهار 24 السوق متعددة عنقودية كورنية

من ام جنو رصلة. الأوراق ذات ٢ أعصاب إلى ٥. الحراشف يضاء الحوافي مستدقة إلى ناب ثلث الكاس طولاً أو أكثر. أسنان الكاس يضاء الحوافي. الصفيحة باهتة ربع الكاس طولاً مستطيلة محروقة النمة إلى خرق قليلة - الصيف

pruinosa, Boiss. ب. النخالي. الاوراق السفلى والسوق خلسة نخلية - صخور عتباب

ومرعى

D. Sibbaldii, Labill. ٦. القرنفل اللبناني 24 الساق ضخمة مثل كورني أو بسيط. الاوراق

خامسة الاعصاب منعقة احياناً. الازهار منفردة عند قم الفروع او مجتمعة ٢ او ٣. الحراشف ٦ اوراق
بخطانية نصف الكاس طولاً بيضية القاعدة منتهية بناب رمحي طويل منفرج. اسنان الكاس طويلة حادة.

الصفحة باهية بيضية مقلوبة اسنينة حلمية من الانسية ذات اطخة حمراء ومشرحة الى نصفها الى مخرق حلبي

الصف - تحت جرد لبنان. قلدون. جبل كنبرينا في سينا

D. Ambriata, M. B. V. القرنفل المكشكش 24 نجبي القاعدة كثير السوق المنصبة

البسيطة او المنفرعة. الاوراق مزينة قللاً خلية مخزنية. الازهار منفردة. الحراشف ٦ - ٨ مستطيلة

حادة ثلث الكاس طولاً. الكاس طويلة واسنانها مدببة. الغلب منبثق قليلاً. الصفحة ريشية المخرق -

الصف

brevifolius, Boiss. ب. القصير الورق. الاوراق قصيرة. الحراشف منتهية فجأة بحمة.

قاعدة الصفحة ذات لحية - قرب ارز لبنان

D. melancholica, P. ٨. القرنفل الشعي البطل الجذع ينبع دو سوق عديدة

حاملة ازهار وعافرة. الاوراق ذات اعصاب الى ٧ والجذرية منها طويلة منفرجة. الساق مثل درني بسيط

او منفرج. الازهار ٢ - ٣ باقية او منفردة. الحراشف ٨ - ١٠ بيضية حادة. الكاس ٤ اضعايف

الحراشف طولاً اسنانها مثانة مستطيلة. الصفحة وردية لحوية بيضبة مقلوبة قصيرة المخرق مسننتها -

الصف - الصخور قرب انطاكية وشمالها

D. pendula, Boiss. ٩. القرنفل المينوي (المساح) 24 اغبر. سوق منشعبة من

القاعدة كثيرة الفروع. الاوراق الجذرية مضخمة قبل الانقسام مخزنية. الساقية مستطيلة الى ثاب ملازم

٢ - ٤ اضعايف الغمد طولاً. الازهار منفردة. الحراشف ١٠ ملازمة بيضبة بيضاء الحوافي ومسدنة الى

حمة قصيرة. الصفحة ملساء اعرض قليلاً من الغلب مستطيلة مشرحة الى ثلاثة ارباع طولها - آب

الصخور عند سفح جبل سينا

D. pendula, Boiss. et El. ١٠. القرنفل المتدلي 24 الجذع خشبي. السوق مستطيلة

ورقية بسيطة او قليلة الفروع. الاوراق السفلى طويلة ذات اعصاب غالباً. الازهار منفردة او ٢ - ٣

معاً. الحراشف ١٠ - ١٤ متراكبة مستطيلة رحيمة حادة ثلث الكاس طولاً. الصفحة لحوية القاعدة

وردية منصوبة الى ربع طولها ثلث الكاس طولاً - آخر الصف - متدل من صخور لبنان من اثنائهم

الموسطة الى تحت الجرد

D. caloecephalus, Boiss. 11 . القرنفل الطريف الرأس 24 مستغبر عالٍ . الاوراق
مسترخية خماسية الاعصاب تقريباً . الغدد اطول كثيراً من عرض الساق . الازهار مرتبة في رأس مندمج .
الحراشف مستطيلة رمجية تستدق فجأة الى سبلات طويلة غشائية ثلث الكاس طولاً . اسنان الكاس مدببة .
الصفيحة لبنيّة اللون مشعرة من الاعلى بيضيه اسفينية مسننة القمة - الصيف - الصخور حول انطاكية

٢ التونكا TUNICA, Scop.

الكاس ذات حراشف عند قاعدتها او عارية بلبلية او انبوية طويلة خماسية الاسنان . الپتلات
٥ طويلة الخلس ذات صفيحة مخرومة او متشعبة عادمة الاكليل . الاسدية ١٠ . حامل المبيض قصير .
الجيب مستطيل كثير البنور رباعي الاسنان - اعشاب شجيرة ازهارها صغيرة اوراقها نجمية
T. velutina, Guss. 1 . **التونكا الخصلية** ⊙ الفواصل المتوسطة خصلية . السوق متصبية
بسيطة . الاوراق العليا سرحاء الحواف . الغدد طويل . الحراشف المغلفة الكاس والكاس منفذة .
الصفيحة متشعبة . البنور زورقية درنية - الربيع - سواحل سورية البحرية
T. syriaca, Boiss. 2 . **التونكا السورية** ⊙ اخضر املس . نجيحي القاعدة . السوق كثيرة
خيطية يابسة خشنة بسيطة احادية الازهار . الاوراق خطية . ثلثة خدشة . والدية منها قصيرة . اوراق
الطرف متعددة مثل الكاس طولاً رمجية ضيقة والضلع المتوسط احر . الصفيحة كاملة وردية - الصيف
- الصخور حول انطاكية

T. pachygonia, F. et M. 3 . **التونكا الغليظة الزوايا** ⊙ غديدي لرج . الساق
منتصب متشعب من منتصف عقودي . الاوراق ذات ٣ اعصاب . الزيدات يابسة ضخمة مثل الكاس
طولاً او اطول منها . الكاس جرسية ملساء بيضيه اسنان حويبتها مضلعة . الپتلات بيضاء محمرة من
الاسفل خطية ملوقية كاملة - الربيع والصيف - حلب . غور الاردن والى الشرق منه
T. Arnica, Bris. 4 . **التونكا العربية** ⊙ قزم غديدي زغبي . الساق مخفض متشعب .
الاوراق قصيرة خشنة الحواف ذات ٣ اعصاب غير واضحة . الزيدات ضخمة مثل الكاس الى ضعفها طولاً .
الكاس مخروطية مقنونة غديدة مثثة الاسنان حادتها . الصفيحة بيضاء منضرة خطية - ايار - بادية
التيه بقرب فلسطين

٤ الجيسوفيليا GYPSOPHILA, L.

الكاس بلبلية او جرسية ونادراً اسطوانية غشائية بين اعصابها الخمس . الپتلات ٥ صفيحتها عارية

القاعدة . حامل المبيض قصير . الجيب كروي أو بيضي ونادراً مستطيلي - اعشاب ونادراً الحجمات
Si. tenuis, Fenzl. 1 الجيسوفيل التحميل 2f. مستغبر . السوق اسطوانية عالية فضبة العند
 متمية بعنفود امس . كثير الفروع . الاوراق مستطيلة رمحية مدبية . الفلوس عشية ضبة الحوافي .
 الزيدات شعرة 4 اضعاغ الكاس الى 6 طولاً . الكاس بلدية جرسية . الصفحة وردية ضعف الكاس
 طولاً . الجيب اطول قليلاً من الكاس - ايار - من عينتاب الى حلب وشرقها
Si. Bokejeka, Del. 3 . الجيسوفيل الروكييكا (الكزامة . البراج) 2f. مستغبر امس .

شكل ٥٨



الجذر نحيل . السوق نخيلة يضاء متشعبة عنقودية . الاوراق لحمية ذات
 عصب واحد والسفلى منها مستطيلة رمحية والبقية خطية رمحية . اللوس
 خطية عشية . الزيدات 4 اضعاغ الكاس الى 6 طولاً . الكاس جرسية
 مستطيلة الفصوص الكالة البيضاء الحوافي . الثلات وردية مخططة
 خطوطاً بنفجية ضعف الكاس طولاً . الجيب اقصر من الكاس - الربيع
 - بادية تدمر . البقاع . بين الدس واربجا . بادية سينا ومصر

Si. Libanotica, Boiss. 3 . الجيسوفيل اللبانية 2f. اغبر . م . سيات الجيسوفيل

ومن الاسفل امس . السوق عديدة نخيلة . العنفود مستطيلي . الاوراق
 صغيرة لحمية مستطيلة حادة ذات 3 اعصاب متبكية . الفلوس صغيرة
 ث . اسديها ومدتها

غشائية . الزيدات 3 اضعاغ الكاس الى 4 طولاً . الكاس جرسية اسنانها حادة يضاء الحوافي . الصفحة
 وردية اقصر من الكاس . الجيب اطول من الكاس - الصيف - جرود لبنان وتحت جرود

Si. Aucheri, Boiss. 4 . جيسوفيل أوشر 2f. اخضر . السوق نخيلة عالية كثيرة الفرع .

العنفود مستطيلي غديدي او امس . الاوراق درنية مستطيلة او خطية رمحية ذات 3 اعصاب . اللوس
 خطية رقيقة . الزيدات ضعفا الكاس او 3 اضعاغها طولاً . الكاس يضاء الدرنات والفصوص بيضية كالة
 يضاء الحوافي مضحلة المحبة . الصفحة وردية اقصر من الكاس - آب - مرعش وشمالها

Si. Damascena, Boiss. 5 . الجيسوفيل الدمشقية 2f. اغبر . العنفود منتشر متشعب .

الاوراق صغيرة لحمية مستطيلة حادة ذات 3 اعصاب متفمة . الزيدات 4 اضعاغ الكاس الى 6
 طولاً . الكاس جرسية فصوصها كالة غشائية الحوافي . الصفحة يضاء . مثل الكاس طولاً . الجيب ضعف
 الكاس طولاً - نموز - تلؤلؤ جافة من دمشق والجبل الشرقي الى الحوران وشرقها

Si. persicifolia, Boiss. 6 . الجيسوفيل الرسكي الورق 2f. امس . السوق نخيلة ذات اوراق

من الاسفل ومتشعبة العنفود . الاوراق مخنانية بيضية او مستطيلة حادة متبكية الوردية والساقية منها قلبية
 القاعدة . الزيدات 3 اضعاغ الكاس الى 6 طولاً . الفلوس صغيرة غشائية . الكاس جرسية بيضية

كالة الاسنان. الصفيحة الوردية والجيب ضعف الكاس طولاً - حزينان - تلؤل حواريه من عينتاب الى البقاع والى الشرق

G. connata, Post. ٧ . الجيسوفيل المتحدة القاعدة 24 ملمس . السوق عصوية منتهية

بعنقود قمي . الاوراق سفينية والساقية منها بيضيه مثله عريضة متحدة القاعدة . مشبكة الورد حادة . الزنيدات ضعفا الكاس طولاً او اكثر . الفلوس صغيرة غشائية . الكاس جرسية فصوصها درنية حادة غشائية ذات ضلع ارجواني . البتلات البيضاء والجيب ضعفا الكاس طولاً تقريباً - الصيف - مارد بن *G. elegans*, M. B. ٨ . الجيسوفيل الحسن 24 ملمس . الساق متشعب كورني عنقودي .

الاوراق السفلى مستطيلة ملوقيه والساقية خطية رمحية والزهرية غشائية . الزنيدة اطول من الكاس اضعاًفاً كثيرة . الكاس نصف كروية فصوصها بيضاء الحوافي . البتلات وردية اسفينية ضعفا الكاس الى ٥ اضعاًفاً طولاً . الجيب اطول من الكاس - من ابار الى تموز - اماكن رطبة في بادية سينا

G. viscosa, Murr. ٩ . الجيسوفيل اللزجة 24 ملمس من الاسفل لزوج من الاعلى . الساق متعرج متشعب الى عنقود متبسط . الاوراق متحدة القاعدة القلبية . مستطيلة رمحية مدببة والزهرية رقيقة . الزنيدات ضعفا الكاس او ٣ اضعاًفاً طولاً . الكاس نصف كروية اسنانها كالة بيضاء الحوافي . البتلات وردية مجذومة مخرومة ضعف الكاس طولاً . الجيب اطول قليلاً من الكاس - ايار وحزيران - مزارع حلب وبتماس الى الجبل الشرقي بقرب دمشق والى الشرق

G. frankenioides, Boiss. ١٠ . الجيسوفيل الشبيهة بالفرنكنيا 24 حزمي غدي عفاًني . الفروع نحيلة مستقيمة . الاوراق قصيرة باقية خطية هلمية . الازهار منفردة تقريباً في الآباط العليا . الزنيدات اقصر من الكاس . اسنان الكاس مستطيلة غشائية الحوافي كالة . البتلات وردية اطول من الكاس . الجيب يضي اقصر من الكاس - الصيف -

Libanotica, Boiss. ب . اللبانية لزوج . الزنيدات احباًفاً اطول من الكاس . صخور

لبنان بقرب الارز وديمان

G. hirsuta, Labill. ١١ . الجيسوفيل العفائية 24 متفرق الخبل لزوج نحيسي القاعدة .

السوق قصبة متينة او متساعدة قليلة التشعب . الاوراق ضخمة خطية ملوقيه او مستطيلة اهليجية مستدقة القاعدة . الازهار الشعية قصيرة الزنيدات منعقفتها اخيراً والانتهائية جالسة باقية . الكاس حادة الاسنان . الصفيحة يضاء بيضيه اطول من الكاس . الجيب مستطيل اسطواني اطول من الكاس - الصيف -

mollis, Boiss. ب . الناعمة . لحري . السوق ١٠ متر الى ٢٠ طولاً - تحت جرد لبنان

alpina, Boiss. ت . الجردية . قزم حزمي قصير الخبل . كل الازهار انتهائية - قم لبنان

والجبل الشرقي وقمة جبل كترينا في بادية سينا
 Barradensis, Boiss. ث. البردية . مخضر . الازهار منفردة تقريباً - صخور سوق وادي
 بردة

ج. الحيطلية الساق . مستشيب خلي . السوق طويلة متفرجة . الاوراق
 بيضة مستطيلة . الازهار في باقات مؤلفة من زهرتين او ٢ - البناء . الجبل الشرقي من دمشق الى تدمر
 ١٢. ١٣. *cf. porrigens, L.* الحجسوفلا الممتدة ٥ لرج الشعر طويلة . الساق منتصب ضخم
 متشعب من الاعلى كورني عنقودي . الاوراق رحيمة عريضة متحدة قليلاً عند القاعدة والعليا خطية .
 الزيدات طويلة جداً منفردة اخيراً اسنان الكاس كالة مستطانية بيضاء الحوافي . الصفيحة وردية اسنينة
 مخرومة . الجيب كبير مثل الكاس طولاً - اورفا الى قلدون والجبل الشرقي والى الشرق

٥ الانكيرويتلم *ANKIROPETALUM, Fenzl.*

الكاس اسطوانية غشائية بين فئانها الخمس . الپتلات ٥ مندخمة على المحافة العليا لقرص قديم
 وهي ثلثة الشبب عادة الاكليل . الاسدية متبقة . المبيض ذو ٨ . بويضات الى ٩ . الجيب يبضي او
 مستطيل ذو غرنة واحدة . المضارب ٤ غير متساوية - اعشاب معبرة عادة الاوراق ثريباً مشبكة
 الفروع

١. *A. confertiflorum, Fenzl.* الانكيرويتلم الشبيه بالحجسوفلا ٢٢ الفروع كثيرة
 التشعب العنقودي . الاوراق مخززية . الزيدات ٣ اضعايف الكاس او ٤ طولاً ١١ . اس زغبية مستطيلة
 اسنانها مستديرة كالة . خرق الصفيحة الوسطى على هيئة مرسة . الجيب اهليلجي انحر من الكاس -
 الصيف - هضاب حوارية وطباشيرية من عنتاب الى مخززة قرب حاه والى الشرق

٢. *A. arbusculum, Fenzl.* الانكيرويتلم الارسوسي ٢٢ الفروع بسبضة اوفقية
 الفريعات المترادفة . الاوراق خاية قصيرة . الزيدات ضعفا الكاس الى ٣ اضعايف طولاً . الكاس
 ملساء جرسية اسنانها بيضة كالة . خرق الصفيحة الوسطى قصيرة التشعب . الجيب * * * - حيران
 - صخور مرعش الى جبل بيازن

٣. *A. confertiflorum, Boiss.* الانكيرويتلم البقاعي ٢٢ الفروع كثيرة التشعب . الاوراق
 لحمية صغيرة خطية مخززية . الزيدات ضعفا الكاس طولاً اقل . الكاس ملساء . خرق الصفيحة
 الوسطى مثلثة مقلوبة مخرومة القبة مستدقة القاعدة عادة الاسنان . الجيب يبضي اطول من الكاس
 - تموز - اراضي مقفرة في البناع

٦ الصابونية *SAPONARIA, L.*

الكاس اسطوانية او مستطيلة واعصابها كثيرة غير واضحة. البتلات ٥ مغلفة ذات نيتين طويلتين من الانسية. الصفيحة حرشفة القاعدة او عارية ومتسعة على الغالب. الاسدية ١٠. حامل المبيض مفقود او موجود. المبيض غالباً كثير البويضات. الحبيب بيض مغلوب او مستطلي او كرري ينشق الى ٤ مصاريع او اسنان

١. *S. nodiflora*, Boiss. الصابونية المعتدة الزهر ① امس عال. الفروع دولانية تقريباً. الاوراق السفلى مستطيلة ملوقة كالة والساقية رحيمة حادة. الفلوس اقصر من الكاس خطية لرجة. الازهار صغيرة. الكاس اسطوانية لرجة رحيمة الاسنان. الحبيب شاق قاعدة الكاس وهو نصفها طولاً - شمالي سورية بقرب مجسنة وملاطية

٢. *S. Vaccaria, L.* الصابونية البقرية ② الاوراق السفلى مستطيلة مستدقة القاعدة والبقية جالسة قليلة القاعدة رحيمة يابسة. اسنان الكاس مثثة غشائية الحوافي. الخلب منبثق قليلاً. الصفيحة بيضية مغلوبة مضومة نصف الكاس طولاً - الربيع - المزارع. عام
oxyodonta, Post. ب. الحاد السن. الصفيحة صغيرة ضيقة. اسنان الكاس طويلة - مع الرمز
(*S. oxyodonta*, Boiss.)

٣. *S. pulvinaris*, Boiss. الصابونية الوسادية ③ حرمي وسادي. السوق قزمة متشعبة ذات ٣ ازهار الى ٧. الاوراق صغيرة والجذرية منها خطية مترابطة محزومة قليلاً كالة والساقية والفلوس حادة. الزهر عفائي لرج. الزيدات مثل الكاس الاسطوانية طولاً او اقصر منها. الصفيحة اسطوانية مخرومة. الحبيب مستطلي مثل الكاس طولاً - الصيف - قم لبنان والمجل الشرقي العليا

٤. *S. officinalis, L.* الصابونية المخزنية (شرش حلاوة) ④ امس. السوق عالية. الاوراق كبيرة مستطيلة اهليجة حادة ذات ٣ اعصاب. الصفيات كثيرة الازهار قصيرة الزناد. الكاس ملساء واسنانها مثثة مدية. الصفيحة بيضية مغلوبة كاملة او مخرومة. الحبيب مستطلي - الصيف - ارياف السواقي بقرب بتياس. مزروعة في اماكن شتى لاجل جذرها النافع لغسل الثياب ولعمل الحلاوة

٥. *S. Mesogitana*, Boiss. الصابونية الموسجثانا ⑤ زغبي لرج. الساق منتصب مخفض متشعب من القاعدة كورني. الاوراق السفلى مستطيلة ملوقة كالة والزهرية خطية رحيمة. الكاس اسطوانية واسنانها بيضية كالة غشائية الحوافي. الصفيحة بيضية مغلوبة نصف الكاس طولاً. الزيدات المتيرة منفردة قليلاً. الحبيب مستطلي - جرود شمالي سورية

٦. *S. prostrata*. الصابونية الملقاة ⑥ حليبي مستشيب. السوق متكئة ضخمة متشعبة

كثيرة الفروع. الاوراق مستطيلة خطية ملوقة ذات عصب واحد. الكورنب مندمج. الكاس اسطوانية متفتحة في الاثمار. الصفيحة مستطيلة ملوقة كاملة. الجيب صغير كروي مثل حامله طولاً - الصيف - جبال جافة في شمالي سورية

٧. *tridentata*, Boiss. الصابونية الثلاثية الاسنان ٢٤ متفرق الخية لزوج. الساق منتصب متشعب القاعنة. الاوراق مستطيلة احادية العصب والعليا اهليجة. الكورنب مسترخ. الزيبات منفرجة اطول من الكاس. الكاس لحوية اسطوانية والاسنان يضيبة مثلثة غشائية الحوافي. الصفيحة اقصر من الكاس يضيبة مقلوبة اسفينية ذات ٣ شعب. الجيب * * * - الربيع - سفح جبل اكضاغ في شمالي سورية

٨. *Sylvestris*, Boiss. الصابونية السورية (١) متفرق الزغب لزج. الساق منتصب متفرق. الكورنب مسترخ. الاوراق السلي مستطيلة كالة والعليا اهليجة خضبة. الزيبات منتصب اقصر من الكاس والكاس اسطوانية مثلثة الاسنان. الصفيحة صغيرة اسفينية مجذومة متشعبة ثعنتين. الجيب غشائي قشري القمة اقصر قليلاً من الكاس

٧ السيلينة SILENEAE

الكاس انبوية ذات ١٠ اعصاب الى ٦٠. الثلاث ٥ ذات محالب على فمها ثعنتان. الاسدية ١٠ وخمس منها مقعدة بالثلاث. المبيض كثير البويضات وقاعدته منفصلة الى ٣ غريفات. الجيب معمول على سوية - اعشاب سنوية او معمرة

السلسلة الاولى. السنوية والاحادية الاثمار

السلسلة الاولى. الكاس اسطوانية اودبوسية منضمة الفم في الاثمار ذات ١٥ عصباً الى ٦٠

الكاس ذات ٢٠ عصباً *S. coniflora* ١

S. Juvenalis ٢ *conoidea* ٣ " ٣٠ " "


S. macrodonta ٤ " ٦٠ " "

السلسلة الثانية. الكاس اسطوانية اودبوسية

ذات ١٠ اعصاب

* الازهار مدمجة القيمات

S. compacta ٥ *Reuteriana* ٦



ب. زبدة نوع من السيلينة. ث. حامل المبيض داخل الكاس. ث. المبيض. ح. جرح من بلة. ح. سدة متحد حويص بقاعدة

استلة. ح. السبات اثلاث. د. مقطوع المبيض المستعرض. د. شعنتا الاكاييل

* * * الأزهار في قيات متشعبة . الكاس ملساء .

S. muscipula ٧ *Behen* ٨

* * * * * الأزهار في قمبات متشعبة او راسيات مائلة الى جانب . الكاس عفائية او حلمية منضجة

القبة في الاثمار

S. squamigera ٩ *vesiculifera* ١٠ *crassipes* ١١ *gonocalyx* ١٢ *racemosa* ١٣

Gallica ١٤

* * * * * الأزهار في راسيات مائلة الى جانب . الكاس عفائية او حلمية قمتها غير منضجة في الاثمار

S. villosa ١٥ *Arabica* ١٦ *obtusifolia* ١٧ *setacea* ١٨ *siderophila* ١٩

Damascena ٢٠ *Palæstina* ٢١ *nocturna* ٢٢ *Canopica* ٢٣ *bipartita* ٢٤

Oliveriana ٢٥

* * * * * الزهر تشعي . الكاس كما تقدم . اعشاب غضة او متفرقة العفاه

S. rubella ٢٦ *sedoides* ٢٧ *fuscata* ٢٨ *Atocion* ٢٩

* * * * * * * * * * * الزهر غير منتظم التشعب . الكاس كما تقدم . اعشاب يابسة فروعها وزيناتها

خيطية لمساء لرجة

S. Kotschyi ٣٠ *linearis* ٣١ *Cassia* ٣٢ *Hussoni* ٣٣ *junceae* ٣٤ *chaetodonta* ٣٥

السلسلة الثانية . المعرة

* الأزهار متوسطة ثنائية المسكن او احادية

S. pharnaceifolia ٣٦ *stenobotrys* ٣٧ *brevipes* ٣٨ *spargulifolia* ٣٩

pruinosa ٤٠ *Montbretiana* ٤١

* * * الأزهار خشوية

S. subulata ٤٢ *Tejedensis* ٤٣ *odontopetala* ٤٤ *inflata* ٤٥ *Italica* ٤٦ *Amana* ٤٧

leucophylla ٤٨ *longipetala* ٤٩ *swertiaefolia* ٥٠ *Makmeliana* ٥١

Schimperiana ٥٢ *Libanotica* ٥٣ *gigantea* ٥٤ *grisea* ٥٥ *succulenta* ٥٦

S. coniflora, Otth. ١ . السيلينة الخضر وطية الزهر © قصير الزغب لرجة مخفض .

الاوراق نجيلة خيطية رحيمة مدببة . الكاس سرية القاعدة وفي الاثمار متفتحة واسنانها رحيمة ثلثها طولاً .

الصفيحة وردية ابيضاض . خرق الاكليل طويلة . الجيب جالس مستطيل مخروطي مثل الكاس طولاً تقريباً

— الربيع — من حلب الى دمشق والبقاء وشرقها

S. Juvenalis, Del. ٢ . سيلينة جوفثال © قصير الخبل لرج من الاعلى . الاوراق

مستطيلة رمحية حادة من الاعلى. الكاس مجذومة القاعدة اسطوانية وفي الإثمار بيضية متفتحة واسنانها رمحية نصفها طولا. الصفيحة كبيرة وردية قلبية مقلوبة. حامل المبيض قصير. الجيب يضي حاد اقصر من الكاس قليلاً - الربيع - عيتاب وشالبا - نوع ازهاره ظريفة


٥. *conoides*, L. السيلينة الشبيهة بمغروط ⑤ زغبى لزوج مستطيل. الاوراق مستطيلة رمحية حادة. الكاس سرية القاعدة مغروطة طويلة وفي الإثمار مستطيلة واسنانها ثلثها طولا. الصفيحة صغيرة وردية بيضية مقلوبة كاملة او مقصومة. الجيب جالس كروي متد بنفاز مثله طولا - الربيع - المزارع من حلب الى القدس. البلقاء. وادي طولمات في مصر

٦. *Lacrodonta*, Boiss. السيلينة الكبيرة السن ⑥ خلي مستشيب لزوج من الاعلى. الاوراق السفلى مستطيلة خطية والبقية خطية. الكاس مجذومة القاعدة اسطوانية وفي الإثمار مستطيلة مستدقة القمة واسنانها نصفها طولا. الصفيحة وردية قلبية مقلوبة. الجيب قصير السويقة مستطيل مغروطي اقصر من الكاس - الربيع - حلب. طرابلس. بيروت

٧. *compacta*, Horn. السيلينة المدجج ⑦ امس مستغبر. الساق ضخم بسيط او قليل الفرع. الاوراق السفلى ملوقة رمحية والبقية بقعة القاعدة مستطيلة او مستطيلة رمحية والعليا مجمعة على هيئة ظرف تحت الثنيات. الكاس سرية القاعدة دبوسية خضراء الاسنان كالتها. الصفيحة بيضية مقاربة كاملة. خرق الاكويل رمحية حادة. الجيب مستطيل نصف حامله طولا - الصيف - غابات في جبال مرعش وبلان

٨. *feuteriana*, Boiss. سيلينة رويتر ⑧ امس مستغبر متشعب من القاعدة. الاوراق السفلى مقاربة متفرعة قليلاً رمحية خطية حادة والبقية قصيرة خدية. الازهار جالسة تقريباً والسوى منها في نبط الشعب والعليا مجموعة روعوسا. اسنان الكاس بيضية كالة. الصفيحة وردية ذات فصين. الجيب مستطيل اقصر من حامله - الصيف - ومار لبنان بقرب بكنيا وصليا

٩. *muscipula*, L. السيلينة الصيادة الذباب ⑨ امس لزوج من الاعلى. الساق يابس متشعب. الاوراق السفلى مستطيلة ملوقة والساقية خطية رمحية والزهرية مخزفة معادلة الكاس طولا تقريباً. الازهار قصيرة الزناد. الكاس سرية القاعدة اسطوانية متضاخمة في الإثمار اسنانها مثلية بيضاء الحواشي. الصفيحة صغيرة ذات فصين. الجيب اهليلجي مستطيل ضعب حامله طولا تقريباً وطول قليلاً من الكاس - الربيع - ساحل سورية البحري ورفدان زهرين



كس السباينة اصباحه اسباب حال
الزهور. ترى تضيقاً موضع حامل
الجيب وقبة الجيب مستدقة من فوهة
الكاس. ب. ب. شعنين. ت. ت.

٨. *S. Behen*, L. السيلينة بيهن ○ أملس مستغبر. الساق متشعب. الزناد السفلي كالكاس طولاً أو أطول والعليا أقصر. الأوراق بيضية مقبوبة مستطيلة حادة والعليا مستطيلة رجمية. الكاس مستطيلة مفتحة في الإثمار وإوردها حمراء مشتبكة وأسنانها بيضية كالة. الصفيحة صغيرة متشعبة إلى قرب قاعدتها. الجيب يضي وسوقها قصيرة - الربيع - سواحل سورية وفلسطين

٩. *S. squamigera*, Boiss. السيلينة الحرشفية ○ زغي حرش. السوق متشعبة. الأوراق السفلى مستطيلة ملوقة والبقية خطية. الزناد قصيرة والراسيات العليا مائلة إلى جانب. الكاس دوسية بيضاء مجهزة على مسير الاضلاع بحراشف مستديرة قرطاسية ذات سن إلى أسنان. الصفيحة بيضاء قلبية مقبوبة. الجيب يضي أقصر قليلاً من حامله - أيار - المزارع بين عيتاب ومرعش

١٠. *S. vesiculifera*, J. Gay. السيلينة الفقاعية ○ زغي لرج. الساق متشعب من الفاعنة عقودي. الزناد قصيرة جداً. الكاس بيضية مقبوبة خضراء الخطوط مجهزة على مسير الاضلاع بحراشف فناعية سرجاء أو حموية. الصفيحة بيضاء خطية اسنينية ذات فصين. الجيب كروي ضعف حامله طولاً - الصيف - دوما

١١. *S. crassipes*, Fenzl. السيلينة الغضبية الساق ○ زغي حرش. الساق متشعب

شكل ٦١



يابس الفرع. الأوراق السفلى مستطيلة رجمية والساقية رجمية خطية والزهرية مثل الكاس طولاً أو أطول. الزناد قصيرة جداً غضبية. الكاس دوسية في الإثمار وهي مجهزة بمجليات قصيرة مخروطية. الصفيحة صغيرة خطية مخرومة. الجيب يضي ثلثة أضعاف حامله طولاً تقريباً - الربيع - من حلب إلى صيدا وزحلة

١٢. *S. gonocalyx*, Boiss. السيلينة الزاوية الكاس ○

حش متشعب من الفاعنة. الأوراق السفلى مستطيلة ملوقة والعليا مستطيلة رجمية حادة. الأزهار جالسة تقريباً وفي أعلى الفروع مجمعة ٢-٥. الكاس خضراء قصيرة الغطاء مضلعة. الصفيحة بيضية مقبوبة مستطيلة كاملة. الجيب يضي ضعفاً حامله الضخم طولاً - الربيع - سورية وفلسطين الألبال العالية

١٣. *S. racemosa*, Oth. السيلينة الراسجية ○ مسنن بغير متوج. الساق متصاعد كثير التشعب. الأوراق السفلى ملوقة والساقية رجمية مستطيلة والزهرية غشائية. الراسيات طويلة مسترسلة. الزناد قصيرة جداً. الكاس هلبية ولا سيما عند الأعصاب اسطوانية وفي الإثمار بيضية مستطيلة. الصفيحة بيضاء متشعبة إلى الفاعدة تقريباً. الجيب يضي قصير السوفية - الربيع -

Sibthorpiana, Boiss. ب. السبثوربية. الأكليل صغير - من حلب إلى فلسطين

glabrescens, Post. ت. المستحلبة. قصير الزغب أو مستطلس - حصص

١٤. *S. Gallien*, J. م. السيلينة الفرنسية © منفرج الغشاء ومن الأعلى لزوج. الساق بسوط أو متشعب. ازهار الراسيم السفلى طويلة الزناد والعليا جالسة تقريباً. الأوراق السفلى بيضيه مقلوبة ملوقيه والعليا مستطليه رحيمة. اللولس خطية كاللكاس طولاً. الكاس منفرجة الحية مستديرة القاعدة اسطوانية وفي الإثمار بيضيه. الصفيحة يضاء او وردية بيضيه مقلوبة مخروطة او مسننة. الجيب جالس تقريباً - الربيع - سورية وشمال فلسطين

١٥. *S. villosa*, For k. م. السيلينة الوبرية (الذنابة) © متفرق الغشاء لزوج. السوق كثيرة الأوراق راحفة. الأوراق لحمية مستطليه رحيمة كثة. الزناد اقصر من اللولس والكاس. الكاس اسطوانية وفي الإثمار دبوسية مبسة حراشف محبرة. الخلب طويل منبثق. الصفيحة يضاء متشعبة شعباً بيضيه مقلوبة. الجيب مستطلي أطول قليلاً من حامله - الربيع - باء. بادية سينا

١٦. *S. Arabien*, Bois. م. السيلينة العربية (إعطائي) © متفرق الغشاء لزوج. السوق مخفضة منتصبه بسيطة تقريباً. الأوراق خطية رحيمة. ازهار مسترسنة. الزناد مثل الكاس طولاً او أطول منفرجة في الإثمار. اللولس خطية غير متساوية. الكاس يضاء مخفضة خطوطها خضراء باهتة وفي الإثمار دبوسية واسنانها هدية. الصفيحة متشعبة. الجيب يضي مثل حامله طولاً - الربيع - اودية سينا

١٧. *S. obtusifolia*, Willd. م. السيلينة الكالة الورق © متفرق الوبر. الساق يابس متشعب. الأوراق بيضيه مقلوبة ملوقيه كالة. الزناد السفلى أطول من الكاس والبقية متقاصرة. اللولس خطية اقصر من الزناد. الكاس باهتة مخروطية متوثة اعصابها خضراء. الصفيحة يضاء متشعبة. الجيب مستطلي - الربيع - ذالية مصر

١٨. *S. ceterae*, Viv. م. السيلينة الهلبيه © ملازم الزغب قصير. السوق مخفضة منتصبه بسوط او متشعبة عدد الناعة. الزناد قصيرة. الأوراق مخروزة. اللولس مستطليه خطية متساوية تقريباً. الكاس ملازمة الزغب خضراء الاعصاب اسطوانية وفي الإثمار دبوسية. الصفيحة يضاء متشعبة الى قاعدتها. الجيب يضي - الربيع - رمال بادية النيه وشمر لوط. الاسكندرية

١٩. *S. heterophylla*, Boiss et Grail. م. السيلينة العجة الصدا © متفرق الزغب قصير ومن الأعلى لزوج. الساق منتصب مثل التشعب. الأوراق مستطليه خطية والعليا رحيمة. الزناد اقصر من الكاس. احد الفلسين مخروزي أطول من الزناد والاخر متلاش تقريباً. الكاس عماتية اسطوانية اعصابها خضراء. الصفيحة يضاء متشعبة الى منتصفها. الجيب مستطلي - اربيع - رمال حمر تحت جرود لبنان. مرج عيون

S. Damascena, Boiss. et Grail. ٢٠. السيلينة الدمشقية ⊙ منفرج العناء . الساق

متشعب عالٍ . الاوراق مستطيلة خطية . الزناد السفلى طويلة والعليا قصيرة . احد الفلوس خطي رمحي والآخر صغير سفلي . الكاس قليلة الغديذات اسطوانية مستندقة القاعدة واعصابها حمراء . الجيب مستطيلي مثل حامله طولاً - الربيع - لبنان والجبل الشرقي ويمرود الى القدس

S. Palestina, Boiss. ٢١. السيلينة الفلسطينية ⊙ منفرج الخبة لزجها . الساق متعصب

بسيط او متشعب من الاسفل . الاوراق مستطيلة خطية حادة . الراسيات طويلة . احد الفلوسين مستطيلي خطي اطول من الزند والآخر خطي مخزري صغير . الكاس خشائية غدديبة مستطيلة اسطوانية ذات اعصاب حمراء . الصفيحة متسعة ارجوانية متشعبة الى القاعدة الى شعب قليلة مقلوبة . الجيب يضي . البزور لماعة - الربيع - فلسطين من صردة الى غزة وشمال النيه

شكل ٦٣



راسم مشر من السيلينة
الليلية . (الرمو)

S. nocturna, L. ٢٢. السيلينة الليلية ⊙ قصير الرغبة .

الساق متعصب بسيط او متشعب . الاوراق السفلى ملوقية والبقية خطية . الزناد قصيرة جدًا . الفلوس غير متساوية قليلاً . الكاس ملازمة العناء اسطوانية وفي الإنثاء مستطيلة . الصفيحة صغيرة بيضاء مكعدة من الاسفل متشعبة . الجيب مستطيلي عادم السويقة تقريباً - الربيع - سورية وفلسطين . وادي طوملات

pedunculata, Post. ب . الزندية . ضخ الساق واغروع .

الزناد السفلى كالكاس طولاً - النهر الحاصباني . سور القدس
prostrata, Post. ت . الملقاة . مستلق منتشر . الراسيات قليلة
الازهار والازهار انتهازية - يبرود

S. Canopica, Del. ٢٣. السيلينة الكانوبية ⊙ منفرد الرغبة .

السوق متعددة زاححة بسيطة او متشعبة . الاوراق مستطيلة او مستطيلة رمحية مثل الزناد المنتصب ونصف الكاس او ثلثها طولاً . الكاس مستشبية خضراء الاعصاب مستندقة القاعدة هدية الاسنان . الصفيحة بيضاء متشعبة الى اكثر من منتصفها . الجيب يضي مثل حامله طولاً - الربيع - الرمل بقرب الاسكندرية

S. bipartita, Desf. ٢٤. السيلينة المتشعبة ⊙ ملازم العناء . السوق متصاعدة او زاححة

القاعدة ونادراً متعصب . الاوراق السفلى مقلوبة كالة والعليا مستطيلة رمحية . الفلوس صغيرة غير متساوية . الكاس غالباً اطول من الزند واعصابها حمراء . الصفيحة وردية متشعبة شعبتين يضيبتين مقلوبتين . الجيب يضي ضعف حامله طولاً - الربيع - سورية وفلسطين

eriocaulon, Boiss. ب. الصوفية الساق. خبي مستشيب - شاطئ سورية

٨. *Oliveriana*, (Othl. ٢٥) السيلينة الاولشيرية Ⓞ ملازم الزغب قصير. السوق منتصبه او منصاعة متشعبة من القاعدة. الاوراق خطية او رحيمة درنية او مستبسة. الفلوس غير متساوية. الكاس اطول من الزندوا عصابها خضراء. الصفحة خضراء من الاسفل متشعبة الى قاعدة تقريباً شعبتين خطيتين ملوطينين. الجيب يضي اطول من حامله - الربيع - رمال دمشق وصيدا الى بادية سينا وإلى الشرق

spatulata, Post. ب. الملوقة. الاوراق السفلى ملوقة - بيروت

٩. *rubella*, L. ٢٦ السيلينة الحمرة Ⓞ زغبى مستغبر. الاوراق السفلى بيضية مستطيلة

شكل ٣٨



تزهـر السيلينة الحمرة

والعليا خطية. السوق غير متساوية الشعب. زناد الازهار الشعبية طويلة والبقية قصيرة. الكاس غشائية زغبية وفي الإثمار متفتحة بداية. الصفحة صغيرة وردية مخرومة. الجيب يضي ضعف حامله او أكثر طولاً - الربيع - من دمشق الى الحولة. ذالية مصر وارض الصعيد

١٠. *sedoides*, Jacq. ٢٧ السيلينة الشبيهة بالسيدم Ⓞ متفرق

العفان لرج كثير النفرع. السوق مخفضة متشعبة. الاوراق صغيرة لحمية كثة والجذرية منها ملوقة والبقية مستطيلة. الازهار السفلى في نقط التنبع والانتهاية راسمية. الزيتيدات مثل الكاس طولاً او اطول. الكاس مستطيلة

لرجة ٢٠٧٥ متر طولاً. الصفحة صغيرة بيضة مقلوبة مخرومة. الجيب غشائي مستطالي مثل الكاس واربعه اضعاف حامله طولاً - الربيع - رمل شاطئ صيدا وبيروت وإلى الشمال

١١. *finckiana*, Link. ٢٨ السيلينة الشقراء Ⓞ زغبى لرج. السوق منتصبه متشعبة. الزناد

الابطية طويلة والانتهاية قصيرة متراكبة. الكاس غشائية مستطيلة اسطوانية وفي الإثمار دبوسية. الصفحة وردية اسفينية بيضية مقلوبة كاملة. الجيب يضي مثل حامله طولاً - الربيع - مزارع سهل سورية البحري. ساحل البقعة

١٢. *Atoton*, Murr. ٢٩ السيلينة التوسيون Ⓞ قصير الزغب، السوق منتصبه متشعبة ومتدافنة.

الاوراق السفلى بيضية ملوقة ذات رجالات والمتوسطة جالسة حادة. الزناد الابطية قصيرة والانتهاية قصيرة متراكبة. الكاس وردية غامقة مضحكة الاعصاب خلية وفي الإثمار دبوسية. الصفحة نصف ستمتر طولاً متشعبة. الجيب مستطالي اقصر قليلاً من حامله - الشتاء والربيع - وع حريف أنثر وجوداً في سورية وفلسطين من سائر انواع الجنس

١٣. *Kotschyi*, Boiss. ٣٠ سيلينة كوتشي Ⓞ قصير الزغب نخالية ون الاعلى لرج اخضر.

الساق تحيل متشعب من الأعلى . الفروع والزنادات خيطية طويلة . الأوراق خيطية مخززية حوية .
الكاس حلبيية عفاية وفي الإنماد دبوسية وأعصابها حمراء . الصفيحة وردية اسفينة متشعبة الى المنتصف .
الجيب يضي أطول قليلاً من الكاس ومن حامله - من الربيع الى حزيران - في الرمل من عينتاب الى
دمشق والنفاع ولبنان

maritima, Boiss. ب . البحرية . تخفض ٢٠٤ متر الى ٢٠٨ علواً قصير النفاصل - يقرب

السويدية

٢١. *S. linearis*, Decaisn. السيلينة الخطية ○ مستغبر زغبى او مستلس ومن الأعلى ارج .
الساق عال متشعب . الأوراق السفلى رحيمة والبقية خيطية مطوية . الكاس اقصر من الزناد او أطول
منها عفاية او مستتلة وأعصابها خضراء . الصفيحة يضاء متشعبة الى أكثر طولها . الجيب يضي اقصر من
حامله - الربيع - بادية التيه وسينا ومصر

٢٢. *S. Cassia*, Boiss. السيلينة الاقرعية ○ قصير الحلقات من الأسفل املس لرج من
الأعلى . الساق ٢٦٠ متر علواً متشعب عنقودي الفروع . الأوراق الجذرية خيطية رحيمة مستندقة القواعد
والساقية خيطية مطوية . الكاس اقصر من الزناد ملازمة الحلقات مخططة خطوطاً خضراء . الصفيحة يضاء
مخضرة متشعبة الى منتصفها . الجيب مستطيل أطول من حامله - حزيران - غابات قرب سفح الجبل
الأقرع

٢٣. *S. Hussoni*, Boiss. سيلينة هُسن ○ قصير الغطاء لرج . السوق قزمية متشعبة من
القاعدة . الأوراق السفلى مستطيلة رحيمة والزهرية خيطية . الزناد متتعبة أطول من الكاس . الكاس
عفاية خضراء بلبلية طويلة الاسنان . الصفيحة خيطية يضاء متشعبة الى منتصفها . الجيب يضي ضعف
حامله طولاً - الربيع - الرمل في وادي السنور في مصر

٢٤. *S. Juncea*, Sibth. السيلينة الاسلية ○ درني زغبى من الأسفل املس لرج اخضر
من الأعلى . الساق متر علواً . الفروع طويلة عنقودية كورنية . الأوراق السفلى كبيرة بيضية طويلة
الرجلات والمتوسطة خيطية عريضة والزهرية خيطية هلبية . الزناد اقصر كثيراً من الكاس . الكاس
ملساء حمراء الاعصاب مشتبكة التهمة مخروطية مقلوبة . الصفيحة عريضة ظريفة يضاء او وردية باهنة
ذات خطوط ارجوانية مشتبكة من الأسفل وخرق بيضية مقلوبة . الجيب يضي مثل حامله طولاً -
الربيع والصيف - اماكن رملية في سورية

pallida, Boiss. ب . الباهة . اعصاب الكاس باهنة . خرق الصفيحة ضيقة وأعصابها غير

متنفذة - الصخر يقرب بعلبك

٢٥. *S. chretodonta*, Boiss. السيلينة المخززية السن ○ ١٥ متر الى ٢٠ علواً زغبى من

الاسفل وزغبوي لرج من الاعلى . الساق تحمل يابس متشعب كورني من الاعلى . الاوراق مزينة خطية . الزناد اطول من الكاس . الكاس لمساء او عفائية بارزة الاعصاب خضراؤها اسطوانية ذات اسنان طويلة محززة . الصفحة وردية متشعبة الى المنتصف . الجيب يضي ضعف حاملو طولاً واقصر من الكاس

modesta, Boiss. م.ب. المحششة . اسنان الكاس اطول قليلاً من الجيب — بيروت — سور

القدس

٣٦ *pharnaceifolia, Fenzl.* م.ب. السيلينة الفرناسية الورق 2٤ م الجذور ضخمة والجذوع متفرعة حرمية . السوق نحيلة ٤ م متر الى ١٠ م علواً ذات زهرة الى ٥ . الاوراق وهرية محززة والجذرية منها باقية . الفلوس رمية غشائية الناعنة . الكاس معمرة مخروطية مقلوبة جرسية زغبية . الصفحة قلبية مقلوبة . الجيب يضي قصير السويقة — الصيف — قرب ارز حدث

٣٧ *stenobotrya, Boiss. et Haussk.* م.ب. السيلينة الضيقة العنقود 7٢ م غالي زغبوي . السوق كثيرة متضبة ٣٠ م متر الى ٥٠ م طولاً . الاوراق محززة هلبية هدية الناعنة . الفيات ذات زهرة الى ٣ قصيرة الزناد تكون راسياً طولاً مسترسلاً لرجاً . الكاس غديدة عفائية اسطوانية مخروطية مقلوبة . الصفحة بيضاء متشعبة الى قاعدتها تقريباً . الخويطات عفائية . الجيب صغير يضي عفائي ضعف حاملو طولاً واكثر

٣٨ *brevipena, Paine.* م.ب. السيلينة القصيرة السويقة 2٤ م زغبوي ٣٠ م متر علواً . السوق متعددة منشرة . الاوراق صغيرة رمية . الفيات سنبلية . الازهار قليلة صغيرة منفردة او قوامية . الكاس زغبية اسطوانية . الصفحة مستديرة كاملة تقريباً بيضاء مركزها قائم . الجيب مثل الكاس طولاً بالاسويقة تقريباً — الريع — جبل صياغة الى جهة وادي الجدد

٣٩ *perguliifolia, Desf.* م.ب. السيلينة السبركمولية الورق 2٤ م حرش زغبوي حرمي . السوق متصاعدة منخفضة على الغالب . الاوراق خطية محززة عفائية هدية الناعنة . الفيات قصيرة الزناد تكون راسيات انتهائية قصيرة متقطعة واحياناً رثوسا . الكاس غديدة عفائية مخروطية مقلوبة سيف الاثمار دبوسية بارزة الزوايا . الصفحة بيضاء خطية الخرق . الخويطات لمساء . الجيب معتدل انماعة مخروطي ضعف حاملو طولاً واكثر — ايار وحزيران — جبال شمالي سورية

elongata, Boiss. م.ب. المطولة . السوق ٣٠ م متر علواً . الراسيات مسترسلة — عينتاب

والجبال شماليها

٤٠ *pruinosa, Boiss.* م.ب. السيلينة النخالية 2٤ م رادي معتدل الصوف . السوق كثيرة متصاعدة عشوية وفروع العناقيد مترادفة على الغالب . الاوراق قصيرة خطية ملوقة . الكاس غديدة

اسطوانية مخروطية. الصفيحة بيضاء خضلة الخرق. الجيب منقط مستطيل مخروطي مثل حامله الى ضعفه طولاً - حريان - من عيتاب الى الجبل الاقرق والى الشمال

S. Montbretiana, Boiss. ٤١. السيلينة المونتريريانية 2٤ قصير الخجل سنيانية.

السوق منتصبة بسيطة او متفرعة (٢١٥ متر الى ٢٣٠). الاوراق احادية الاعصاب مستطيلة رجمية او خضلة رجمية والزهرية مستطيلة مثلية. القمية انتهائية ذات ٣ ازهار او اقل قصيرة الزناد. الكاس غددي عناقية جرسية. الخلب ذوسن على كل من جانبيه. الصفيحة صفراء بيضبة المخرق. الجيب مستطيل مثل حامله طولاً - ايار - جبال شمالي سورية وقرب عيتاب

S. subulata, Boiss. ٤٢. السيلينة الغمرزية 2٤ زغبية غددي حزمي القاعة. السوق

متعددة قزمة ذات زهرة واحدة. الاوراق يابسة مطوية غمرزية. الكاس مشتبكة الورد اسطوانية مستدقة القاعدة ٢.٢ متر طولاً او اكثر. الصفيحة بيضاء مصفرة صغيرة قلبية مقلوبة. الجيب مستطيل مثل حامله طولاً تقريباً - الصيف - قمة لبنان بين ديمان وبعونة

S. Tefedensis, Boiss. ٤٣. السيلينة التيجدية 2٤ كثيف الغناء غددي قزم. الجذوع

نخلة مستقيمة عارية. الاوراق السفلى وردية النظام. السوق ذات زهرة او زهرتين عند قممها. الاوراق مستطيلة رجمية حادة او كالة. الزناد قصيرة. الكاس غددي دبوسية اسطوانية واضلاعها خضراء. الصفيحة وردية باهتة متشعبة الى منتصفها. الجيب مستطيل اقصر من حامله

S. odontopetala, Fenzl. ٤٤. السيلينة السنية اليجل 2٤ كثيف الزغب. السوق

بسيطة تقريباً وبرية غددي من الاعلى ذات اوراق. القميات ذات زهرة الى ٧. الاوراق السفلى ملوقة حادة والساقية رجمية ذات عصب ١. الكاس لزجة بيضاء جرسية منتخفة. الصفيحة بيضاء. الجيب يضي اقصر قليلاً من الكاس مثل حامله طولاً او اطول منه - الصيف - شقوق الصخور. قمة لبنان وجبل الشيخ

rubrocalyx, Post. ب. الحمراء الكاس. الكاس عمهرة - قمة جبل صنين

S. inkata, Sm. ٤٥. السيلينة المنطفخة 2٤ مستغير مستطيل من الاعلى. السوق متصاعدة.

القميات كورنية. الاوراق اهليجية او رجمية مدببة. الكاس منتخفة يضية سرية القاعة. الصفيحة بيضاء متشعبة الى قاعدتها. الجيب يضي كروي اقصر من الكاس واضيق منها وخمسة اضعااف حامله طولاً - الربيع والصيف - كثير الوجود في مزارع سورية وفلسطين

rubriflora, Boiss. ب. الحمراء الزهر. الينلات حمراء - قرب دمشق والقدس وغيرها

S. Italica, L. ٤٦. السيلينة الايطالية 2٤ صوفي من الاسفل مستشيب لزج من الاعلى.

العنق متفرع الى فروع عاقرة وسوق منتصبه مسنسله العناقيد . الاوراق السفلى ملوثة رحيمة
والزهرة خطية . الكاس زغبية غديدية اسطوانية مخروطية ملوثة . الصفيحة بيضاء متشعبة الى اكثر من
متصفها . الجيب يضي مثل حامله طولاً او اطول منه . - اياروحى بران - تحت جرد لبنان

٤٧. *Amara, Boiss.* ٤٧. السيلينة اللكامية 2. اخضر زغبى غديدي لرج من الاعلى . الساق
بسيط ذو اوراق . الاوراق ذات رجيلات ويضية مستطيلة حادة . المنفرد مسترسل وازهاره قليلة منفعة .
الكاس غديدية اسطوانية غير متساوية الاسنان . اعناباً متفرعة خضراء . الصفيحة بيضاء مخدرة متشعبة
شعباً خطية . الجيب يضي اقصر من حامله اسلول من الكاس . الصيف - بنرب وازن

٤٨. *Leucophylla, Boiss.* ٤٨. السيلينة البيضاء الورق 2. صوفى مستشيب حرمي .
السوق لرجة . الاوراق الجذرية متراكمة يتشعب مستطالية . اوقية والساقية خطية . ماوقية وخطية . الازهار
٣ - ٥ انتهائية طويلة الزناد منفعة ثل الانساق . اناس تبصرة الخدود اسطوانية مسندنة من
الاسفل . الصفيحة خضراء اسنوية متشعبة شعباً خضراء . اسنوب مستطال مسنق من الكاس مثل حامله
طولاً - اول الصيف - جل كنزنا في طور سبنا

٤٩. *Leucophylla, Boiss.* ٤٩. السيلينة الطويلة البتلة 2. مرن رطب من الكاس
واملس لرج من الاعلى . السوق خضراء . الزرور السند مستطالية رحيمة . مسندنة الى رحيمة والساقية
خطية رحيمة جالسة والزهرة صغير . الازهار مسنقة . مرن ذات رز الى ٧ . الكاس مسنقة
بليلة قصيرة مخططة . الصفيحة بيضاء . مسنقة شعبيين حرميين وابت . سب . كروي رحيمة
اضعاف حامله طولاً - الربيع - ارض برز كنبر الوجود في سورية ولسانين اى عار ١٣٠ م
purpurascens, Boiss. ٥٠. الارجوانية . اثلاث ارجوانية . حسب سوسن . سب

القدس واربنا

٥٠. *serotinaefolia, Boiss.* ٥٠. السيلينة السورتية الورق 2. مسنق رازج من الاعلى .
السوق متشعبة . الاوراق السفلى مسنقة ملوثة ولبوسفة خضراء . رازج رحيمة و
بلا اعصاب وهي مستطيلة واسنابها مستطالية مسنقة كاتواحدة على اربعة . اثلاثية متشعبة شعباً بيضوية
ملوثة عريضة . الجيب مستطال مالى الكاس اطول من حامله - الصيف - حسب سوسن
stenophylla, Boiss. ٥١. الصيقة الورق . الاوراق السفلى مسنقة مسنقة . الكاس ٢٠١٥ م
مترالى ٢٠٢ طولاً . الحالب منبقة - قرب عيناب

٥١. *zakianiana, Boiss.* ٥١. السيانية المكملية 2. مسنق . سوق مسنقة متشعبة .
الاوراق السفلى واوراق الدروع عاقرة قصيرة مستطالية رحيمة مسندنة البتلة واثلاثية . الازهار

طويلة الزناد، الكاس ستميمتران طولاً أسطوانية دبوسية وبعض اسنانها مثثة حادة والبقية المترادفة بها مستطيلة كالة. الصفيحة قلبية مقلوبة منقصة فصين. الجيب مستطيلي مثل حاملو طولاً - الصيف - تحت جرد لبنان والجبل الشرقي

S. Schimperiana, Boiss. ٥٢. السيلينة الشهبورية 24 مستغبر لرج من الأعلى. السوق عالية (متر) بأسة معقدة متشعبة طويلة الفروع. الأوراق السفلى خطية ملوقة حادة والعليا خطية. الأزهار منفردة قصيرة الزناد. الكاس أسطوانية بلا اعصاب. الصفيحة خطية اسطوانية متشعبة. الجيب مستطيلي مثل حاملو طولاً - الصيف - البستان في طورسينا

S. Libanotica, Boiss. ٥٣. السيلينة اللبنانية 24 مستغبر ومن الأعلى لرج. الجذوع قصيرة عارية. السوق نخيلة متفرعة من الأعلى فروعاً مترادفة احادية الأزهار. الأوراق السفلى مستطيلة ملوقة كالة والبقية ريمية وخطية حادة. الزناد مثل الكاس طولاً. الكاس ستميمتر طولاً بلا اعصاب مخروطية مقلوبة. الصفيحة خطية اسطوانية متشعبة. الجيب مستطيلي ضعف حاملو طولاً - الصيف - تحت جرد لبنان وجردود. الصخور بقرب الخليل

S. gigantea, L. ٥٤. السيلينة الجبارية 24 الساق عال (متر إلى مترين) ضخيم رباعي الزوايا من الأسفل. الأوراق صوفية والجذرية منها وردية النظام بيضيه مقلوبة حوية والساقية اهللمجية مستطيلة والزهرية صغيرة خطية ريمية. العنقود طويل راسبي مolf من قمبات دوائية متباعدة. الكاس متفرقة الغناء مخروطية مقلوبة. الصفيحة بيضاء متشعبة. الجيب كبير يضي ممزق الكاس اخيراً ٢ اضعاف حاملو طولاً - الصيف

viridescens, Boiss. ب. المخضرة. اللبس قليل. الأوراق مخضرة. العنقود شديد اللزوجة. الفصيات مسترسلة أكثر مما في الرمز. حامل المبيض قصير جداً - تياس. لبنان بقرب بروانا

S. grisea, Boiss. ٥٥. السيلينة السجائية 24 ٢٣٠ متر علواً. خليي سنجابي حرمي الناعدة. السوق نخيلة ذات زوايا وركب ولزجة من الأعلى. الراسم قصير. الأوراق الجذرية متراكبة وهي والساقية السفلى مستطيلة ملوقة والعليا خطية. فروع الراسم ذات زهرة إلى ٣. الكاس عديدة أسطوانية دبوسية منغضة في الإثمار. الصفيحة صفراء مخضرة متشعبة. الجيب مستطيلي أطول من الكاس و٢ اضعاف حاملو إلى ٤ طولاً - الصيف - جرد لبنان وتحت جردود

S. succulenta, Forsk. ٥٦. السيلينة العصارية 24 حليبي خليي لرج. الجذر ضخيم. السوق كثيرة متشرة كثيفة الأوراق. الأوراق لحمية بيضيه او مستطيلة ملوقة والزهرية خطية ريمية مثل الزناد طولاً. الأزهار غير متساوية الفصيات اوراسيمية. الزناد اقصر من الكاس والكاس انبوبة مخروطية

الاسنان. الصفحية منشعبة شعباً مالوقية. الحبيب مستطيلي اطول من حامله - الربيع - ومل شاطئ. سورية ومصر.

٨ المالندريوم MELANDRIUM, Rohl.

الكاس غشائية ملتصقة اخيراً ذات ٥ اسنان و ١٠ اعصاب. البتلات ٥ ذات أكليل. الاسدية ١٠ ومنها ٥ ملتصقة بالبتلات. المبيض ذو غرقة واحدة وبويضات كثيرة. الاقلام ٥ مقابلة اسنان الكاس - اعشاب معبرة ذات مسكنين تشبه السيلينة

١. *M. pratense*, Rohl. المالندريوم المرجي 24 الساق عال وبري من الاسفل. الاوراق بيضية او مستطيلة رمحية مدببة. الزهر غديدي عفائي. الكاس السدوية مستطيلة والمدقية بيضية. الصفحية بيضاء مخروقة خرقتين كالتين. الحبيب يضي او مستطيلي مخروطي متصمب الاسنان - الصيف - حول اهدن

٢. *M. erioalycinum*, Boiss. المالندريوم الصوفي الكاس 24 الساق عال خلب. الاوراق مستطيلة كالة. الكاس عنكبونية والسدوية مستطيلة والمدقية بيضية، الصفحية مخروقة خرقتين قصيرتين. الحبيب يضي اطول من الكاس مستدق فجأة الى عنق واسنانه منتعجة - الصيف - بقرب قم لبنان

٩ الكِثَاكُو GITHAGO, Desf.

الكاس سخنيانية ذات ٥ اسنان طويلة ساقطة اخيراً. الاضلاع ١٠. البتلات ٥ بلا أكليل. الاسدية ١٠ ومنها ٥ ملتصقة بالبتلات. المبيض ذو غرقة واحدة وبويضات كثيرة. الاقلام ٥ مرادفة اسنان الكاس - اعشاب سنوية منشعبة متصبة ازهارها ذات زناد طويلة

G. segetum, Desf. كَثَاكُو المزارع ① ملازم الشعراشبية. الساق ضخيم. الاوراق خطية رمحية حادة. الكاس بيضية ضيقة القمة وخرقها خطية رمحية اطول كثيراً من الانبوبة وضعف البتل طولاً تقريباً. الصفحية ارجوانية بيضية متناوبة مخرومة قليلاً - اول الصيف - كثير الوجود في مزارع سورية وفلسطين

الرتبة الرابعة عشرة الاسينية ALSINEÆ.



الازهار قياسية. السيلات ٤-٥ مستقلة. الهلات كالسيلات
عدداً ترادفها او منفردة. الاسدية مختلفة العدد مندغمة في
قرص تحت المبيض او حولة قليلاً وتكون هذا القرص غديداً.
المبيض جالس مستقل احادي الغرنية ذو بويضات كثيرة او
قليلة على مشية مركبة. الاقلام مستقلة مختلفة العدد. الحبيب
منشق الى اسنان او مصاريع مثل الاقلام
او ضعفها عدداً. البزور ذات البيومن.
الحجين محيط - اعشاب او نجمات اوراقها
ذات ذنبيات او عادمها

شكل ٦٤. ث. قطعة نوع من الرملية.

ت. زهرتها. ج. ثمرها. ح. الزهرة مكبرة

تري فيها ٥ بتلات و ١٠ اسدية و ٢ اقلام. خ. البزرة يرى فيها الحجين ملتفاً حول البيومن ت

السبط الاول. الرمليات. SABULINEÆ. الاوراق بلا ذنبيات. المصاريع مثل الاقلام

عدداً اواقل منها

١. *Sagina*. البتلات ٤ او منفردة. الاقلام ٤. المبيض كثير البويضات

٢. *Buffonia*. البتلات ٤. الاقلام ٢. المبيض ذو بويضتين الى ١٠

٣. *Alsine*. البتلات ٥. الاقلام ٣. المبيض كثير البويضات

٤. *Queria*. البتلات منفردة. الاقلام ٣. المبيض ذو بويضة واحدة

السبط الثاني. الكوكبيات. STELLARINEÆ. الاوراق بلا ذنبيات. المصاريع او

اسنان الحبيب ضعف الاقلام عدداً

٥. *Arenaria*. البتلات ٥ كاملة. الاسدية ١٠ مندغمة تحت المبيض

٦. *Stellaria*. البتلات ٤-٥ متشعبة. الاسدية ١٠ مندغمة تحت المبيض او حولة

٧. *Holosteum*. البتلات ٥ ذات سنينات. الاسدية ٣-٤

٨. *Cerastium*. البتلات ٤-٥ ذات سنين او خرفتين. الاسدية ٤-١٠

السبط الثالث. السبركوليات. *SPERGULEÆ*. الاوراق ذات ذنبات. المصارع
مثل الاقلام عدداً

١. *Spergula*. ٥. الاقلام ٥. الاوراق دولانية

١٠. *Spergularia*. ٢. الاقلام ٢. الاوراق متغلبة

١. السأكنيا *SAGINA, L.*

السبلات ٤. البتلات ٤ او مفقودة. الاسدية ٤ مندغمة تحت المبيض. الاقلام ٣. المبيض كثير
البويضات. الحبيب ذو ٤ مصارع الى ٥ ممتدة الى قاعدتي. البزور كوكبة - اعشاب حزامية سنوية ذات
ازهار بيضاء واوراق مخزنية متحدة القاعدة

S. apetala, L. السأكنيا العادمة البتلات ٥ السوق متضبة. الاوراق مخزنية سلبية
هدية القاعدة ولساء. الزناد متضبة بعد الابتسام. السبلات بيضبة كالة اقصر من الحبيب فالاشقان
المخارجتان قصيرتا الحبة. البتلات صغيرة او مفقودة - الربيع - رمل شواطئ - سورية وفلسطين. سور
القدس

٢. البوفونيا *BUFFONIA, Sauv.*

السبلات ٤ غشائية المحواقي. البتلات ٤ كاملة او ذات سنين. الاسدية ٤ او ٨ مندغمة في قرص
حول المبيض. الاقلام ٣. المبيض ذو بويضتين الى ١٠. الحبيب عدسي منضغط ذو مصراعين. البزور
غالباً ٢ هلالية - اعشاب سنوية او معمرة تشبه الاسل البوفوني

B. macrosperma, J. Gay. ١. البوفونيا الكبيرة البزور ٥ السوق متضبة. التزه
قمي راسمي. الزنيدات خشنة. السبلات رحيمة مديبة ذات ٥ اعصاب. البتلات ٤/٢ الكاس
طولاً. الاسدية ٤ ربع الكاس طولاً. الاقلام اقصر من المبيض - اول الضيف - لبنان. بعلبك
B. virgata, Boiss. ٢. البوفونيا العسوية ٥ السوق عالية قليلة التفرع. التزه سندي.
الزنيدات قصيرة غشائية. السبلات مستطيلة ذات ٢ اعصاب. البتلات ٤/٢ الكاس طولاً. الاسدية ٤
ثلث الكاس طولاً. الاقلام قصيرة جداً - الصيف - عيتاب. جبل الشيخ

B. multiceps, Decaisne. ٣. البوفونيا الكثيرة الرووس ٥ الفروع كثيرة متضبة
خلفية. التزه راسمي كورني. الاوراق قصيرة. الزنيدات قصيرة خلية. السبلات ملساء رحيمة ذات ٢
اعصاب. البتلات كاملة رحيمة اقصر من الكاس. المخويطات نصف الكاس طولاً. الاقلام اطول

قليلًا من المبيض - صخور سينا

٢ الأسينة ALSINE, Wahl.

السيلات ٥. البتلات ٥ كاملة او مخرومة واوقانًا مفقودة. الاسدية ١٠ اوراق مندغبة في غديدات قرص تحت المبيض. الاقلام ٢. المبيض كثير البويضات. الجيب ذو ٢. صارع. البزور كلوية بلا بسباسة - اعشاب معبرة او سنوية ازهارها غالبًا بيضاء

* معبرة

A. procumbens ١ rupestris ٢ juniperina ٣ Libanotica ٤

** سنوية

A. Meyeri ٥ brevis ٦ Smithii ٧ decipiens ٨ tenuifolia ٩ thymifolia ١٠

picta ١١ formosa ١٢

A. procumbens Vahl. ١ الأسينة المتكئة 24 غديدي عفائي. ام الجذور صلبة. الفروع

مستطيلة. القبيات غير منتظمة الشعب. الزنيدات اطول من الكاس. الاوراق لحية كالة مستطيلة. السيلات عفائية مستطيلة بيضية. البتلات وردية بيضية مثل الكاس طولاً. الجيب يضي مثل الكاس طولاً - الربيع - قرب الاسكندرية

A. rupestris, Labill. ٢ الأسينة الصخرية 24 حزمي قزم. الجذوع صلبة عريانة. اوراق

الفروع العاقرة قصيرة حزمة يابسة مخززية هدية القاعدة. اوراق الفروع الزهرية قليلة قصيرة مخززية. القبيات ذات ٢ ازهار الى ٥. الزنيدات غديدية ضعفا الكاس طولاً او أكثر. السيلات غديدية مستطيلة ذات ٢ اعصاب مضحلة. البتلات وردية ظريفة اطول من الكاس. الجيب مثل الكاس طولاً ذو بزة او ٢ - الصيف - قم لبنان وجبل الشيخ

A. juniperina, Fenzl. ٣ الأسينة العرعرية 24 حزمي. الجذوع مستطيلة صلبة العند.

الفروع يابسة بسيطة. التهر قمى صبوراني. الاوراق مخززية يابسة او هدية ضخمة مخنجة والمينة منها خالدة. الزنيدات اطول من الكاس. السيلات رحيمة واعصابها ٢ بارزة. البتلات خطية اسنينة اطول من الكاس. الجيب اسطواني مخروطي اطول من الكاس - الصيف - جرود لبنان والجبل الشرقي. المجال حول الناصرة

١. legitima, Boiss. الشرعية. املس او زغي. الاوراق يابسة مسنكية

٢. tenuifolia, Boiss. ب. النخيلة الورق. الاوراق اقل بيوسة من السابق ذكره

٤. *A. Libanotica*, Boiss. الاسينة اللبنانية 2٤ ملمس حزمي قزم. المجموع مستطيلة خيطية. الفروع قصيرة ذات زهرتين الى ٥. الزنيدات اقصر من الكاس. الاوراق صغيرة مخززية مثلة والسفل منها متراكبة رباعية الاصطاف. الكاس بيضية مستطيلة والسيلات رحيمة حادة غشائية المحافة. البتلات مستطيلة اقصر من الكاس. الحبيب * * * - الصيف - جبل مكمّل

puberula, Post. ب. الزغيبية. زغبوي. فم الميزاب

٥. *A. Meyeri*, Boiss. الاسينة ماير ٥ منفرق الغديلات غفائي. السوق متشعبة قبة. الفروع خيطية. الاوراق خيطية ذات ٧ اعصاب. الزنيدات مستقيمة اقصر من الكاس. السيلات عشبية غفائية غير متساوية رحيمة مستدقة القمة والخارجية منها ذات ٥ اعصاب والداخلية ذات ٢. البتلات بيضية مستطيلة ثلث الكاس طولاً. الحبيب مستطيلي ثلث الكاس طولاً - الصيف - صوف ضاغ. لبنان بقرب اهدن

major, Boiss. ب. الكبري. الاوراق اعرض مما في الزنود طول السفل منها ٢٠ سمتر.

الزنيدات اطول من الكاس - جنيّة دير النخلي في سينا

٦. *A. brevis*, Boiss. الاسينة القصيرة ٥ قزم زغبوي غديدي. القمة مندججة قليلة الازهار انتهائية وقد توجد زهرة ابوية او ٢ ايضاً. الزنيدات مستقيمة مثل الكاس طولاً. الاوراق مخززية يابسة ذات ٥ اعصاب. السيلات لحيية ذات ٢ اعصاب متساوية تقريباً رحيمة مدببة. البتلات مستطيلة ثلث الكاس طولاً. الحبيب ٢/٣ الكاس طولاً - الربيع - صخور سينا

٧. *A. Smithii*, Fenzl. الاسينة سميت ٥ غديدي ويرسب. السوق يابسة غير منتظمة الشعب. القميّات باقية مسترسلة قليلة الازهار. الزنيدات نصف الكاس طولاً. الاوراق رحيمة خيطية ذات ٥ اعصاب الى ٧. السيلات غير متساوية ذات ٢ اعصاب رحيمة حادة. البتلات بيضية او مستطيلة ثلث الكاس طولاً. الحبيب اقصر من الكاس - الصيف - جبال انطاكية ولبنان

٨. *A. decipiens*, Fenzl. الاسينة الغاشة ٥ تصبر الحبل نخالة قليل الزوجة متشعب منتشر من القاعدة. القميّات باقية متشعبة ابوية وانتهائية. الاوراق رحيمة خيطية ذات ٥ اعصاب الى ٧. الكاس مخروطية وقاعدتها مجنومة محدبة. السيلات متساوية تقريباً ذات ٢ اعصاب بارزة. البتلات رحيمة ضيقة نصف الكاس طولاً. الحبيب اقصر من الكاس - الصيف - عيتاب الى جبل كرمل وشرقهما

٩. *A. tenuifolia*, L. الاسينة النخيلة الورق ٥ ملمس او غديدي غفائي متشعب عنقودي. الاوراق مخززية عريضة القاعدة. السيلات رحيمة مخززية القمة. البتلات بيضية مستطيلة مستدقة القاعدة. الاسدية ٢ - ١٠. الحبيب اسطواناني مخروطي او بيضي واحياناً اول من الكاس - الربيع - سورية وفلسطين. وهناك اشهر نباتات السورية

genuina, Boiss. ١. الحقيقية . املس منشور الاوراق يابسة . الزيدات اطول كثيراً من الكاس والبتلات اقصر منها . الاسدية ١٠
macropetala, Boiss. ب . الكبيرة البتل . منشور . الاوراق ملتوية . الزيدات كما في السابق . البتلات اطول من الكاس . الاسدية ١٠
muconata, Boiss. ت . المحبوية . يابس . الاوراق مسترخية . التزه متراكم والزيدات قصيرة . البتلات نصف الكاس او ثلثها طولاً او مفقودة

١ . *A. thymifolia*, Sibth. et Sm. الاسينية الثومسية الورق © املس . السوق قرمة بسيطة وفيها مندجة متشعبة . الاوراق قصيرة محبة ملوقة خطية كالة . الزيدات نصف الكاس طولاً او اكثر . السبلات بيضية مستطيلة لمساء ذات ٢ اعصاب وحوا فيها ضيقة بيضاء . البتلات قصيرة المخالب بيضية اطول قليلاً من الكاس . الاسدية ١٠ . الجيب يضي اطول قليلاً من الكاس - الربيع
Syriaca, Boiss. ب . السورية . التزه عنائي - شاطئ راس بيروت

١١ . *A. picta*, Sibth. et Sm. الاسينية المدهونة © الساق قرم خيطي متصب ورفي القاعدة متشعب . الاوراق هلبية يابسة هدية القاعدة . القبيات طويلة الزناد منفرجتها ذات فلولس غشائية . الزيدات ضعفا الكاس الى ٢ اضعافها طولاً منعكسة اخيراً . السبلات لمساء بيضية غشائية الحوافي . البتلات وردية مخنطة مخرومة ضعف الكاس طولاً او اكثر . الجيب يضي اطول من الكاس - الربيع - مزارع حلب الى فلسطين والى الشرق

brachypetala, Boiss. ب . القصيرة البتل . البتلات اطول من الكاس قليلاً - دمشق . فلسطين

Sinaica, Boiss. ت . السنيوية . اكثر دقة من الرمز . الاوراق اطول . الازهار واجزاؤها اصفر - رمل بادية سينا . جبل موسى

١٢ . *A. formosa*, Fenzl. الاسينية الجميلة © غديدي . الساق متصب قصير منشعب من القاعدة . القبيات متشعبة مسترسلة . الزيدات اطول اضعافاً من الكاس شعرية منفرجة . الفلولس غشائية النصف . الاوراق هلبية منسعة القاعدة قليلاً . السبلات رحيمة مدبية غشائية الحافة . البتلات وردية بيضية مقلوبة اسفينية اطول من الكاس . الجيب يضي كروي مثل الكاس طولاً - الربيع - ساحل عكار

٤ الكويريا *QUERIA*, L.

السبلات ٥ . البتلات مفقودة . حوامل الاسدية ٥ مقابلة السبلات او مفقودة . الاسدية ١٠ .

الاقلام ٢. المبيض ذو بويضة واحدة. الجيب ذو ٢ مصارع. البترة بلا بسباسة - عشب متشعب يشبه الالسنبة

Q. Hispanica, Lœff. الكوربا الاسبانية © قزم زغبى. القبيبات مندمجة رأسية ذات فلوس وقصيرة الزناد. الازهار جالسة فالتى في مراكز الشعب مثمرة والشعاعية عاقرة مستقيمة الى سيلتين فلسيتين. سيلات الازهار المنخرة غير متساوية ذات ٢ اعصاب فالانثتان الخارجيتان والفلوس شصية القة - الربيع - اماكن جافة. عيتاب وحلب الى راشيا واهدن

٦ الرملة ARENARIA, L.

السلات ٥. الپنلات ٥ كاملة ومخرومة. الاسدية ١٠ مندغبة في قرص غديدي حول المبيض. الاقلام ٢ (ونادراً ٣-٥). المبيض كثير البويضات. الجيب ذو ٦ مصارع او ٢ مصارع ثنائية الاسنان. البنور بلا بسباسة - اعشاب سنوية او معبرة او نجيحية الفاعة * معبرة

A. Libanotica | graveolens

* * سنوية

A. leptoclados ٢ serpyllifolia ٤ Cassia ٥ tremula ٦ oxypetala ٧ Pamphylica ٨

A. Libanotica, Ky. ١. الرملة اللبنانية 2٤ حزمى قزم (٢٠-٢٢ متر). الاوراق صغيرة مستطلة متراكبة عند قواعد الفروع بيضية مقنوبة محيضة كالة. الفروع قصيرة غديدية خملية ذات زهرة الى ٢. الزينات اطول من الكاس. السلات غديدية عفائية بيضية كالة. البتلات بيضية مقنوبة اطول من الكاس - الصيف - الجرد شالى الارز. بين يونه وديمان

A. graveolens, Schreb. ٢. الرملة المنقنة 2٤ زغبى لرج حزمى. الفروع قصعة خيطية متصاعدة متشعبة مشبكة. الاوراق قصيرة الرجيلات بيضية او مستطيلة حادة درنية. الزينات شعرية اطول كثير من السلات والسلات خضراء رمحية مستطيلة. البتلات كاملة ومخرومة اطول من الكاس. الجيب مستطيل اقصر قليلاً من الكاس - الصيف - صخور لبنان والجبل الشرقي اعلى من ١٢٠٠ متر. طور سينا

A. leptoclados, Rehb. ٣. الرملة الخملية الفروع ٢ زغبى حرش بابس متشعب. الفرع عنقودي راسي. الاوراق بيضية جالسة تقريباً. الزناد المشعرة افقية. السلات ٣ اضعاف التوج طولاً عفائية رمحية حادة ذات ٢ اعصاب. البتلات بيضية. الجيب مستطيل اطول قليلاً من الكاس - الربيع - سورية وربما هو تبانين من الآتي ذكره

٤. *A. serpyllifolia*, L. الرملية السريلية الورق ⊙ زغبى حرش. التفرع متشعب عنقودي. الأوراق بيضية جالسة تقريباً. الزناد المثمرة متصببة. السيئات ضعفاً التوجج طولاً أو أكثر. عناقيد بيضية رحيمة ذات ٢ أعصاب. البتلات بيضية. الحبيب متفتح بيضي أطول من الكأس - الصيف - يقرب أهدن وأرز حدث

٥. *A. Cassia*, Boiss. الرملية الأقرعية ⊙ زغبى حرش. السوق متكنة. التفرع متشعب عنقودي. الأوراق جالسة تقريباً بيضية ملوقة حموية. الزندات متصببة ضعف الكأس طولاً أو أكثر. السيئات بيضية عريضة ذات أعصاب بارزة متفرعة للخارجية منها أعصاب وللداخلية ٢. البتلات ثلاث السيئات طولاً. الحبيب بيضي متفتح مستدق فجأة إلى عنق منبثق - الربيع - الجبل الأقرع. أرز لبنان *A. tremula*, Boiss. ٦. الرملية المرتجفة ⊙ حرش نخالي من الأسفل. السوق متشعبة. التفرع منفرج في. الزندات شعرية بإسرة أطول كثيراً من الكأس منفرجة أخيراً. الأوراق جالسة تقريباً مستطيلة حادة. السيئات مستطيلة بيضية مدببة ثلاثية الأعصاب عريضة الحواف بيضاؤها. البتلات ثلث الكأس طولاً. الحبيب بيضي مخروطي أطول من الكأس - الصيف - الجبل الأقرع

٧. *A. oxypetala*, Sibth. et Sm. الرملية الحادة البقل ⊙ زغبى غددي. السوق خيطية. الزندات خيطية أطول كثيراً من الكأس متعفة في الإثمار. الأوراق بيضية مستدقة إلى رحيمة وذات عصب واحد. السيئات رحيمة عناقيد ذات عنة أعصاب. البتلات أطول قليلاً من الكأس. الحبيب مستطيل أطول من الكأس - أيار - مرجبات لبنان

٨. *A. Pamphylica*, Boiss. et. Held. الرملية البهيلية ⊙ متفرق العناء غض. الساق مخنض متصبب متشعب. الذراع كورني مسترسل من الأعلى. الزندات شعرية متصببة أطول كثيراً من الكأس. الأوراق السفلى بيضية أو ذالية ذات رجيلات والعلوية اهليلجية خطية حادة. السيئات عناقيد رحيمة مدببة مضحكة الأعصاب الخمسة. البتلات بيضية مغلوقة أطول قليلاً من الكأس. الحبيب مستطيل أطول قليلاً من الكأس - أول الصيف - أرز لبنان - وربما هوبانين من المتقدم ذكره

٦ الكوكبية STELLARIA, L.

السيئات ٥. البتلات ٥ ذات شعبتين. الأسدية ٥ على الغالب مندغة تحت المبيض. الأقلام ٢. المبيض كثير البويضات. الحبيب ذو ٧ مصارع. البذور بلا بساسة - أعشاب غضة منشرة سنوية ازهارها بيضاء

s. media, L. الكوكبية المتوسطة (أذان الفار - المصرينة) ⊙ السوق ذات صف

واحد من الشعر. الأوراق السفلى بيضية مدببة قليلاً والعليا جالسة. النخبة مسترسلة ورقية. الزيدات طويلة واخيراً متعقنة. السبلات عنائية مستطيلة. البتلات اقصر من الكاس. الجيب مستطيلي اطول من الكاس - كل السنة - جوانب الطرق واماكن رطبة

apetala, Boiss. ب. العادمة البتل - مع الرمز

major, Koch. ت. الكبرى. الأوراق اكبرها في الرمز واكثرها جالسة. الاسدية ١٠.

البتلات اطول من الكاس - دمشق

pubescens, Post. ث. الزغبية. السوق من الاعلى زغبية - لبنان. طرابلس. بيروت

٧ الهولوستنيوم HOLOSTEUM, L.

السبلات ٥. البتلات ٥ كاملة او مسنة. الاسدية غالباً ٣-٤. الاقلام ٣. الجيب اسطواني ذو اسنان. البرور بلا بمباسة - اعشاب سنوية صوانية انزهر زيتها غير متساوية تعنف في الاثمار قبل انثاق البرعم تنصب

unbellatæ, L. الهولوستنيوم الصواني ٥ اغبر املس او قليل الغديلات. الأوراق

السفلى مستدقة الى رحيلات والساقية مستطبة رحيمة. الغلوس صغيرة غشائية الحوافي. السبلات عشية غشائية الحوافي. البتلات بيضاء وردية اطول من الكاس لحوية القاعة خليجية مسنة الزمة - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

ovatum, Post. ب. البيضي. الأوراق الساقية بيضية - عينتاب

glandulosum, Post. ت. الغديدي. كثيف الغديلات لزج - دير عنة شمالي دمشق

٨ السراستنيوم C. ALSINÆÆ, L.

السبلات ٥ ونادراً ٤. البتلات ٤ ونادراً ٤ منشعبة او ذات سنين. اسدية ٨-١٠ او نادراً ٤-٥. الاقلام ٣-٥. الجيب اسطواني واسنانة ضعف الاقلام عدداً. البرور بلا بمباسة - اعشاب سنوية ازهارها بيضاء

* الاقلام ٢

C. anomalum | Kotschy ٢

** الاقلام ٥

C. perfoliatum ٢ Illyricum ٤ dichotomum ٥ inflatum ٦ viscosum ٧

brachypetalum & fragillimum ٩

١. *C. anomalum*, W. K. | السراستيموم الشاذّ ⊙ غديدي زغي. السوق متعصبة. القمية متشعبة كورنية. الاوراق خطية والسفلى منها ملوقية. الزنيدات متعصبة مثل الكاس طولاً واطول. السيلات مستطيلة رحيمة وحافتها ضيقة غشائية. الپنلات اطول من الكاس مشقوقة الى منتصفها. الجيب اطول من الكاس واسنانه مستقيمة - الربيع - اماكن رطبة من حلب الى بقية الحصن وحاصبيا.

٢. *C. Kotschy*, Boiss. | سراستيموم كوتشي ⊙ غديدي عنقائي من الاعلى. الساق متعصب. القمية كثيرة الشعب كورني. الاوراق خطية والساقية منها مبسعة القاعدة قليلاً. الزنيدات متعصبة اطول قليلاً من الكاس. السيلات مستطيلة كالة وحافتها عريضة غشائية. الپنلات مثل الكاس طولاً ذات سنين قصيرين - الربيع - قرب بلودان

٣. *C. perfoliatum*, L. | السراستيموم المثقوب ⊙ املس اغبر. الساق متعصب بسيط. القمية كثيرة الازهار باسمة. الاوراق السفلى رحيمة ذات رجيلات والبقية مستطيلة متحدة القواعد. الزنيدات طويلة متعصبة. السيلات مستطيلة درنية. الپنلات متشعبة اقصر من الكاس. الاسدية ملساء. الجيب ضعف الكاس طولاً واكثر - الربيع - من عينتاب ومرعش الى حلب

٤. *C. Illyricum*, Arduin. | السراستيموم الايليري ⊙ منخفض متفرع. الشعر طويل منعطف عند الفروع منفرج عند الاوراق. الاوراق مستطيلة ملوقية ومستطيلة. الفلوس عشبية. الزنيدات مستقيمة او منفرجة ضعف الكاس طولاً. السيلات لحوية وحوافها ضيقة غشائية. الپنلات مستطيلة خطية متشعبة نصف الكاس طولاً. المخويطات ملساء. الجيب اسطواني مستدق القبة اقصر من الكاس - اول الصيف - قرب ارزليان

٥. *C. dichotomum*, L. | السراستيموم المتشعب ⊙ غديدي زغي. الساق ضخم متشعب. الاوراق رحيمة خطية كالة. القمية مندمجة. الزنيدات متعصبة اقصر من الكاس. الكاس غير متفتحة والسيلات مستطيلة حادة. الپنلات ملساء بيضية مقلوبة مستطيلة اقصر من الكاس. الجيب مستقيم ضعف الكاس طولاً واكثر - الربيع - مزارع سورية وفلسطين وشرقها

٦. *C. inflatum*, Link. | السراستيموم المتفتح ⊙ غديدي زغي. الساق ضخم متشعب. الاوراق رحيمة كالة. القمية مسترسلة متشعبة. الزنيدات متعصبة اقصر من الكاس. الكاس متفتحة بيضية كروية سرية القاعدة. السيلات بيضية مستطيلة مدببة. الپنلات بيضية مقلوبة مستطيلة اقصر من الكاس. الجيب اسطواني اطول من الكاس واضيق منها كثيراً - الربيع - البقاع. بلودان. بادية النيه

٧. *C. viscosum*, L. | السراستيموم اللزج ⊙ غديدي عنقائي. الاوراق السفلى بيضية ملوقية

مستدقة الى رجلة والبنية مستطيلة او اهليلجية . القباها مندجحة او غير مندجحة . الزبدات اقل من الكاس او مثلها طولاً منفرجة اخيراً . الفلوس عشبية . السبلات مدبة لحوية القبة . البتلات مثل الكاس طولاً منشعبة . الجيب مخنٍ قليلاً ضعف الكاس طولاً - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

٨. *brachypetalum*, Desf. . السراستيم القصير البتلة ⊙ طول الشعر ناعمة

كثيفة . الاوراق السفلى ملوقة والساقية بيضية مستطيلة . القبة مسترسلة . الزبدات مستقيمة ضعف الكاس طولاً واكثر . الفلوس عشبية . السبلات رحيمة عشائية قليلاً لحوية القبة . البتلات بيضية مقلوبة منشعبة القبة اقصر من الكاس او مثلها طولاً . الجيب مخنٍ قليلاً اطول قليلاً من الكاس - اول الصيف - قرب امدن

٩. *fragillimum*, Boiss. . السراستيم الاقصم ⊙ قصير الغشاء كثير المزوجة . السوق متصاعدة نحلة قصعة . الاوراق السفلى ملوقة مستدقة الى رجلة والبنية مستطيلة . القبة مسترسلة . الزبدات ضعف الكاس طولاً واكثر منعقة في الإثمار ثم متصببة . الفلوس عشبية . السبلات مستطيلة كالة وحوافيها ضيقة غشائية . البتلات اقصر من الكاس مستدقة الناعدة خطية ذات سنين . الجيب مخنٍ ضعف الكاس طولاً - الصيف - لبنان قرب الارز . الجبل الشرقي فوق زبدات

٩ السبركيولا SPERGULA, L.

السبلات ٥ لحبة غشائية المحوافي . البتلات ٥ كاملة مندجحة في اسفل الكاس . الاسدية ٥ - ١٠ مندجحة في حوية حول المبيض . الاقلام ٥ ترادف السبلات . الجيب منقسم الى ٥ مصاريع تقابل السبلات . البزور محرفة او ممحقة - اعشاب سنوية اوراقها خيطية دولابية باقية

١. *arvensis*, L. . السبركيولا المحقلية ⊙ اخضر . الاوراق محدبة من الاعلى مثلثة من الاسفل . البتلات بيضية كالة . البزور كروية عدسية درنية ضيقة المحوافي - الربيع - كثير الوجود في سورية

٢. *pentandra*, L. . السبركيولا الخماصية الاسدية ⊙ مستغبر . الاوراق غير مثلبة . البتلات رحيمة حادة . البزور مضطقة لمساء محاطة بمجناج ايض مخطط مثلها عرضاً - الربيع - غرة مصر

١٠ السبركيولاريا SPERGULARIA, Pers.

السبلات ٥ غشائية المحافة . البتلات ٥ كاملة مندجحة في اسفل الكاس . الاسدية ٥ - ١٠ : ٢ - ٣ مندجحة في حوية حول المبيض . الاقلام ٢ ونادراً ٥ . الجيب منفصل الى ٣ مصاريع او ٥ . البزور

أجاصية أو عدسية غشائية الحوافي أو غير مجنحة - أعشاب سنوية أو معمرة أو راقها متفائلة خيطية لحمية زينةاها منعكسة في الإثمار

١. *S. rubra*, Wahl. السيركيولاريا الحمراء ② أو 2f غديدي أكثر أو أقل مستلق.

الأوراق خطية. القميات ورقية. السبلات رحيمة غشائية الحوافي. البتلات محمرة بيضية مقلوقة مثل الكاس طولاً. الأسدية ٥-١٠ مثل المحبب طولاً. البزور غير مجنحة ضخمة الحوافي - الربيع - جوانب طرق سورية

٢. *S. glandra*, Gus. السيركيولاريا ذات السداتين (الدقيقي) ② غديدي ومن

الاسفل مستأس. السوق منصبة أو متصاعدة نجيل متشعبة. الأوراق خيطية حموية. القميّات غير ورقية طويلة الزنيدات. السبلات مستطيلة غشائية الحوافي. البتلات وردية بيضية أقصر من الكاس. الأسدية ٢-٢. المحبب أطول من الكاس. البزور غير مجنحة ضخمة الحوافي - الربيع - الرمل. اقل وجوداً من السابق ذكره وربما هو تبائن منه

٣. *S. media*, Wahl. السيركيولاريا المتوسطة 2f أو ② زغي من الاسفل وغديدي من

الأعلى. السوق مستقيمة أو متصاعدة. الأوراق اسطوانية تقريباً. القمية ورقية. السبلات رحيمة غشائية الحوافي. البتلات بيضية مقلوقة أطول من الكاس. الأسدية ٥-١٠. المحبب مثل الكاس طولاً أو أطول قليلاً.

البزور منضغطة مضغنة غير مجنحة أو السفلى منها مجنحة - الربيع - الشواطئ. كثير الوجود

٤. *S. marginata*, D. C. السيركيولاريا المحرّفة 2f مستأس ومن الأعلى غديدي زغي

مستلق أو متصاعد. الأوراق نصف اسطوانية سرحاء تقريباً. القمية راسمية قليلة الأوراق. السبلات رحيمة غشائية الحوافي. البتلات بيضية عريضة مثل الكاس طولاً. الأسدية ٥-١٠. المحبب ضعف الكاس طولاً أو أقل من ذلك قليلاً. البزور منضغطة ملساء عريضة الاجنحة - الربيع - الشواطئ والسواحل الداخلية

الرتبة الخامسة عشرة الاحسية. PARONYCHIEE.

الأزهار قياسية. الكاس ذات ٥ تقاسم ونادراً ٤ متراكبة في التصيف خالدة. البتلات غالباً

صغيرة وإحياناً شبيهة بإسدية أو مفقودة مندغمة في الكاس مرادفة فصوصها. الأسدية مندغمة في قرص تحت المبيض أو حوله مثل خرق الكاس عدداً أو أقل منها ونادراً ضعفها. المبيض مستقل أو متحد بقاعدة الكاس وذو غرينة واحدة وبويضات كثيرة أو قليلة. الاقلام ٢-٣ غير متحدة أو متحدة الثلاثة. الثمر جيب ذو ٣ مصارع وبزور متعددة أو رحيمة غير منشقة ذات بكرة واحدة

* الجنبين محيط بالايومين

ب. الجنب كثير البنور

١. *Robbalea*. الثلاث ذات مغالب وصفيحتها قلبية بيضبة

٢. *Polycarpon*. الثلاث بيضبة مقلوبة او مستطيلة

٣. *Polycarpæa*. الثلاث رحيمة نصف الكاس طولاً

ت. الرحيمة غشائية احادية البنر

٤. الاوراق ذات ذنبات

٤. *Herniaria*. اعشاب حزمية سنجابية او خضراء

٥. *Paronychia*. اعشاب مستتية ذات فلوس فصية غشائية

٦. *Symnocarpum*. نجيحة يابسة النرع ازهارها في قم متراكمة

٧. *Sclerocephalus*. اعشاب مخنصة بالبادية رؤوسها المثمرة شوكية

٨. *Corrigiola*. اعشاب لحمية الاوراق غذائية الذنبات

٩. الاوراق بلا ذنبات

٩. *Scleranthus*. ابوبة الكاس ندحية. الثلاث خيطية او مفنودة

١٠. *Habrosia*. المسلات خطية قليلة الاتحاد عند قواعدها. الثلاث بيضبة ملوثة

* * الجنبين مستقيم جاسي


١١. *Pteranthus*. الكاس ذات ٤ خرق. الثلاث مفنودة. الاسدية ٤

١٢. *Cometes*. الكاس ذات ٥ خرق. الثلاث ٥. الاسدية ٥

١. الغباشي^٣

2201203 922221/1 B(1-2).

شكل ٦



الكاس ذات ٥ خرق مقعرة ضيقة الحواف غشائية. الثلاث ٥ ذات

مغالب والصفيحة قلبية بيضبة. الاسدية ٥ متدة في طوق حول المنبص.

القلم ثلاثي الشعب. الجيب ذو ٢ مصارع. البزور اسطوانية منحنية متدة

الظهر - اعشاب معمرة مستقيمة

٢. *prostrata*, Forsk. الغباشي الملقى. (السمسم) ٢. رعدة احد ثباته مكبرة

امس. السوق متعددة خيطية مستقيمة يابسة التفرع. الاوراق صغيرة ت. ح. ح.

مستطيلة او خطية. الذنبات والفلوس قصيرة مثلية غشائية الحواف. القمم احزمية مسترسلة. ازوردات

كالكاس طولاً أو أطول منها. السبلات بيضة كالة. البتلات وردية. نبل الكاس طولاً - الربيع - رمال من الخليل والتيه الى بادية مصر وإلى الشرق

٢ البوليكرپون POLYCARPON, L.

الكاس ذات ٥ خرق محيضة ضيقة الحوافي غشائيتها قبيصة القمة. البتلات ٥ بيضة مقلوبة أو مستطيلة. الاسدية ٢ - ٥ مندغمة في قرص حول المبيض. الفلم ثلاثي الشعب. المحبب ذو ٢ مصارع. البزور محنية الظهر مستقيمة الوجه - اعشاب

* الذنبات مثلبة كلها غشائية. الفلوس معانقة قاعدة الكاس

١. *P. tetraphyllum, L.* البوليكرپون الرباعي الورق © السوق كثيرة. الفترع

متشعب من القاعدة. الاوراق الساقية مرتبة اربعة اربعة على هيئة دولاب والفرعية متعاقبة وكلها مستطيلة ملوقية. القميّات مسترسلة والازهار ذات ٢ اسدية. الزنبات اطول من الكاس. السبلات بيضة حمية. البتلات مفروضة نصف الكاس طولاً. الفلم اقصر من المبيض - الربيع والصيف - جوانب الطرق. عام الاوراق لمساء لحمية قليلاً مرتبة اربعة اربعة في دواليب او متعاقبة وكلها بيضة. القميّات مندجّة والازهار ذات ٥ اسدية. الزنبات كالكاس طولاً. السبلات بيضة حمية. البتلات مستطيلة كاملة تقريباً نصف الكاس طولاً. الفلم اقصر من المبيض - اول الصيف - الاسكندرية

٢. *P. Arabicum, Boiss.* البوليكرپون العربي © قزم (٢٠٢ متر الى ٢٠٤) السوق

مستطيلة. الاوراق صغيرة لحمية متعاقبة خطية مستطيلة. القميّات مندجّة. الازهار ذات ٥ اسدية. الزنبات مثل الكاس طولاً. السبلات مستطيلة كالة عريضة الحوافي غشائيتها. البتلات مستطيلة خطية مثل الكاس طولاً. الفلم ضعف المبيض طولاً - الربيع - رمال الفيه وسينا

* * * الذنبات والفارس عشبية الظهر غشائية الحوافي. الفلوس اقصر من الزنبات

شكل ٦٦



ب ت

ب. زهرة البوليكرپون المصري

ت. مكبر. ت. جبهة

٤. *P. uerbenifolium, Del.* البوليكرپون العصيري ©

السوق مستطيلة. الاوراق لحمية مرتبة اربعة اربعة او متعاقبة خطية مستطيلة مستدقة الى رجيّة. القميّات مسترسلة قليلة الازهار. الزنبات اطول من الكاس غالباً. السبلات مستطيلة كالة والداخلية منها اطول من الخارجية. البتلات مستطيلة بيضة مقبوة مثل الكاس طولاً. الفلم مكبر. ت. جبهة اطول من المبيض - الربيع - رمال - سينا ومصر

densum, Post. ب. الكثيف. القبيات كثيفة الأزهار. الأوراق اهليلجية ملوقية-بافا. غرة

٣ الكباش POLYCARPÆA, Lam.

الكاس ذات ٥ خرق حادة غشائية الحوافي. البتلات ٥ رحيمة نصف الكاس طولاً. الاسدية ٥ وقد تجهز بفلوس حذاء البتلات وكلها مندغمة في قرص حول المبيض. النلم ذو ٣ فصوص. الجيب ذو ٣ مصاريع. البزير اجاصية منمية قليلاً--اعشاب او نجيلات ذنيباغ وفلوسها غشائية

شكل ٦٧ P. fragilis, Del. I. الكباش القصم 24 ملانم الصوف.



السوق عشبية مستقيمة متفرعة. الأوراق يابسة متباعدة او مجمعة خطية رحيمة قصيرة ملتفة الحافة. القبيات مندمجة عنقودية. خرق الكاس صوفية

بيضية عريضة الحوافي غشائيتها وقبة عصبها حموية. البتلات حادة. زهرة الكباش انهم مكبرة النلم مثل المبيض طولاً. الحمة رأسية ذات ٣ نصوص - الربيع - بادية سينا ومصر

P. Memphitica, Del. I. الكباش القسطاطي 24 او خجلي. السوق مستقيمة عشبية

شكل ٦٨



متفرعة. الأوراق متباعدة او مجمعة بيضية منلوقة ملوقية كالة. القبيات انتهائية قليلة الأزهار. خرق الكاس غشائية خطية مستطيلة متفرعة كالة. البتلات مستطيلة رحيمة. النلم قصير. الاسدية منعنة - الربيع - رمال مصر ومزارعها

زهرة الكباش القسطاطي مكبرة

٤ الهرناريا HERINARIA, L.

خرق الكاس ٥ او ٤ مقعرة قليلاً. البتلات خطية. الاسدية ٢ - ٥ مندغمة في خجيرة الكاس. الاقلام ٣ مستقلان او ١ منشعب. الرحمة منضمنة في الكاس غير منشقة - اعشاب حزامية وقد تكون نجيلية الفاعلة فروعها مستقيمة واوراقها العليا غالباً مترادفة

* سنوية او مستعرة

II. cinerea I glabra I hirsuta I

** معبرة

II. incana I hemistemon I

II. cinerea, D. C. I. الهرناريا الرمادية I سنجلي. الثروع ضخمة متصاعدة.

الأوراق مستطيلة خطية. الباقات جالسة ذات ٧ ازهار الى ١٠ مترادفة. الكاس مستطيلة مجبرة

بشعر متساوي مثل قطرها طولاً. الاقلام قصيرة منفردة - الربيع - اماكن منفردة. كثير الوجود

diffusa, Post. ب. المنتشرة. الفروع منشرة طويلة - البقاع

II. *glabra*, L. ٣. الهرباريا الملساء ٥ او 2 ملمس. الفروع نخيلة مستطيلة. الاوراق

مستطيلة مستدقة القاعدة واحياناً هدية. الازهار جالسة والباقات مترادفة مقابلة الاوراق ذات ٧
ازهار الى ٨. خرق الكاس ملساء بيضيه قصيرة كاله. القلم قصير متشعب والمات منفردة - نيسان الى
ابول - حلب. تحت جرود لبنان وجبل الشيخ

III. *hirsuta*, L. ٣. الهرباريا العفائية ٥ او 2 غفائي. الفروع مستطيلة. الاوراق

اهليجية مستطيلة مستدقة القاعدة. الازهار جالسة والمخز ذات ٧ ازهار الى ١٠. خرق الكاس مستطيلة
منتهية بهلبة طويلة. المات جالسة - الربيع - بيروت

IV. *incana*, ٤. الهرباريا المشيبة 2٤ خيلي مستشيب. السوق متصلة من الاسفل

منشرة منفردة. الاوراق بيضيه منقوبة مستدقة القاعدة او ملوقة. الباقات ذات ٣ ازهار الى ٦ منفردة
وزيداتها كالكاس طولاً. الكاس بيضيه ذات شعر متساوي الطول ابيض منفرد. المات جالسة
تقريباً منفردة - اول الصيف - تحت جرود جبال سورية الشامية ولبنان والجبل الشرقي

V. *hemistemon*, J. Gay. ٥. الهرباريا النصفية السداة (ام لبيدة) 2٤ قصير المخيل

حزمي. السوق قصبة مستطيلة خطية كثيرة الفروع. الاوراق مستطيلة مستدقة القاعدة. الذنبات
صدائية. الازهار جالسة باقية ذات ٤ سيلات و ٤ بتلات وسدانين. انبوية الكاس لحوية والمخزقتان
الخارجيتان لحميتان ٤ اضعاف الداخليتين حجماً ذائتان ملوقتان. والداخليتان يعضتان غشائيتان.
القلمان طويلان مستفلان من قاعدتهما - الربيع - بادية ارجحة واليه وسبنا ومصر

٥ الحربط PARONYCHIA, Tourn.

خرق الكاس منفلحة مقعرة او قبيعية القمة. البتلات خيطية. الاسدية ٥ او ٣ مندغمة في حجرة الكاس.
القلم متشعب. الرحمة غشائية متضمنة في الكاس تنمق بغير انتظام من قاعدتها - اعشاب اورانها
مقابلة ازهارها مخفية غالباً بفلوس فضية غشائية

* خرق الكاس عشبية غير قبيعية القمة. الازهار مندغمة جداً

P. capitata ١ imbricata ٢ Kurdica ٣ Sinaica ٤

* خرق الكاس نصف غشائية قبيعية القمة. الازهار اكثر اقل اندماجاً

P. argentea ٥ Arabica ٦ desertorum ٧

١. *P. capitata*, Koch. الحُرْبُطُ المَرَأْسُ 2٤ الفروع متصاعدة أو مستقيمة. الأوراق بيضية أو مستطيلة محزومة قليلاً كالة ملازمة العناء. الفلوس كبيرة بيضية حادة أو كالة حموية. خرق الكاس متساوية طولاً عنائفة مستطيلة كالة منقرة - الصيف - جبل النكام والاقرع

٢. *P. imbricata*, Boiss. et. Haussk. الحريط المتراكب 2٤ حزمي. الفروع قصيرة (٢٠٢ متر) متصبية. الأوراق متراكمة ٢٠٠٢ متر طولاً رباعية الاصطفاة لحمية متراكمة ملازمة العناء مستطيلة. الذنبيات فضية أطول من الورقة. الرويسات انتهائية ذات ٤ أزهار إلى ٥. الفلوس بيضية مثقلة أطول قليلاً من الزهرة. خرق الكاس مستطيلة ملازمة العناء متساوية الطول - حزينان - شقوق الصخور يقرب عنباناب

٣. *P. Kurdica*, Boiss. الحريط الكردي 2٤ الفروع صوبية متصاعدة أو مستقيمة. الأوراق صوبية مستطيلة خطية كالة. الفلوس عريضة مستطيلة مدببة. خرق الكاس غير متساوية طولاً عنائفة مستطيلة ريمحة كالة وقد تكون منقبة التبة - الصيف - الصخور من عنباناب إلى حلب

٤. *P. sinatica*, Fresen. الحريط السينوي 2٤ خلمي صوبي. الفروع متصاعدة. الأوراق مستطيلة خطية كالة. الفلوس مستديرة مدببة. خرق الكاس محزومة مستطيلة خطية حادة غير متساوية - الربيع - سينا

flavescens, Boiss. ب. المصفر. الفلوس أكبر مصفرة سرحاء - بادية التيه بقرب فلسطين

acutifolia, Post. ت. الحاد الورق. الأوراق حادة - بيت لحم والخليل

٥. *P. argentea*, Lam. الحريط الفضي 2٤ الفروع مستطيلة مستقيمة. الأوراق ملساء اهليلجية مستطيلة حادة. جميع الرويسات منتزجة بالأوراق. الفلوس بيضية حادة أطول كثيراً من الزهرة. خرق الكاس مستطيلة محزومة قصيرة السبل والحافة الغشائية أضيق من الجزء المشي - الربيع - أماكن غير مزروعة. كثير الوجود

٦. *P. Arabica*, L. الحريط العربي (الحرايبث) © زغبوي. الفروع خيطية مستقيمة. الأوراق متباعدة مستطيلة ريمحة أو مستطيلة ملقوة ملساء أو مدببة وذات حمة. الرويسات متعددة قليلة الأزهار. الفلوس مستطيلة ريمحة مدببة مثل الأزهار طولاً أو أطول منها. انبوبة الكاس عنائفة والخرق بيضية ملقوبة محزومة طويلة السبل والحافة الغشائية اعرض من الجزء المشي - الربيع - رمال فلسطين بقرب غزة. بحرية مصر

macrostegia, Boiss. ب. الكبير الفلوس. الفلوس أطول كثيراً من الأزهار - رمال

ovalifolia, Post. ث. العدسي الورق. الاوراق عدسية اويضية مقلوقة — مزارج ذالية

مصر

confertiflora, Post. ث. الكثيف الزهر. الفروع متراكبة كثيفة الرويسات والاوراق.

الفلس اطول كثيراً من الكاس — الاسكندرية

P. desertorum, Boiss. ٧. حريط البادية (الرُخَيْبَة) ⊙ خلي زغبى. الفروع

قصبة مطولة منتشرة متراكبة الاوراق والذنبات من الاسفل. الاوراق مستطيلة رحيمة ذات حمة.

الرويسات متعددة قليلة الازهار مرتبة على هيئة عناقيد طويلة ضيقة. الفلس بيضية حادة اطول قليلاً

من الازهار. خرق الكاس بيضية مقلوقة مجذومة جذماً مستديراً قصيرة المحبة والمخافة الغشائية اعرض

قليلاً من الجزء العشبي — الربيع — بين مصر وسويس وبين سويس ووادي غرندل وإلى الشرق

٦ الكرَد GYMNOCARPUM, Forsk.

الكاس عشبية جريّة القاعدة خرقها قبيعة القمة قليلاً وظهر القبع حموي متصلب. البتلات ٥ هليّة.

الاسدية ٥ مندغبة في حجرة الكاس مقابلة المخرق. القلم طويل والسمات ٣ خطية. المبيض جالس.

الرحمة غشائية غير منشقة الآتيا تنزق اخيراً من قاعدتها — نجيحة مشبكة الفروع متقابلة الاوراق

ازهارها مجمعة في قيات ابطية قصيرة الزناد

G. fruticosum, Pers. الكرَد النجبي ث. النشر سنجابي مبيض. الفروع متعرجة معقّدة

قصيرة. الاوراق خطية اسطوانية حموية. الذنبات مثلثة قصيرة. الفلس رحيمة اقصر من الكاس.

انبوبة الكاس مخالفة خلية والمخرق خطية حمراء ضيقة الحواشي غشائية — الربيع — جنوبي فلسطين.

بادية التيه وسبنا ومصر وإلى الشرق

٧ السكليروكفلس SCLEROCEPHALUS, Boiss.

الكاس ذات ٥ خرق فنجانية القاعدة معقّدة مع الاوراق الزهرية والفلس وخرقها شوكية القمة

قبيعة قليلاً. البتلات منقودة. الاسدية ٥ مندغبة في حافة القرص الغشائي البطن انبوبة الكاس

مقابلة اسنانها. الخويطات خطية قصيرة. المبيض غشائي متحد بانبوبة الكاس مستقل القمة. القلم

متشعب شعباً منعقّدة. الرحمة متمزقة على غير انتظام — عشب سنوي متقابل الاوراق متفرع العنق فروع

مستقلة قصيرة رؤوس ذات ٤ ازهار إلى ٧ وعند النضج ثوبوية. الثمر ساقط مع زنده

S. Arabiens, Boiss. السكليروكفلس العربي ⊙ قزم. الاوراق خطية اسطوانية حموية.

الذنبات غشائية حادة. الاوراق الزهرية اطول قليلاً من الكاس. الفلس حادة غشائية اقصر من

الكاس. اسنان الكاس مستقيمة صوفية - الربيع - بادية سيناء. الرؤوس المتفرعة ضعيف اليزلا تجا تلتصق
بمباب المازين

٨ الكوريجيولا *CORRIGIOLA*, L.

الكاس خالدة ذات ٥ خرق كالة بتلية ذات حوافي . البتلات ٥ مستديرة مثل الكاس طولاً .
الاسدية ٥ مندغمة في حافة القرص الصغير . الاقلام ٣ قصيرة . الجوزة بيضبة ثلثية الروايا متضمنة في
الكاس ساقطة معها - اعشاب سنوية اوراقها لحمية ذنيابها غشائية
C. littoralis, L. . الكوريجيولا الشاطئية ٥ مستمس . السوق نخولة مستقيمة . الاوراق
مستطيلة رحيمة . الذنبيات نصف سهمية مدببة . الازهار متراكمة في رؤوس - الربيع - بيروت

٩ السكليرانثس *SCLERANTHUS*, L.

انبوبة الكاس جرية متصلة وخرقها ٥ سرحاء . البتلات خطيبة واحياناً مفقودة . الاسدية ٥ مقابلة
خرق الكاس مندغمة امام حوبة حجرهما . البيض مستفل . الاقلام ٢ منفصلان . الرحيمة غير منشقة
ساقطة مع الكاس - اعشاب متخضة اوراقها خطية مخززية
S. verticillatus, Tausch. . السكليرانثس الدولابي ٥ الازهار صغيرة مجمعة في الآباط
كورنية من الاعلى . خرق الكاس اطول من الانبوبة ضيقة الحوافي غشائيتها ملقطة الى الداخل في الانهار
- الصيف - اماكن جافة من عيذاب الى حلب

١٠ الهابروسيا *HABROSIA*, Fenzl.

الكاس متعدة قليلاً من الاسفل والخرق محدبة القاعة ذات سبلات . البتلات ٥ مندغمة في حجرة
الكاس بيضبة ملوقية . الاسدية ٥ مندغمة في حوافي القرص المبطن انبوبة الكاس والخويطات قصيرة
والانثيرات كروية نوامية . الاقلام ٢ مستفلان . الرحيمة غير منشقة - اعشاب سنوية نخولة
H. spinulifera, Ser. . الهابروسيا الحاملة الشويك ٥ امس . الساق منتصب
خيطي . الفرع متشعب عنقودي . الاوراق متسعة القاعة هلبية كالة . الزنيدات اخيراً اطول من الكاس
منفرجة . اللوس رحيمة قصيرة عشبية غشائية الحوافي . خرق الكاس مستطيلة محزومة غشائية الحوافي .
البتلات ثلث الكاس طولاً - الربيع - من حلب وتدمر الى دمشق وشرقيها

١١ البسومة PTERANTHUS, Frosk.

الكاس ذات ٤ خرق مستقيمة مستطيلة قبيعية القمة مجهزة من الاعلى بعلقة غشائية المخافة شوكية والخرفتان الخارجيتان اعرض وأكثر تحيزاً من الداخليتين. البتلات مفقودة. الاسدية ٤ مقابلة خرق الكاس متحدة من القاعدة في كؤيسة وانثيراتها بيضية السمة منشعبة. والرحمة غير منشقة - اعشاب سنوية لحمية اوراقها متفابلة تظهر دولانية لتراكبها في الأباط. القميّات ذات ٢ ازهار على زند مشترك يتفخ عند الابتسام ويصير اجوف. الازهار جالسة بجانب فريع عاقر منقسم الى خرق ريشية *P. echinatus, Desf.* البسومة التوقيوية ⊙ السوق ثنائية الشعب او ثلاثية متصاعدة او متكسكة. الاوراق خطية. الذنبات رحيمة. القميّات حلبيّة عفاثية مرتبة في عنقود كورني. الفلوس صغيرة. الغريقات الزهرية العاقرة مثل الازهار طولاً وخريفانم امتركة متعقفة غشائية المحوافي - الربيع - بين القدس واربحا. بادية النيه

١٢ الكوميتيس COMETES, Burm.

الكاس ذات ٥ خرق مستقيمة مقعرة قليلاً. البتلات ٥ قديمة متحدة بالكؤيسة الحاملة الاسدية. الاسدية ٥ مقابلة خرق الكاس خويطانم متحدة عند قواعدها بالكؤيسة تحت المبيض وانثيراتها مستطيلة. القلم خيطي متينق ثلاثي الشعب عند قنوه. الرحمة غير منشقة - اعشاب سنوية حرشة اوراقها متفابلة ذنبانم مخززية سوقها منشعبة كورنيّة عنقودية وقميّاتها ذات ٢ ازهار محمولة على زند خيطي اسرح يسقط معها. الازهار جالسة بجانب فريع عاقر منقسم الى هلب صدائي ينوبعد التزهرو يتصلب فيعلو الزهر

C. Abyssinica, R. Br. الكوميتيس الحبشي ⊙ منفرد الغناء. الاوراق خطية رحيمة حموية مستدقة القواعد جالسة تقريباً. الكاس عفاثية خرقها مستطيلة قبيعية القمة مخززة منبهة بحمة عفاث. البتلات اطول من الخويطات - الربيع - سينا

الرتبة السادسة عشرة المولوجينية MOLLUGINEAE.

الازهار قياسية خنثوية. الكاس مستمرة خماسية التقاسيم. البتلات غير محدودة او مفقودة. الاسدية ٢-٥ او متعددة مندغمة في اسفل الكاس. المبيض مستقل ذوعدة غريقات كاملة او غير كاملة. البويضات متعددة مندغمة في المحور. الجيب غشائي. الجنين محيط بالليبومن - اعشاب وانجم اوراقها

مرادفة اوشببة بالدولاية ذات ذيبات اوبدنما

التليفوم *TELEPHIUM, L.*

الكاس ذات ٥ تقاسم. الثلاث ٥ مندغة في قرص في اسفل الكاس. الاسدية ٥ مقابلة خرق الكاس. الاقلام ٢ منفرجة. غريقات الجيب ٢ او ٤ غير كاملة. البزور متعددة — اعشاب مستلقية اوراقها لحمية مرادفة ذات ذيبات

١. *T. Imperati, L.* تليفوم المأمور 24 السوق مطولة. الاوراق مستطيلة ملوقية. القمية انتهائية متراكمة. الجيب هرجي ذو منقار والبزور ١٥ - ٢٠ كلوية — الصيف *Orientalis, Boiss.* م.ب. الشرقي. الاوراق ضيقة والعليا منها اهليلجية خطية — جبال سورية

العالية

٢. *T. sphærospermum, Boiss.* التليفوم الكروي البزور ٥ او ٦ السوق قصيرة. الاوراق مستطيلة اهليلجية حادة او كالة. القمية انتهائية قصيرة القروغ. الجيب يضي بلامنقار ذو ٢٥ بزرة كروية الى ٢٠ — الربيع بادية سينا ومصر

الكليسن *GLINUS, Loeffl.*

الكاس ذات ٥ خرق متساوية. الثلاث مفقودة او غير محدودة قدية وغالبًا ذات شعبتين الى ٢. الاسدية ٢ - ٣٠ مندغة في اسفل الكاس منفصلة او مجمعة خوات. المبيض مستقل ذو ٢ غريقات الى ٥. الاقلام ٢ - ٥ خطية. الجيب يضي خماسي الزوايا وذو ٢ انلام الى ٥ و ٢ غريقات الى ٥. البزور متعددة كلوية — اعشاب سنوية صوفية اوراقها مرادفة اوشببة بدولاية بلا ذيبات

١. *G. lotoides, L.* الكليسن الشبيه باللؤلؤس ٥ السوق طويلة مستلقية متشعبة. الاوراق بيضية مقلوبة ملوقية. الازهار مجمعة في الآباط غير متساوية الزينات. الكاس بيضية وخرقها اهليلجية سرجاء تقريبًا. الثلاث كاملة او متشعبة. الاسدية ١٢. الاقلام ٥ — الصيف — ساحل سورية البحري ومصر وشرقها

٢. *G. dictamnoides, L.* الكليسن الشبيه بالديكتامنس ٥ السوق مستلقية متشعبة. الاوراق صغيرة مستديرة او بيضية مقلوبة طويلة الرجليات. الازهار صغيرة مجمعة عند الآباط غير متساوية الزينات. الهلات مستطيلة قمية حموية حادة. الثلاث مفقودة. الاسدية ١٠. الاقلام ٢ - ٣ الصيف — اماكن رطبة قرب راشيا

الرتبة السابعة عشرة البقلية. PORTULACACEÆ.

الازهار قياسية خثوية. الكاس متراكبة في التصنيف ذات سلتين، البتلات ٤-٦ مندغمة حول المبيض متحدة قليلاً عند قاعدتها. الاسدية ٨-١٥ متحدة بقواعد البتلات. المبيض كثير البويضات. القلم ذو ٥ خرق الى ٦. العلبة غشائية ينفصل غطاؤها من الجزء المحامل البزري - اعشاب لحمية اوراقها مترادفة او متقابلة تقريباً ذات ذنبات

البقل PORTULACA L.

السلتان متحدتان في انبوبة ملتصقة بالمبيض. البتلات مندغمة في اعل انبوبة الكاس - اعشاب ذنباتها مشرحة الى شعر

١. *P. oleracea*, L. البقل السلقي ⊙ املس. السوق متفرعة مستقيمة. الاوراق جالسة بيضية مقنونة. الاباط عريانة. الازهار جالسة في نقط التشعب. السلطان غير متساويتين كاللذان محيزتان تحت القمة. البتلات ٥-٦ بيضية مقنونة صفراء - الصف جوانب الطرق وامكن مسننة. عام

٢. *P. quadrifida*, L. البقل الرباعي المخرق ⊙ السوق منشرة. الاوراق لحمية جالسة مستطيلة او مستطيلة خطية. الاباط مشعرة. الازهار انتهائية محاطة بطرف مؤلف من ٤ اوراق. السلطان متساوية. البتلات ٤ صفراء - الصف - رمال مصر

الرتبة الثامنة عشرة الطرفائية. TAMARISCINEÆ.

الازهار قياسية وغالباً خثوية. الكاس متراكبة في التصنيف ذات ٤ تقاسيم الى ٥. البتلات ٤-٥ متراكبة مندغمة تحت قرص تحت المبيض. الاسدية ٤-٨ مندغمة في القرص مستقلة او ذات خوة واحدة. المبيض مستقل ذو غرينة واحدة وبويضات متعددة. الاقلام ٢-٥. المحجب ذو مصاريع تساوي الاقلام عدداً. البزور مشعرة او شراية القمة - انجم او شجيرات

١. *Reaumuria*. البزور مشعرة الجانين البيومنية. الازهار منفردة

٢. *Tamarix*. البزور شراية القمة غير البيومنية. الازهار في راسجات او سنابل

الملاح REAUMURIA, L.

الكاس خماسية الفصوص او المخرق ذات فلوس قاعدية. البتلات ٥ متساوية او منحرفة وعلى كل

من جانبي القاعدة حشف طويل مكشكش. الاسدية متعددة مجتمعة في ٥ خوات مقابلة البتل مندغمة في الحوية المحبة المحيطة بقاعدة المبيض. المبيض كروي ذو خمس زوايا. الافلام ٥ مخطية. المشيمات حاجزة ذات ٤ بويضات الى ١٠ ومثبتة بقاعدة التجويف وتنفذ فقط. الجيب غضروفي - انجم غبراء كثيرة الفروع مخنثانية الاوراق والحبيبات

* الاوراق جالسة غير مستدقة القاعدة. البويضات ٤ على كل مشيمة

R. hirtella, Jaub. et. Sp. ١. الملاح التصير العفاء ق. قصير العفاء. الفروع منتصب.

الاوراق خطية مستطيلة كالة. الازهار راسمية عنقودية والجانبية منها قصيرة الزناد. الفلوس متراكبة كالة منفردة مثل الكاس طولاً. فصوص الكاس مستطيلة مستدقة الى قرينة قصيرة كالة. قاعدة الخويطات شرافية - الصيف - رمال بادية اثني وسينا ومصر

R. mucronata, Jaub. et. Sp. ٢. الملاح الحجوي ق. امس. الفروع منفردة. الاوراق

خطية حادة. العناقيد غير منتظمة او الازهار انتهائية. الفلوس متراكبة حوية منفردة مثل الكاس طولاً. فصوص الكاس مستطيلة منتهية بقرينة حموية اقصر منها. قاعدة الخويطات كاملة - الصيف - بادية الاسكدرية

R. Palestina, Boiss. ٣. الملاح الفلستيني ق. الفروع بيضاء زغبية. العناقيد غير

منتظمة راسمية. الاوراق خطية ضيقة كالة مخرومة القاعدة والباطية منها باقية قصيرة. الازهار قصيرة الزناد. الفلوس مثل الاوراق طولاً مسترسلة منفردة اطول من الكاس. خرق الكاس مثلثة رجمية مستدقة الى قرينة اقصر منها. قاعدة الخويطات غير مسننة - حزيران - بين مارسابا وبحر لوط * الاوراق مستدقة الى شبه رجلة. البويضات ٨ - ١٠ على كل مشيمة

R. Billardieri, Jaub. et. Sp. ٤. ملاح بليارديري ق. امس. الفروع عنقودية.

الاوراق بيضية حادة والباطية منها مفردة والاوراق الفروع الزهرية خطية قصيرة. الفلوس حادة اطول من الكاس منفردة. خرق الكاس منفردة بيضية ذالية مدببة. الخويطات شرافية القاعدة - الصيف - بادية سورية

الطرفاء TAMARIX, L.

السيلات والثلثات ٤ - ٦. الاسدية ٤ - ١٠ مندغمة في قرص غددي شرافي والخويطات

مستقلة. الافلام ٣ - ٥ واحياناً قصيرة جداً. الجيب ذو غرقة ١ والمصاريع ٢ - ٤ والمشيمات ضخمة من الاسفل مستدقة من الاعلى. البنور منتهية بمنقار ذي شراية من قاعدته - شجيرات فروعها ساقطة اوراقها صغيرة حشفية ازهارها خنثوية ونادراً ثنائية المسكن

* الراسيات باكرة جانبية ناشئة من الفروع المحولة او المعبرة قبل الفروع الجديدة الحاملة الاوراق الجديدة او معها

T. Syriaca ١ macrantha ٢ Fieldii ٣ tetragyna ٤ tetrandra ٥ Jordanis ٦

* * الراسيات ناشئة من الخرايع الورقية مرتبة عناقيد انتهائية

T. Pallasii ٧ Nilotica ٨ mannifera ٩ arborea ١٠ articulata ١١ amplexicaulis ١٢

passerinoides ١٣ macrocarpa ١٤

T. Syriaca, Boiss. ١ . الطرفاء السورية ١ املس اخضر. الاوراق جالسة رحيمة مبيضة

القمه. الراسيات قصيرة الزناد مسترسلة. الازهار خماسية الاغلفة. الزنيدات اقصر من الفلوس والكاس.

البتلات بيضية قبيعية منتصبه. الاسدية ٦ - ٨ مندمجة بين غديئات القرص التوائمة. الاقلام ٢ - ٤

نصف المبيض طولاً - الربيع - وادي الاولي بقرب صيدا

T. macrantha, Post. ٢ . الطرفاء الكبرى الزهر ٢ املس اخضر. اوراق الفروع

مستطيلة واوراق الخرايع مستطيلة رحيمة عريضة القاعدة. الراسيات فضحة ٢١٠ متر طولاً ذات زناد.

الازهار ٢٠٠٣ متر عرضاً. الفلوس غشائية مستطيلة خطية اطول من الزهور منقطة اخيراً. الزنيدات

كالكاس طولاً. البتلات بيضية مقلوبة. الاثنيات سرحاء. السبات جالسة - الربيع - حاران بقرب

دمشق. خان منية

T. Fieldii, Post. ٣ . طرفاء فيلد ٣ املس مستغير. اوراق الفروع الاولى مستطيلة

مستدقة القبة. اوراق الخرايع رحيمة مدببة عريضة القاعدة. الراسيات ٢١٠ متر طولاً ٢٠٠٥ عرضاً

ذات زناد. الازهار نصف ازهار النوع السابق ذكره مجبهاً. الفلوس غشائية مثل الازهار طولاً مستطيلة

خطية. الزنيدات اقصر قليلاً من الكاس. البتلات بيضية مقلوبة. الاثنيات سرحاء - الربيع - وادي

المولج في بادية التيه

T. tetragyna, Ehr. ٤ . الطرفاء الرباعية الاقلام ٤ مستغير املس. الاوراق عريضة

القاعدة رحيمة ملساء الحوافي. الراسيات مسترسلة ذات زناد طويلة. الفلوس غشائية اقصر من الزهرة.

الزنيدات مثل الكاس طولاً. البتلات بيضية مقلوبة منفرجة. الاسدية مندمجة في فصوص القرص.

الاقلام ٤ متحدة القاعدة ملووية نصف المبيض طولاً - الربيع - مستنقعات ملححة في بحيرة مصر وبادية

مصر واثنية

Meyeri, Boiss. ب . ماير. الاوراق اكبر ما في الرمز قلبية القاعدة تقريباً. الفلوس مثل

الزهرة طولاً وغالباً منعكسة - النجوم

T. tetrandra, Pall. ٥ . الطرفاء الرباعية الاسدية ٥ اخضر املس. الفشر اسود.

الأوراق رحيمة حادة وحافنها غضروفية. الراسيات قصيرة الزناد. الفلوس مستطيلة خطية أطول من الزندة والكأس. البتلات اهلليجية مستطيلة منتصبة مستمرة مدة. الانثيرات ذات حجات قصيرة. الاقلام دبوسية - الربيع - الشريعة

T. Jordanis, Boiss. ٦. طرفاء الاردن ث املس مستغبر. الاوراق معانقة النصف بيضية نايبة غشائية القبة. الراسيات مسترسلة ذات زناد طويلة. الزنديات مثل الكأس طولاً أقصر من الفلوس والفلوس رحيمة حادة. البتلات بيضية اهلليجية منتصبة. فصوص القرص ٥ مخرومة. الخويطات خطية ناشئة من خنجان القرص. الانثيرات مرآسة. الاقلام ٣ دبوسية نصف المبيض طولاً تقريباً - الربيع - ارباب الاردن

T. Pallasii, Desv. ٧. طرفاء بالاس ث املس مستغبر. الاوراق معانقة النصف بيضية او ذالية قلبية حادة. الراسيات مرتبة عناقيد متسعة. الفلوس مستطيلة حادة أطول من الزنديات والزنديات قصيرة. البتلات بيضية مقلوبة مخرفة متغامزة مستمرة الى حين الإثمار. فصوص القرص ٥ مخرومة او ذات فصيصين. الخويطات خطية مندغمة بين الفصوص. الاقلام دبوسية نصف المبيض طولاً - الربيع - شواطىء سورية. الحولة

Smyrnensis, Boiss. ب. الازمهرية. مخضر. الراسيات قصيرة متراكبة - شواطىء سورية. وهو غالباً نجمة لاتعلو أكثر من قامة الانسان **Tigrensis, Bunge.** ت. الدجلية. اغبر. الازهار صغيرة. الفروع والراسيات نحيلة جداً - دمشق. شمالي بحر لوط

campanulata, Post. ث. الجرسية. الازهار كبيرة جرسية او فنجانية - بيروت **densa, Post.** ج. الكثيفة. مستغبر. العنود كثيف جداً. الفروع غليظة - ماردين **T. Nilotica, Ehr.** ٨. الطرفاء النيلية ث املس مستغبر واخضر. الاوراق معانقة النصف بيضية او ذالية قلبية حادة منفرجة قليلاً. الراسيات طويلة عنقودية مسترسلة. الزنديات أقصر من الكأس والفلوس. البتلات سريعة السقوط بيضية مقلوبة مستطيلة. الخويطات خطية القاعدة مندغمة في قرص متساوي الشرافات العشر تقريباً. الانثيرات قلبية راسية. الاقلام بيضية مقلوبة نصف المبيض طولاً - الربيع - وادي النيل

T. mannifera, Ehr. ٩. الطرفاء الحاملة المن ث املس اغبر. الخراعيب يابسة. الاوراق معانقة النصف بيضية ذالية حادة. الراسيات قصيرة مندحمة منفرجة. الزنديات أطول من الكأس أقصر من الفلوس والفلوس حادة. البتلات سريعة السقوط بيضية مقلوبة مستطيلة مستدقة القاعدة.

فصوص النرص ٥ مخرومة. الخويطات متمعة القاعدة. الاقلام ٣ بيضية مقلوبة ثلث المبيض طولاً -
الربيع - بادية التيه وسينا ومصر

١٠. *T. arborea*, B'ge. الطرفاء الشجرية ث املس مستغبر. الخراغيب متخفة. الاوراق
معانقة النصف بيضية ذالية حادة. الراسيات قصيرة مسترسلة. الزنيدات مثل الكاس طولاً اقصر من
الفلوس والفلوس حادة. الپتلات سريعة السقوط مستطيلة متغامزة. الخويطات متمعة القاعدة مندغمة
في زوايا النرص. الاثنيات راسية. الاقلام بيضية مقلوبة مستطيلة نصف المبيض طولاً - الربيع -
مصر. وربما هذه الانواع الثلاثة نباتات نوع واحد

١١. *T. articulata*, Vahl. الطرفاء المفصلة (العبل) ث املس اغبر. الاوراق غمدية
قصيرة المحبة. الراسيات عنقودية قصيرة الزناد غمدية مندغمة. الفلوس غمدية اقصر من الزهرة والزهرة
جالسة تقريباً. الپتلات خطية مستطيلة متغامزة منفردة النبة. الخويطات خيطية مندغمة في خنجان
النرص العشرة. الاقلام ٣ بيضية مقلوبة نصف المبيض طولاً - الربيع - مصر. بادية التيه. عين موسى
- شجرة علوها ٥ متر الى ٨ فروعها مدلاة غمدية تظهر عارية لصغر الاوراق وبندرها زهارها

١٢. *T. amplexicaulis*, Ehr. الطرفاء المعانقة الساق ث املس اغبر. الاوراق ذات
غرزات ومعانقة الساق ذالية قلبية. الراسيات انتباهية عنقودية مندغمة متصبية. الزنيدات قصيرة جداً.
الفلوس مثل الكاس طولاً. الپتلات اهليجية. فصوص النرص ١٠ منتهية بالخويطات. الاثنيات راسية.
الاقلام نصف المبيض طولاً. المحجب ٢٠٠٣ متر طولاً - الربيع - الواحة الكبرى في الصحراء

١٣. *T. passerinoides*, Del. الطرفاء الشبيهة بالپاسرينا ث املس اغبر. الاوراق
ذات غرزات ومعانقة تقريباً قلبية. الراسيات سنبلية. الزنيدات نصف الكاس طولاً اقصر من الفلوس.
الپتلات بيضية اهليجية. فصوص النرص ١٠ - ١٣ منتهية بخويطات. الاثنيات راسية. الاقلام قصيرة
او مفقودة. المحجب ٢٠٠٤ متر الى ٢٠٠٦ طولاً - الربيع - الواحة الكبرى في الصحراء

١٤. *T. macrocarpa*, Bunge. الطرفاء الكبيرة الثمرة ث املس مخضر او مستغبر.
الاوراق ذات غرزات ومعانقة النصف قلبية. الراسيات مستطيلة مسترسلة. الزنيدات مثل الكاس
وايضاً مثل الفلوس طولاً او اطول منها. الازهار كبيرة ٥٠٠ متر عرضاً. الپتلات بيضية اهليجية.
فصوص النرص ١٠ منتهية باسدية. الاثنيات قصيرة الرؤوس. الاقلام قصيرة. المحجب ١٠١ متر
طولاً او اطول - الربيع - عين حوارة في بادية سينا. مصر

الرتبة التاسعة عشرة الألاتينية ELATINEÆ.

السپلات ٢-٥ مترآكة . السپلات مندغمة تحت المبيض مترآكة . الاسدية مندغمة تحت المبيض مستقلة مثل السپلات عددآ اوضعفها . المبيض مستقل ذو غريفات واقلام كالسپلات عددآ . السهات راسية . الغريفات كثيرة البويضات مندغمة في المحور . الجيب منشق على الحواجز والمحور مشبي مسمر - اعشاب مائة اوراقها غالبآ ذات ذنبات

١ الألاتينة ELATINE, L.

اغلفة الازهار ٣-٤ في الصف . السپلات غشائية عادمة الاضلاع . المبيض كروي . الجيب غشائي - اعشاب صغيرة مائة لمسا اوراقها متفالبة ازهارها ابطية منفردة صغيرة بلا فلوس *E. campylosperma*, Seub. الألاتينة المنحنية البذر ٥ الاوراق بيضية مستطيلة اطول من رجليها . الزناد اطول من الورقة . الازهار راعية الاغلفة ذات ٨ اسدية - الربيع - مستنقعات يافا . مصر

٢ البركيا BERGIA, L.

الازهار خماسية الاغلفة . السپلات عشبية مضلعة الى منتصفها . المبيض بيضي . الجيب قشري - اعشاب او اشج اوراقها متفالبة ازهارها في باقات ابطية ذات فيلسات *B. aquatica*, Roxb. ١ البركيا المائية ٥ املس . الاوراق رحيمة مسننة مستدقة الى رجيلة

شكل ٦٩ ب



ب . ورقتان من البركيا المائية في ابطيها باقتان من الازهار . ت . زهرة . ث . الكاس . ج . المبيض . ح . البذور على جميعها الطبيعي . خ . احدى البذور مكبرة

قصيرة . النسيات كثيرة الازهار اقصر كثيرا من الاوراق . الاسدية ٨-١٠ . البذور اسطوانية - الربيع - مزارع الارز في بحيرة مصر

شكل ٧٠



ب ت



ج ث


٣ البركيا النجمية *B. suffruticosa*, Del.

زغبية غددي. الفروع متصاعدة مشبكة. الاوراق مستطيلة
رحمية مسننة. القبيات قليلة الازهار. الاسدية ١٠. البزور مستطيلة
ملساء - الربيع - رمال ارض الصعيد

الرتبة العشرون الهيريكية. HYPERICINEÆ.

الازهار قياسية خشوية. الكاس ذات ٥ نقاسم متراكبة في
النصف. البتلات مغلما عدداً متراكبة او مبرومة. الاسدية غير ث. المبيض ج. ذلك مكبر مشقوق عرضاً
محدودة ذات ٣ خوات الى ٥ عند قاعدتها ولا نثرات متقلبة. المبيض مستغل مركب في الاصل من ٣

شكل ٧١



ت

ب

ث

ب. قبة من الهيريكيم المتقرب ترى في الزهر ثلث خوات من الاسدية والنقط السود على البتلات. ت. المدقة
الثلاثية الغرقات والاقلام. ث. المبيض مفتوح

ثميرات الى ٥ واما ان يكون ذو غرقة واحدة او ٣ غرقات الى ٥ اكثر او اقل كالأ. البويضات متعددة
او قليلة. الثمر جيب ينشق على الحواجر - اعشاب اولنج اوراقها متقابلة ونادراً دوائية واجزاء الاوراق
منقطة نقطاً شفافه وسوداً

١ التريادينيا *TRIADENIA*, Spach.

وجه البتلات مجهز بمعلقة قبيية. الاسدية ذات ٣ خوات وقواعد الخوات قدية تترادف بغديلات
تحت المبيض. الجيب ذو ٣ غرقات - النجم كثيرة النروع ملساء غبراء اوراقها صغيرة لحمية ذات نقوط

شفافة ازهارها صغيرة سبلانها كالة بلا غديدات

T. Egyptiaca, L. . التريادينيا المصرية ٣ الاوراق اهليلجية حادة . الازهار ابطية

منفردة تقريباً . السبلات بيضة كالة وهي والبتلات مستهرة . الاقلام ثلث المبيض طولاً متضمنة في الكاس - اول الصيف - مصر

T. Russeggeri, Fenzl. ٢ . تريادينيا روسيكر ٣ الاوراق مستطيلة ملوقة كالة

مستدقة القاعدة . الاباط باقية . الازهار مرتبة في قبيبات انتهائية . السبلات مستطيلة خطية حادة وهي والبتلات وقتية . الاقلام ثلث المبيض طولاً - حريران - السويدية . السلوقية

٢ الهيريكم **HYPERICUM, L.**

البتلات عريانة القاعدة . الاسدية ذات ٢ خوات الى ٥ عند قواعدها اوتادراً ذات خوة ١ .
الغديدات تحت المبيض مفنودة - اعشاب معمرة او نجمات او نجم ازهارها صفراء
* الاسدية ذات ٥ خوات

H. hircinum. ١

** الاسدية ذات ٢ خوات

† انجم او نجميات

II. cardiophyllum ٢ rupestre ٢ nanum ٤ serpyllifolium ٥ cuneatum ٦
tortuosum ٧

† † اعشاب معمرة خشبية القاعدة

† النجيب مضلع طولاً

§ البنور حلمية

H. scabrum ٨ læve ٩ hyssopifolium ١٠ Kotschyanum ١١ helianthemoides

§ § البنور شهديدة او ملساء

II. adenocladum ١٢ retusum ١٤ Amanum ١٥ spectabile ١٦ tetrapterum ١٧
crispum ١٨ lanuginosum ١٩ Sinaicum ٢٠

† † تقاسم الجيب ذات ضلع واحد الى ٢ اضلاع وبجانها حويصلات بيضة منحرفة

H. perforatum ٢١

† † † الجيب كثيف الفواقع . البنور خطية متموجة

H. Cassium ٢٢

١. *H. hircinum*, L. . الهيبريك المعزي (دموع البمين) ٥ حال (من ٢ إلى ٣ متر)

المس. الفروع متصبية مربعة. الاوراق مستطيلة مستدقة القبة كالة جالسة. القيمات انتهائية قليلة الازهار. السبلات رحيمة حادة كاملة غير منقطعة ساقطة. الاسدية اطول من التويج. الاقلام ستة اضعاف البيض طولاً اطول من الثلاث. الجيب ينشق من قنوه - الصيف - جبال سورية وساحلها البحري - رائحة كراتحة المعز

٢. *H. cardiophyllum*, Boiss. الهيبريك القلبي الورق ٥ المس. الاوراق قليلة القاعدة

بيضية كالة كبيرة (٢٠٠ متر طولاً) قليلة النفط شفافها. الثنيات انتهائية قصيرة الزناد. الازهار متراكبة. السبلات بيضية كاملة بلا غديدات. الثلاث مستمرة الى حين الإثمار - الصيف - صخور عينتاب الى انطاكية وإلى الشرق

٣. *H. rupestre*, Jaub. et Sp. الهيبريك الصخري ٥ المس. الاوراق ٢٠١ متر الى ٢٠٢ طولاً

مستديرة القاعدة او مستدقتها بيضية او بيضية مستطيلة او اهليجية كالة او مخرومة منقطعة قطعاً شفافة من الاعلى وغبراء من الاسفل. القيمات ذات ٩ ازهار الى ١٥. السبلات بيضية كالة حوافها ذات غديدات سود جالسة - الصيف - الصخور بقرب بشري

٤. *H. nanum*, Poir. الهيبريك القزم ٥ المس. الاوراق مستديرة او بيضية صغيرة (٢٠١

متر) قليلة النفط شفافها. القيمات انتهائية ذات ٢ ازهار الى ٩. السبلات مستطيلة رحيمة مدببة بلا غديدات - الصيف - جدران الشوامق تحت جرود لبنان والجبل الشرقي

٥. *prostratum*, Boiss. ب. الملقى. الفروع قصيرة ملازمة الصفر. الاوراق اصغر مما في الرمز

وادي بركة قرب فيجة

٥. *H. scryphifolium*, L. الهيبريك السريجلي الورق ٥ من فصاعداً علواً المس.

الفروع طويلة مستقيمة. الاوراق صغيرة (٢٠٠ متر) قصيرة الرجيلات اهليجية كبيرة النفط غبراء من الاسفل. القيمات متراكبة عند قم الفروع. السبلات مستطيلة كالة ربع التويج طولاً ذات غديدات جالسة سوداء على حوافها - الصيف - كثير الوجود في سورية

٦. *H. cuneatum*, Poir. الهيبريك الاسفني ٥ قزم المس. الفروع قصبة محبرة.

الاوراق اسفنية القاعدة بيضية او بيضية مثقوبة كاملة او جونية قليلاً غبراء من الاسفل واحياناً منقطعة نقوطاً سوداً قليلة الازهار مرتبة في راسيمات قصيرة ورقية. السبلات خطية رحيمة اقل من نصف التويج طولاً كاملة او ذات بعض الغديدات السود على الحوافي - الصيف - صخور الجبل الاقرب ولبنان

وبقرب الشاطئ الى بيروت

II. tortuosum, Post. ٧ . الهيبيريك المتعرج ٥ قدم امس . الجذوع خشبية والفروع

متعرجة مشبكة سنجابية . الاوراق جالسة اهليجية كاملة محبرة الاوردة ومنطة نفوطاً سوداً من الاسفل .
الازهار ٥ - ١٠ في قممات انتهائية مسترسلة والسيلات رحيمة بارزة الاعصاب ثلث التويج طولاً - الربع
- قلدون شمالي دمشق

II. scabrum, L. ٨ . الهيبيريك المحرش 2٤ السوق كثيرة غدية حرسه حمر . الاوراق

جالسة خطية او مستطيلة كبيرة النقط شفافة . القممات مجمعة على هيئة كورنب مركب مندمج . خرق
الكاس ثلث التويج طولاً بيضبة او مستطيلة كاملة او مقضومة بلا غديدات او ذات غديدات سوداء
جالسة . الجيب مدبب ٢ اضعا الكاس طولاً وفي كل جراب منه بزرتان - الصيف - من عيتاب
الى تحت جرود لبنان والجبل الشرقي

II. laeve, Boiss. et. Haussk. ٩ . الهيبيريك الاصوح 2٤ امس كثير السوق سرخاؤها .

الاوراق جالسة ملتفة الحوافي خطية شفافة النقط . القممات متراكمة في عنقود مندمج كورني . الفلوس
مستطيلة خطية ذات غديدات سوداء . خرق الكاس اهليجية مستطيلة كاله حوافها ذات غديدات
جالسة سوداء . الجيب * * * - الصيف - تلول كلسية في شمالي سورية

P. hyssopifolium, Vill. ١٠ . الهيبيريك الزوفوي الورق 2٤ امس . السوق عالية

ذات خطين مرتفعين . الاوراق جالسة سنجابية تقريباً شفافة النقط مستطيلة او خطية كاله ملتفة الحوافي .
القممات ذات زناد مرنة عنقوداً ضيقاً . الفلوس خطية كاملة . خرق الكاس بيضبة مستطيلة بلا غديدات
او غديدات الحوافي . الجيب ٢ اضعا الكاس طولاً الى ٤ يضي مستطيلي مدبب - الصيف -

Lydium, Boiss. ب . الليدي . اخضر باهت . الاوراق ضيقة . الپنلات ٢ اضعا

الكاس الى ٤ طولاً - جبل لكاه الى لبنان والجبل الشرقي

latifolium, Boiss. ت . العريض الورق . الاوراق الساقية ٢٠٠٢ متر عرضاً الى ٢٠٠٥ .

الپنلات ٤ اضعا الكاس الى ٥ طولاً - جرد حمرون

III. Kotschyannun, Boiss. ١١ . الهيبيريك الكوتشياني 2٤ منفرد الخبل مستشيب .

الاوراق مستطيلة متوازية الاعصاب متعددها وفي الخراعيب الابطية متراكمة خطية . القممات ذات
زناد وقيلة الازهار عنقودية قصيرة . خرق الكاس سدس التويج طولاً بيضبة كاله قمتها ذات غديدات
سوداء . الجيب مستطيلي ثلثة اضعا الكاس طولاً - الصيف - تلول كلسية قرب عيتاب

III. helianthemoides, Spach. ١٢ . الهيبيريك الشبيه بالهلينا نهم 2٤ امس . السوق

ذات خطين مرتفعين. الأوراق شفاة النفوط خطية اسطوانية ملتفة الحوافي . القميّات ذات زناد مرتبة على هيئة عناقيد طويلة . الفلوس مستطيلة خطية كاملة او قليلة الغديّات . خرق الكاس ثلث التويج طولاً و اقل من ذلك بيضية مستطيلة كثيفة السنينات غديّتها . الجيب ضعفا الكاس طولاً و أكثر يضي مدبب - الصيف - جبال سورية من صوف ضاغ الى لبنان و الجبل الشرقي و البقاع و شرقيها elongatum, Post. ب. المطول . الساق عال متباعد الأوراق . الأزهار كبيرة - زحلة montanum, Post. ت. المجبلي . منخفض . أوراق الفروع العاقرة متراكمة قصيرة - جرود لبنان و تحت جرود

١٢. *H. adenocladum*, Boiss. المهيريكم الغديّ الفروع 24 السوق ٢٠٨ مترالى ٢١. علوّ بسيطة كثيفة الغديّات الشفاة بارزتها . الأوراق شفاة النفوط مستطيلة او خطية ملتفة الحوافي . القميّات قصيرة الزناد متراكمة الأزهار و العنقود قصير يضي . الفلوس غديّية . خرق الكاس ثلث التويج طولاً مستطيلة رحيمة كثيفة الغديّات على حافاتهما . الجيب * * * - الصيف - جرود جبل اللكام

١٤. *H. retusum*, Auch. المهيريكم المخروم 24 املس . السوق ٢٣٠ متر علوّ سوداء النفوط ذات خطين مرتفعين . الأوراق قليلة النفوط الشفاة و السود خطية ملتفة الحوافي مجذومة القمة او مخرومة . القميّات مرتبة عناقيد و الأزهار الجانية جالسة . خرق الكاس اقل من نصف التويج طولاً مستطيلة كالة قليلة الغدد او عادمها . الجيب * * * - الصيف - عيتاب و شرقيها

١٥. *H. Amanum*, Boiss. المهيريكم اللكامي 24 املس مستغبر . السوق عالية بسيطة تقريباً بارزة الخطين . الأوراق جالسة يابسة قليلة النفوط شفاقتها مستطيلة رحيمة و العليا منها جالسة متصاغرة . القميّات مرتبة عنقوداً سهاقياً و الفلوس ذات سنيّات . خرق الكاس بيضية مقلوبة كالة ثلث الكاس طولاً كثيفة السنيّات الغديّة . الجيب اطول من الكاس يضي مدبب فجأة - الصيف - غابات جبل اللكام و الاقارع

١٦. *H. spectabile*, Jaub. et Gp. المهيريكم ذو المنظر 24 املس مستغبر . السوق عالية ذات خطين مرتفعين . الأوراق صفّانية تقريباً متحدة القاعدة قليلاً بيضية كالة و حافتها غسروفية ذات سنيّات . القميّات مرتبة عنقوداً مندمجاً . خرق الكاس ثلث التويج طولاً بيضية مستطيلة كثيفة السنيّات غديّتها . الجيب * * * - الصيف - عيتاب و شمالها

١٧. *H. tetrapterum*, Fries. المهيريكم الرباعي الاجنحة 24 املس ستولوني القاعدة . السوق ذات ٤ اجنحة . الأوراق ذات نفوط شفاة و سوداء و جيّتها معانقة و الساقية منها بيضية مستطيلة .

القميات مرتبة عنقوداً كورنياً . خرق الكاس نصف التويج طولاً رحمة كاملة حادة بلا غديدات -
الصف - لبنان والجبل الشرقي

anagallidifolium, Boiss. ب. الانا كالي الورق . مسرسل . الاوراق قصيرة - لبنان .

طرابلس . صيدا

H. crispum, L. ١٨ . المهيريكم القهم 24 املس مستغبر هرجي الهيئة . الفروع كثيفة

متصالبة يابسة متشعبة . الاوراق قليلة القاعدة رحمة متبوجة الحافة متصاعدة ذات نقوط شفافة وسوداء .
القميات على اطراف الفروع ذات زهرة الى ٥ . السبلات بيضية او مستطيلة كاملة او ذات سنيئات
بلا غديدات . الثلاث 4 اضعايف الكاس طولاً . الجيب يضي ثلثة اضعايف الكاس طولاً - الربيع
والصيف - اماكن متروكة وكروم في سورية وفلسطين وشرقي الاردن

H. lanuginosum, Lam. ١٩ . المهيريكم الصوفي 24 مستشيب صوفي الا التزهر .

السوق عالية . الاوراق قليلة النقوط الشفافة ذات نقوط سود على الحوافي قليلة معاينة القاعدة مستطيلة
او مستطيلة رحمة والعليا مدبية . العنود عريض . خرق الكاس اقل من نصف التويج طولاً عصبية
بيضية او مستطيلة بلا نقوط سود الا ان الحافة كثيفة السنيئات غديدي بها . حوافي الثلاث غير غديدية -
اول الصيف - سورية وفلسطين الى علو ١٠٠٠ متر

majus, Post. ب. الاكبر . الاوراق المتوسطة ٢٠٢ متر الى ٢٠٤ طولاً و ٢٠٢ عرضاً . بيروت

H. sinatum, Hochst. ٢٠ . المهيريكم السينوي 24 خملي مستشيب . السوق متعددة

متشعبة او متصاعدة . الاوراق قليلة معاينة القاعدة قليلاً مستطيلة كالة (٢٠٠٥ متر طولاً) ذات نقوط
شفافة . فروع القمية الانتهاية قصيرة متشعبة . خرق الكاس ملساء بيضية مستطيلة غديدية الحافة .
الثلاث ثلثة اضعايف الكاس طولاً ذات غديدات سوداء على حوافها - الصف - وادي الاربعين
والبستان في صيدا

H. perforatum, L. ٢١ . المهيريكم المثقوب 24 اخضر املس . الساق عال ذو خطين

كورني عنقودي . الاوراق جالسة كثيفة النقط الشفافة والسود اهليجية او خطية وكثيراً ما تكون ملثثة
الحوافي . خرق الكاس نصف التويج طولاً رحمة حادة كاملة بلا غديدات ونقوط سود - الصف -
سواحل سورية وجبالها

H. Cassium, Boiss. ٢٢ . المهيريكم الاقروعي 24 املس اغبر . السوق عالية . الاوراق

يابسة غير منتظمة قليلة معاينة القاعدة بيضية مستطيلة والعليا حادة . القميات مرتبة كورنياً تسخيل
بعد التزهر الى راسيات . السبلات خطية رحمة وفي الاثمار منعقبة قليلة النقوط السود وحوافها ذات

سنيئات غليدية متباعدة . الجيب مستطيلي اسطواني ذو ٢ اثال عميقة والاجرة كبيرة كروية - الصيف
- جبل الكام والافرع

الرتبة الحادية والعشرون الخبازية MALVACEÆ.

الازهار قياسية خنثوية . خرق الكاس مصراعية ٥ ونادراً ٣-٤ . البتلات ٥ مندغة تحت المبيض
متحدة بالعمود السدوي . الخربطات متحدة بانبوبة تحيط بالقلم . الانثيرات ذات غريفة واحدة تنشق بفمحة
مستعرضة . القرص مفقود . المبيض ذو غريفة واحدة او عدة غريرات ولكل منها بويضة او أكثر . القلم
متفرع من الاعلى . الثمر مؤلف من ثمرات راسية او دوائية تنفصل اخيراً من المحور او جيب كثير الغريرات .
الالبوم قليل او مفقود - اعشاب او شج ذات عصار لزج صفي

شكل ٧٢



ب . زهرة من المخططي الخبزي . ت . واحدة من انثيرات الكلتوية الشكل مكبرة . ث . المدقة مكبرة . ج . جيب
من الهيسكس المسكي تظهر فيه الكاس الخالدة والظرف . ح . ذلك الجيب بعد انقسامه الى اجرتين الاصلية . خ .
اسدية نوع من الخبازي متحدة في انبوبة تحيط بالقلم

* جميع فروع الانبوبة السدوية حاملة انثيرات

١. *Althaea* . الفليسات ٦-٩ . الثمرات بلا زائدة من الانسية

٢. *Alcea* . الفليسات ٦-٩ . الثمرات ذات زائدة من الانسية

٣. *Lavatera* . الفليسات متحدة في ظرف ثلاثي الخرق

٤. *Malva* . الفليسات ٢ مستقلة ونادراً ٣ . الثمرات غير متفتحة

٥. *Malvella* . الفليسات ٢ مستقلة . الثمرات متفتحة

٦. *Abutilon* . الفليسات مفقودة

* * الألبية السديوية حاملة الثمرات من الوحشية مجذومة الثبة أو خماسية الأسنان
Hibiscus. ٧. النليسات متعددة ضيقة . الجيب غشائي أو مخطياني

١ الألبيا ALTHEA, L.

النليسات ٦-٩ متحدة القاعة . الكاس ذات ٥ خرق . فروع القلم خطية ساعها طويلة ممتدة على وجهها الأسى . الثمرات دولاية مرتبة حول فئار أقصر منها مفلطحة الظهر غير منشنة ذات غرقة واحدة - أعشاب سنوية أو معمرة أزهارها صغيرة

١. A. hirsuta. الألبيا العنائية ٥ ذو شعر طويل بسيط . الساق متفرع من القاعة . الأوراق السفلى كلوية مستديرة شرافية مضخمة النصوص والعليا كفية ذات ٣ فصوص الى ٥ مستطيلة منقوصة شرافية . الزناد منفردة احادية الأزهار أطول من الأوراق . خرق الظرف خطية رمجية أقصر من الكاس . الثمرات ملساء مستعرضة الغضون كالة الحافة - الربيع - مزارع سورية وفلسطين وشرقها
٢. A. Ludwigii, L. الشيا لُدويك ٥ ذو شعر حزمي . الأوراق مستطيلة مستديرة والسفلى منها شرافية والبقي مفصصة أو مفصلة وقطعها ٢-٥ اسفنية فتمها ذات أسنان كالة . الزناد متراكبة في الأباط قصيرة . الظرف ويري وخرقة خطية هلبة . الثمرات ملساء مغطنة الظهر حادة الحوافي - الربيع - مزارع بادية التيه ومصر وشرقها

٣. A. officinalis, L. الألبيا المعزنية 2٤ الساق عال . الأوراق لبادية ناعمة قليلة أو بيضية المحيط غير متساوية الأسنان والسفلى منها ذات ٥ فصوص مضخمة والعليا ذات ٣ فصوص . الزناد ابطية أقصر من الأوراق ذات زهرة أو أكثر . الظرف لبادي وخرقة ٢-١٠ خطية رمجية نصف الكاس طولاً . الثمرات لبادية مسترخية كالة الحافة - الصيف - من عينتاب الى دمشق وإلى الشرق

٤. A. cannabina, L. الألبيا القنبية 2٤ الساق عال . الأوراق ذات زغب كوكبي خضراء والسفلى منها كنية التفصيل والبقي كنية محروقة خرقها ٣ أو ٥ قصيرة الرجالات مستطيلة رمجية كبيرة الأسنان . الزناد ١-٢ ابطية ضعف الورقة طولاً أو أكثر . خرق الظرف ٧-٨ رمجية أقصر من الكاس قليلاً . الثمرات ملساء مغطنة الظهر مثله قليلاً - الصيف - من عينتاب الى جبل اللكام وإلى الشرق

٢ المخطي ALCEA, L.

مثل المتقدم ذكره إلا أن الثمرات تكاد تنفصل الى غريفتين مجازفتي والجزء العلوي صغير خال - أعشاب معمرة كبيرة الأزهار وغالباً عالية الساق

* الثميرات بلا ارجحة

A. acaulis ١ | Palæstina ٢ | rufescens ٣ | lavateræflora ٤ | setosa ٥ | striata ٦

Haussknechtii ٧ | foliosa ٨ | apterocarpa ٩

* * الثميرات مجنحة

A. Kurdica ١٠

A. acaulis, Cavan. ١. الخطي العادم الساق 2٤ لبادي سنجابي بلا ساق او ذوساق قصير حامل ازهار من قاعدته. الاوراق طويلة الرجالات كلوية او قلبية شرافية واحياناً ذات ٥ فصوص كالة. الزناد اقصر من الكاس. الظرف ثلث الكاس طولاً. الثلاث وردية باهتة. الثميرات ملساء مستعرضة الغضون. البزور كثيرة النفوط البثيرة - الربيع - حوافي المزارع في سورية وفلسطين

A. Palæstina, Post. ٢. الخطي الفلسطيني 2٤ لبادي ذوساق قصيرة. الاوراق طويلة الرجالات كلوية او قلبية عريضة شرافية. الزناد ضعفا الكاس طولاً او أكثر. الظرف ثلث الكاس طولاً. الثلاث ارجوانية ٣ اضعايف الكاس طولاً او مستطالة او ملساء ذات غضون ضخمة. البزور ملساء - الربيع - يتبين. سمخ جبل الكرمل

A. rufescens, Boiss. ٣. الخطي النحصر 2٤ قصير الباد شبره. مخفض متبرع من الاسفل الى فروع طويلة قليلة الاوراق من الاعلى. الاوراق قلبية مستديرة كالة الاله وص. الازهار جالسة تقريباً. الظرف ثلث الكاس طولاً. الثلاث صفراء. الثميرات لبادية مستعرضة اغضون وحوافيها ذات سنينات. البزور ملساء - الصيف - من حلب الى بعلبك وبتباس وشرقيها

A. lavateræflora, D. C. ٤. الخطي اللافتير 2٤ الزهر 2٤ الساق عال بسيط على الغالب. الاوراق طويلة الرجالات ملازمة اللباد والسفلى منها كفية مفصلة والقبية مفصصة قطعها ٣- ٥ ضيقة القاعدة مستطيلة كالة والفصوص غير قياسية شرافية. الازهار جالسة تقريباً. الظرف اقصر قليلاً من الكاس. الثميرات عنائية مغضنة الجانبيين ميزبة الظهر حادة الحواقي. البزور ذات نفوط بيضاء صغيرة - الصيف - مزارع سورية وفلسطين

glabrescens, Boiss. ب. المستطلي. السوق ملساء والاوراق قليلة الشعر - مصر
A. setosa, Poiss. ٥. الخطي الهلبي 2٤ الساق عال بسيط ملبس كالرجالات ايضاً جليب منعكف. الاوراق مستديرة قلبية ذات ٥ فصوص كالة الى ٧. اعلى الساق قليل الاوراق. الزناد كالظرف طولاً. الظرف اقصر قليلاً من الكاس. الازهارات عنائية الظهر - الربيع والصيف - الكرمل. مستطبة
A. striata, D. C. ٦. الخطي المنقط 2٤ قصير اللباد. الساق عال. الاوراق مستديرة

قلبية ذات ٣ فصوص الى ٥ مضحلة شرافية. الزناد اقصر من الكاس. الظرف ثلث الكاس طولاً. الثمرات ملساء مغضنة قصيرة الغطاء على منتصف الظهر حادة الحوافي. البزور بثرية منقطة - وادي فيران في بادية سينا

A. Haussknechtii, Boiss. ٧ خطي هو صكتنجت 24 اخضر باهت قصير اللباد حرش.

المساق مستطيل الى راسم وركي. الاوراق قلبية مستديرة كالة الفصوص. الزناد السفلي مثل الكاس طولاً والعليا قصيرة. خرق الظرف مثلثة ثلث الكاس طولاً. الثمرات * * * - شمالي سورية

A. foliosa, Post. ٨ الخطي الورقي 24 المساق مستطيل صوفي. الراسم وركي. الاوراق

مستديرة ذات فصوص كالة شرافية. الازهار جالسة مرتبة في راسم وركي. الظرف ثلث الكاس طولاً اواقل من ذلك. الثمرات ملساء مبرزة الظهر مغضنة عرضاً شديدة. البزور منقطة نقوطاً أيضاً - الربيع - قرب جسر الشيخ عياش شمالي طرابلس

A. apterocarpa, Fenzl. ٩ الخطي العادم الجناح 24 ملان اللباد مستشيب.

المساق عال بلا اوراق من الاعلى. الاوراق قلبية مستديرة ذات ٥ فصوص كالة. الزناد قصيرة. الظرف اقصر قليلاً من الكاس. الثمرات مغضنة مضحلة الميزاب كالة الحافة. البزور ملساء - الصيف - دير مار سركيس

A. Kurdica, Schlecht. ١٠ الخطي الكردي 24 قصير الغطاء لبادية. المساق عال نخيل.

الراسم غالباً متفرع عنقودي. الاوراق السفلى قلبية كوية ذات ٥ فصوص الى ٧ والزهرية متصاعدة كفية التنصص فصوصها خطية مستطيلة حادة الشرافات. الزناد اقصر من الكاس. الظرف ثلث الكاس طولاً. الثمرات عريضة الميزاب صوفية وجناحها غير مغضن. البزور كثيفة البثور يضاؤها مبرزة الظهر قليلاً - الصيف - الجبل الشرقي بقرب زبدانة

٢ اللافتيرا LAVATERA, L.

الفلسات ٣ متحدة في ظرف. خرق الكاس ٥. السمات طويلة موضوعة على الوجه الانسي من فروع القلم. الثمرات غير منشقة دلاية النظام حول فقار مخروطي او متسع - اعشاب او انجم شبيهة بالخجazy

L. Cretica, L. ١ اللافتيرا الاكرتية ٥ الشعر حري لببيدي. السوق حرشة. الاوراق

السفلى قلبية مستديرة ذات ٥ فصوص مضحلة الى ٧ والعليا ذات ٥ فصوص زاوية. الزناد حزيمة. الظرف اقصر من الكاس متنام حين الإثمار فصوصه منفصلة تقريباً منفرشة بيضية مثلثة الروغوس. الفقار قصير مخروطي. الثمرات ملساء اولبادية حرشة - الربيع - زارع سورية وفلسطين

٢ *L. punctata*, All. اللافتيرا المنقططة (أبه كوججي) ○ حرش ملازم العفاء حرمية
الساق منتصب متفرع. الاوراق السفلى كlobية شرافية والمتوسطة ذات ٣ حرق الى ٥ والعليا طبرية ورمحية
منعقة اخيرة. الزناد منفردة طويلة منفرجة. الظرف متحد تقريباً مثل الكاس طولاً متنامٍ فصوصه
مثلثة مدبة اذينية القاعدة. الفئار قليل الانثاق - الربيع - مزارع سورية وفلسطين
٣ *L. trimestris*, L. اللافتيرا ذات الثلاثة اشهر ○ عفائي او املس. الساق منتصب
متفرع. الاوراق السفلى كlobية شرافية والمتوسطة قلبية بيضية زاوية والعليا ذات ٣ فصوص. الزناد طويلة
منفردة. الظرف افصر من الكاس متنامٍ مشبك الورد فصوصه مثلثة حادة مسنة. الفئار متسع
على هيئة قرص يغطي الثمرات والثمار مغضنة - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

٤ الخبازي (الخبيزة) *MALVA*, L.

الفليسات ٢ او ٣ منفصلة. حرق الكاس ٥. فروع القلم خيطية والسمات طويلة موضوعة الى
جهتها الانسية. الثمرات غير منشقة دولاية حول فئار قصير مخروطي - اعشاب سنوية او محولة
* الزناد واحد او اثنان في الابطاط. الفليسات تحت الكاس ٢

M. Aegyptia ١

** الزناد حرمية في الابطاط. الفليسات تحت الكاس ٣

M. sylvestris ٢ *Nicaeensis* ٣ *rotundifolia* ٤ *parviflora* ٥ *oxyloba* ٦

١ *M. Aegyptia*, L. الخبازي المصرية ○ السوق متكنة مجهزة بشعر ملازم. الاوراق
مستديرة ثنائية التقسيم الكفي خرقها خطية قصيرة هدية. الزناد ذات زهرة الى ٢ وطول من الورقة.
الفليسات ٢ خطيان. حرق الكاس مثلثة مدبة اطول قليلاً من الظرف مثل التويج طولاً. التويج صغير -
الربيع - الجبل الايض في بادية سورية. بادية التيه

٢ *M. sylvestris*, L. الخبازي الاجبية ○ منفرج العفاء. الساق منتصب او متصاعد.
الاوراق قلبية مستديرة ذات ٥ فصوص كالة الى ٧. الزناد متصببة بعد سقوط الازهار. فصوص
الكاس متنامية مثلثة. الپتلات كبيرة ٤ اضعاف الكاس طولاً الى ٤ مفروضة والمخلب لحوي. الثمرات
ملساء مشبكة الغضون حادة الحوافي كاملتها - الربيع والصيف - جبال طرق سورية

٣ *M. Nicaeensis*, All. الخبازي النيكية ○ منتصب او منشتر عفائي كثر او قل. الاوراق
قلبية مستديرة ذات ٥ فصوص كالة الى ٧. الزناد متصببة بعد الزهر. الفليسات بيضية مستطيلة
كالة. حرق الكاس متنامية مثلثة. الپتلات ضعف الكاس طولاً مفروضة. الثمرات ملساء او عفائية

مشبكة الغضون حادة الحوافي كاملتها - اماكن عشبية وجوانب الطرق في سورية وفلسطين
 ٤. *M. rotundifolia*, L. الخبازي المستديرة الورق ⊙ ذو غطاء حرمب . السوق
 منشرة . الاوراق قليلة مستديرة مضحلة الفصوص شرافيتها . الزناد المثمرة منعقبة . الفليسات خطية
 حادة . فصوص الكاس متنامية مثلثة حادة . البتلات مفروضة ضعف الكاس طولاً او اقل من ذلك .
 الثمرات ليبيدية او لمساء حادة الحوافي كاملتها مشبكة الغضون - الربيع - جوانب الطرق . عام
 ٥. *M. parviflora*, L. الخبازي الصغيرة الزهر ⊙ غفائي او مستمسك منشرة . الاوراق
 قليلة مستديرة ذات ٥ فصوص مضحلة الى ٧ . الزناد مفرجة بعد الإثمار . الفليسات خطية ضيقة . الكاس
 المثمرة متنامية مستديرة الخرق حوميتها . البتلات مخرومة اطول قليلاً من الكاس . الثمرات غفائية او
 لمساء غضونها مشبكة حوافيها مرتفعة مصنعة - الربيع - جوانب الطرق في فلسطين وبادية سينا ومصر
 ٦. *M. oxyloba*, Boiss. الخبازي المحادة الفصوص ⊙ مستمسك منشرة . الخجان الاوراق
 ضيقة قطعاً ٢-٥ بيضية مقلوبة اسفينية منقسمة الى خرق ريمية حادة . الزناد قصيرة مفرجة في الثمر .
 الفليسات هلبية . فصوص الكاس متنامية بيضية مثلثة . البتلات مجذومة مخرومة اطول قليلاً من
 الكاس . الثمرات لمساء مستعرضة الغضون مرتفعة الحوافي مسننتها - الربيع - اماكن عشبية في سورية
 وفلسطين

٥ الخبيزة *MALVIELLA*, Jaub. et. Sp.

الفليسات ٢ مسننة . خرق الكاس ٥ . الاقلام منفصلة . السمات راسية دبوسية . الثمرات متفخمة
 غشائية غير منشقة غير متساوية الحجم . القمار قصير - عشبة معمرة
 ١. *M. Sherardiana*, L. الخبيزة الشرادية ٢٤ ليبيدي سنجاني . السوق متعددة
 مستنفة . الاوراق قليلة كلوية شرافية مجمدة مضحلة الفصوص . الزناد ابضية مفردة خطية اطول من
 الرجلة . الفليسات قصيرة هلبية . فصوص الكاس بيضية . البتلات ضعف الكاس طولاً - الربيع
 والصف - مزارع وجوانب الطرق في سورية وفلسطين

٦ الابوتيلون *ABUTILLON*, Gorta.

الفليسات مفقودة تقريباً . خرق الكاس ٥ . الاقلام متحدة . السمات راسية . غريبات المبيض ذات
 ٢ بويضات الى ٩ . الثمرات دولاية النظام عند النضج متحدة من قاعدتها او منفصلة من القمار - اشباب
 او نجم ازهارها صفراء
 ١. *A. punicococcinea*, Guill. et. Perr. الابوتيلون النجمي ذو خيلي مبيض متعصب انفرع .

الأوراق قلبية بيضيه شرافية أو كاملة. الزناد احادية الزهرة ذات منفصل أعلى متصفاً وهي أطول من الرحلة. الأزهار صغيرة. الشبريات ٨-١٠ خبيلة متحدة القاعدة - أول الصيف - صخور بادية سينا *A. muticum*, Del. ٣. الابوتيلون الاسمرح لبادي مبيض. الأوراق بيضيه مستديرة مدببة قلبية القاعدة شرافية. الزناد ذات منفصل قرب انتهائها وغالباً أقصر من الرحلة. الشبريات ٢٥ - ٣٠ غفائية منفصلة أخيراً من الفلار معلقة بعصبتها - الربيع - عين جدي. أرض الصعيد

٧ البامية *HIBISCUS*, L.

الفليسات متعددة وغالباً ضيقة. خرق الكاس ٥. فروع القلم ٥. السات رأسية متسعة. غريقات المبيض ٥ ذات ٢ بويضات أو أكثر. الحبيب غشائي أو سخنياني كثراو قل - اعشاب وانجم *H. ovalifolius*, Vahl. ١. البامية البيضاء الورق حش متفرق الشعر كوكبة. الأوراق صغيرة بيضيه كالة ذات اسنان حادة. الزناد العليا أطول من الرحلة. الفليسات هليية أقصر من الكاس. خرق الكاس غير المنتخفة مثثة مدببة. الأزهار صغيرة. البتلات ارجوانية بيضيه مقلوبة مستطيلة ثلثة اضعااف الكاس طولاً. البزور صوفية - الصيف - صخور سينا *H. Trionum*, L. ٣. بامية بنات نعش زغبي كثراو قل. الأوراق السفلى مستديرة غير منقسمة والبقية ذات ٢ اقسام إلى ٥ بيضيه مقلوبة مستطيلة كالة النصوص أو الاسنان. الفليسات هليية متعددة غفائية حرشة. الكاس متخفة في الإنغار عصبية غشائية خرقها مثثة. البتلات بيضيه مقلوبة ضعف الكاس طولاً صفراء ارجوانية القاعدة - الصيف - مزارع سورية ويزرع من هذا الجنس البامية المأكولة *H. esculentus*, L. والبامية القنبية *H. cannabinus*, L.

الرتبة الثانية والعشرون التيلية *TILIACEÆ*.

الأزهار قياسية خنثوية. السلات ٤-٥ مصراعية في التصيف. البتلات مثل السلات عدداً مندخمة حول قاعدة الفلار مهرومة متراكبة. الاسدية مندخمة في الفلار تحت المبيض غالباً غير محدودة العدد مستقلة أو ملتجة قليلاً والسفلى منها في ٥ خوات إلى ٦. الشبريات ذات غريقتين. المبيض مستقل كثير الغريقات والغريقات ذات برة أو أكثر على مشبات محورية. الثمر نووي أو عني غير منشق أو جيب تنشق مصارعة - اعشاب وانجم

الكرويا *GREWIA*, L.

السلات ٥ سخنيانية تقريباً. البتلات ٥ ذات سخ انسي قاعدتها مندخمة حول قاعدة الفلار والفلار

مرتفع كثرا وقل يحمل الاسدية على قته. الاسدية مستقلة. القلم مخزني. السمة ذات فصين الى ٤. الثمر اسرج نووي ذو فص ١ الى ٤- انجم ازهارها في قمبات ابضية
G. populifolia, Vahl. الكرويا الحورية الورق. الاوراق صغيرة قصيرة الرجلات
 يابسة مستديرة ابيضية مقلوبة حادة الاسنان كوكبية الزغب من الاسفل ثم ملساء. الزناد منفردة
 احادية الازهار اقصر من الورقة. السيلات خطية رحيمة زغبية اطول من الپتلات والپتلات خطية
 متشعبة. الثمر لماع - الصيف - بادية النيه

الملوخية. *CORCHORUS*, L.

السيلات ٤-٥. الپتلات ٤-٥ عريانة القاعدة. الاسدية متعددة ونادراً ضعف الپتلات عدداً.
 القلم قصير. السمة مجوفة شرافية. الجيب خرنوبي عريان غريفة ٢-٥ مشقة على المصاريع كثيرة
 البزور - اعشاب ازهارها صفراء

* السيلات والپتلات ٥. الاسدية متعددة

١. *C. trilobularis*, L. الملوخية الثلاثية الغريفات ⊙ حرش. الاوراق قصيرة

الرجلات بيضية مستطيلة مسنة والاسنان السفلى احياناً هدية. الخرنوبيات حشرية اسطوانية ذات ٢
 زوايا او ٤ طولها ٢. ضعف قطرها الى ٢. ومصاريعها ٢ - الربيع - مصر

٢. *C. oltorius*, L. الملوخية السلقية ⊙ مستهلس. الاوراق ذات رجلات بيضية

مستطيلة مسنة والاسنان السفلى طويلة الملب. الخرنوبيات ملساء اسطوانية ضخمة ذات ١٠ زوايا طولها
 ٦ اضعاف قطرها الى ٨ ومصاريعها ٥ - الربيع - مزروع وبري. ساحل سورية البحري
 * السيلات والپتلات ٤. الاسدية ٨

٣. *C. antichorus*, Ræusch. الملوخية انيجورس ⊙ املس. الفروع مستلقية متفرعة

واخيراً متصلة. الاوراق صغيرة طويلة الرجلات بيضية بعيدة الشرافات. الزناد مبرومة. الخرنوبيات
 اسطوانية طولها ١٠ اضعاف قطرها الى ١٥ ومصاريعها ٤ مستدقة الى مقار نحيل - الخريف - ارض
 الصعيد

الفصيلة الثانية. القرصية الازهار. *DISCIFLORE*.

السيلات غالباً متحدة نادراً منفصلة. الفقار قرص لحمي كاسي مستقل ومتمدد بكل من الكاس والمبيض
 او باحدهما. الپتلات والاسدية مندغمة في القرص. المبيض مندغم في قمة القرص او مظهر فيه

LINACEÆ. الرتبة الثالثة والعشرون الكتانية

الازهار قياسية. خرق الكاس ٤-٥ متراكبة. البتلات ٥، مثلها عددًا مندغبة تحت المبيض مبرومة. الاسدية ٥ مندغبة في القرص يظلها ٥ اشباه اسدية مثل اسنان. الاثيرات ذات فتحتين. المبيض ذو ٤ غرينات او ٥ وفي كل منها بويضة او ٢. الاقلام ٤-٥ مستقلة او متحدة كنراو قل. الجيب ذو ٤ غرينات و ٥ الا ان الغرقة قد تنفصل تقريباً الى غرقتين

RADIOLA, Gmel. الرديولا

السپلات والبتلات ٤. الجيب ذو ٤ غرينات - عشب صغير كثير التشعب ازهاره صغيرة كورنية بيضاء

R. linoides, Gmel. الرديولا الشبيهة بالكتان ٥ الاوراق بيضية حادة متقابلة.

السپلات بيضية حادة، مثل النوج والجيب طولاً - الصيف - بجانب السواقي قرب عين الصواعير بين جبلي صنين وكبسة على علو نحو ١٢٠٠ متر

الكتان (الزير. الفرق) LINUM, L.

اغلة الزهر ٥ في كل من الصنين. الجيب ذو ٤ غرينات - اعشاب او نجيلات * البتلات صفراء مستقلة

L. Gallicum | *corymbulosum* | *strictum* |

* * البتلات صفراء مخدة المخالب قليلاً

L. nodiflorum | *Balsæ* | *Orientalis* | *Syriacum* | *sulphureum* |

* * * البتلات مستقلة زرقاء او وردية

† السمات دهبوسية

L. pubescens | *usitatissimum* | *humile* | *angustifolium* |

† السمات راسية

L. tenuifolium | *Austriacum* | *carnulosum* |

L. Gallicum, L. | الكتان الفرنسي ٥ املس. الساق نجيل مسنسل الكورنب.

الاوراق خطية رجمية حادة خشنة الحواف. الزوائد المتفرقة السفلى مثل الكاس طولاً او اطول منها. السپلات

رحمة مدينة نصف التوج طولاً أطول من الجيب - الربيع - مزارع سورية وفلسطين
L. corymbulosum, Rehb. ٣. **الكتان الكورني** Ⓞ الساق نحيل كورني عنقودي
 مسترسل. الاوراق والزينات كما في المقدم ذكره. السبلات ثلث التوج وضعف الجيب طولاً - الربيع
 - طرابلس. الكرمل

L. strictum, L. ٣. **الكتان المتيس** Ⓞ املس. الساق متيس. العنقود ضيق مؤلف من
 راسيات مندمجة. الاوراق خطية رحمة حشرة جد^١. الزينات المثمرة ضخمة أقصر من الجيب. السبلات
 رحمة مدينة ثلث التوج وضعف الجيب طولاً - الربيع - مزارع سورية وفلسطين
L. nodiflorum, L. ٤. **الكتان العقدي** الزهر Ⓞ املس. السوق متيس ذات زوايا.
 الاوراق ملوقة رحمة ذات ٣ اعصاب الى ٥ خشنة الحوافي. الثمبات منشعبة. الازهار متباعدة جالسة
 تقريباً. السبلات خطية بلا غدد نصف التوج طولاً وأطول كثيراً من الجيب والجيب بيضي - الربيع
 - اماكن جافة في سورية وفلسطين


L. Balansee, Boiss. ٥. **كتان بلنسا** 24 املس اغبر. اعالي السوق ذات خطوط بارزة
 الاوراق بيضية مقلوبة ذات ٥ اعصاب الى ٧ واعلى مستطيلة وكلها مدينة قليلاً. الثمبات قليلة الازهار.
 السبلات رحمة مدينة غدة الحوافي ثلث التوج وضعفاً الجيب طولاً منعقفة في الاثمار. الثلات برتقالية
 والحجيرة ارجوانية - الصيف - عينتاب وشرقها

L. Orientale, Boiss. ٦. **الكتان الشرقي** 24 املس. السوق ذات زوايا من الاعلى.
 الاوراق السفلى بيضة مقلوبة مستطيلة والبقية مستطيلة مدينة. فروع النبتة قصيرة ضخمة واحياناً متشعبة.
 السبلات رحمة مدينة غدة الحوافي ربع التوج طولاً وأطول قليلاً من الجيب. الثلات برتقالية بيضة
 مقلوبة - الربيع - اماكن جافة في سورية وفلسطين وشرقها

L. Syriacum, Boiss. et Gaill. ٧. **الكتان السوري** 24 املس مستغبر. السوق
 قليلة الزوايا من الاعلى. الاوراق صغيرة رحمة خطية حادة. الثمبات قليلة الازهار. السبلات رحمة ضيقة
 غشائية من الاسفل قصيرة الغدد مدينة حموية ثلث التوج طولاً وأطول من الجيب. الثلات
 صفراء باهتة بيضة مقلوبة. السبلات خطية - الربيع وأول الصيف - اماكن صحيرية قرب حمص وبنين
 والجبل الشرقي الى جنوبي فلسطين

L. sulphureum, Boiss. et Haussk. ٨. **الكتان الكبيريتي** 24 اخضر. السوق مخفضة.
 الثمبات ذات ٣ ازهار الى ٥ قصيرة الزناد. الاوراق ذات عصب واحد ملساء الحوافي والسفلى منها
 صغيرة جدًا مستطيلة ملوقة حموية والبقية مستطيلة خطية حادة. السبلات رحمة مهيمنة مسندة ثلث

التويج الكبريتي طولاً - الربيع - شمالي سورية - وربما الانواع الثلاثة الاخيرة تباينات نوع واحد
 L. pubescens, Russ. ٩. **الكثان الزغبي** ⊙ زغبي هلي. السوق منتصبه من عنق متفرع.
 الاوراق السفلى مستطيلة والعليا غدية الحوافي مستطيلة رحيمة. القدييات مركبة وفروعها طويلة واخيراً
 سنبلية. الزناد الملمرة قصيرة. السيلات غدية الحوافي خطية رحيمة ثلث التويج الوردى وثلاثة اضعايف
 الجيب طولاً - الربيع - مزارع وأثث سورية وفلسطين - نوع كثير الوجود ازهاره كبيرة جميلة
 L. usitatissimum, L. ١٠. **الكثان الكثير الاستعمال** ⊙ الساق منتصب بسيط. الاوراق
 خطية سرحاء الحوافي مدببة. السيلات بيضيه مدببة هدية الحوافي ثلث التويج ومثل الجيب طولاً.
 البتلات زرقاء شرافية. حوافي حواجز الجيب سرحاء - الربيع - مزروع ومنثلت من الزرع



ب. زهرتان من الكثان الكثير الاستعمال . ث. زهرة مكبرة بنيتها ظاهرة فيها. ث. الجيب مقطوعاً عرضاً فرى
 فيه الغريفتان العشر المكونة بواسطة خمسة حواجز حقينية وخمسة كاذبة واصلة من ضلع مصراع الغريفة الى محور
 الجيب تقريباً

L. humile, Mill. ١١. **الكثان السافل** ⊙ الساق منتصب. الاوراق مقلطحة خطية حادة
 سرحاء الحوافي. السيلات بيضيه مدببة هدية ثلث التويج طولاً واقرصر من الجيب. البتلات زرقاء كاملة.
 حوافي حواجز الجيب هدية - الربيع - مزارع شمالي سورية . جبل الشيخ . مصر

L. signatifolium, Huds. ١٢. **الكثان الضيق الورق** ⊙ او 24 الفروع متعددة
 متصاعدة من العنق. الاوراق قليلة خطية مدببة. السيلات ثلث التويج او اقل من ذلك ومثل الجيب
 تقريباً طولاً بيضيه مدببة والخارجية منها هدية. البتلات زرقاء كاملة - مراعي سورية وفلسطين

L. corniculatum, L. ١٣. **الكثان التحيل الورق** 24 قاعلة الساق متكثفة والفروع منتصبه.
 الاوراق متراكمة خطية محززة محززة الحوافي حرسه. السيلات اهليجية القاعلة محززة القمة ثلث التويج
 طولاً واطول قليلاً من الجيب. التويج وردي مزرق - اول الصيف - تحت الجرد مجوار عينتاب

L. Austriacum, L. ١٤. **الكثان النمساوي** ⊙ او 24 املس. السوق متعددة منتصبه

من عنق متفرع. الاوراق كثيفة خطية حادة. فروع القية راسمية. الزناد المثمرة منحنية. السيلات بيضية ذات اعصاب عند قاعدتها اقصر من الجيب والداخلتان منها اكثر كلالاً من الثالثة الخارجية سرحالو حوية. السمات بيضية مستطيلة - الربيع والصيف -

Ooelsyriacum, Post. م. البقاعي. السيلات بيضية مستطيلة نصف الجيب الناضج طولاً - بعليك. وربما هو الموصل بين هذا النوع والآتي ذكره

١٥. *L. carnulosum*, Boiss. الكتان اللحمي 2f. امس اغبر. السوق قزمية (٢.٤ متر) حزمية. الاوراق متراكبة خطية كاله لحية. الثنيات ذات زهرة اوزهرت والزناد المثمرة منغضة. السيلات بيضية مستديرة عريضة الحوافي غشائيتها نصف الجيب طولاً - الصيف - جرود لبنان اعلى الارز. وربما هو تبان جردي من المتقدم ذكره

الرتبة الرابعة والعشرون الزيكوفيلية. ZYGOPHYLLACEÆ.

الازهار قياسية. السيلات ٥ ونادراً ٤ متراكبة او مصراعية. البتلات مثل السيلات عدداً متراكبة او مصراعية او مفقودة. الاسدية كالبتلات عدداً اضعافها وغالباً مجهزة بحراشف انسية. المبيض ذو فصوص مثل السيلات عدداً نادراً اكثر وفي كل غرينة بويضان او اكثر ونادراً او قد تنصل بجواجز مستعرضة. الاقلام ١ - ٥. السمة بسيط. الثرجيب ينشق او اجرة تنفصل من الفئار ونادراً نووي - اعشاب وافجم اوراقها ذات ذنيات وغالباً مركبة

* الجنين بلا اليومن

١. *Tribulus*. الثمر منفصل الى ثمرات ملبسة شوكة. اعشاب مستقيمة

٢. *Nitraria*. الثمر عينية نوية. شجيرات مخنصة بالمستنعات المالحة

* الجنين ذو اليومن

٣. *Sectzenia*. البتلات مفقودة. الاسدية ٥. الخويطات عريانة

٤. *Zygophyllum*. البتلات ٤ - ٥. الاسدية ٨ - ١٠. الخويطات مجهزة بحراشف انسي

٥. *Fagonia*. البتلات ٥. الاسدية ١٠. الخويطات عريانة

١. التريبولس *TRIBULUS*, L.

السيلات ٥. البتلات ٥ ساقطة. القرص على هيئة طوق. الاسدية ١٠ او ٥ مندغمة عند قاعدة القرص والتي تغلب البتلات اقصر من البنية مجهزة بغديدة من الانسية. المبيض جالس ذو ٥

غريفات محجوزة عرضاً. القلم والسمة ذات ٤ اشعة. البويضات ١ - ٥ مصطفة بعضها فوق بعض في الغريفات. الثمر اجربة عظيمة شوكية او مجخنة - اعشاب سنوية مستقيمة مسترسلة الفروع ازهارها ابوية او نامية في نبط الشعب. الاوراق ريشية شغمية متقابلة او مترادفة لعدم نشواحنها

T. bimucronatus, Viv. ١ التريبولس الثنائي المحبة ٥ ملازم الغاء مستشيب.

البتلات بيضية مقلوبة اطول من الكاس. الاسدية ٥ ونادراً ١٠. السمة راسية او يضية مثل القلم طولاً او اطول منه. الثمرات ملازمة الغاء او يضاء مستديرة الظهر مغضنة سرية ذات ٤ اشواك والسفلى منها قد تستعمل الى درنات - الربيع - بادية سينا ومصر

T. terrestris, L. ٢ التريبولس الارضي ٥ ملازم الزغب او ابيض حريري. البتلات

شكل ٧٤



مستطيلة اطول قليلاً من الكاس. الاسدية

١٠. السمة هرمية جالسة تقريباً. الثمرات

ملازمة الغاء او يضاء محجوزة الظهر كثر او قل

ذات عرف شوكي و ٤ اشواك والسفلى منها

اصغر من العليا او مقنودة تقريباً - الربيع

والصيف - جوانب الطرق واماكن منروكة.

كبير الوجود

ورق التريبولس الارضي وثمره

T. alatus, Del. ٣ التريبولس الجناح ٥

زغبي مبيض. البتلات بيضية مقلوبة مستطيلة مثل الكاس طولاً او اطول منها. الاسدية ١٠ ونادراً ٥.

السمة يضية راسية مثل القلم طولاً او اقصر منه. الثمرات عناقية سرية الظهر مغضنة محجوزة كثر او قل

مجهزة على كل من الجانبين بمجناح مثلث مسنن اضيق من قطر الثمرة - الربيع - بادية التيه ومصر

T. macropterus, Boiss. ٤ التريبولس الكبير الجناح ٥ وهرى مبيض. البتلات

بيضية مقنونة مستطيلة اطول قليلاً من الكاس. الاسدية ١٠. السمة نخيلة اسطوانية هرمية اطول قليلاً

من القلم. الثمرات طويلة الغاء محدبة الظهر درنية مجهزة على كل من الجانبين بمجناح معني اعرض من

قطر الثمرة - الربيع - وادي دئب و وادي قطار في ارض الصعيد

NITRARIA, L. ٣ الغرد

الكاس صغيرة ذات ٥ خرق مستهورة مصراعية متباعدة في البرعم. القرص قليل الوضوح يلبس

قعر الكاس. البتلات ٥ قبيعية متفاربة القمة مثنية الى الداخل في التصفيف. الاسدية ١٥ مندغمة في

حافة القرص عريانة القاعدة. المبيض حريري مستطلي هرمي ذو ٢ غريفات وفي كل غريفة بويضة. السمات ٢ متغامزة. الثمر نووي احادي الغريفة لزوال المحوار ينشق من قنبو - شجيرة ناهية في المستنقعات المالحة اوراقها لحمية مترادفة او حزامية ازهارها عنقودية اوفية
N. tridentata, Desf. الغرقد الثلاثي الاسنان ٣ شوكي. الاوراق اسفينية مجنومة كاملة
 او ذات ٢ اسنان الى ٥ على طرفها. الذنبات مستمرة. الپتلات عفاثة - الربيع - بحر لوط. بادية
 التيه وسينا ومصر

٣ السيترينيا SEETZENIA, R. Br.

الپتلات ٥ مصراعية. الپتلات مفقودة. القرص صغير ذو ٥ فصوص. الاسدية ٥ عريانة القاعدة. المبيض جالس خماسي الزوايا والغريفات. البويضات منفردة في الغريفات. الاقلام ٥ مستقلة منعقفة. الحبيب يبضي خماسي الزوايا ضخما منفصل اخيراً الى ٥ ثمرات قشرية. البنور منفردة - عشب معمر
 ذواوراق نفلية شبيه بالفلاب

S. Orientalis, Decaisn. السيترينيا الشرقية 24 املس. الفروع نحيلة مستقلة. الوريقات
 اطول من الرحيلة والانتهائية منها يضية مقلوقة والجانبينتان مخرفتان وجميعها حموية. الذنبات مثلبة
 غشائية هدية. الزند منفرد اطول من الورقة. الپتلات لحمية مستطلية - الربيع - بادية سينا ومصر

٤ الفلاب ZYGOPHYLLUM, L.

الپتلات ٤ - ٥ مستمرة او ساقطة متراكبة في التصيف. الپتلات ٤ - ٥ متراكبة في التصيف
 ذات محالب. القرص لحمي. الاسدية ٨ - ١٠ مجهزة بمحرف انسي قاعدتها. المبيض جالس ذوزوايا
 مستدق الى قلم. البويضات مصطفة صفين علوي وسفلي. الثمر زاوي او مخمخ - اعشاب معمرة او
 نجيلات او انجم ونادراً اعشاب سنوية زنادها ابطية اوراقها لحمية متناوبة مركبة او بسيطة ذات ذنبات
 ازهارها منفردة ابطية

* الحبيب مخمخ

Z. dumosum | *eurypterum*

** الحبيب ذوزوايا بلا اشمجة

Z. simplex ٢ *fabago* ٤ *decumbens* ٥ *album* ٦ *coccineum* ٧

Z. dumosum, Boiss. ١ الفلاب الأعقي ٣ ملازم الرغبة مستشيب. الفروع متعرجة

قصيرة يابسة . الوريقات زوج واحد مستطيلة اسطوانية مثل الرجل طولا . الزند نجمل اطول من الكاس . السبلات عفاثة مستطيلة . البتلات مستطيلة ملوقة ضعف الكاس طولاً أو أكثر . المحراشف بيضية مستديرة مسننة القمة . الحبيب منعطف كروي خماسي الاجنحة - بادية فيه . شمالي بحر لوط

٣ *Z. eurypterum*, Boiss. et Buhse. . القلاب العريض الجناح ذو الفروع مبيضة طويلة . الاوراق برصاء مستطيلة او بيضية مقلوبة مستدقة الى رجليه قصيرة . الزناد اطول قليلاً من الكاس . السبلات والبتلات ٤ والاخيرة اطول من الاولى . المحراشف مشرشرة مثل المبيض طولاً . الحبيب كروي ذو ٤ اجنحة اربعة اضعاف قطر الغريقات عرضاً - الربيع - الجبل الأبيض بين حماء وتدمر

٤ *Z. simplex*, L. . القلاب البسيط (القرمة . العاذر) املس . الفروع مستقيمة مشرشرة عشية مشبكة . الذنبيات رحيمة حادة . الاوراق بسيطة جالسة اسطوانية ١٠ متر طولاً . الزناد مثل الكاس طولاً . السبلات بيضية مقلوبة . البتلات ملوقة . المحراشف متشعبة . الغريقات ذات ٤ بويضات . الحبيب منعطف مفصّل بليلي صغير منقسم تقريباً الى ٥ ثمرات منضغطة - الربيع - بادية فيه وسينا ومصر

٥ *Z. Fabago*, L. . القلاب فاباكو 24 حال ٧٠ متر املس منتصب عشية . الاوراق ذات زوج واحد والوريقات بيضية مقلوبة مستطيلة اطول من الرجل ٢٠ متر او أكثر طولاً و ١٠ متر عرضاً . الزند اقصر قليلاً من الكاس . السبلات مستطيلة . البتلات اسفينية مثلاً طولاً . المحراشف مشرشرة حلمية مثل المبيض طولاً . الحبيب ٢٠ متر طولاً منعطف مستطيلي اسطواني حاد الزوايا والغريقات كثيرة البنور - اول الصيف - من حلب الى دمشق والى الجزائر والشرق

٥ *Z. decumbens*, Del. . القلاب المنخفض 24 املس . الفروع منتفضة طويلة . الاوراق ذات زوج واحد والوريقات بيضية مقلوبة مستطيلة مغلظحة اسفينية الفاتحة اطول من الرجل اقل من ١٠ متر طولاً . الزناد اطول من الزهرة . السبلات بيضية مقلوبة قلبية . البتلات مستطيلة ملوقة بيضاء مثلاً طولاً . المحراشف نصف المبيض طولاً حادة الشمين . الحبيب منتصب بليلي كروي خماسي الزوايا سري الامة - الربيع - بادية مصر

٦ *Z. albertina*, L. . القلاب الأبيض ذو حنكوتي مستشيب . الفروع متصاعدة . الاوراق ذات زوج واحد والوريقات لحمية اسطوانية بيضية مقلوبة اقصر نابلاً من الرجل ٢٠٠ متر طولاً . الزند اقصر كثيراً من الكاس . السبلات بيضية مستطيلة . البتلات بيضاء مربعة اطول من الكاس . المحراشف بيضية مستطيلة كاملة اطول من المبيض والمبيض تخلي ايض . الحبيب منتصب او منفرج

بليلي كروي خماسي الزوايا منفصل الثمرات من الأعلى - الربيع - بادية التيه ومصر
Z. coccineum, L. ٧. القلاب القرمزي في الاجزاء الجديدة مستشبية والبقية خضراء.
 الفروع متعصب او متصاعدة. الاوراق ذات زوج واحد والورقات اسطوانية اقصر من الرجل
 والرجلة ضخمة. الزند اطول من الكاس. السبلات بيضية قبيعة. الثلات بيضاء او وردية ملوقة مدببة
 ضعف الكاس طولاً. الحراشف بيضية مخرومة مثل المبيض طولاً. المبيض املس او خجلي. الجيب متعصب
 اسطواني خماسي الزوايا عريض القمة - الربيع - اريحا. بادية التيه وسينا ومصر

٥ الشكاكة *FAGONIA*, L.

السبلات ٥ متراكبة مستدقة الى حمة سافطة. الثلات ٥ متراكبة ذات مغالب. الاسدية ١٠ عريانة
 المخويطات. المبيض جالس ذو ٥ غريفات. القلم مخزني ذو ٥ زوايا. السمة بسيطة. البويضات ٢.
 الثمر هرجي ذو ٥ زوايا ٥ ثمرات تنفصل اخيراً من المحور وهي احادية البذر - اعشاب معبرة (الأنوع
 الاول) كثيرة الفروع ورفقاها ١ - ٢ حموية والذنبات غالباً شوكية والزناد احادية الازهار

* الفروع الجديدة رباعية الزوايا مثلثة السطوح

† الذنبات شوكية اقصر كثيراً من الاوراق

F. latifolia ١ *glutinosa* ٢ *Kahirina* ٣

† † الذنبات شوكية مثل الاوراق طولاً او اطول منها

F. Bruguieri ٤ *myriacantha* ٥ *Olivieri* ٦ *mollis* ٧ *grandiflora* ٨

** الفروع الجديدة اسطوانية مخططة

F. Arabica ٩ *Thebaica* ١٠ *parviflora* ١١ *minima* ١٢

شكل ٧٥



راسم منبر من الشكاكة
العريضة الورق

١ *F. latifolia*, Del. الشكاكة العريضة الورق

٢ ذو شعر طويل. الفروع متفرجة متشعبة طويلة الفواصل.
 الشوك عشبي اطول قليلاً من الرجل. الاوراق الجذرية احادية الوريقة
 والنبية ذات ٢ وريقات والورقة المتوسطة اسنينية الناعمة بيضية
 مستديرة والجانبينتان مستطيلتان صغيرتان. السبلات عفاثية بيضية
 مستطيلة. الزند مثل الجيب طولاً او اطول قليلاً منه - الربيع -
 بادية القاهرة

٣ *F. glutinosa*, Del. الشكاكة الدبقة (المداهين) ٢٤ مستشيب دبق مكس.

شكل ١٦



ب. جيب الشكاعة الدقيقة.
ت. ذلك مكبر مشقوق عرضاً

بغديدات جالسة يلتصق بها الرمل. الفروع مستطيلة طويلة ذات
فواصل طويلة. الشوك اخضر مثل الرجل طولا او اطول منه قليلا.
الرجلة اقصر من الورقات. الورقة المتوسطة اهليجية والمجانبيتان
مستطيلتان صغيرتان. السهلات بيضية مستطيلة. الزند منتصب
او منفرج اقصر من الجيب - الربيع - بادية التيه وسينا

٣. *F. Kahirina*, Boiss. الشكاعة القاهرية 24 اخضر غديدي. الفروع متشعبة منشرة.

الشوك اقصر من التفاصيل. الاوراق العليا بسيطة والبقية ذات ٣ ورقات صغيرة بيضية مستطيلة
مثل الرجل طولا. السهلات غديدية عفاثية بيضية. الزند منعطف اطول من الجيب - الربيع - بادية
سينا ومصر

٤. *F. Bruguierei*, D. C. شكاعة بروكويير 24 غديدي اخضر باهت. الفروع
متكثة قصيرة وتفاصيلها قصيرة. الشوك طويل (٢٠١ مترا و اكثر). الاوراق السفلى ذات ٣ ورقات
والبقية بسيطة. الورقات بيضية مستطيلة. السهلات زغبية بيضية. الزند منعطف اقصر من الجيب
والجيب عفاثي - الربيع - بادية التيه وسينا ومصر

٥. *F. myriacantha*, Boiss. الشكاعة الربوية الشوك 24 قليل الغديدات اخضر
باهت. الفروع مستطيلة كثيرة الفرع. التفاصيل طويلة. الشوك طويل منفرج ابري. الاوراق جالسة
تقريبا والسفلى منها ذات ٣ ورقات والعليا بسيطة. الورقات مستطيلة خطية وخطية. السهلات مستطيلة
رعيمة مدببة. الپتلات وردية باهتة. الزند منعطف اطول من الجيب خيلي - الربيع - بادية سينا

٦. *F. Olivieri*, D. C. شكاعة اوليفيير 24 اخضر ذو غديدات جالسة. الفروع طويلة
منتصبه. التفاصيل طويلة. الشوك منفرج مثل الورقة طولا. الاوراق جالسة تقريبا ذات ورقة واحدة
مستطيلة خطية باهتة ١٣. ٢٠ متر طولا و اكثر. السهلات عفاثية مستطيلة رعيمة. الپتلات وردية باهتة.
الزند منعطف اقصر من الجيب والجيب عفاثي - الربيع - سوق وادي بردة ودمر وشالهما وشرقيهما

شكل ١٧



قطعة من فرع الشكاعة الناعمة
عليها ورقتان وزهرة

٧. *F. mollis*, Del. Y. الشكاعة الناعمة 24 متفرق الخلية.

الفروع كثيفة ورقية منتصبه. التفاصيل اقصر من الاوراق غالبا.
الشوك عفاثي اطول من الرجلات ومثل الاوراق طولا تقريبا.
جميع الاوراق ذات ٣ ورقات لحمية بيضية حموية اطول قليلا من
رجلتيها. السهلات بيضية كالة عفاثية. الپتلات وردية ثلاثة اضعاف
الكاس طولا. الزناد منعطف اقصر من الجيب والجيب عفاثي -

الربيع - بادية التيه وسينا ومصر

٨. *F. grandiflora*, Boiss. **الشكاعة الكبيرة الزهر** $\bar{\sigma}$ مستطيل أخضر. الفروع ضخمة متعصبة. التفصيل أطول قليلاً من الأوراق. الشوك غليظ مثل التفصيلة طولاً. جميع الأوراق ذات ٢ ورقات لحمية بيضبة وميضية مستطيلة حموية أقصر من الرجلة قليلاً. السبلات بيضبة لمسار ربع التويج طولاً. التويج ١٥-٢٠ مم عرضاً. البتلات وردية. الزناد منعطف والمجيب عفاقي مثلها طولاً - الربيع - بين مار سابا ومجر لوط

٩. *F. Arabica*, L. **الشكاعة العربية** $\bar{\sigma}$ غديدي أخضر. الفروع متعصبة. الشوك أطول من الورقة وكثيراً ما يعادل التفصيلة طولاً. الرجلة مثل الوريقات طولاً والوريقات مستطيلة حادة. السبلات مستطيلة رمحية غديدية. البتلات وردية باهتة ضعف الكاس طولاً. الزند منعطف أطول قليلاً من المجيب والمجيب خلي - الربيع - البلقاء. بادية التيه وسينا. وادي النيل

١٠. *F. Thibatica*, Boiss. **الشكاعة الشيبية** $\bar{\sigma}$ أملس أخضر. الفروع كثيفة متعصبة. الشوك السفلي قصير والعلوي مثل الورقة طولاً. الأوراق السفلى ذات ٣ ورقات والعلوية ذات ورقة. الوريقات لحمية مستطيلة كاله حموية. السبلات بيضبة مستطيلة. البتلات وردية ضعف الكاس طولاً. الزند اعنف والمجيب لببيدي أقصر منه - الربيع - أرض الصعيد

petiolata, Post. ب. الرجيلية. الرجيلات أطول من الوريقات أو مثلها طولاً. الزناد

طويلة - وادي فران

١١. *F. parviflora*, Boiss. **الشكاعة الصغيرة الزهر** $\bar{\sigma}$ أملس الأجزاء الجديدة وهي نخالية غديدية. الفروع كثيفة متعصبة. التفصيل طويلة. الشوك نحيل غير متساو قليلاً أطول من الورقة غالباً. جميع الأوراق بسيطة قصيرة الرجلة خطية رمحية متفرقة المحمة. السبلات حلمية رمحية قصيرة. البتلات وردية باهتة ضعف الكاس طولاً. الزند اعنف ضعف المجيب طولاً - الربيع - شلالة النيل عند اصوان

١٢. *F. minima*, Post. **الشكاعة الصغرى (حلاوة التيه)** $\bar{\sigma}$ قزم قصم متفرق الغديديات أخضر. الفروع أفقية. الشوك أقصر من الورقة أخضر عريض القاعدة. الأوراق صغيرة والسفلى منها ٣ ورقات والعلوية ٢ ورقات ٢-٣ مم طولاً مستطيلة حادة مثل رجلياتها طولاً. السبلات بيضبة حلمية. البتلات وردية ٢ أضعاف الكاس طولاً. الزند اعنف والمجيب صوفي مثله طولاً - الربيع - بادية التيه بفرب نسب المراقنة

الرتبة الخامسة والعشرون الجراية GERANIACEÆ.

الازهار قياسية او غير قياسية. السبلات ٥ متراكبة في القصيف. البتلات متراكبة في القصيف وقد تغلفها غديدات. الاسدية ٥ - ١٥ متحدة القواعد وجميعها او نصفها حاملة اثثيرات. المبيض ذو ٥ فصوص وغريقات مجهزة غالباً بمنقار ملتصق بالفقار. الغريقات ذات بذرة واحدة او بذرتين. الثغيرات منفصلة اخيراً من الفقار - اعشاب او نجيات او اشجار

شكل ٧٨



ث ورقة من الجرايوم الملتفخ. ت. زهرة منه. ب. الثمر حال التفاف الثغيرات الى الاعلى. ح. الاسدية والقلم. ج. بذرة. خ. البذرة مقطوعة عرضاً لظمار الفلقين الملتفين معاً على هيئة ساطالية

* المبيض ذو منقار ينتهي بقلم ذي ٥ فروع

١. *Geranium*. الاسدية ١٠ جميعها ذات اثثيرات على الغالب

٢. *Erodium*. الاسدية ١٠ ومنها ٥ بلا اثثيرات

٣. *Monsonia*. الاسدية ١٥ جميعها ذات اثثيرات خماسية الخوات عند قاعدتها

٤. *Pelargonium*. الاسدية ١٠ منها ٧ ذات اثثيرات

* * المبيض بلا منقار ذو ٥ فصوص. الاقلام منفصلة تنشأ من انسي الثغيرة. السمات راسية

٥. *Liebersteinia*. الاسدية ١٠ كلها ذات اثثيرات متحدة القواعد

١ الجرايوم *GERANIUM*, L.

الازهار قياسية. الغديدات ٥ ترادف البتلات. الاسدية ١٠ جميعها ذات اثثيرات على الغالب.

الثورات منشقة على وجهها الانسي . متغار الثمرة الملس من الانسية ينثني الى الاعلى على هيئة قوس (ب شكل ٧٨) - اعشاب سنوية او معمرة او نجيليات اورانها ذات ذنبات وزنادها غالباً ذات زهرتين

* معمرة

G. subcaulescens ١ *tuberosum* ٢ *Libanoticum* ٣ *asphodeloides* ٤

** سنوية

† مخالب الثلاث قصيرة او مفقودة . الكأس بلا زوايا

G. pusillum ٥ *rotundifolium* ٦ *columbinum* ٧ *dissectum* ٨ *molle* ٩

† مخالب الثلاث طويلة . الكأس ذات زوايا

G. Robertianum ١٠ *lucidum* ١١

G. subcaulescens, L' her. ١ . الجرانيوم القصير الساق 2٤ أم الجذور ضخمة اسطوانية

عمودية . السوق قليلة الازهار واحياناً بلا اوراق . الاوراق مستديرة ذات ٥ اقسام اسفينية ثلثية المخرق والاوراق الجذرية طويلة الرجيلات والجميع سنجابية ملازمة الخمل . الزنيدات المشرفة منعقفة . السيلات ملبسة خملًا يتخلل شعر طويل . الثلاث ضعف السيلات طولاً - الصيف - جرود لبنان قرب الارز

G. tuberosum, L. ٢ . الجرانيوم البضاخي 2٤ أم الجذور بيضية كروية . زغبي او غنائي

كثراو قل . الساق متعصب كثير التشعب من الاعلى . الاوراق مستديرة قطعاً ٥ - ٩ رحيمة مستطيلة المحيط ريشية المخرق والجذرية منها طويلة الرجيلات والزهري جالسة خطية النطح . الزناد ذات زهرة او ٢ متعصب في الإثمار . السيلات عنائية بيضية حموية . الثلاث قلبية مغلوبة بتفسيمة ضعف الكأس طولاً . المصارع عنائية - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

G. Libanoticum, Boiss. et Bl. ٣ . الجرانيوم اللبناني 2٤ أم الجذور منحرفة . السوق

متعصب ضعف الاوراق الجذرية علواً او اقل من ذلك منعقة الغفاء . الاوراق الساقية ازواج والبقعة جذرية خماسية الزوايا كثيفة قطعاً معينة مخروقة كالة الاسنان . الكورنب قليل الازهار . السيلات زغبية هدية ذات سيل . الثلاث منفرجة ذات ٥ خطوط من قاعدتها الى منتصفها مفروضة . المصارع عنائية - الصيف - جبل اللكام ولبنان

G. glabrescens, Post. ب . المستملس . منفرق الهليب . البناح

G. asphodeloides, Willd. ٤ . الجرانيوم الشبيه بالبرقوق 2٤ زغبي . أم الجذور قصيرة

مجهزة بالبالف ضخمة مغزلية . الساق متصاعد او منشع متفرع ورقي . الاوراق مستديرة والسفلى منها ذات ٧ فصوص الى ٩ والعليا ذات ٢ - ٥ اسفينية ثلثية الشعب . الزنيدات المشرفة منعقة . السيلات

رحمة ذات سبول . الثلاث بنفجية باهتة ضعف الكاس طولاً . المصاريع زغبية - الصيف
 ١. *genuinum*, Boiss. الحقيقي . السوق والفروع منعقة الزغب ملازمة . الزنيدات
 غديدية - كسب

hispidum, Boiss. ب . الحوي . لحوي والزنيدات غديدية - تحت جرد لبنان
 ٥. *G. pusillum*, L. المجرانيوم الحقير زغب ومن الأعلى متفرق الغديلات قصيرها .
 الساق منتشر . الأوراق مستديرة كفية ذات ٥ قطع الى ٩ اسنينية مقصوفة . الزناد قصيرة . الزناد
 المثمرة مثنية الى الأسفل . السبلات مستطيلة حادة قصيرة المحبة . الثلاث مستطيلة قليلاً مقلوقة زرقاء
 باهتة مثل الكاس طولاً . الخوايطات هدية . المصاريع ملازمة الغناء - الربيع - مزارع متموكة في
 شمالي سورية

٦. *G. rotundifolium*, L. المجرانيوم المستدير الورق غديدي زغب . الساق
 منتصب . الفرع متشعب . الأوراق كوية ذات ٧ أقسام كاله الخرق مستطيلتها والعليا متصاعدة حادة
 الفصوص . الزناد قصيرة . الزنيدات المثمرة مثنية الى الأسفل . السبلات عنائية قصيرة السبول .
 الثلاث وردية ابيضاض مستطيلة اسنينية كاملة لمساء مثل الكاس الى ضعفها طولاً . المصاريع زغبية .
 البنور سخية - الربيع - مزارع سورية وفلسطين وصغورها

٧. *G. columbinum*, L. المجرانيوم الحماي ملازم الغناء . الساق متصاعداً منتشر
 متفرق الفروع . الأوراق مستديرة كفية ذات ٥ أقسام الى ٧ خرقاً خطية والعليا ثلثة الخرق . الزناد
 والزنيدات طويلة جداً . الزنيدات المثمرة مثنية الى الأسفل . السبلات عريضة بيضية طويلة السبول
 ملازمة الغناء . الثلاث ارجوانية مثل الكاس طولاً . المصاريع محيضة الظهر مستمسة . البنور سخية -
 الربيع - بيت مري

٨. *G. dissectum*, L. المجرانيوم المشرح الساق منتصب منعك الحية . الأوراق
 مستديرة كفية ذات ٥ قطع الى ٧ خطية الخرق . الزناد قصيرة . الزنيدات المثرة مثنية الى الأسفل
 غديدية على الغالب . السبلات عنائية قصيرة السبول . الثلاث زرقاء باهتة . المصاريع وبرية ذات
 حمة عند قاعدة الدرز . البنور سخية - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

٩. *G. molle*, L. المجرانيوم الناعم ناعم الوبر غديدي من الأعلى . الساق متصاعداً
 منتشر . الأوراق مستديرة كنية ذات ٧ قطع الى ٩ فصوصها اسنينية مقصوفة مسنة . الزناد قصيرة .
 الزنيدات المثرة منعقة . السبلات بيضية قصيرة المحبة . الثلاث ارجوانية اطول قليلاً من الكاس .
 المصاريع لمساء مخرفة الغضون . البنور مستوية - الربيع - اماكن عشبية . كثير الوجود

١٠. *G. Robertianum*, L. الجرجانيوم الروبرتي ☉ زغبى حلبي كثرا وقل. الساق منتصب. الفرع منشعب. الاوراق مثلثة المحيط وثلاثية المنشأ او خماسيته قطعها ريشية ذات رجيلات والمخرق مستطيلة كالة الاسنان حويبتها. الزنيدات غديدية منفرجة في الإنثار. السبلات حلبيية الحوافي. البتلات ارجوانية ضعف الكاس طولاً. المصاريع مفضضة مشبكة - الربيع - بجانب السواقي. اهدن. يسمون

purpureum, Post. ب. الارجواني. البتلات اقل من ضعف الكاس طولاً. المصاريع ذات غضون متقاربة (*G. purpureum*, Vill.) - صخور سورية وفلسطين وغاباتها
١١. *G. lucidum*, L. الجرجانيوم اللؤلؤي ☉ أملس. الساق منتصب. الاوراق مستديرة صكفية ذات ٥ خرق الى ٧ اسفينية الفصوص كالة المخرق والشرافات. الزناد قصيرة. الزنيدات عفائية على جانب واحد والمثمرة منها مشئية الى الاسفل. السبلات ريمحة مدبية مستعرضة الغضون. البتلات اطول من الكاس. المصاريع زغبية القمة ظهرها مغضن طولاً ووجهها شبكي - الربيع - صخور سورية وفلسطين وغاباتها

٢ الدهامين (ياغزال دُور دُور) *ERODIUM*, L.

الازهار قباسية او البتلات غير متساوية قليلاً. السبلات متساوية. الغديلات ٥ ترادف البتلات. الاسدية ١٠ ومنها فقط حاملة اثثيرات. مصاريع الجيب غير منشدة. المناقير مشعرة من الانسية ملنفة لولياً عند نضجها - اعشاب سغوية او معبرة ذات اوراق ذنبية وزناد صيوانية القمة نادراً ثنائية المسكن واحياناً ذات جذع خشبي

* المنقار مستمر ملازم الهلب من الانسية. المصاريع ذات ستين تقيين

† معبرة

E. trichomanefolium ١ *Amanum* ٢ *Romanum* ٣

† † سنوية

‡ جميع الاوراق ريشية

E. cicutarium ٤ *moschatum* ٥ *cichonium* ٦

‡ ‡ الاوراق السفلى على الاقل غير منقسمة او منقسمة

E. gruinum ٧ *botrys* ٨ *laeinatum* ٩ *malacoides* ١٠ *Egyptiacum* ١١

* * المنقار سريع السقوط ذو شعر طويل من الانسية. المصاريع بلا سغ

E. hirtum | ٢ *Gaillardoti* | ٣ *glaucophyllum* | ٤ *Hussoni* | ٥ *bryoniæfolium* | ٦

١. الدهامين التريكوما في الورق 24 كيف *E. trichomanefolium*, L'her. |

العفاء غديده حزبي بلا ساق. الاوراق مستطيلة المحيط ثنائية التفصيل الريشي خرقها صغيرة كالة. الزناد ذات زهرتين الى ٤. السبلات غديده عنقائية قصيرة الحمة. البتلات بيضاء اوارجوانية اطول قليلاً من الكاس. الثميرات لحوية ربع المنقار طولاً - قم لبنان العليا

٢. الدهامين اللكاهي 24 ايض زغبى بلا غديبات حزبي. *E. Amanum*, Boiss. et Ky.

ام الجذور كثيرة الرؤوس. الاوراق مستطيلة المحيط ريشية قطعها بيضية منقصة فصوصاً كالة. السوق قصيرة جريدية وهي والزنادات عنقائية. السبلات خطية رحيمة مدببة فجأة عنقائية ذات ٥ اعصاب. البتلات * * *. الثميرات بيضاء الوبر ثلث المنقار طولاً - الصيف - جبل اللكاه

٣. الدهامين الروماني 24 متفرق الشعرا بيضة بلا ساق. *E. Romanum*, L.

وردية النظام مستطيلة رحيمة المحيط ريشية قطعها جالسة بيضية مستطيلة ريشية وفصوصها صغيرة مستطيلة حادة. الجرائد ذات ٢ امرار الى ٥. السبلات متفرقة العفاء تنتهي بهلبة. البتلات وردية ضعف السبلات طولاً واكثر. الثميرات بيضاء عنقائية خمس المنقار طولاً - الربيع والصيف - من حلب الى القدس

٤. الدهامين الشوكراني ٥ بلا ساق في الاول ثم ذو ساق وشعر *Fl. elenagifolium*, L.

ايض حليبي. الاوراق ثنائية التفصيل الريشي. الزناد ذات ٢ ازار الى ٦. السبلات ذات حمة قصيرة منتمية بهلبة. البتلات كالسبلات طولاً ارا طول منها. الثميرة عنقائية ذات ثنية اسفل سنفها موازية حافة. المنقار ٥ اضعايف الثميرة طولاً الى ٦ - الربيع - كثير الوجود في سورية وفلسطين الى بادية التيه وشرقيها

٥. الدهامين المسكي (المسكية) ٥ متفرق العفاء حليمية ومن *E. ad elenagifolium*, L.

الاعلى لوج. السوق متصاعدة ضخمة. الاوراق مستطيلة المحيط ريشية قطعها ١١ - ١٢ كبيرة متباعدة بيضية مزدوجة الاسنان. الزناد طويلة كثيرة الازهار. البتلات كالدبلات طولاً. المخويطات ذات سنين من الاسفل. الثميرة ذات غضن اسفل السخ يوازي حافة الاسفل. المنقار ٦ اضعايف الثميرة طولاً الى ٨ -

الربيع - اماكن عشبية ورملية في سورية وفلسطين وشرقيها

٦. الدهامين اللقاني ٥ زغبى لوج. *E. elenagifolium*, L.

الاوراق بيضية المحيط ريشية وقطعها راجعة ريشية المحرق او الاقسام والفقار مسنن. السبلات طويلة السبل وفي مثل البتلات طولاً. المخويطات هديية من الاسفل. الثميرة بلا غضن موازي حافة السخ السفلى. المنقار ١٠ اضعايف الثميرة طولاً - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

شكل ٧٩



ثمر الدهامين الكرني

٨. *E. botrys*, Cavan. الدهامين العنقودي ⊙ السوق متصاعدة منعقفة الحلييات العفائية.

شكل ٨٠



ثمار الدهامين المخرق

pusillum, Post. ب. الحقيير. منخفض. الاوراق مستطيلة المحيط

صغيرة. سبل السيلة قصير - شمالي النبه

Porteri, Post. ت. پورتر. خرق الاوراق عريضة متراكبة.

السبول نصف السيلات طولاً - حقل قرب دمشق

٧. *E. gruinum*, L. الدهامين الكرني ⊙ الساق ضخمة متفرقة

الشعر. الاوراق ملازمة الحلييات والسفلى منها غير متسومة قلبية بيضية والبقية

ذات ٣ اقسام جالسة مسننة والقسم الانتهائي طويل ذو ٢ قصوص الى ٥.

الزناد طويلة ذات زهرتين الى ٦. السيلات منخطة ذات حمة طويلة. التويج

١٥. ٢ متر عرضاً. الپتلات بنفسجية باهتة اطول من الكاس. الخويطات

ملساء متسعة القاعدة. الغضن اسفل السخ بارز. المنقار ٦ اضعاف الثميرة

طولاً - مزارع وجوانب الطرق في سورية وفلسطين - نوع جميل

١٠. *aristatum*, Post. ب. المسبل. عال. السبول مخرزة ثلث

السيلات طولاً - بيروت

١١. *Carmeli*, Post. ت. الكرمل. عال. منعطف الملب حليية.

قصوص الاوراق العليا رمحية حادة. الثميرة ذات غضبين تحت السخ.

السبول ربع السيلات طولاً - سخ جبل الكرمل

٨. *E. botrys*, Cavan. الدهامين العنقودي ⊙ السوق متصاعدة منعقفة الحلييات العفائية.

الاوراق مستطيلة المحيط والسفلى منها خليجية ريشية والعليا ثنائية التقسيم الريشي

ضيقة المخرق. الزناد طويلة ذات زهرة الى ٣. السيلات غديدة قصيرة المحمة.

الپتلات اطول قليلاً من الكاس. الخويطات ملساء. الثميرة مجهزة بغضبين

اسفل السخ. المنقار طويل - الربيع - بيت مري

٩. *E. laeinatum*, Cavan. الدهامين المخرق ⊙ السوق

متكئة ملبسة كالرجلات ايضاً شعراً حليياً منعقفاً. الاوراق عفائية او ملساء

والسفلى منها بيضية قلبية كالة القصوص والبقية احادية التفصيل الريشي او

ثنائية قصيرة المخرق حادتها. الزناد ذات ٤ ازهار الى ٦. السيلات حموية.

الپتلات مثل السيلات طولاً او اطول منها. الخويطات ذات سنين او بلاها

وذات هدجين. الثميرة بلا غضن اسفل السخ. المنقار ٦ اضعاف الثميرة

طولاً الى ٨ - الربيع - ساحل سورية البحري. شمالي النبه

pulverulentum, Boiss. البغيري (إجرية الغراب) مستشيب. الأوراق صغيرة خليجية ريشية الفصوص أو ثنائية التفصيل الريشي. السبلات ليبيدية سرحاء تقريباً. المنقار أحياناً قصير - رمال بادية التيه وسينا ومصر
glabrescens, Post. ت. المستعلس. تحيل مستعلس. خلعجان الأوراق متسعة. السبلات سرحاء تقريباً - يبروت

١٠. *E. malacoides*, L. الدهامين الشبيه بالمكوس (المجرنا) Ⓞ السوق متفرعة متصبية أو منشرة ناعمة الغطاء. التزهير غديدي. الأوراق ملازمة الرغبة بيضية مستطيلة مسننة مضحلة الفصوص والسفل منها قلبية. الزناد كبيرة الأزهار. السبلات عفائية غديدية حموية. البتلات أطول قليلاً من الكاس. الخويطات لمساء. الثمرة ذات غضن بارز أسفل السخ. المنقار ٢ أضعاف الثمرة طولاً إلى ٤ - الربيع - جوانب الطرق ومزارع في سورية وفلسطين

١١. *E. Aegyptiacum*, Boiss. الدهامين المصري Ⓞ ذو شعرا يبيض مخروطي منفرج عند السوق وملانم عند الأوراق. السوق منشرة. الأوراق بيضية مستطيلة ذات ٣ فصوص أو أقسام حادة المحرق والأنسان. الزناد كبيرة الأزهار. السبلات عفائية. البتلات كالكاس طولاً. الخويطات لمساء. الثمرة ذات غضن أسفل السخ. المنقار ٢ أضعاف الثمرة طولاً إلى ٦ - الربيع - من القاهرة إلى جرجي

١٢. *E. hirtum*, Forsk. الدهامين العفائي (البَدُو) 2٤ مستعلس أو عفائي. الجذر ضخيم منفرج والباقة منتفخة في أماكن على هيئة بضايض. السوق قصيرة منكثة. الأوراق مثلثة المحيط ثنائية التقسيم الريشي قطعها راحة والمحرق قصيرة حادة. الزناد ذات ٥ أزهار إلى ٦. السبلات حموية. البتلات أطول من الكاس. الخويطات مديدة. الثمرة ذات غضنين أسفل قمتها - الربيع - جنوبي فلسطين. بادية التيه وسينا ومصر

١٣. *E. Gallardoti*, Boiss. دهامين كالياردو 2٤ عفائي. الجذور ذات بضايض بيضية كروية. الساق متعرج. الأوراق شباه مغضنة بيضية قلبية شرافية مسننة بعضها غير منتظم والبقية ثلثية القطع المنفوصة والساقية منها صغيرة ريشية. الزناد ذات ٥ أزهار إلى ٧. السبلات سرحاء غديدية. البتلات ضعف الكاس طولاً. الخويطات لمساء. الثمرة بلا غضن أسفل قمتها. المنقار ٧ أضعاف الثمرة طولاً - الربيع - ساحل دمشق وشماله

١٤. *E. glaucophyllum*, Ait. الدهامين الاخير الورق 2٤ اغبر. الجذر ضخيم. السوق مستتلية منشعبة لمساء. الأوراق ضخمة مستعلسة أو زغبية بيضية مستطيلة شرافية مفصصة. الزناد

ذات زهرتين الى ٤. السبلات حموية ملازمة الغشاء عند الاعصاب او ملساء. البتلات اطول من الكاس. الخويطات ملساء وذات الانثيرات منها ثنائية الاسنان من الاسفل. الثميرة ذات غضنين اسفل قمتها - الربيع - البقاع وبادية التيه وسينا ومصر والى الشرق

١٥. *E. Hussoni*, Boiss. دهامين هصن 24 نخالي. ام الجذور خشبية حرسنية. السوق متعصبه قليلة الفروع. الاوراق ضخمة بيضية قلبية شرافية او مضطحة الفصوص. الزناد ذات ٢ ازهار الى ٦. السبلات حموية. البتلات اطول قليلاً من الكاس. الخويطات هدية. الثميرات عفاثية بلا غضن اسفل قمتها. المنفار ٢١ متر طولاً - الربيع - بادية مصر

١٦. *E. bryoniaefolium*, Boiss. الدهامين الفاشري الورق (المرغيط) شيب. السوق مستانية منعقنة للبييد. الاوراق حريرية فضية والجذرية منها مضغنة قلبية بيضية كالة الشرافات غير منقسمة او ثلثية الفصوص او القطع والنص العلوي مخروق. الاوراق العليا متصاغرة. الزناد ذات زهرتين الى ٤. السبلات حموية. البتلات اطول قليلاً من الكاس. الخويطات غير الحاملة الانثيرات ذات شعر عند القنول والحاملة الانثيرات هدية القاعة. الثميرة بلا غضن اسفل قمتها - الربيع - مادية سبنا ومصر وشرقيها

٢ اليهق *MONSONIA, L.*

الازهار قياسية. الغدد بذات ٥ تفصل البتلات. الاسدية ٥ كلها حاملة انثيرات ومقعدة عند قاعدتها في ٥ خوات مقابلة البتلات. مصاربع الجيب غير منشقة. المنفار مشعر من الانسية مائتف عند النضج من الفاعلة الى القمة - اعشاب سنوية او معمرة شبيهة بالدهامين

١. *M. nivea*, Decaisn. اليهق الثلجي ٥ او 24 السوق مكثمة بيضاء لحوية. الاوراق بيضية مستطيلة فضية لبادية ذات سنينات وغضون. الفلوس بيضية مدببة. السلات سرحاء تقريباً. الثميرات ذات غضنين اسفل السخ - الربيع - بادية التيه وسينا ومصر

٢. *M. holotropoides*, Cavan. اليهق الاكراري 24 ام الجذور خشبية. السوق والزناد لحوية. الاوراق طويلة الرجالات ملازمة الشيب بيضية ذات سنينات. الثاوس مستطيلة رحيمة مدببة. السبلات حموية. الثميرات ذات غضنين او ٢ اسفل السخ - الربيع - مادية الاقصر في ارض الصعيد

٤ البيلاركونيوم *PELLAERONIA, L'Her.*

الازهار قياسية. السلات ٥ تفصل القاعة والسلة الخلفية صمدية الى ٨. هاز. مرقى بالزينة.

البتلات ٥ أو أقل غير قياسية قليلاً. الغدد ذات مفقودة. الاسدية ١٠ متحدة القاعدة ومنها ٧ ذات اثنيات. المنقار منحني إلى الأعلى عند النضج - انجم عطرة جذرها لحمي
P. Endlicherianum, Fenzl. البلاركونيوم الأندلخري 24 خيلي. السوق ضخمة بسيطة قليلة الفروع. الأوراق المجذرية قلبية شكلية مستديرة شرافية والساقية ذات ٢ أقسام إلى ٥ مفصصة والنص المتوسطة أكبر من البقية معينة الشكل ذات ٣ خرق. الزناد ذات ٥ ازهار إلى ١٠. المهاز ممتد إلى قرب قاعدة الزينة. البتلتان العلويتان ٢ أضعايف الكاس طولاً والثلاث السفلى متلهوجة ثلثها طولاً. المنقار لحوي من الأنسية - الصيف - جبل اللكام

٥ البيبرستينيا *BIEBERSTEINIA, Steph.*

الازهار قياسية. السبلات ٥ متراكبة متنامية في الإثمار. البتلات ٥ مندغمة تحت المبيض متراكبة. الغدد ذات ٥ لحمية تحتل البتلات. الاسدية ١٠ جميعها حاملة اثنيات متحدة القاعدة. المبايض ٥ مندغمة من قاعدتها إلى منتصفها في الفئار. الثبيلات فشرية مغضنة - اعشاب معمرة غديدية أوراقها ذنيبية ثنائية التركيب الريشي أو ثلاثية ازهارها عتقودية أو سنبلية
B. multifida, D. C. البيبرستينيا الكثيرة المخرق 24 الجذر ضخيم بضاضي متفرع. الساق ضخيم ورقي. الأوراق رمحية المحيط عفاثة قليلة الغدد ذات خرقها ضيقة حادة. الفلوس مفصصة أو ريشية مخروقة. السبلات بيضية مستطيلة. البتلات بيضاء مصفرة مستطيلة اسفينية كاملة النعمة أو مسنتها مثل الكاس طولاً - الربيع - جرود لبنان والجبل الشرقي وساحل دمشق وشاليها وشرقيها

الرتبة السادسة والعشرون الحمضية *OXALIDEÆ.*

الازهار قياسية. الكاس ذات ٥ سبلات متراكبة في الصيف. البتلات ٥ لولية في التصنيف بلا غدد ذات قاعدية. الاسدية ١٠ - ١٥ احادية الخوة عند قاعدتها جميعها حاملة اثنيات. المبيض ذو ٥ غريفات كثيرة البويضات على الغالب. الاقلام ٥ منفصلة. الشرجيب

الحميض *OXALIS, L.*

الكاس مستمرة. الاسدية ١٠ الخمس الخارجية منها أطول من الداخلية. الاقلام ٥ منفصلة. الحبيب ذو ٥ غريفات مشقة على المصارع. البرور ذات بسباسة لحمية - اعشاب ذات ذنبات أوراقها ثلاثة المنشأ

O. corniculata, L. الحمض القرني ٢ زغي . الجذر غير ستولوني . السوق منشرة متصلة من قاعدتها . الذنبات مستطيلة ملتصقة بالرجلة . الورقات قلبية مقنونة . الزناد اقصر من الورقة ذات زهرتين او ٢ . الزناد المثرة منعكفة . الثلات صفراء مفروضة - الربيع والصيف - ساحل سورية البحري ولبنان

الرتبة السابعة والعشرون السنائية RUTACEÆ.

الازهار خشوية . خرق الكاس ٢-٥ متراكبة في النصف . الثلات مثل خرق الكاس عددًا تفعلها . الاسدية مثل خرق الكاس عددًا اضعفها . فصوص البيض مثل خرق الكاس عددًا والغرفات ذات بويضتين او اكثر الفلم واحدناشيء بين فصوص البيض . السمة بسيطة . غرفات الجيب منشقة الى الانسية وقد تكون الشمرات غير منشقة - اعشاب سنوية او معمرة اوراقها غديدية منفطة ساطعة الرائحة بسيطة او مركبة ذات ذنبات او بلاها

* الازهار غير قياسية

Dictamnus. ٢ . الثلات ٤ . الثلات ٥٢ . من طولاً والراسيات غديدية

** الازهار قياسية

Ruta. ٢ . الثلات ٤ . الاسدية ٨ . الاوراق ريشية بلا ذنبات

Tetradicels. ٢ . الثلات والاسدية ٤ . الازهار صغيرة . السبل عري . الاوراق ذات

ذنبات

Peganum. ٤ . الثلات ٥ . الاسدية ١٢-١٥ . الاوراق ذات ذنبات هلبية صغيرة

Haplophyllum. ٥ . الثلات ٥ . الاسدية ١٠ . الاوراق بسيطة وذات ثلثة اقسام بلا ذنبات

١ الدكتمنس DICTAMNUS, L.

الكاس ساقطة ذات ٥ اقسام . الثلات ٥ ذات مخالب والارباع العليا منها متصاعدة والسفلى مخنية الى الاسفل . الخويطات ١٠ غديدية مخززية الطرف اقترابها كروية . الجيب قصير السويقة ثمراته ذات مناقير وتحتوي على بززين او ٢ - اعشاب معبرة ذات اوراق ريشية مفردة وتزهر راسي غديدي والزنبات ذات فلوس عند قاعدتها

D. fraxinella, Pers. الدكتمنس الدريد ير ٢ . الورقات بيضية مستطيلة مسننة فغارها

ذو حافة . الثلات الهليجية مستطيلة مستدقة الى المخالب والجانبية منها كالة والبقية حادة - اول الصيف - غابات الجبل الاقريع

٢ السذاب *RUTA, L.*

الکاس ذات ٤ اقسام . الثلاث مثلها عددًا قبيحة مسننة . الاسدية ٨ . المبيض جالس رباعي الفصوص غريفاته ذات ٦ بويضات الى ١٢ . غريفات الجيب منشقة الى الانسية - اعشاب جذعها متصلب اوراقها ريشية تزهرها كورني ازهارها ذات فلوس

R. Chalepensis, L. . السذاب المحلي 2f الوراق جالسة تقريباً بيضية مستطيلة المحيط قطعها غير متساوية رحيمة مقلوبة او بيضية مقلوبة او مستطيلة . الكورنب مندج . الفلوس ضيقة رحيمة . الزنيدات اطول قليلاً من الجيب . خرق الکاس مثثلة حادة . الثلاث مشرشرة . فصوص الجيب حادة - الربيع -

bracteosa, Boiss. ب . الفلسي . الفلوس قلبية بيضية اورحيمة اعرض من الفرع - ساحل

سورية البحري . فلسطين . مصر

٣ التترديکس *TETRADICLIS, Stev.*

الکاس رباعية الاقسام مستمرة . الثلاث ٤ قصيرة الخالاب مستمرة . القرص غير واضح . الاسدية ٤ خويطاتها محززة مستمرة . المبيض ذو ٤ زوايا و ٤ غريفات ومركزه منعطف . البويضات ٦ في كل غريفة . الغريفات منشقة على المصاريع - اعشاب سنوية لحمية صغيرة ازهارها سنبلية ذات فلوس ورقية ولوراقها مقصوفة ذات ذنبيات

T. salsa, Stev. . التترديکس المالح ① متفرع من العنق . الوراق ريشية . الراسيات طويلة

- الربيع - مستنقعات لحمية وغير لحمية في مرج دمشق والاسكندرية والى الشرق

٤ الپکام *PEGANUM, L.*

الکاس ذات ٥ اقسام مستمرة مفتوحة في النصف . الثلاث ٥ متراكبة . الاسدية ١٢ - ١٥ عريانة متسعة القاعدة . المبيض كروي ذو ٢ غريفات او ٤ . البويضات متعددة . الجيب ذو ٢ غريفات تشق على المصاريع - اعشاب منتصبه اوراقها غير قياسية الخرق متعددها ذنبياتها هليمة صغيرة ازهارها انتهازية مقابلة الوراق

P. Harmala, L. . الپکام المحرمل 2f املس . السوق عشبية متشعبة وكورنية . الوراق

كثيرة الخرق خطيبتها حادتها . الثلاث مستطيلة اهليلجية اطول قليلاً من الکاس . الجيب منتصب منعطف القمة - اول الصيف - جوارب الطرق واماًکن مقفرة في سورية والبلقاء وبادية سبنا ومصر

• HAPLOPHYLLUM, Juss.

٥ الهلوفايل

الكاس ذات ٥ اقسام. البويضات ٥ قبعية كاملة. الاسدية ١٠ قواعدها متسعة مستقلة او متحدة قليلاً. المبيض ذو ٥ فصوص. البويضات ٢ - ٤ في كل غرقة. القمة راسية. الجيب غديدي غريقاًها منشقة الى الانسية او غير منشقة - اعشاب متصلة الجذر كثيرة السوق منتصبها اوراقها بسيطة او ثلثية المخرق تزهرها كورني ذو فلولس

* ذات ٤ بويضات في كل غرقة. الاوراق غير منشقة. الخويطات مستقلة

H. sylvaticum ١

* * ذات بويضتين في كل غرقة

II. *fruticulosum* ٣ *villosulum* ٢ *Blanchet* ٤ *Buxbaumii* ٥ *tuberculatum* ٦

longifolium ٧

H. sylvaticum, Boiss. ١ الهلوفايل الغالي 2f املس. السوق كثيرة متصاعدة عالية بسيطة. الاوراق متبسة جالسة مستدقة القاعدة مستطيلة رمحية حادة. الكورنب مندمج واحياناً زغبى. الزينات قصيرة. فصوص الكاس صغيرة مثثة. الاسدية ثلثا التويج طولاً. تحدبات المبيض نصف الغرقة طولاً - الصيف - غابات الجبل الاقارع

H. fruticosum, Labill. ٣ الهلوفايل العجيبى 2f منفرد اللبيد. السوق بسيطة او متفرعة. الاوراق بسيطة جالسة مخنانية والسفلى منها صغيرة بيضية والبقية مستطيلة رمحية او خطية. الكورنات مندمجة. الزينات اقصر من الزهرة. خرق الكاس بيضية كالة. التلات ملساء كالة. الخويطات ثلثا التويج طولاً. المبيض وبري ذو قرينات مخروطية مخننية الى الداخل - من تدمر الى دمشق ووادي بردة

H. villosulum, Boiss. et Haussk. ٣ الهلوفايل الوبيري 2f وبيري. السوق عصوية متشعبة كورنية. الاوراق السفلى بسيطة والبقية ذات ٣ خرق مفضنة خطية والعليا منها مستدقة. الزينات اطول من الكاس. خرق الكاس بيضية هدية. التلات ملساء اهليجية خطية. الخويطات لحوية القاعدة. المبيض املس - كروم عينتاب

H. Blanchet, Boiss. ٤ هيلوفيلم بلانش 2f اخضر زغبى ذو غديدات سوداء. السوق عصوية. الكورنات راسية. الاوراق بسيطة خطية مانفة الخوافي زغبية من الاسفل. الازهار جالسة تقريباً. اقسام الكاس بيضية مستدرة كالة هدية. التلات ملساء مستطيلة قبعية محبرة. الخويطات متحدة قليلاً.

المبيض املس - الربيع - الجبل الايض في بادية سورية

H. Buxbaumii, Poir. ٥. هبلوفيل بكصوم 2f اصفر مخضر زغبى . السوق متصاعدة متفرعة من الاعلى. الاوراق كالة بيضية مقلوبة ملوقة مستدقة الى رجلة وجميعها بسيطة والعليا منها ثلاثية الاقسام. الكورنب متسع. خرق الكاس خضراء ملساء او قليلة الغطاء بيضية كالة. البنات ملساء مستدقة من الاسفل صفراء مستطيلة كالة. الخويطات لحوية الى منتصفها. المبيض املس - الربيع واول الصيف - مزارع سورية

stenophyllum, Boiss. ب. الضيق الورق . بعض الاوراق ذات ٢ خرق ملوقة خطية

- من عينتاب الى دمشق . ساحل سورية المجري

lasiocarpum, Boiss. الحرش الثمر . انسي الجيوب زغبى - بين حلب وانطاكية

corymbulosum, Boiss. ث. الكورني . الاوراق الأقل من العليا منها بسيطة.

الكورنبات صغيرة . الازهار صغيرة - عين السلطان

H. tuberculatum, Forsk. ٦. المهلوفيل المتدرون 2f متدرون زغبى او مستملس .

السوق متصاعدة كثيرة الشعب . الاوراق السلى واوراق الفروع العاقرة بيضية مقلوبة او مستطيلة ملوقة مستدقة الى رجلة والعليا ملوقة خطية كالة. وحوافى الجميع متموجة شرافية ثولولية . فروع القيات ثولولية . الازهار جالسة تقريباً . خرق الكاس صفراء بيضية كالة . البنات ملساء مستطيلة كالة. المبيض املس او عنقائي - اول الصيف - جنوبي فلسطين والغور . بادية اثية . مصر

obovatum, Hochst. ب. البضي المقلوب . جميع الاوراق بيضية مقلوبة - بين مصر

وسويس

H. longifolium, Boiss. ٧. المهلوفيل الطويل الورق 2f اخضر لرج محرش بغدد بارزة.

السوق متعددة نخيلة يابسة التفرع . الاوراق خطية ٤.٥ متر الى ٥.٥ طولاً وحوافها متموجة مثلثة . الكورنبات صغيرة . الازهار مندمجة جالسة . خرق الكاس ملساء بيضية كالة. البنات ذات غخاب قصيرة . المبيض والقلم املسان - الربيع - الادوية الحارة بين مارساها والبحر الميت

الرتبة الثامنة والعشرون السياروبية . SINAIASUBAE.

الازهار خشوية . السبلات ٥ متر كبة . البنات ٥ . الفرص لحمى . الاسدية ٥ . المبيض ذو ٥

غريقات . الثمر نووي - اشجار اورانها بلا غدد

الزقوم^٥ BALANITES, Delil.

القرص مجوف القبة. المخويطات عريانة. نصف المبيض مندغم في القرص. الثمر زيتوني الهيئة - شجرة ذات ثوبك ابطي متين واوراق مترادفة ذات ورقتين وازهارها مخضرة قيمة النظام
B. *Egyptiaca*, Del. الزقوم المصري^٥ الرجلات الاصلية والثانوية قصيرة. الوريقات
مخضائية بيضيه زغبية. القميّات ذات ٢ ازهار الى ٥. الپتلات خطية ملساء اطول من السپلات -
الربيع - قرب اريحا. بادية ارض الصعد

الرتبة التاسعة والعشرون الازدرختية^{٥٥} MELIACEÆ.

الازهار قياسية خشوية. الكاس ذات ٥ اقسام متراكبة. الپتلات ٥ مستقلة. الاسدية ٨ - ١٠
مندغمة في ظاهر حافة القرص متحدة المخويطات. المبيض مستقل ذو ٢ غريقات الى ٥. القلم ١. الثمر نووي
مستحيل الى جيب عند جنافه

الازدرخت MELIA, L.

الپتلات خطية ملوقة مهرومة في النسييف. السبة ذات ٢ فصوص الى ٦. الجيب ذو ٥ غريقات
جدرانها عظمية وفي كل منها بزرّة - اشجار اوراقها ثنائية التركيب الريشي
M. *Azedarach*, L. الازدرخت ازدرخت (الزترخت) ^٥ الاوراق ساقطة.
الوريقات منحرفة بيضيه او مستطيلة مدببة غير متظمة الاسنان. المناقيد كثيرة الازهار طويلة الزناد.
الپتلات منفردة ٤ اضعاف الكاس طولاً الى ٥ - الربيع - مزروع ومستوطن

الرتبة الثلاثون النبقية RHAMNACEÆ.

الازهار غالباً خشوية. الكاس ذات ٤ خرق الى ٥ مصراعية في النسييف وانبوبتها ملتصقة كثيراً
قل بالمبيض. الپتلات مثلها عدداً مندغمة في حنجرتها ونادراً مفردة. الاسدية مثل الپتلات عدداً
مندغمة معها تقابلها. القرص مستقل او مبطن انبوبة الكاس ونادراً متلوج. المبيض محاط بالقرص
ونادراً ملتصق كثيراً قل بانبوبة الكاس ذو غريقتين الى ٤. القلم متصب. السبات ٢ - ٤.
البويضات منفردة في الغريقات. الثمر نووي اوجيب - اشجار او شجيرات وانجيب

PALIURUS, Juss.

المغيلان

انبوبة الكاس مخروطية مقلوبة وفصوصها ٥ دولابية ساقطة . البتلات ٥ مندغمة مع الاسدية في القرص المبطن الكاس . المبيض مندغم الى منتصفه في القرص ذو ٢ غريفات . الاقلام ٢-٣ . الثمر جاف محاط بمجناح عريض مخفياني ونواته خشبية ذات ٢ غريفات و ٢ بزور - شجيرة اوراقها مترادفة مخفيانية ذنبها ابرية

P. aculeatus, Lam. المغيلان الابري ذو كثير الفروع . الاوراق بيضية منفرجة مضحكة الشرافات . الراسيات قصيرة . المجناح متموج شرافي - الربيع والصيف - سياجات . كثير الوجود في سورية وفلسطين وشرقيها

ZIZYPHUS, Juss. العناب

الكاس والبتلات والاسدية كما في المغيلان . المبيض محاط بالقرص وقاعدته ملصقة به ذو غريفتين او ٣ . الاقلام ٢-٣ . الثمر نووي ذو غريفة الى ٢ وبزرة الى ٢ - شجيرات او اشجار اوراقها مترادفة مخفيانية *Z. vulgaris*, Lam. | العناب الاعتيادي ذو الفروع متعرجة ملساء . الذنبتان

مستشككتان احلاهما صغيرة منعقة او منفودة . الاوراق متوسطة مستطيلة بيضية ملساء اسنماها صغيرة . الازهار ٣-٥ باقية . النوية بيضية مستطيلة لذيدة - اول الصيف - كثير الوجود في سورية

Z. Spina-Christi, L. ٢ العناب شوك المسيح (النبق . السدر) ذو الفروع بيضاء ملساء . الذنبتان متبستان احلاهما منعقة . الاوراق كبيرة ملساء (او الاعصاب زغبية من الاسفل) مستديرة الفاعلة او قليتها بيضية او مستطيلة مضحكة الشرافات . الازهار باقية . الزينات لبادية . النوية بيضية كروية لذيدة - الربيع - غور الاردن . بادية سينا . مصر

inermis, Boiss. ب . بلا شوك . الاوراق كبيرة . يزروع في سورية ومصر

Z. Lotus, L. ٢ العناب لوتس ذو الفروع متعرجة بيضاء ملساء . الذنبتان ابريتان احلاهما منعقة . الاوراق صغيرة بيضية مستطيلة مضحكة الشرافات . الازهار قليلة باقية . النوية كروية تقريباً - الربيع - باناس

RHAMNUS, L. النبق

الكاس ذات ٤ خرق او ٥ ساقطة . البتلات ٤-٥ مندغمة في حافة انبوبة الكاس . الاسدية ٥-٤ . القرص مسترق مبطن انبوبة الكاس . القلم ذو قمعين الى ٤ او غير منقسم المبيض مستقل ذو

٣ غريبات أو ٤ الشمر مؤلف من عجمتين أو ٤ لحبة أو جافة - النجم أو شجيرات ازهارها ثنائية المسكن أو مزوجية ونادراً خنثوية

* بلاشوك

R. Alaternus | Libanotica I

** مششيك

R. punctata ٢ Kurdica ٤ petiolaris ٥

R. Alaternus, L. ١ . النبق المترادف (الزفرين) ١ الملس. الاوراق متوسطة سنجيانية

مستهرة بيضية أو اهليلجية متباعدة السنينات وذات رجيلات . الراسيات ابطية وانتهائية قصيرة مندمجة .
الفلوس صغيرة بيضية لبيدية . الاسدية ٥ . خرق الكاس رحيمة حادة . الپنلات مفقودة . النووية سوداء
بيضية مقلوبة كروية - الربيع - جبال يبلان ولبنان وساحل سورية البحري . بانياس

R. Libanotica, Boiss. ٢ . النبق اللبناني ٢ الفروع ضخمة متكئة القاعدة . الاوراق

كبيرة ساقطة مستديرة القاعدة قصيرة الرجيلات بيضية أو مستطيلة بارزة الاعصاب متقاربة السنينات
صفراء اللبيد ريشية الوردية . النووية عفاثة - الصيف جردان نجت جرود لبنان وجبل الشيخ

R. punctata, Boiss. ٣ . النبق المنقط ٣ مششيك الفروع لبيدية . الاوراق صغيرة

قصيرة الرجيلات سنجيانية ضخمة كاملة ملتفة الحوافي مستلسة من الاعلى لبيدية من الاسفل بيضية مقلوبة
أو مستطيلة أو اهليلجية . الزنيدات كالكاس طولاً . الپنلات رحيمة صغيرة . القرص عفاثي . النووية بيضية
مقلوبة - الربيع - غابات واثن سورية وفلسطين

Palæstina, Post . ب. الفلسطيني (العجم) . الاوراق مستلسة من الاسفل شريفة - سورية

وفلسطين (R. Palæstina, Boiss.)

R. Kurdica, Boiss. et Hoh. ٤ . النبق الكردي ٤ الخراعيب مشبكة . الاوراق سنجيانية


خضراء باهتة قصيرة اللبيد بيضية أو مستطيلة ملوقية كالة أو مستعدة متباعدة الشرافات غديبها .
الازهار قليلة باقية مثل زنادها طولاً . النووية صغيرة بيضية مقلوبة - الصيف - كروم شمالي سورية

R. petiolaris, Boiss. ٥ . النبق الرجيلي ٥ الفروع منفرجة . الاوراق مقابلة الفروع

مثل وجيلاها طولاً تقريباً ملساء اسفينية القاعدة أو قليتها تقريباً مستطيلة حادة شرافية . الازهار باقية .
النووية جافة كبيرة - الصيف - عيتاب . غابة اهدن . البنور تسمى حبوب العجم وترسل الى اوربا
من برانضول للباغ

الرتبة الحادية والثلاثون الكرمية. AMPELIDÆÆ.

شكل ٨١



ث ث

ب. غصن من الكرم المحمل بالخمر على أوراق وعن. ث. زهرة نرى فيها
البتلات متصلة بقمها من القرص. ث. زهرة بعد سقوط البتلات ترى
فبها فصوص القرص بين الاسدية

الازهار قياسية خشوية او
ثنائية المسكن. الكاس صغيرة
كاملة او ذات ٤ اسنان او ٥
ومبطنة من الداخل بخفت قرصي
او جري. البتلات ٤-٥ مندغة
في ظاهر حافة القرص تغطل
اسنان الكاس. الاسدية مثل
البتلات عددًا مندغة امامها.
المبيض مستقل ذو غريفتين
الى ٦ في كل منها بويضة او ٢.
القلم ١. العمة راسية - النجم
متعرشة

الكرم (العريش) VITIS, L.

الكاس كاملة او مضحجة الاسنان. البتلات مستقلة او ملتصقة القم تسقط على هيئة قلمسوة. القلم
طويل او العمة جالسة. الثمر عيني - النجم ذات عنق
v. *Orientalis*, Lam. الكرم الشرقي ث. امس. الفروع مخططة. الاوراق مثالية المحيط ثنائية
التفصيل الريشي والعليا منها احيانًا ذات ٣ وريقات فقط. الوريقات ذات رجيلات وغبراء من الاسفل
مستديرة القاعدة او اسفينيةما يضيعة مستطيلة كبيرة الاسنان. الزناد اقصر من الاوراق متشعبة قمية.
فصوص الكاس ٤ مضحجة. البتلات ٤ قبية اطول كثيرًا من الكاس. العناية معقبة ذات ٤ بزور -
الربيع - جبال شمالي سورية الى سويدية

الرتبة الثانية والثلاثون السايندية SAPINDACEÆ.

الازهار قباية او غير قياسية مزوجية ثنائية المسكن ونادرًا خشوية. السهلات متراكبة ٤-٥


ونادراً متعددة مستتلة او مخددة كثر اوراق. البتلات منفردة او ٢-٥ قياسية. القرص كامل. الاسدية ٤-١٢. المبيض كامل او منفصل ذو غريفة الى ٤ في كل منها بويضة او ٢. الاقلام ٢-٣. الثمر جيب او متناج - اشجار او شجيرات

١. *Acer*. الاوراق بسيطة منصصة كنية. الازهار مزوجية. الثمر متناج
٢. *Staphylea*. الاوراق ريشية وريفاها مسنة. الازهار خنثوية. الثمر جيب غشائي

١ القيقب *ACER*, L.

الازهار مزوجية. الكأس ذات ٥ اقسام ساقطة. البتلات ٥ ونادراً منفردة. الاسدية ٨ ونادراً ٤-١٢ وخويطات الازهار السدية اطول مما في المدقية. المبيض ذو فصين وقلمين. المتناج طويل الجناحين - اشجار اوراقها كنية بسيطة متقابلة

شكل ٨٢



ب. غصن نوع من القيقب ثابت في اميركا على اوراق سدية. ت. زهرة واحدة منفصلة. ث. غصن على اوراق مدقية. ج. زهرة واحدة منها بعد نزع فلويس الباقية. ح. ذلك بعد نزع الكأس. خ. باقة من الثمار المتفاحية. د. ثمرناضج (متناج) فتمى جراباً واحداً مفتوحاً. ذ. ورقة من اوراق

١. *A. Hyrcanum*, F. et Mey. القيقب الهيركاني في الاوراق غبراء من الاسفل ذات

ه فصوص والنصوص الثلاثة المتوسطة مجذومة القبة ذات ٣ فصوص والاثان الجانبيان حادان. الازهار

طويلة الزيدات مرتبة في كورنبات مدلاة . المبيض املس . جناحا الثمر متصبان تقريباً - الصيف
 Reygassei, Boiss. ب. ريكاس . قاعة الاوراق مجذومة تقريباً - لبنان بقرب اهدن
 ٣ A. Monspensulanum, L. . القيقب المونزيسبولي ٧ الاوراق الجديدة عفاثة الوجه
 السفلي وثلاثة الوجه العلوي قلبية القاعدة او مستديرتها ذات ٣ فصوص مستطيلة بيضية كاملة او
 شرافية . الكورنبات جالسة تقريباً منفضة . السبلات والبنات بيضية مستطيلة . متساوية طولاً . المبيض
 عفاثي . الجناحان متصبان او منفرجان - الربيع - جبال شمالي سورية ولبنان والجبل الشرقي
 microphyllum, Boiss. ب. الصغير الورق . الاوراق نحو ٢,٠ متر طولاً وعرضاً - لبنان
 وجبل الشيخ
 شكل ٨٣



مفتاح القيقب السوري

٣ A. Syriacum, Boiss. et Gaill. . القيقب
 السوري ٧ الاوراق الجديدة لمساء مثل رجلها طولاً
 او طول مخيانية مصفرة لماعة من الاعلى مستمرة مستديرة
 القاعدة اسفينيتها مجذومة القمة ذات ٣ فصوص عريضة
 قصيرة . اوراق الفروع الجديدة خفيفة الحوافي او مسننتها
 مستطيلة او ذات ٢ زوايا . الكورنبات جالسة تقريباً منفضة .
 السبلات والبنات بيضية والبنات نصف السبلات طولاً .
 الجناحان منفرجان - الربيع - لبنان والجبل الشرقي

٣ الستافيليا STAPHYLEA, L.

الازهار خنثوية . السبلات ٥ ساقطة . البنات ٥ . الاسدية ٥ . المبيض منفصل الى قاعدته تقريباً
 ذو غريقتين او ٣ متعددة البويضات . الاقلام ٢ - ٣ . مستقلة تقريباً . السمات راسية . الجيب ذو سوقة
 منفتح - شجيرات اوراقها ريشية
 S. pinnata, L. . الستافيليا الريشية ٧ الوريقات ٥ - ٧ متباعدة مستطيلة رمحية مدببة
 مسننة اسناتاً صغيرة . الراسيات انتهائية طويلة الزناد بيضية مدلاة . البنات مستطيلة ملوقية . مثل
 السبلات طولاً والسبلات بيضية مقلوبة . فصوص الجيب متغامزة - الربيع - جبل اللكام

الرتبة الثالثة والثلاثون البطمية TEREBINTHACEÆ.

الازهار مزوجية ثنائية المسكن ونادراً خنثوية . الكاس صغيرة مستمرة ذات ٣ حرق الى ٧ .

البنات كحرق الكاس عددًا مندغبة في قاعدة القرص مصراعية وإحيانًا مفقودة. الاسدية مثل البنات عددًا. المبيض ذو غرفة ١ وبذرة ١ - أشجار أو شجيرات وأوراقها مترادفة

١ الساق RHUS, L.

الأزهار خنثوية أو مزوجية ثنائية المسكن. الكاس صغيرة ذات ٥ خرق. الاسدية ٥ مندغبة عند قاعدة القرص. الأقسام أو السامات الجالسة ٢. النوية صغيرة جافة منضغطة - شجيرات وأوراقها بسيطة أو ثلثية المنشأ أو ريشية

١. *R. Cotinus*, L. الساق كوتينس ٥ أ. الأوراق بسيطة بيضية مقلوبة كاملة غبراء من الأسفل. العناقيد كبيرة مركبة انتهائية. كثيرة من الزيدات متلهوجة عفائية. الأزهار خنثوية. النوية بيضية مقلوبة وريدية لمساء ذات نواة مثلبة - الربيع - شمالي سورية

٢. *R. Ceriaria*, L. الساق كورياريا ٥ الأوراق ريشية مفردة ذات ٥ أزواج الى ٧ والورينات وبذرية من الأسفل ذات أسنان كبيرة. العنقود مندج انتهائي. الأزهار مزوجية. النوية كروية كلبية سرية ذات وبر حامض - أول الصيف - سورية وفلسطين

٣. *R. oxyacanthoides*, Dum. الساق الشبيه بالزعرور ٥ الفروع كثيرة معوجة شوكية. الأوراق لمساء ثلاثية المنشأ والرجلة أقصر قليلًا من الورينات والورينات جالسة أسفلية القاعدة بيضية مقلوبة مسننة من منتصفها الى رأسها. الراسيات قصيرة انتهائية. الأزهار ثنائية المسكن. النوية لماعة لمساء كروية - الصيف - سفح لبنان فوق صيدا. وادي العرب في التيه

٢ الفستق PISTACHIA, L.

الأزهار ثنائية المسكن بلا بنات. الأزهار السدية. الكاس ذات ٥ خرق صغيرة. الاسدية ٥ قصيرة الخويطات متحدة من الأسفل بالقرص. المدقة. الكاس ذات ٢ خرق أو ٤. المبيض جالس أحادي الغرفة. القلم قصير ثلاثي الشعب. النوية ذات بذرة واحدة - أشجار أو شجيرات تفرز صغًا أوراقها مترادفة وغالبًا ريشية عنقيدها أو راسياتها بطية. أزهارها صغيرة

١. *P. vera*, L. الفسق الحقيقي (القمميدة) ٥ الأوراق خلية في الأول ثم مستطيلة ريشية مفردة ذات زوج أو زوجين أو بسيطة. الرجلة زغبية. الورينات متسعة سنجانية كالة أو حموية لماعة من الأعلى. العناقيد يابسة. الشجر كبير مستطيل حموي - الربيع - عين التينة بقرب دمشق. مزروع في بساتين سورية وفلسطين

٢. *P. Terebinthaceae*, L. الفسق البطم. (البطم) ٥ الأوراق ساقطة ريشية مفردة

ذات ٤ أزواج الى ٦. الرجيلة ملساء زاوية. الوريقات مستطيلة بيضية مستطيلة أو مستطيلة ريمية منحرفة الفاعدة متألثة من الاعلى طويلة المحبة. الازهار في عناقيد. العنود المشهر متيبس النمر يضي حموي - الربيع

Palæstina, Post. ب. **الفلسطيني**. الوريقات أكثر تدبياً مما في الرمز. الوريقات الانتهائية

صغيرة أو مفقودة وحيث ينوب منها سبل. الرجيلة زغبية - كثير الوجود في سورية وفلسطين
(*P. Palæstina, Boiss.*)

٣. *P. mutica, F. et M.* **الفسق الاصح** ٥ الاوراق اساقطة ريشية مفردة ذات زوجين

الى ٤. الرجيلة زغبية ذات حافة ضيقة قرب منهاها. الوريقات بيضية أو مستطيلة كالة سرحاء غفائية الحافة لماعة من الاعلى. العناقيد المثمرة متيبسة. النمر صغير يضي منلوب حموي - الربيع - شمالي القدس

٤. *P. Lentibicus, L.* **الفسق المستيك (المستيك)** ٥ الاوراق مستهرة ملساء ريشية

شفعية ذات ٢ أزواج الى ٥. الرجيلة مجحفة. الوريقات صغيرة تنحنيانية مستطيلة ريمية وبيضية كالة حموية. الراسيات بسيطة سنبلية مندحجة. النمر كروي منضغظ حموي - الربيع - سورية وفلسطين

الرتبة الرابعة والثلاثون البانية MORINGEÆ.

الازهار خموية غير قياسية. الكاس ذات ٥ اقسام مستطيلة خطية متراكبة وانبوبها قصيرة. الثلاث ٥ مرادفة خرق الكاس متراكبة مندغمة في انبوبة الكاس. القرص مبطن انبوبة الكاس. الاسدية ١٠ مندغمة في حافة القرص ٥ منها اكبر من البقية ذات اثنيات و٥ خطية عاقرة. المبيض مستقل ذو غرقة واحدة ٣ مشيات جنارية. البويضات متعددة. القلم منعطف مجذوم القمة. المحجب شبيه بقرنة ذو ٣ زوايا الى ٦

البان MORINGA, Jusq.

شجيرات اوراقها ثنائية التفصيل الريشي بلا ذنبيات عناقيدها متسعة

M. aptera, Gært. **البان العادم الجناح** ٥ مستطيل. الاقسام الاولى للورقة ٢ أزواج.

الرجلات الثانوية طويلة اسلية. الوريقات متباعدة مستطيلة كالة والسفلى منها غالباً متراذفة. الثرون ذات ٦ ميازيب. البزور بلبلية بلا اسحجة - الصيف - الغور. بادية سينا ومصر

الفصيلة الثالثة الكاسية الازهار. CALYCIFLORÆ.

الكاس متحدة كثر او قل . القرص الحامل الاسدية ملتصق بانبوبة الكاس مستغل عن المبيض او موصل الكاس بالمبيض . البتلات مثل اقسام الكاس عدداً اقل منها مندغمة في قمة انبوبة الكاس او القرص الذي يطنها او مفقودة . الاسدية متنوعة عدداً مندغمة في حافة القرص او باطنه . المبيض متعد او منفصل الى ثمرات تفضن في انبوبة الكاس مدة الازهار على الغالب

القسيمة الاولى المنفصلة البتلات. POLYPETALÆ.

الرتبة الخامسة والثلاثون القرنية. LEGUMINOSÆ.

الازهار غير قياسية على الغالب خنثوية ونادراً قياسية واذ ذاك غالباً مزووجة . الكاس ذات ٥

شكل ٨٤

ت



ث



خ

ج

ت . زهرة فراشية . ث . العلم . ج .

الزورق . ح . خ . الجناحان

اسنان والسن الخامس سفلي او الكاس ذات شفتين . البتلات مستقلة على الغالب ونادراً متحدة بعضها ببعض او بالاسدية وفي الازهار غير القياسية فراشية (شكل ٨٤) واما ان يغطي العلم بقية البتلات او يغطي الجناحان العلم . وفي الازهار القياسية البتلات مصراعية في التصنيف . الاسدية مندغمة تحت المبيض غالباً وفي احادية الخوة او ثنائيتها او مستقلة ونادراً غير محدودة العدد . المبيض مستغل ذو غريفة واحدة ومشممة على جانب واحد . البويضات متعددة على الغالب ونادراً واحدة فقط . القرقرية غالباً ذات مصراعين غشائيين ونادراً نووية وقد تنقسم القرنية الى غريفتين باثنا الدرز الى الداخل (٢٢) او غريفات عديدة بواسطة حواجز مستعرضة (٢٦ - ٤١) - اعشاب او اشجار او اوراقها غالباً مترادفة ذنبية واحياناً مركبة تركيباً كلياً او ريشياً

الرتبة الاولى الفراشيات. PAPILIONACEÆ.

التوج فراشي كثر او قل . الكاس متحدة على الاقل الى

خارج القرص. البتلات متراكبة والعليا (اي العلم) خارجية. الفلتان حرفيتان

السبط الاول. البوداليريّات. *Podalyriæ*. الاسدية مستقلة. القرنة غير منفصلة.

انجم اوراقها ثلثية الوريقات

١. *Anagyris*. نجمة اوراقها ذات ٢ وريقات وازهارها راسمية صفراء ملتصقة العلم

السبط الثاني. الجنستيات. *Genistæ*. الاسدية ذات خوة واحدة ونصف

الاثيرات قصيرة منقبة تحتها البقية وهي طويلة ثابتة القاعدة. حافتا الجناحين مطويتان او مجمدتان -

انجم ونادراً (٤) اعشاب

* الاوراق بسيطة

٢. *Crotalaria*. بلا شوك وبلا ذنبيات. القرنة متفتحة. الازهار صفراء

٩. *Retama*. (الرم) بلا شوك وقليل الوراق. الازهار بيضاء متوسطة متراكبة

١٠. *Spartium*. (الوزال) بلا شوك وقليل الوراق. الازهار صفراء كبيرة مسترسلة

* * الاوراق بسيطة او ذات ٢ وريقات اصبعية النظام

٣. *Lotononis*. بلا شوك صغير مستلق مخنص بالبادة. الوريقات صغيرة اسطوانية بيضية مغلوقة

٥. *Argyrolobium*. بلا شوك منتصب فضي حريري. القرنة مخنقة بين البرور بلا غدد

٦. *Adenocarpus*. " " " " القرنة غير مخنقة بين البرور غدية

٧. *Calycotome*. (القندول) شوكي مشبك الفروع. الكاس مجذومة. القرنة ذات ٤ زوايا

٨. *Genista*. شوكية او بلا شوك. الوراق متفرقة على الفروع. الازهار صفراء. الكاس شفوية

١١. *Cytisus*. بلا شوك. الذنبيات هلبية. الازهار صفراء متوسطة. القرنة مستطيلة

١٢. *Gonocytisus*. بلا شوك. الفروع عسلجية. الازهار صفراء صغيرة. القرنة معينة

* * * الاوراق كفية ذات ٥ وريقات او اكثر

٤. *Lupinus*. (الترمس) منتصب كثيف الشعر. الذنبيات متحدة بالرجلة

السبط الثالث. النفليات. *Trifoliæ*. الاسدية ذات خوتين ونادراً خوة -

اعشاب ونادراً انجم اوراقها نفلية او بسيطة تنتهي اوردتها باسنان

١٣. *Ononis*. الازهار في راسيات او سنابل ورقية. القرنة غالباً منتفخة مستطيلة او خطية بلا منقار

١٤. *Trigonella*. ذات رائحة حلوية. القرنة مستطيلة او خطية او مغالطحة عريضة وذات منقار

- Medicago. ١٥.** الأزهار صفراء في رؤوس أو راسيات مندحمة. الثمرة ملتفة الشفاقاً مغليلاً أو حلزونية
Melilotus. ١٦. ذات رائحة حنظل قوية. الثمرة كروية أو بيضية غير مغلفة بالكأس الجافة
Trifolium. ١٧. الأزهار غالباً في رؤوس. الثمرة صغيرة، متضمنة في الكأس أو التويج المستعنيين

٢٥. *Biserrula*. القرنة خطية محبوزة طولاً مسننة الحوافي

السبط السادس. الكورونيليات. *CORONILLEÆ*. الاسدية ذات خوتين.

القرنة اسطوانية او منضخطة مقسومة الى قطع غير منشئة منفصلة عند النضج ذات بذرة واحدة

٢٦. *Scorpiurus*. الاوراق بسيطة. القرنة ملتفة طولاً مثثة طولاً مضلة

٢٧. *Hammatolobium*. الاوراق ذات ٥ وريقات بلا رجلة تقريباً. القرنة كما في ٢٨

٢٨. *Ornithopus*. الاوراق ريشية. القرنة قلادية نفاصيلها اسطوانية او مستطيلة

٢٩. *Coronilla*. " " . القرنة اسطوانية ذات ٤ زوايا ومنصلة بجواجز مستعرضة

٤٠. *Hippocrepis*. الاوراق ريشية. حافة القرنة العليا متعرة عند البزور والفواصل قوسية

السبط السابع. الهديساريات. *HEDYSAREÆ*. الاسدية ذات خوتين او خوة

واحدة. القرنة ملفطة او اسطوانية منفصلة طولاً ونادراً بلا تفاصيل ذات بذرة او ٢ - اعشاب اوراقها ريشية او بسيطة وريقاتها كاملة وازهارها راسمية او سنبلية

٤١. *Hedysarum*. درزا القرنة شرايفان ونفاصيلها متعددة ونادراً ٢ - ٣ تنفصل عند النضج

٤٢. *Onobrychis*. القرنة غير منقسمة مستديرة ملتفة سنجية حائتها عريفة او توتوبة

٤٣. *Alhagi*. القرنة مخنثقة على غير انتظام بين البزور قلادية نفاصيلها غير منفصلة عند النضج

السبط الثامن. الباقيات. *VICIEÆ*. الاسدية ذات خوتين انثرياتها متغلبة. القرنة

غير منفصلة ذات مصراعين. الفلتان ضخمات ثقبان تحت الارض في الاستفراخ غير متغيرتين -

اعشاب منخفضة او متعرشة اوراقها ريشية مفردة او شفعية او منتهية بنعم وقد تكون رجيلات فقط شبيهة

برريقات والورقات بلا ذنبيات

٤٤. *Cicer*. الفلم خيطي بلا لحية والسمة انتهائية. القرنة متفخفة

٤٥. *Vicia*. الفلم محاط بلحية بقرب طرفه او ذوحمة شعر من الاسفل بقرب قمته او امس

٤٦. *Ervum*. الفلم لحوي من الاعلى بلا لحية من الاسفل. اعشاب تشبه *Vicia* هيئة

٤٧. *Lathyrus*. الفلم مبروم قليلاً متسع قرب طرفه ذو لحية من الاعلى. الرجولة منتهية بنعم او سبل

٤٨. *Orobus*. الفلم غير مبروم وفي غير ذلك مثل ما في سابقه. الرجولة منتهية بسبل او وريثة

٤٩. *Pisum*. الفلم حيزومي مطوي وينزب من الاسفل لحوي من الاعلى. الذنبيات كبيرة ورقية

السبط التاسع. اللوبيات. *PHASEOLEÆ*. الاسدية ثنائية الخوة او احاديها تقريباً

الاثرياعا متقلبة او نصفها ثابتة القاعدة . القرنة غير منفصلة ذات مصراعين . الفلتان ضخمتان صاعدتان فوق الارض في الاستفراخ غالباً . الاوراق الاولى متقابلة - اعشاب معبرة متعرشة اوراقها نغلية وريشية ورباقها كاملة او منفصلة ذات ذنبيات

٥٠. *Vigna* . الازهار باقية على قمة زند ابطي . الفشار معند

٥١. *Rhynchosia* . الازهار في راسيات ابطية . الفشار غير معند

الرتيبة الثانية السيزليبينيات *CÆSALPINEÆ*.

الازهار غير قياسية . الكاس منفصلة الى القرص . العلم مقطعاً بالمجانحين . الاسدية مستقلة

السبط العاشر . الكاسيات *CASSIÆ* . الاوراق ريشية . البتلات غير فراشية ٥ او مقودة . الاثريات ثابتة القاعدة ونادراً متقلبة . المبيض (اوسويقنة) مستقل في قعر الكاس

٥٢. *Cassia* 24 الازهار خموية صفراء كبيرة . الاثريات مثبتة من القاعدة

٥٣. *Ceratonia* 2 الازهار ثنائية المسكن او مزووجة . القرنة منسومة عرضاً بمجواجر لينة

السبط الحادي عشر . البوهينيات *BAUHINÆ* . الاوراق بسيطة كاملة . البتلات ٥ شبيهة بالنراشية . الاثريات متقلبة . المبيض (اوسويقنة) مستقل او ناعم بقعر الكاس

٥٤. *Cercis* . اشجار ازارها وردية مرتبة في راسيات قصيرة على الفروع القديمة

الرتيبة الثالثة الميهوسيات *MIMOSEÆ*.

الازهار قياسية صغيرة والبتلات مصراعية متحدة تحت متنصفا

السبط الثاني عشر . الادينانتيريئات *ADENANTHERÆ* . الاغلفة خمسة خمسة . الاسدية ١٠ غالباً مستقلة والاثريات مكلفة بغدة ساقطة . حبيبات اللقاح متعددة منفصلة

٥٥. *Prosopis* . شجيرات اوراقها ثنائية التفصيل الريشي . القرنة ضخمة اسنجية القوام

السبط الثالث عشر . اليوميوسيات *EUMIMOSEÆ* . الاغلفة اربعة اربعة او خمسة خمسة . الكاس بيوسية . الاسدية ضعف البتلات او مثلها عدداً مستقلة والاثريات غير غدية . حبيبات اللقاح متعددة منفصلة

٥٦. *Mimosa* . شجرة اوراقها ثنائية التفصيل الريشي

السبط الرابع عشر . السنطيات *ACACIÆ* . الاغلفة اربعة اربعة او خمسة خمسة .

الكاس مصراعية. الاسدية غير محدودة مستقلة او الانسية منها متحدة قليلاً. كتل الفاج ٢-٦ مجتمعة في غريفة واحدة

٥٧. *Acacia*. النجم او اشجار اوراقها ثنائية التصلب الريشي

السبط الخامس عشر. الانجيات. *INGEE*. السبلات والبتلات ٥ على الغالب.

الكاس مصراعية. الاسدية غير محدودة منبثقة متحدة عند القاعدة او الى منتصفها. حبيبات الفاج ٢-٦ مجتمعة في غريفة واحدة

٥٨. *Albizia* ث بلا شوك اوراقها ثنائية التصلب الريشي. القرون طويلة عريضة مفلطحة

١ المجرود *ANAGYRIS, L.*

الكاس جرسية اسنانها ٥ غير متساوية. الجناح أطول من العلم واقصر من الزورق. القرنة ذات سويقة ومفلطحة متعددة البزور منقسمة بمجواجز حوصلية — نجمة اوراقها ثنائية والذنبتان متحدتان تقابلان الورقة

A. foetida, L. المجرود المتن ث الوريقات رجمية اهليلجية كالة حموية. الراسبات قصيرة

جانبية. العلم ملتح بسواد. القرنة مخنقة. البزور بنفسجية — آخر الشتاء — صخور سورية وفلسطين

٢ الكروتالاريا *CROTALARIA, L.*

فصوص الكاس مستقلة ونادراً ذات شفتين. الاسدية متحدة في غمد مثنوق من الاعلى. القرنة مستفحة غالباً وبزورها متعددة — اعشاب وانجم اوراقها بسيطة والذنبات مفنودة

١. *C. Thebaica, Del.* الكروتالاريا الليبية ث متفرق الوير. الفروع مستقلة منشعبة

شكل ٨٥



ثم مستشبكة. الاوراق عفاثية حموية جالسة والساقية معها مستطيلة والفرعية صغيرة بيضية. الازهار قليلة مسترسلة الراسبات. خرق الكاس عفاثية رجمية ثلثة اضعاف انبوبها طولاً. البويضات ٢-٣. القرنة ضعف الكاس طولاً بيضية كروية زغبية — آخر الشتاء — بادية الصعيد

٢. *C. Egyptiaca, Benth.* الكروتالاريا المصرية ث

الفروع كثيرة متصبية يابسة لمسأوا والملازمة الزغب مستشبكة ثم مستشبكة. الاوراق صغيرة جالسة بيضية مستشبكة. الراسبات مسترسلة. خرق الكاس

رجمية ثلثة اضعاف انبوبها طولاً. القرنة بيضية ضعفنا الكاس طولاً او أكثر فرع منه من الكروتالاريا الليبية

ملساء - الربيع - بادية سينا ومصر

٣ اللوتونونس LOTONONIS, D. C.

الفصوص الاربعة العليا للكاس متحدة زوجين وهي اضيق واطول من النصف السفلي. خوة الخويطات مشقوقة من الاعلى. القرنة مستقيمة او منحرفة - اعشاب او نجيلات اوراقها نغلية
L. dichotoma, Del. اللوتونونس المتشعب ♂ او ♂ زغبي. السوق منشرة متشعبة.
 الوريقات اسطوانية بيضيه مقلوبة. الازهار بيضاء مصفرة ٢-٦ في المحزم. خرق الكاس العليا ضعفا السفلى طولاً. الزورق اطول من العلم والكاس. القرنة مستطيلة ذات ٦ بزور مفضضة الى ١٠ - الربيع - بادية سينا ومصر

Persica, Post. ب. الفارسي. القرنة ذات ٤ بزور الى ٥ ملساء. الزورق مثل العلم طولاً

قريباً - بادية سينا (*L. Persica*, *Jaub. et Sp.*)

٤ الترمس LUPINUS, L.

الكاس شغوية وغالباً ذات فلوس. الجناحان غالباً متحد القبة. جميع الاسدية متحدة في انبوبة مغلقة. القرنة ملفطة كثر او قل مقسومة بمجاذر مستعرضة حريصلية - اعشاب سنوية اوراقها اصبعية
 * البزور درنية حرشة

L. pilosus, L. ١. الترمس الشعري (الفول البري) ♂ منفرج الشعر. الساق بسيط

او منفرج قليلاً من الاعلى ضخ ٢٥٠ متر عالياً. الوريقات بيضيه مقلوبة ملوقيه مستطيلة. الراسم قصير دولاني. الفلوس رحيمة. الزيدات اقصر من الكاس. شفة الكاس العليا متشعبة والسفلى اطول منها كاملة. الزورق مخن. القرنة عريضة ذات ٢ بزور حرشة مجهزة بمجدة اعلى الندبة - الربيع - مزارع سورية
digitatus, Post. ب. الاصبعي. القرنة ٢٠١ متر عرضاً. البزرة اصغرماً في الرمز وكثر

تفلطاً - ارض العيد (*L. digitatus*, *Forsk.*)

L. Palaestinus, Boiss. ٢. الترمس الفلسطيني ♂ منفرج اللحية. الساق منفرج من العنق

والفروع متصاعدة ٢٢ متر الى ٢٠ عالياً. الوريقات ملوقيه مستطيلة. الراسم متباعد الدواليب. الفلوس خطية ساقطة. الزيدات اقصر قليلاً من الكاس. شفة الكاس العليا متشعبة والسفلى اطول منها كاملة. الزورق مخن على زاوية قائمة. القرنة خطية عريضة كثيرة اللحية ذات ٢ بزور او ٤ - الربيع - من بيروت الى غزة

* * البزور مستوية

٣. *L. hirsutus*, L. الترمس العفائي ⊙ ذو شعر صدائي منفرج. الوريقات بيضية مقلوبة

ملووية. الراسم يضي غير واضح والدوايب. الفلوس مخزنية. شفة الكاس العليا متشعبة والسفلى ذات ٢ خرق. التويج ضعف الكاس طولاً. القرنة لحوية صدائية ذات ٢ بزور او ٤ سنجابية سمراء - الربيع - سواحل سورية ولبنان الى علو ٧٠٠ متر

glabrescens, Post. ب. المستحسن. القرون طويلة مستمسة ذات ٤ بزور او ٥ - بيروت

٤. *L. angustifolius*, L. الترمس الضيق الورق ⊙ ملازم الزغب. الاوراق خطية

مستطيلة. الراسم مندمج. الزنيدات قصيرة مترادفة. شفة الكاس العليا متشعبة والسفلى ذات سنتينين او ٣. البزور ٢ - ٤ سنجابية متلحظة لعنًا يضاء ومخططة خطوطًا غير قياسية صفراء - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

٥. *L. reticulatus*, Desv. الترمس المشتبك ⊙ ملازم الزغب. الوريقات خطية ضيقة

مبزية. الراسم مسترسل. الزنيدات قصيرة مترادفة. شفة الكاس العليا متشعبة والسفلى اطول منها كاملة تقريباً. البزور بيضية كروية يضاء ذات خطوط مشتبكة سوداء ولطح غامقة منقطة بسواد - الربيع - جنوبي فلسطين

٦. *L. Ternat.*, Forsk. الترمس ترمس ⊙ حريري وبري. الوريقات بيضية مقلوبة

مستطيلة او مستطيلة اهليجية وبرية من الاسفل هدية لمساء من الاعلى. الراسم طويل مسترسل. الازهار مترادفة. البتلات يضاء مزرققة الغمة. شفة الكاس العليا كاملة والسفلى ذات ٢ سنينات مضحلة او كاملة. البزور يضاء منحصرة - الربيع - مزروع وذاتي في سورية وفلسطين ومصر

٥. الارجيرولوبيوم *ARGYROLLOBIUM*, Eckl. et Zeyh.

الكاس شفوية والشفة العليا متشعبة والسفلى ذات ٢ خرق. الاسدية متحدة في انبوبة غير مشقوقة.

القرنة مجوزة اكثر اقل بين البزور - نجيحات اوراقها تنلبة

١. *A. crotarioides*, J. et Sp. الارجيرولوبيوم الكروتلاري ⊙ فضي حريري.

الاروع منتصب. الوريقات متشابهة مستطيلة رعية مطوية. الزنيدات قصيرة. الراسيات طويلة بسيطة تقريباً انتهائية. التويج كبري اطول قليلاً من الكاس. القرون حريرية خطية مستطيلة ٢٠١ متر الى ٢٠١٥ طولاً - الصيف - من عينتاب الى تحت جرد لبنان والمجل الشرقي

٢. *A. uniflorum*, Decaisn. الارجيرولوبيوم الاحادي الزهر ⊙ فضي حريري.

الاروع كثيرة باسة منفرجة. الوريقات متشابهة مستطيلة وخطية. الازهار منفردة صغيرة مقابلة الاوراق.

الزبدات قصيرة. الفرج أطول قليلاً من الكاس. القرون حربية خطية ٢.٠٢ متر طولاً - الربيع - لبنان. بادية البية وسينا

ADENOCARPUS, D. C.

٦ الادينوكريس

الكاس شفوية والشفة العليا متشعبة والسفلى ذات ٢ خرق. الاسدية متحدة في انبوبة غير مشقوقة. الفرنة مستطيلة غدية - النجم اوراقها نغلية ازهارها صفراء مرتبة في راسيات انتهائية

شكل ٨٦



A. divaricatus, L'her. الادينوكريس المتشعب

الفرع منفردة زغبية او مستمسة. وريقات الاوراق السفلى بيضية مستطيلة والعليا مضايقة. الكاس زغبية او مجهزة بغدييات ذات سويقات وشفة السفلى اطول من العليا والخرقة المتوسطة اطول من الجانبيتين. العلم غنائي. قاعدة الفرنة ضيقة - الصيف - ثمر الادينوكريس المتشعب ١٠. اليوناني

Græcus, Boiss. ١٠. اليوناني. الفروع والكاس وهرية - تحت جرد لبنان

Bivonæ, Boiss. ب. بيقونا. الفروع مستمسة. الكاس غنائية او غدية - جبل اللكام

ولبنان

٧ القندول CALYCOTOME, Link.

الكاس غشائية مجذومة مضخلة السنينات. مخالب البتلات مستقلة. الاسدية متحدة في انبوبة غير مشقوقة. درز الفرنة العلوي منحج - النجم فروعها متشعبة مشبكة فروعها مشبكة اوراقها نغلية

C. villosa, Vahl. القندول الوبري. الفروع مضطحة. الوريقات بيضية مقلوبة.

حربية من الاسفل. الازهار متراكمة عند العقد العليا ذات زبدات. الكاس وهرية. القرون رباعية الزوايا تقريباً صوفية متفتحة - اول الربيع - سياجات سورية وفلسطين

٨ الجنستا GENISTA, L.

شفة الكاس العليا متشعبة والسفلى ذات ٢ خرق. الزروق غالباً منحج الى الاسفل. مخالب البتلات السفلى غالباً متحدة بالانبوبة السدوية وهذه الانبوبة غير مشقوقة. الفرنة مضغطة كثر اقل معينة او بيضية او خطية - نجبات بلاشوك او شوكية اوراقها بسيطة او نغلية ازهارها صفراء

* الفرنة بيضبة او معينة منخرقة المنقار ذات بررة او برزق

G. acanthoclada | *sphacelata* ٢ *Anatolica* ٣

* الفترة خطية او رحيمة مستطيلة مستقيمة معقدة متعددة الزروع على الغالب

G. albidia ٤ *Lydia* ٥ *Libanotica* ٦

G. acanthoclada, D. C. ١. الجنس الشوكية الفروع ٥ ملازم الغناء. الفريعات

متقابلة تقريباً منتصبة شوكية مستقيمة. الاوراق جالسة تقريباً نغلية خطية مطوية. الزينات متقابلة تقريباً ثلث الكاس الى نصفها طولاً. الكاس حريرية واسنان الشفة العليا مثل الانبوبة طولاً او اقصر منها. الفترة حريرية بيضية معينة - الصيف. الجبل الاقصر. صافيا

G. sphacelata, Decaisn. ٢. الجنس الميتة ٥ قليل الغناء ناعمة. الفريعات شوكية

متقابلة تقريباً منتصبة شوكية مستقيمة. الاوراق بسيطة خطية او مستطيلة ملوقة تسجل العليا منها الى حراشف صغيرة بيضية سوداء. الازهار متراذفة والزينات اقصر من الكاس. الكاس مستقيمة واسنانها العليا مثانة قصيرة. القرون بيضية واخيراً ملساء - الصيف - طرابلس. الكرمل

G. Anatolica, Boiss. ٣. الجنس الاتصولية ٥ الفروع منتصبة والفريعات شوكية منتصبة.

الزغب قصم متزج بشعر طويل والشوك الابطي عاقر حامل ورق. الاوراق بسيطة متراذفة مستطيلة او خطية ملوقة. الراسيات انتهائية قصيرة متجهة بشوك. العلم حريري من الخارج. الفترة ملازمة الغناء بيضية معينة مدبة - الصيف

Cassia, Boiss. ب. الاقري. عناني غير لبادي. العلم امس - جبل اللكام والاقصر

G. albidia, Willd. ٤. الجنس المبيضة ٥ بلاشوك. كنيف الفروع مستطيل درني.

الفريعات متصاعدة قصيرة. الشبر ملازم او منفرج. الاوراق رحيمة مستطيلة حادة والزهرة منها بيضية ملوقة. الازهار ابطية منفردة او ثنائية تكون راسيات انتهائية قصيرة. الزينات مثل الكاس طولاً او اقصر منها. الفترة ملازمة الغناء مستدقة القاعدة مخنجة قليلاً - الصيف

Pestalozzae, Boiss. ب. بستالوتزا. لبادي. الاوراق قصيرة مستطيلة والزهرة منها

بيضية ملوقة. الراسيات قليلة الازهار - جبال شالي سورية

G. Lydia, Boiss. ٥. الجنس الليدية ٥ بلاشوك. امس او قليل الغناء الهدني درني.

الفروع منتصبة غالباً مطولة والفريعات متصاعدة مخططة. الاوراق صغيرة اهليجية خطية او ملوقة. الراسيات مسترسلة. الفترة ملساء معقدة خطية - الربيع - جبل صابا في شالي سورية

G. Libanotica, Boiss. ٦. الجنس اللبنانية ٥ بلاشوك حرمي. الفروع خشبية مستقيمة

متعددة الفريعات. الفترة ملساء معقدة خطية - الربيع - جبل صابا في شالي سورية

ملازم. الازهار ١-٤ في راسم انتهائي قصير. القرنة قليلة الغناء ملازمة - الصنف - جرود لبنان والجبل الشرقي وتحت جرودها

٩ الترم RETAMA, Boiss.

الكاس كنية. الخالب ملتصقة بالانبوبة السدوية. القرنة متفخمة مستديرة ابيضية غير منشقة ذات بذرة واحدة - النجم فروعها المزهرة عريانة والعاقرة ذات اوراق صغيرة بسيطة خطية
 E. Retam, Forsk. الترم رتم في الفروع كثيرة منتصبه والمزهرة منها ملازمة الزغب او مستهلكة والعاقرة ملازمة الزغب. الاوراق حموية ٢٠٠٥ مترطولا. الازهار بيضاء ١-٥ في باقات جالسة تقريبا. البتلات ملساء الانفما وهي حريرية. القرنة مستطيلة بيضية مدببة - الربيع - ساحل سورية البحري. بادية النبه وسينا ومصر

١٠ الوزال SPARTIUM, L.

الكاس غشائية كنية مشنوقة من الاعلى ذات ٥ سنينات. العلم عريض مستدير. مخالب الجناحين ملتصقان بالانبوبة السدوية. بتلات الزورق منفصلان. القرنة خطية كبيرة البزور - نجمة ذات اوراق بسيطة

S. junceum, L. الوزال الاسلي في الجذع خشبي. الفروع العليا منخطة اسلية عريانة تقريبا. الاوراق خطية مستطيلة او مستطيلة. الازهار كبيرة صفراء مرتبة في راسيات انتهائية. القرنة ملساء ٢٠٦ متر الى ١٠ طولاً - الصنف - اماكن صحريه في سورية وفلسطين

١١ السيتسس CYTISUS, L.

الكاس شوية. الخالب البتلات متقلبة الامدية متحدة في انبوبة. القرنة منضغطة مستطيلة او خطية - النجم بلاشوك اوراقها اصوية ذات ٢ وريقات

C. Casalis, Boiss. I. السيتسس الاقريقي في الفروع منتصبه ملساء كثيفة الخراشيب. الوريقات ضعف الرجل طولا بيضية مقلوبة كالة مستدقة القاعدة والجذبة منها ملازمة الغشاء ثم ملساء. الازهار ٢-٥ في رؤوس عند قمم الخراشيب. شفة الكاس العليا مجذومة متشعبة والسفلى ذات ٢ اسنان خطية. القرنة صوفية - الصنف - الجبل الاقارع

C. drepanolobus, Boiss. II. السيتسس المنجلي القرنة في منتصب كورني او عنودي. الترم ملزم الغشاء الو فاب خفرا اما في الاعلى قلة الغناء الملازم. الاسفل اهلبيبة قسيرة

الحمة . الأزهار متعددة مندمجة محاطة بالأوراق العليا . شفة الكأس العليا ذات فصين والسفلى ذات ٣ أسنان خطية هلبية . الفترة ملازمة الغشاء مجلّية - أول الصيف - جبل اللكام شكل ٨٧ والأقرب إلى الشمال



فرقة السينس السوري

٣ C. Syriaeus, Boiss. et Bl. السينس السوري ٥ الفروع مطولة مخططة منفرجة الغشاء . الخرايع يبسة . الأوراق عنائية والورقات المثلجية ومستطيلة طويلة الحمة . الأزهار ٢-٩ في راسيات على أطراف الفروع . شفة الكأس العليا متشعبة إلى قاعدتها والسفلى كاملة . الفروع منخية عنائية - الصيف - غابات الصنوبر في وإسط لبنان

١٢ الكونوسيتيس GONOCYTISUS, Spach.

الكأس بليلة مجذومة منفرجة مضخمة الشفتين . والعليا منها قصيرة الشعبتين والسفلى ذات ٣ سنينات . الزروق غير منعطف . محالب الثلاث السفلى ملتصقة بالانبوبة السدوية . الانثريات لحوية القاعدة والقمة . الفترة معينة او مستطيلة ذات بزره إلى ٢ - النجم عالية بلاشوك أوراقها الآ العليا منها ذات ٣ ورقات اصبعية ازهارها صغيرة صفراء



فرقة الكونوسيتيس
المجناحي الفروع

G. pterocladus, Boiss. الكونوسيتيس المجناحي الفروع ٥ ملازم الغشاء الخرايع مثنية مجنحة . الأوراق جالسة والورقات مستطيلة . الراسيات مطولة مسترسلة . الزروق مثل العلم طولاً واقصر وأطول من المجناحين قليلاً . الفترة منفرجة القاعدة والراس ذات حافة . القلم منفرج - الصيف - التلول والصخور في جبال اللكام والأقرب ولبنان وساحل سورية البحري

١٣ اللّتين ONONIS, L.

خرق الكأس متشابهة تقريباً . الزروق ذو منقار . الاسدية ذات خوق واحدة . نصف الانثريات طويلة مندمجة بواسطة قاعدتها والبقة مغنلتها اقصر منها مثقلية . الفترة غالباً منتفخة مستطيلة او خطية - اعشاب او نجيلات ذنباتها ملتصقة بالرجلة أوراقها نغلية ريشية ذات زوجين

* معرفة

O. antiquorum ١ Columnæ ٢ adenotricha ٣ Natix ٤ vaginalis ٥

† القرنة مدلاة . الزيدات ذات ركة بفرب قمها

O. ornithopodoides ٦ Sicula ٧ breviflora ٨ biflora ٩ reclinata ١٠ pubescens ١١

† القرنة منتصبه . الزينة بلا ركة

O. variegata ١٢ hirta ١٣ serrata ١٤ phyllocephala ١٥ mitissima ١٦

alopecuroides ١٧

O. antiquorum, L. ١. لتين القدماء (المبرق) 2٤ مجهز بغدد جالسة ويبري أو

مستمسك. الشوك كثيف. السوق متعرجة. الورقات صغيرة بيضية مقلوبة أو مستطيلة. الأزهار إبطية

منفردة متباعدة. الزناد أقصر من الكاس. الفرون بيضية عدسية غنائية. البزور ١ - ٢ درنية حرشة

— الربيع والصيف — مزارع وجوانب الطرق في سورية ولسطن

leiosperma, Post. ب. الاملس البزور. ويري أو صوفي والورقات مستطيلة. البزور

أملس — سورية (O. leiosperma, Boiss)

longispina, Post. ت. الطويل الشوك. الشوك ٢٠٢ من إلى ٢٠٤ طولاً — قرب الارز.

الحوران

O. Columnæ, All. ٢. لتين العمود (اي جبل طارق) 2٤ غدي زغبي مخفض.

السوق متصاعدة. الرجلات طويلة والورقات بيضية مقلوبة مستطيلة. الأزهار جالسة تقريباً منفردة في

الأباط مكوّنة رأسيات ورقية. التويج مثل الكاس طولاً أو أقصر منها. القرنة ويبرية برصية معينة مثل

الكاس طولاً تقريباً — الصيف — عيتاب. تحت جرود لبنان

O. adenotricha, Boiss. ٣. اللتين الغدي الشعر 2٤ قزم متفرج الغطاء غدبة. السوق

متصاعدة قليلة الفروع. الأوراق طويلة الرجلات وأحياناً ذات زوجين والعلما منها بسيطة. الورقات بيضية

مقلوبة مغططة. الزناد اسرج أو ذو سبل وزهرة واحدة تعلو الورقة على الغالب. خرق الكاس مخززية

رحبة ٢ أضعاف الانبوبة طولاً أو ٤. التويج أطول قليلاً من الكاس. القرنة غنائية مستطيلة ضعف

الكاس طولاً — الصيف — تحت جرود لبنان

stenophylla, Boiss. ب. الضيق الورق. الورقات اسفينية أو خطية مستطيلة —

عيتاب. جبل منبطري

O. Natrix, L. ٤. اللتين ناتركس (اللصيق . اللتين) 2٤ عال غدي غنائى. السوق

متصاعدة. الأوراق طويلة الرجلات نفلية أو ذات زوجين والعلما منها أحياناً جالسة. الورقات مستطيلة

ذات سنينات. السوق منتهية بعنقود كبير ورتي. الزناد ذات زهرة وسلة. خرق الكاس، زهرة اذمان.

انبوبتها طولاً. التوج ضعف الكاس طولاً. العلم مخطط أحياناً خطوطاً حمراء. القرنة خطية عنقائية ضعف الكاس طولاً - الصيف - كثير الوجود في سورية وفلسطين

tomentosa, Boiss. ب. الصوفي. صوفي مستشيب - بيروت. القدس

stenophylla, Boiss. ت. الضيق الورق. مستشيب. الوريقات والذنبات مندمجة

مجموعة قرب اطراف الفروع. الوريقات صغيرة خطية - شواطئ سورية

microphylla, Boiss. ث. الصغير الورق. اخضر مخفض. الوريقات بيضية مقلوبة

مستديرة. العلم أكثر استدارة مما في الرمز - القدس

macrophylla, Post. ج. الكبير الورق. الوريقات ٢.١ متر طولاً أو أكثر مستطيلة بيضية

مقلوبة مسننة. الأزهار ٢.١٥ متر طولاً أو أكثر كثيفة. العلم مخطط - صردة

laxiuscula, Post. ح. المسترسل. عنقائي غدي. الأوراق متباعدة وريقاتها خطية ٢.٠١

عرضاً أو أقل. الزناد طويلة. الأزهار ٢.٠١ متر طولاً مرتبة في رأسهم مسترسل - سورية

O. vaginalis, Vahl. د. التين الغمدي ٢٤ صوفي مستشيب. الفروع قصيرة منصاعة

والذنبات متراكبة غمدية وكثيراً ما تكون بلا أوراق. الوريقات ١ - ٢ صغيرة بيضية مقلوبة حادة

الاسنان. الأزهار قليلة والراسيات قصيرة مندمجة. الزناد ذات زهرة واحدة ٢.٥ اضعاف الورقة طولاً.

خرق الكاس ٢ اضعاف انبوبتها طولاً ولانبوبة بلبلية. التوج ضعف الكاس طولاً. القرون وبيرية

مستطيلة ضعفاً الكاس طولاً أو أكثر - الصيف - بيروت. ارض الحوارة في لبنان والجبل الشرقي والجماء.

الرميل بقرب الاسكندرية. وربما يعتبر تيناً من السابق ذكره

O. confertiflora, Wiedow, L. ٦. التين الشبيه بالاورثويس © غدي زغبى. الساق

شكل ٨٩



مخفض متفرع والفروع عنقودية. الأوراق السنلى بسيطة والبقية نغلية والريقات

في الأوراق السفلى بيضية وفي العليا مستطيلة اسفينية. الزناد ذات زهرة ٢

والزنبات ذات سبل. خرق الكاس مخززية ٥ اضعاف انبوبتها ومثل التوج طولاً.

القرنة خطية معقدة - الربيع - من دمشق وبيروت الى البلقاء والكركم

O. Stenzel, Guss. Y. التين السيسيلي © قصير الحية والشعر العدي.

الساق منتصب مخفض (٢.١٥ متر). الأوراق العليا بسيطة والبقية نغلية وريقاتها

خطية مستطيلة حادة السينات والوريقات العليا حادة. الذنبات كاملة تقريباً. الشبيه بالاورثويس

الزناد ذات زهرة واحدة وسبل وهي مثل الورقة طولاً. خرق الكاس خطية مخززية ٤ اضعاف انبوبتها

طولاً واطول من التوج. القرنة عنقائية ضعف الكاس طولاً. الينور ٢٠ - ٢٤ - الربيع - من حلب

وقد مر الى بادية سيناء ومصر الى الشرق

٨. *O. breviflora*, D. C. اللتين القصير الزهر ○ قصير اللحية والشعر الغدي. الساق

شكل ١٠



منتصب (٢٠ متر) متفرع. الاوراق السفلى والعليا بسيطة والبقية

نفلية والورقات مستطيلة اهليلجية والورقة الانتهاية اكبر من

الجانبيتين. الذنبات كاملة تقريباً. الزناد مثل الاوراق طولاً ذات

زهرة واحدة وسبل. خرق الكاس خطية رحمة ٥ اضعاف الانبوبة

ونصف القرنة العفائية طولاً وطول من التويج. البنور ١٠ الى ١٢ - زند اللتين القصير الزهر وقرنته. ب.

السبل. ت. الركبة

الربيع - مزارع سورية وفلسطين

٩. *O. oblonga*, Post. ب. المستطيلي. الورقات مستطيلة - طرابلس - عارياً

٩. *O. biflora*, Desf. اللتين ذو الزهرتين ○ منفرج الزغب غديه. الساق منتصب

متفرع. الاوراق السفلى احياناً بسيطة والبقية نفلية ريشية وورقاتها مستطيلة بيضية مقلوبة او مستطيلة

كالة او محذومة. الذنبات مستطيلة مثل الرجل طولا. الزناد ذات زهرة او ٢ مثل الورقة طولاً او

اطول منها. خرق الكاس رحمة مخززية ضعف الانبوبة ونصف التويج طولاً. القرنة ذات سوقة وعفائية

٢ اضعاف الكاس طولاً الى ٤ - الربيع - القدس

١٠. *O. reclinata*, L. اللتين المنثني الى الاسفل ○ ويري غدي ناعم. السوق مخفضة ٢١٥

متفرعاً ومنفرجاً او متشعباً. الاوراق ذات رجيلات والسفلى منها بسيطة والبقية نفلية وورقاتها بيضية مقلوبة

اسفينية او خطية محذومة مسننة القبة. الذنبات بيضية مسننة. الازهار صغيرة ابضية متفرقة او مرتبة راسياً

قصيراً ورقياً. الزناد سرحاء تقريباً ذات زهرة ١. خرق الكاس ٢ اضعاف انبوتها الى ٤ ومثل التويج

الارجواني طولاً. القرنة عفائية اطول قليلاً من الكاس - الربيع -

١١. *O. pubescens*, L. اللتين الزغبي (الديقة) ○ زغبي غديدي. الساق منتصب

صمغ متفرع كورني. الاوراق طويلة الارجيلات والسفلى والعليا منها بسيطة والبقية نفلية وورقاتها كبيرة بيضية

او اهليلجية. الذنبات رحمة عريضة كاملة. الراسيات انتهاية قصيرة مندحمة. الزناد سرحاء مثل

الكاس طولاً ذات زهرة ١. خرق الكاس مستطيلة رحمة ذات ٥ اعصاب انصر من التويج واطول من

القرنة والقرنة بيضة معينة حموية. البنور ٢ الى ٢ - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

١٢. *O. variegata*, L. اللتين المتنوع ○ السوق متكئة او متشعبة زغبية. الاوراق

جالسة تقريباً بسيطة الا السفلى وهي نفلية والورقات بيضيه مقلوبة مغضنة مستهلسة ذنباتها بيضيه غديه عصية منشارية. الازهار باطية مرتبة في راسيات انتهائية مسترسلة. الزناد اقصر قليلاً من الكاس. خرق الكاس مثل انبوبتها ونصف التوج الاصفر طولاً. الفترة زغبية اطول قليلاً من الكاس - الربيع - رمال شاطئ سورية وفلسطين

١٢. *o. hirta*, Desf. اللتين العفائي © السوق متصاعدة او منشرة متفرعة عفائية. الاوراق السفلى بسيطة والبقية نفلية وورقاتها بيضيه مقلوبة حادة السنينات. الذنبات مستطيلة مسننة. الراسيات مندحجة. الزناد قصيرة. خرق الكاس رحمة ٢ اضعاف انبوبتها ومثل التوج البنفسجي طولاً. الفترة عفائية اقصر من الكاس - الربيع - رمل ساحل سورية البحري. مرج ابن عمير

١٤. *o. serrata*, Forsk. اللتين المنشاري © زغبي لرج. السوق مستقيمة متكسنة. الاوراق طويلة الرجلات والهرمية منها بسيطة والبقية نفلية وورقاتها مستطيلة خطية حادة السنينات. الذنبات مثلية رحمة. الزناد قصيرة او مقنودة. خرق الكاس رحمة مخززية ٢ اضعاف انبوبتها الى ٤ ومثل الفترة الزغبية طولاً واقصر قليلاً من التوج الوردى او المبيض - الربيع - شواطئ سورية ومصر. بادية سينا - وربما هو تباني من النوع السابق

major, Boiss. ب. الاكبر. السوق اكثر انصافاً ما في الرمز. الورقات بيضيه مستطيلة او مستديرة تقريباً. الازهار اكبر ما في الرمز - رأس بيروت. طرابلس او مستديرة تقريباً. الازهار اكبر ما في الرمز - رأس بيروت. طرابلس. *laxiuscula*, Post. ت. المسترسل. الورقات خطية مستطيلة. الراسيات مسترسلة -

بيروت

obovata, Post. ث. البيضي المقلوب. الورقات بيضيه مقلوبة. الازهار كبيرة. الراسم مسترسل. خرق الكاس مخززية - الحوارة

١٥. *o. phyllorrhoea*, Boiss. اللتين الورقي الرووس © منفرج الغشاء. الاوراق قصيرة الرجلات نفلية وورقاتها مستطيلة او اسطوانية حادة السنينات مخططة. الذنبات بيضيه مسننة. الازهار جالسة تقريباً مجمعة في رأس مختلطة باوراق قد تكون بسيطة. خرق الكاس رحمة ٢ اضعاف انبوبتها وضعف التوج الوردى طولاً. الراسم ورقي طويل سنبلي في الاثمار. الفترة عفائية بيضيه نصف الكاس طولاً او اقل. البنور الى ٢ حرشة - الربيع - اللاذقية. قلمون

١٦. *o. anisocarpa*, L. اللتين الاثقم © السوق متصبية متفرعة قليلة الزغب. الاوراق قصيرة الرجلات ملساء لماعة او حلبيية اكثرهما نفلية والورقات اهليلجية مخططة حادة السنينات. الذنبات مستطيلة معاننة. الازهار مرتبة في سنابل مندحجة ورقية القاعة والكورس مغطاة بذنبات

متفتحة غشائية بيضاء متراكبة. خرق الكاس رحيمة حسيكية هدية. القرنة بيضية مثل الكاس طولاً -
الربيع - مزارع سورية وفلسطين ومصر وشرقها

O. alopecuroides, L. ١٧. اللّبن الشبيه بالالوپيكورس ٥ قليل الغناء. الساق
منتصب. الأوراق بسيطة ناشئة من غمد ذنبية ذي اذبتين وهي كبيرة مستطيلة مسنة. الازهار جالسة
نربياً مرتبة في رؤوس سبيلية مختلطة بأوراق خطية. خرق الكاس مخروضة ضعف انبوتها والقرنة
البيضية طولاً وأطول من التويج الوردية. البنور ٢ لماعة - الربيع - بيروت. لبنان. مرج ابن عمير

١٤ الحلبة *TRIGONELLA*, L.

خرق الكاس ٥. الزورق كال. الاسدية ذات خوتين مستقلة عن الهلات. الخويطات غير
متسعة القمة. القرنة خطية اورحيمة او مستطيلة او بيضية وفي اسطوانية او منضغطة وغالباً ذات منقار -
اعشاب سنوية اوراقها نغلية ريشية ذنبياها ملتصقة بالرجلة

القسم الاول الحلبة الحقيقية *EUTRIGONELLA*. القرنة خطية اورحيمة او مستطيلة
مستقيمة او منحنية او شصية اسطوانية او منضغطة الا انها غير منفلجة وقرطاسية

١. الفرون متعصبة او منفرجة على هيئة كوكبية

* الازهار مرتبة في رؤوس. الفرون مستطيلة قصيرة

T. Besseriiana ١

* الازهار جالسة ابضية منفردة او مزدوجة. المنقار طويل

T. Foenugræcum ٢ *Berythea* ٣ *Cassia* ٤

*** الازهار صيوانية او مرتبة في راسيات قصيرة. الفرون خطية شبكية

T. Porteri ٥ *astroites* ٦ *spinosa* ٧ *crassipes* ٨ *Monspeliaca* ٩ *monantha* ١٠

ب. الفرون منعقة

* الفرون مسندقة الى منقار

† الفرون مختلطة طولاً

T. strangulata ١١ *Aleppica* ١٢ *Cœlesyriaca* ١٣

†† الفرون مشبكة او ملساء

‡ البنور بيضية او مستطيلة

T. Spruneriana ١٤ Hierosolymitana ١٥ Kotschy ١٦ Sibthorpii ١٧

‡ ‡ البنور اسطوانية

T. cylindracea ١٨ filipes ١٩ lilacina ٢٠ velutina ٢١

** الفرون بلا منقار تقريباً خطية او مستطيلة

† الأزهار راسية

T. corniculata ٢٢ hamosa ٢٣ laciniata ٢٤ occulta ٢٥

† † الأزهار صيوانية

T. maritima ٢٦ stellata ٢٧ anguina ٢٨

** * الفرون في راس مندمج شصية

T. spicata ٢٩ minima ٣٠

القسم الثاني بوكوكيا. POCOCKIA. الفرون مفلطحة قرطاسية ذات اعصاب واوردة.
الأزهار صفراء

T. glomerata ٣١ Arabica ٣٢ radiata ٣٣

T. Besseriiana, Ser. ١. الحلبة البسريانية ١. الورقات مستطيلة وخطية. الأزهار مزرقة

مجمعة في رؤوس بيضية والأثمار في سنابل مستطيلة. الفرون ٢.٠٠٣ متر طولاً مستطيلة منضغطة مخططة
طولاً محدبة الضلع العلوي مستدقة الى منقار اقل منها طولاً ذات بذرة او ٢ - الربيع - يروت .
والارجح انه عرضي من ارمينيا حيث هو وطني

T. Foenugraecum, L. ٢. حلبة حشيشة الاروام (الحلبة) ٢. متصبب. الورقات

بيضية مقنونة او مستطيلة. اسنان الكاس مثل انبوبتها طولاً. التوجع مبيض. القرن ٢.٠٨ متر الى ٢.١
طولاً اعصابها متباعدة متفهمة. البنور ١.٠ الى ٢.٠ - الربيع - منفلت من الزرع في سورية ومصر

T. Berythea, Boiss. et Bl. ٣. الحلبة البيروثية ٣. متساعد مخفض. الورقات بيضية

مقنونة اسفينية وقد يكون عرضها أكثر من طولها. اسنان الكاس اقصر من انبوبتها. التوجع مزرقة.
القرن ٢.٠٦ متر الى ٢.٠٨ طولاً اعصابها متقاربة متوازية بارزة. البنور ٨ الى ١٢ - الربيع - من طرابلس
الى صيدا. اسافل لبنان - اقل علواً من السابق ذكره وأكثر انفرجاً

T. Cassia, Boiss. ٤. الحلبة الاقريقية ٤. السوق ٢.٠٤ متر الى ٢.٠٨ علواً. الورقات

صغيرة مفروضة. خرق الكاس ثلث انبوبتها طولاً. التوجع بنفسي بامت اطول من الكاس. القرن ٢.٠٤
متر الى ٢.٠٨ طولاً. اعصابها متفهمة. البنور ٦ الى ٨ - الصيف - غابات الجبل الاقارع

T. Porteri, Post. ٥. حلبة بورتر ⊙ منفرع من القاعة ٢٤ متر علواً مستطلس. الورقات بيضية مقلوبة اسفينية مسننة القمة. الأزهار ١ الى ٢ صوانية والزند مثل الورقة طولاً. خرق الكاس رحيمة ثلاث انبويها طولاً. التويج مزرق أكثر من ضعف الكاس طولاً. القرنة قوسية قليلاً ٢٠٣ متر الى ٢٠٤ طولاً بمخضطة طولاً حومية. البزور ١٠ الى ١٢ - الربيع - بيروت. نادراً وربما عرضي هناك

T. astroites, F. et M. ٦. الحلبة الكوكبية ⊙ متصاعد او منفرج. الورقات صغيرة قلبية مقلوبة اسفينية. الزند مثل الورقة طولاً. الأزهار ٦-١٢ جالسة ٢٠٠٤ متر طولاً. القرون ٢٠١٥ متر طولاً الى ٢٠٣ رغبية حومية مغضنة عرضاً والدرز الانسي مستقيم والوحيثي جوفي - الربيع - من عنتاب وحلب الى تد مرواشيا

T. spinosa, L. ٧ الحلبة الشوكية ⊙ الورقات بيضية مقلوبة او قلبية مقلوبة اسفينية. الزند قصير ذو سبل. الأزهار ٢-٤ جالسة ٢٠٠٣ طولاً. القرون ملساء منفرجة مخنجة على هيئة نصف دائرة أو أكثر ذات ابردة مستعرضة مخرفة متفهمة قليلاً - الربيع - اماكن عشبية في سورية وفلسطين



شكل ٩١

longipes, Post. ٨. الطويل الزند. الورقات قلبية

مقلوبة مستطيلة اسفينية القاعة مستدقما. الزناد السفلى طويلة. القرون ٢٠٤ متر طولاً - بيروت

شكل ٩٢



T. crassipes, Boiss. ٨. الحلبة الضخمة الزند ⊙ الورقات

صغيرة مثلثة مقلوبة مخرومة. الزند أقصر من الورقة قصير أثناء الإزهار ثم يستطيل في الإنماد ويتضخم. الأزهار ٥-١٠ جالسة ٢٠٠٣٥ متر طولاً مرتبة رؤوساً. القرون متضخمة متوازية تقريباً مستعرضة الضوض متوجتها ضخمة الدروز - الربيع - من مزارع عنتاب وحلب الى راشيا

T. Monspellia, L. ٩. حلبة جبل پيليون ⊙ السوق

مستطيلة او متصاعدة. الورقات بيضية مقلوبة اسفينية. الأزهار ١٨٦-جالسة ٢٠٠٣ متر طولاً مرتبة في رؤوس جالسة ابطية. القرون منفرجة على هيئة كوكبية ضخمة الى الاعلى ٢٠١٢ متر - ٢٠١٥ طولاً ذات غضون مستعرضة

قرون الحلبة الضخمة الزند

مخرفة بارزة - الربيع - جوانب الطرق وفي المزارع في سورية وفلسطين

petiolata, Post. ب. الرجيلية. الرجيلية ضعف القرون طولاً. الورقات كبرى ٢٠١ متر

طولاً. القرون اعرض ما في الرمز - بيروت

١٠. *T. monantha*, C. A. Mey. الحلبة الاحادية الزهر ○ متكى. الوريقات صغيرة بيضية مقلوبة اسفينية مجذومة او مستطيلة. الازهار منفردة او مزدوجة جالسة ٢٠.٧٥ متر طولاً. القرنة اسطوانية منتصبة ٢.٢ متر الى ٢.٦ طولاً مستقيمة او منحنية شصية القمة مخططة طولاً - الربيع - من عنتاب وحلب الى راشيا والبقاع
brachycarpa, Boiss. ب. القصير الثمر. القرنة نحو ٢.٢ متر طولاً. الاعصاب متباعدة - الجبل الشرقي

١١. *T. stranguilata*, Boiss. الحلبة المخنثقة ○ السوق متعصبة قرمة. الوريقات مثلثة مقلوبة مجذومة. الزند اطول من الورقة ينتهي بسبل. الازهار ٤ الى ٨ راسمية ٢٠٠٥ متر طولاً. القرنة اسطوانية ملازمة الغشاء منحنية ٢٠.٧٥ متر طولاً ٢٠.٢ غلظاً مخنثقة بين البزور منتبهة بمقارن من نصفها طولاً ذات اعصاب طويلة ضخمة متعصبة - الربيع - النول حول راشيا. وادي الحوير
١٢. *T. Aleppica*, Boiss. et Haussk. الحلبة الحلبية (المخدقوق) ○ الذنبات نصف بيضية ريشية الخرق. الوريقات بيضية مقلوبة اسفينية مسننة من الاعلى. الازهار ٨ - ١٠ برتقالية صوانية ٢٠٠٩ متر الى ٢.١ طولاً. القرون على هيئة نصف دائرة اسطوانية ٢.٢ متر طولاً. البزور اسطوانية - الربيع - من عنتاب الى حلب

١٣. *T. Caelesyriaca*, Boiss. الحلبة البقاعية ○ الذنبات نصف سهبية مسننة او مقصوفة. الوريقات بيضية مقلوبة اسفينية. الازهار ٦ - ١٥ ليهونية راسية ٢٠.٦ متر الى ٢٠.٧ طولاً. القرون منتصبة ثم منعقبة منحنية ٢.٢ متر الى ٢.٢ طولاً. البزور منضغطة ذات ٤ سطوح تقريباً - الربيع - من عنتاب الى شمالي فلسطين
Gaillardoti, Boiss. ب. كلياردو. الوريقات ١٥ متر طولاً و الازهار اكبر ما في الرز -

بيروت. صيدا

١٤. *T. Sophianica*, Boiss. الحلبة السببرونية ○ الذنبات رعية مخززية. الوريقات بيضية مقلوبة اسفينية مسننة بقرب القمة. الزند مثل الورقة طولاً. الازهار ٨ - ١٢ في راسم راسي ليهونية ٢٠.٨٥ متر طولاً او اقل. الكاس نصف النوح طولاً. القرنة منحنية على هيئة نصف دائرة منتبهة بحجة - الربيع - من عنتاب الى زحلة

١٥. *T. Hieracifolia*, Boiss. الحلبة القدسية ○ الذنبات طويلة رعية مخززية. الوريقات بيضية او مستطيلة او اسفينية مسننة على كل الحوافي او نحو القمة فقط. الزند اطول من الورقة. الازهار ١ - ٢.٠ رتالية ٢٠.١ متر طولاً مرنبة في راسم او راس. الكاس ثلاث النوح طولاً. القرنة منحنية

بلا منقار أو حمة - الربيع - من عيتاب الى جنوبي فلسطين

١٦. *T. Kotschy*, Fenzl. حلبة كوتشي ⊙ الذنبات رمجية مخززية. الوريقات مستطيلة

اسفينية حادة الاسنان. الزند ضعف الورقة طولاً أو أكثر. الأزهار ١٠-١٨ بيضاء ٢.٠٠٧ متر طولاً
مرتبة في راسم راسي. الكاس ثلث التويج طولاً. القرنة نحلة اسطوانية عفاية منخبة على هيئة نصف دائرة
وذات ميزاب جانبي على طولها - الربيع - من الجبل الشرقي الى تدمر وماردن

lilacina, Post. ب. الليلكية. الأزهار وردية أرجوانية اللون. السوق منكثة - يبروت

١٧. *T. Sibthorpi*, Boiss. حلبة سيبثورپ ⊙ الذنبات رمجية. الوريقات بيضية مقلوبة

اسفينية حادة الاسنان قرب قمها. الزند اقصر من الورقة متضخم في الإثمار. الأزهار ٨-١٠ صفراء ٢.٠٠٥ متر طولاً
مرتبة برؤوساً. الكاس أكثر من نصف التويج طولاً. القرون ضخمة خملية والجذرية منها ٢.٠٠٢ متر طولاً
والماقية مشبكة الوردية ٢.٠١٠ متر الى ٢.٠٢ طولاً مستدقة الى حمة شصية - الربيع - من
يبروت الى دمشق وإلى الشمال

١٨. *T. cylindracea*, Desv. الحلبة الاسطوانية ⊙ الذنبات رمجية مخززية. الوريقات

صغيرة مستطيلة اسفينية مقلوبة مجذومة على الغالب مسننة القمة. الزند خيطي اطول من الورقة.
الأزهار ٦-٨ صفراء ٢.٠٠٥ متر طولاً مرتبة برؤوساً. الكاس نصف التويج طولاً اسنانها ثلث انبوتها
طولاً. القرون ٢.٠٢ متر طولاً نحلة مشبكة الوردية ملازمة الزغب منخبة مستدقة الرأس - الربيع -
ساحل سورية المجرى

١٩. *T. alipes*, Boiss. الحلبة الخيطية الزند ⊙ السوق خيطية منكثة. الذنبات رمجية

مخززية. الوريقات صغيرة اسفينية بيضية مقلوبة حادة السنينات. الأزهار ١٥-٢٠ صفراء ٢.٠٠٤ متر
طولاً مرتبة في راسم كثيف. الكاس نصف التويج طولاً أو اقل من ذلك واسنانها نصف انبوتها طولاً.
القرون ذات بزره او ٢ والحجز الحامل البزر ٢.٠٠٢ متر طولاً والمقار ٢.٠٠٧ متر وهو يكون مع الحجز
الحامل البزر زاوية منفرجة - الربيع - من حلب الى زحلة وتدمر

٢٠. *T. lilacina*, Boiss. الحلبة الليلكية ⊙ منتصب. الوريقات اسفينية بيضية مقلوبة

مسننة القمة. الزند اطول من الورقة ذو سبل. الأزهار ٢.٠٠٥ متر طولاً متعددة وردية أرجوانية مرتبة
في راسيات بيضية. الكاس نصف التويج طولاً اسنانها اقصر قليلاً من انبوتها. القرون ٢.٠١٧ متر طولاً
مستدقة الى منقار وبلا زاوية وذات بزرين الى ٢ - الربيع - القلول حول الناصرة والكركم

٢١. *T. velutina*, Boiss. الحلبة الصمغية ⊙ لبادي منشيب سافل منتصب ٢.٠٠٦ متر

الى ٢١٢ علواً. الوريقات مستطيلة خطية مسننة قرب قمها. الزند اطول من الورقة. الأزهار متعددة

صفراء ٢٠٠٤ متر طولاً مرتبة في راسيات تستطيل بعد الإزهار. الكأس وبري خرقاً هلبية مثل التوج وضعف الأنبوبة طولاً. القرون نحو ٢٠١٧ متر طولاً مخفية ذات بذرتين مستدقة الى منقار ذات اورددة مضحلة مشبكة - الربيع - فوق راشيا

٢٢ *T. corniculata*, L. الحلبة القرنية ⊙ الذنبات عريضة القاعدة مخزقة او مسننة مدببة. الوريقات بيضبة مقلوبة ومستطيلة مسنة. الزند ضعف الورقة طولاً تقريباً. الراسيات بيضبة. الازهار متعددة ٢٠٠٧ متر طولاً. الكأس ثلث التوج طولاً خرقاً مثل انبوتها طولاً. القرنة خطية مجلية ٢٠١٧ متر الى ٢٠٢ طولاً ذات اورددة مستعرضة متفمة قليلاً - الربيع - بيروت. القدس

٢٣ *T. hamosa*, L. الحلبة الشصية ⊙ الذنبات نصف سهمية. الوريقات بيضبة مقلوبة اسنينة مجذومة مسننة. الزند مثل الورقة طولاً ذو سبل. الازهار ٢٠٠٤ متر طولاً ٦-٩ عدداً. الكأس ثلث التوج واسنانها نصف انبوتها طولاً. القرون خطية مخفية على هيئة نصف دائرة ٢٠١٢ متر طولاً ذات اورددة مستعرضة ومخرقة متفمة - الربيع - ارياف النيل



٢٤ *T. laciniata*, L. الحلبة المخزقة ⊙ مستطيلة

الذنبات نصف بيضبة ريشية المخرق او الاقسام. الوريقات مثلثة مقلوبة قرون الحلبة الشصية حادة الاسنان. الزند مثل الورقة طولاً. الازهار ٦-٨ عدداً ٢٠٠٤ متر طولاً. الكأس ثلث التوج طولاً واسنانها مخزقة مثل انبوتها طولاً. القرون مستطيلة حموية ٢٠٠٦ متر طولاً و ٢٠٠٣ متر عرضاً مشبكة الاورددة ذات ٥ بذور او ٦ - الربيع - ارياف النيل

subscissilis, Boiss. ب. المجالسة تقريباً. الزند قصيرا ومفقود. الازهار صغيرة. القرون

٢٠٠٤ متر الى ٢٠٠٥ طولاً - مع الرمز

٢٥ *T. occulta*, Delil. الحلبة المستترة ⊙ الذنبات ريشية المخرق. الوريقات صغيرة

مثلثة مقلوبة حادة الاسنان والشقوق. الازهار ٥-٦ جالسة في الاباط. الكأس اطول من التوج وخرقا اطول من انبوتها. القرنة مثل بذر القنب طولاً بيضبة قليلة الانضغاط حموية مشبكة الاورددة ذات بذرتين ٢-٣ - الربيع - ارض الصعيد وربما هوتاين المتقدم ذكره

٢٦ *T. maritima*, Del. الحلبة البحرية ⊙ الذنبات نصف بيضبة مخزقة. الوريقات

اسنينة بيضبة مقلوبة او قلبية مقلوبة كالة الاسنان. الزند اقصر من الورقة. الازهار ٢٠٠٥ متر الى ٢٠٠٧ طولاً. الكأس ثلث التوج طولاً واسنانها نصف انبوتها طولاً واكثر. القرون ٢٠١ متر طولاً خطية مدببة مخفية ذات اورددة مخزقة مشبكة والاخيلة ضيقة طويلة - الشتاء والربيع - بانا. الاسكندرية.

ابو جرج في ارض الصعيد

dura, Boiss. ب. الصلبة. السوق قصيرة متصلة. الزناد المثمرة متضخمة - مطبور تقريباً

في الرمل بقرب الاسكندرية

T. stellata, Forsk. ٢٧ الحلبة المكوكة (الكريعي) ⊙ الذنبيات نصف سهمية والسفلى

منها مسنة. الاوراق طويلة الرجيلات والورقات اسفينية بيضية مقنونة مجذومة او مفروضة مضحلة

الاسنان. الازهار ٦-٨ جالسة تقريباً عند أكثر الاباط ٢.٠٠٣ متر طولاً. الكاس نصف التويج طولاً

واسنانها مثل انبوبتها طولاً. القرون كوكبية النظام اسطوانية ٨.٠٠٨ متر الى ١.٠١ متر طولاً متضخمة ذات

اوردة مخرفة - الربيع - بادية اثية وسينا ومصر

T. anguina, Forsk. ٢٨ الحلبة الحية ⊙ الذنبيات نصف سهمية مسنة مفصولة .

شكل ٩٤



الاوراق طويلة الرجيلات وريقاتها اسفينية بيضية مقنونة شرافية

الاسنان. الازهار ٤-٧ في أكثر الاباط جالسة تقريباً ٢.٠٠٣ متر

طولاً. الكاس ثلثا التويج طولاً واسنانها مثل انبوبتها طولاً تقريباً.

القرون مكوكة خطية مدببة متعرجة مشبكة الوردية - الربيع -

ذالية مصر

T. spicata, Smith. ٢٩ الحلبة السنبلية ⊙

الذنبيات عريضة القاعدة مسننتها رمحية مخزومة. وريقات الاوراق

السفلى بيضية مقنونة مجذومة وورقات الاوراق العليا مستطيلة

قرون الحلبة الحية وورقة منها

وجميعها مسنة. الزناد ضعف الاوراق طولاً او أكثر. الازهار كثيرة منعقة ٥.٠٠٥ متر طولاً او أكثر

مرتبة في راس مستطلي. الكاس اقصر قليلاً من التويج واسنانها الاربعة العليا ضعف الانبوبة طولاً او

أكثر والسفلى صغير جداً. القرون منعقة متراكمة عنائية ٦.٠٠٦ متر طولاً بيضية مستدقة الى منقار

شحي وهي مشبكة الوردية ذات برتين - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

T. amara, Gaine. ٣٠ الحلبة الصغرى ⊙ فم ٤.٠٢ متر الى ٨.٠٢ طولاً ملازم الشعر.

الورقات بيضية مقنونة مسننة اسفينية القاعدة. الازهار ١٠ - ٢٠ في راس مستطلي طويل الزند. اسنان

الكاس الاربعة العليا رمحية مثل انبوبتها طولاً والسفلى صلبة ذالية. القرون منعقة اسطوانية ٧.٠٠٧ متر

طولاً ذات بذرة واحدة ومنقار طويل مخنق قليلاً - مزارع جبل عوشا في البلقاء

T. glomerata, Ledeb. ٣١ الحلبة المصفاة ⊙ الذنبيات نصف سهمية قليلة الاسنان عند

قاعدتها. الورقات اسفينية بيضية مقنونة مفروضة مسنة من الاعلى. الازهار جالسة تقريباً صغيرة ٣.٠٠٣

متر طولاً متراكمة في رؤسات ابضية جالسة تقريباً. اسنان الكاس مخززية ضعفا انبوبتها او اكثر ومثل التويج طولاً. القرون افقية عفاية ملفطة مستطيلة قصيرة متساوية الطول والعرض تقريباً ذات منقار منحرف واوردة مستعرضة متفاربة - ايار وحزيران - بقرب الارز

Cilicica, Boiss. ب. السيليسية. الزناد مثل الاوراق طولاً - الجبل الافرع

T, *Arabica, Del.* ٢٢. الحلبة العربية ☉ الذنبات صغيرة نصف بيضية مخزفة.

شكل ٩٥



قرون من الحلبة العربية

الوريفات اسفينية بيضية مقلوبة جونية او مسنة. الزناد اطول من الاوراق والازهار ٢-٨ صبوانية ٢٠١ متر او اقل طولاً صفراء باهتة. الكاس ثلث التويج الى ربع طولاً واسنانها مثلبة نصف انبوبتها طولاً. القرون ملساء ملفطة مستطيلة منجلية حموية هدية المحافة ذات اوردة مستعرضة متوازية تقريباً - الربيع - الرمل. يبروت الى غرة وبادية النبه وسينا

T. *radiata, L.* ٢٣. الحلبة المشععة ☉ الذنبات نصف

سهمية مسنة الفاعلة. الوريفات بيضية مقلوبة اسفينية مسنة قرب فتمها. الزناد مثل الاوراق طولاً ذات زهرة الى ٣. الازهار ٢٠٠٥ متر طولاً.

الكاس نصف التويج طولاً واسنانها رمجية مثل انبوبتها طولاً. القرون ملساء او عفاية منجلية على هيئة مستديرة وحافتها الانسية ذات جناح مشرشر

والوحشية هدية. والوجه ذو اوردة متوازية من الانسية مشتبكة من الوحشية - الربيع - من عنتاب الى الجبل الشرقي ودمشق

١٥ المديككو MEDICAGO, L.

الكاس قصيرة ذات ٥ اسنان. الزروق كال. الاسدية ذات خوتين مستقلة عن البتلات وقبة المخويطات غير متسعة. القرون كلوية او منجلية او حلزونية ذات بذرة واحدة واكثر - اعشاب ونادراً انهم اوراقها نفاية ذنباتها متحدة بالرجيلات

* معمورة. القرون منجلية او حلزونية مفتوحة المحور

M. *sativa* | *marina* ٢

** سنوية. القرون حلزونية مسدودة المحور

٤ ادوار الحورن غشائية وحافتها كاملة او مجزأة باير غير مثلبة القاعدة

M. *scutellata* ٢ *incurvata* ٤ *orbicularis* ٥ *Blanchiana* ٦ *rotata* ٧ *Mardinensis* ٨

++ ادوار الحزرون ضخمة الحافة ذات غضون مرتفعة مستعرضة او منحرفة

M. elegans ٩ *Noeana* ١٠

+++ الادوار متلازمة وحافتها عادمة الحسك او ذات درنات او ابر بلا ساقين عند قاعدتها

M. littoralis ١١ *tribuloides* ١٢ *tuberculata* ١٣ *Gerardi* ١٤

+++ الادوار غير متلازمة وحافتها مجهزة بابر ذات ساقين عند قاعدتها

++ القرنة قرصية مفلطحة

M. agrestis ١٥ *coronata* ١٦ *Galilæa* ١٧ *denticulata* ١٨

+++ القرنة بيضبة كروية

M. maculata ١٩ *minima* ٢٠ *laciniata* ٢١ *ciliaris* ٢٢

*** سنوية. القرنة كلوية بلا حسك ذات بذرة واحدة وقتها حلزونية

M. lupulina ٢٣

M. sativa, L. ١. المديكاكو المزروع (الدُّحْرَجِيَّة . القنات) 2٤ ملازم الرغب.

السوق منتصبه متفرعة. الذنبات بيضبة رحيمة مخززية. الورقات السفلى بيضبة مقلوبة اسفينية والعلوى خطية اسفينية. الراسيات راسية. الزناد اطول من الاوراق. الازهار بنفسجية او ارجوانية ونادراً صفراء مبيضة. القرنة سرخاء ذات ٢ ادوار و اقل من ذلك - الصيف - مزرور وفالت من الزرع. كثير الوجود

falcata, Post. ب. النجلى. الازهار غالباً صفراء مبيضة ونادراً بنفسجية. القرون مجلية

او ذات دورة واحدة الى ٢ - المزارع من عيتاب الى لبنان (*M. falcata*, L.)

M. marina, L. ٣. المديكاكو البحري 2٤ ابيض صوفي. السوق مستقيمة او متصاعدة.

الورقات بيضبة مقلوبة او اسفينية مسننة القبة. الزند مثل الورقة طولاً ذو ٥ اذهار صفراء الى ١٣.

القرنة صوفية قرصية واسطوانية ذات ٢ ادوار حافتها عادمة الحسك او ذات حسك قصير متباعد -

الربيع - رمل شاطئ - سورية ومصر

شكل ٩٦



M. scutellata, All. ٣. المديكاكو الثَّرَسِيّ ٥ زغبى غدي.

الذنبات نصف بيضبة مدببة مسننة. الورقات كبيرة مستطيلة او بيضبة مقلوبة

حادة الاسنان. الزناد ذات زهرة الى ٤ اقصر كثيراً من الاوراق. الازهار قرنة المديكاكو الثرسي

٢٠٠٥ متر طولاً برتقالية. القرنة كروية ذات ٥ ادوار الى ٦ على هيئة كؤوس متصاعدة متضمنة بعضها

في البعض مشبكة الازردة كاملة الحوافي عيظمتها - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

serrata, Post. ب. المنشاري. الوريقات طويلة الاسنان - بيروت

٤. *M. incurvata*, Post. المديكاكو المنحني © زغبى. الذنبات نصب سهمية مسننة

مدببة. الوريقات السفلى بيضية مقلوبة والمتوسطة والعليا معينة مسننة بقرب قمها. الزناد اطول من الاوراق منخية على هيئة نصف دائرة ذات زهرتين الى ٤ برتغالية ٢٠٠٥ متر الى ٢٠٠٧ طولاً. الفترة كروية اسطوانية ذات ٥ ادوار او ٦ مسترسلة متفتحة مشبكة الوردة الحوافي بحيزمة بلا حسك - الربيع - المزارع من بيروت الى شمالي فلسطين



شكل ٩٧
قرنة المديكاكو الكري

٥. *M. orbicularis*, All. المديكاكو الكري © مستبلس.

الذنبات مشرشرة. الوريقات السفلى قلبية مقلوبة والبنية بيضية مقلوبة. الزناد اقصر من الاوراق ذات زهرة الى ٣ صفراء ٢٠٠٣ متر طولاً. الفترة مفلطحة مستديرة محدة السطحين ذات ذورتين الى ٥ غشائية مشبكة الوردة حادة الحوافي بلا حسك - الربيع - اماكن عشبية في سورية وفلسطين

٦. *M. Blancheana*, Boiss. المديكاكو البلانسي © ملازم الصوف. الذنبات نصف

شكل ٩٨



شكل ٩٨
قرنة المديكاكو البلانسي

بيضية مسننة. الوريقات بيضية مقلوبة او مستطيلة مسننة قرب قمها. الزناد اطول من الورقة مستقيمة ذات زهرة الى ٣ برتغالية ٢٠٠٨ متر طولاً. الفترة ٢٠١ متر عرضاً مسترسلة ذات ٤ ادوار الى ٦ غشائية مشبكة السطح حائتها ذات عصب ومجهزة بصف ابر مثلية قصيرة - الربيع - مزارع سواحل سورية البحرية من طرابلس الى صيدا

٧. *M. rotata*, Boiss. المديكاكو المنحني © ملازم الغناء. الذنبات مسننة. الوريقات

بيضية مقلوبة او مستطيلة. الزناد اطول من الاوراق ذات زهرة الى ٣ صفراء ٢٠٠٤ متر طولاً. الكاس غشائية. الفترة ملساء اسطوانية مفلطحة الطرفين ذات ٤ ادوار او ٥ حائتها كالة وعلى كل من جانبيها عصب ولابر ناشئة بين الحافة والعصين - الربيع - من حلب الى جنوبي فلسطين

٨. *M. Mardinensis*, Post. المديكاكو الماردينسي © ملازم الرغبى منفردة. الذنبات

مضحلة الاسنان. الوريقات معينة مستطيلة. الزناد اقصر من الورقة ذات ٣ ازهار الى ٦ برتغالية ٢٠٠٧ متر طولاً. الكاس ملساء. الفترة بيضية اسطوانية ذات ٤ ادوار او ٥ حائتها ذات عصب بارز مجهز على كل من جانبيه باكليل اسنان منشارية كالة متداخلة افقية باعتبار الحافة - الربيع - ماردن

٩. *M. elegans*, Jacq. المديكاكو المحسن © زغبى غدي. الذنبات مسننة. الوريقات

بيضية مقلوبة مسننة قرب قمها. الزناد اقصر من الاوراق ذات زهرة الى ٣ برتغالية ٢٠٠٣ متر طولاً.

الفرقة زغبية او ملساء قرصية ذات دورتين او ٣ متشعبة الاوردة وحوافيها ضخمة محيضة بارزة الاعصاب
— الربيع — مزارع سورية وفلسطين

١. *M. Noeana*, Boiss. المديكوكا النوياني ☉ ناعم الزغب. الذنبات مسنة القاعدة

او كاملة. الورقات بيضية مقلوبة مستطيلة مسنة قرب قممها. الزناد اطول من الاوراق ذات زهرة
صغيرة او ٢. الفرقة بيضية كروية ذات ٢ ادوار الى ٤ مسترسلة متشعبة الاوردة وحوافيها كالة ميزية على
الغالب ذات غضون قاعدتها منحرفة وقممها موازية الحافة منتهية فيها — الربيع — اماكن عشبية قرب
عقبات

٢. *M. littoralis*, Rohde. المديكوكا الشاطئي ☉ ويرى. الذنبات مخروقة القاعدة.

الورقات بيضية مقلوبة او قلبية مقلوبة مسنة قرب قممها. الزناد اقصر قليلاً من الاوراق ذات زهرتين
الى ٤ برتغالية ٢٠٠٤ متر طولاً. الفرقة صغيرة ملساء اسطوانية ذات ٢ ادوار الى ٥ متلازمة وحوافيها
ضخمة مقلطحة ذات صفى ابرشمية متباعدة — الربيع — الرمل ولا سيما بقرب البحر
subinermis, Boiss. ب. بلا حسك تقريباً. ابر القرون قصيرة او مستقيمة الى درنات —

قرب شاطئ البحر في سورية

٣. *M. tribuloides*, Desr. المديكوكا الشبيه بالثريبيولس ☉ ويرى. الذنبات

مخروقة القاعدة. الورقات بيضية مقلوبة اسفنية. الزناد اقصر من الاوراق ذات زهرة او ٢ برتغالية ٢٠٠٣
متر طولاً. الفرقة متوسطة قليلة الشعر او ملساء اسطوانية مقلطحة الطرفين ذات ٥ ادوار ضخمة متلازمة
وحافتها كالة المحبوس او حادثة ميزية على جانبيه ذات ابر منفرجة او ملازمة الحافة — الربيع — مزارع
سورية وفلسطين

breviaculeata, Boiss. ب. القصير الابر. الفرقة اقل حجماً منها في الرمز. الابر قصيرة

شكل ٩٩



مخينة ملازمة الحافة — لبنان . مصر

٤. *M. maxima*, Post. ت. الاكبر. الفرقة كبيرة ٢٠١ متر قطراً .

الحسك طويل شصي

٥. *M. tuberculata*, Willd. المديكوكا المتدرن ☉ زغبى.

الذنبات مسنة. الورقات بيضية مقلوبة واحياناً معينة. الزناد مثل الاوراق

طولاً ذات زهرتين الى ٨ برتغالية ٢٠٠٦ متر طولاً. الفرقة ملساء اهليجية

اسطوانية ذات ٤ ادوار الى ٦ متقاربة وحافتها بارزة مجهزة على كل من جانبيها بدرنات حادة او كالة —

الربيع — مزارع سورية وفلسطين

- major, Post. ب. الأكبر. السوق مستحلبة. الوريقات كبيرة ٢٠٢ من طولاً بيضية مقلوبة معينة. الزناد أطول من الأوراق ذات ١٢ ازهاراً في ١٢ - البترون. قرب بيت جبرين
١٤. M. Gerardi, Willd. مديكاكو جرارد ٥ زغبي. الذنبات مقصوفة مسنة. الوريقات بيضية مقلوبة اسفينية او قلبية مقلوبة. الزناد مثل الأوراق طولاً ذات زهرتين الى ٥ برتغالية ٢٠٠ من طولاً. القرنه غدية صوفية ونادراً مستحلبة بيضية محدبة الطرفين بلا عصب ولا بر متباعدة قصيرة مخروطية شصية مزينة القاعة - الربيع - المزراع من حلب الى دمشق. مصر
١٥. M. agrestis, Ten. المديكاكو البري ٥ زغبي. الذنبات مقصوفة مسنة. الوريقات بيضية مقلوبة اسفينية واحياناً مفروضة. الزناد أطول من الأوراق ذات زهرة الى ٢ برتغالية. القرنه متوسطة زغبية او مستحلبة محدبة قليلاً على الطرفين. الأدواره حافتها ضخمة ذات صفى ابر متشعبة مخروطية مخزنية شصية - الربيع - اماكن عشبية بقرب حلب. بين حاصبيا وراشيا
١٦. M. coronata, Lam. المديكاكو التاجي ٥ ملازم الزغب. الذنبات صغيرة مسنة القاعة. الوريقات صغيرة بيضية مقلوبة واحياناً مفروضة. الزناد أطول اضعاقاً من الأوراق خيطية ذات ٢ ازهار الى ٨ صفراء ٢٠٢ من طولاً. القرنه ٢٠٠٢ من طولاً. الأدوار ٢ او اقل حافتها مستوية عريضة وعلى كل من جانبيها صف ابر مخزنية افقية بالنسبة الى الحافة على هيئة اكليل - الربيع - اماكن جافة في سورية وفلسطين الى بادية الفيه
١٧. M. Gahlaea, Boiss. المديكاكو الجليلي ٥ مستحلب. الذنبات حادة الاسنان. الوريقات بيضية مستطيلة حادة السنينات. الزناد مثل الأوراق طولاً ذات زهرتين الى ٤ صغيرة. القرنه ذات ٥ ادوار مفلطحة حافتها ذات حسك طويل ملازم القرنه - الربيع - مرج ابن عامر. وربما هوبان من النوع الآتي شرحه
١٨. M. denticulata, Willd. المديكاكو ذو السفينات ٥ املس او مستحلب. الذنبات ريشية المحرق او الاسنان. الزناد مثل الورقة طولاً او اقصر منها ذات ٢ ازهار الى ٦ صفراء ٢٠٠٢ من طولاً. القرنه لمساء ذات دورتين الى ٤ مشبكة الوجه وحافتها كاله وعلى كل من جانبيها ثلم الحسك طويل شصي - الربيع
١. genuina, Boiss. الحقيقي. القرنه متوسطة الحجم. الحسك نصف قطر القرنه طولاً - شمالي سورية
- Jappacea, Boiss. ب. اللاپاسي. القرنه كبيرة. الحسك أكثر من نصف قطر القرنه طولاً - سواحل سورية البحرية الى غزة. السهول الداخلية

pentacycla, Boiss. ث. الخناسي الادوار. الفترة كبيرة ذات ادوار طويلة الحسك -

سورية وفلسطين. البلقاء. بحرية مصر
apiculata, Boiss. ث. الرأس. الفترة صغيرة ذات دورتين او ٣. الحسك قصير يستحيل

احياناً الى درنات مخروطية - ساحل سورية البحري. بحرية مصر
M. maculata, Willd. ١٩. المديكوكو الملتطخ © مستملس. الذنبات نصف سهبية

مستنة. الوريقات عريضة بيضية مقلوبة ذات لائحة سوداء على الغالب والسفل منها قلبية مقلوبة. الزناد اقصر من الاوراق ذات زهرتين او ٣ برتقالية ٢٠٠٣ متر طولاً. الفترة لمساء غير مشبكة الوجه تقريباً ذات ٢ ادوار الى ٥ مسترسلة. الحافة ذات ثلاثة اثلام واربعه حيازيم. الحسك قوسي منعطف وساقه الخلفي ناثي. من الحافة - الربيع - طرابلس

M. minima, Lam. ٣٠. المديكوكو الاصفر © ناعم الزغب. الذنبات كاملة ومستنة.

الوريقات السفلى قلبية مقلوبة والبقية بيضية مقلوبة اسفينية وجميعها صغيرة. الزناد اقصر من الاوراق او مثلها طولاً ذات زهرتين الى ٦ برتقالية ٢٠٠٣ متر طولاً. القرون زغبية كروية تقريباً صغيرة ذات ٤ ادوار الى ٥ مسترسلة حوافها ضيقة مزينة على كل من جانبيها حاملة صفي ابر مخززية شصية أكثر من قطر الفترة طولاً - الربيع - أماكن رملية في سورية وفلسطين

M. laciniata, All. ٣١. المديكوكو المخرق © مستملس. الذنبات مخروقة. الوريقات

صغيرة بيضية مقلوبة اسفينية مفروضة مستنة. الزناد مثل الاوراق طولاً ذات زهرة او زهرتين صفراء ٢٠٠٣ متر طولاً. القرون صغيرة ذات ٤ ادوار او ٥ مسترسلة حوافها متوسطة العرض مزينة على كل من جانبيها حاملة صفي ابر طويلة مخززية شصية منفرجة متداخلة - الربيع - جنوبي فلسطين. بادية مصر

brachyacantha, Boiss. ب. القصير الحسك © الفترة اصغر منها في الرزو. الابر

قصيرة افقية بالنسبة الى الحانة - النجوم

M. ciliaris, Willd. ٣٢. المديكوكو الهدبي © مستملس. الذنبات مقصوفة. الوريقات

بيضية مقلوبة معينة كبيرة. الزناد اقصر قليلاً من الاوراق ذات زهرتين او ٣ ليمونية ٢٠٠٦ متر طولاً او أكثر. القرون ٢٠١ متر قطراً بيضية كروية ذات ٦ ادوار الى ٨ مسترسلة وبرة حوافها ضخمة مثلثة ذات صفي حسك مخززي مستقيم ملازم الفترة او منفرج - الربيع - مزارع سورية وفلسطين. النجوم

M. lupulina, L. ٣٣. المديكوكو الليوپولي © و © زغبي. الذنبات كاملة او مستنة

الفاعة. الوريقات بيضية مقلوبة. الازهار صغيرة جدًا مجمعة في سنبل يضي ليمونة اللون وزندما

شكل ١٠٠



قرنة المديكا كواللبوبولي
مكبرة خمسة قطور

اطول من الاوراق . القرنة صغيرة ذات اعصاب منخية واوردة متفهمة -
الربيع - من عيتاب الى لبنان وساحل سورية البحري . البلقاء

Opuniana, Boiss. ب . الكرويانا في . 2٤ . العنق خشبي -

الصيف - قمة لبنان

١٦ الحندقوق MELILOTUS, Tourm.

اسنان الكاس ٥ قصيرة . الزروق كال . الاسدية ذات خوتين والخويطات غير متسعة النبة . القرنة
كروية اويضية مستقيمة عادمة المنقار غير منشقة تقريباً ذات بذرة الى ٢ - اعشاب او انجم اوراقها
نفاية . ذنباتها ملتصقة بالرجلة

* الثمر مغضن غصوناً مسنديرة او اهليلجية او مستعرضة

M. sulcata ١ infesta ٢ Messanensis ٣ elegans ٤

* الثمر مشبك الغضون

M. parviflora ٥ alba ٦

M. sulcata, Desf. ١ . الحندقوق المثلم ⊙ الذنبات مسننة او كاملة . الوريقات السفلى

بيضية مقلوقة والعليا مستطيلة اسفينية . الزيدات اقصر قليلاً من انبوبة الكاس . الازهار ٢٠٠٢٥ متر
طولاً . الفرون بيضية مقلوقة مستديرة محززة ٢٠٠٢٥ متر طولاً وغضونها متفارة منتظمة - الربيع -
المزارع . كثير الوجود

major, Boiss. ب . الاكبر . الوريقات اكثر عرضاً وخضرة منها في الرمز . الازهار والاثمار

اكبر - يروت

M. infesta, Guss. ٢ . الحندقوق المتعب ⊙ الذنبات هدية . الوريقات السفلى بيضية

مقلوبة والعليا مستطيلة اسفينية . الزيدات اطول من انبوبة الكاس . الازهار ٢٠٠٥ متر طولاً . القرنة
بيضية مقلوقة محززة ٣ . ٢ متر طولاً وغضونها متباعدة متموجة واحياناً متفهمة - الربيع - ساحل
سورية البحري . قرب سبسطية

M. Messanensis, L. ٣ . الحندقوق المسيقي ⊙ الذنبات كاملة تقريباً . الوريقات

بيضية مقلوقة او خطية اسفينية . الراسيات اقصر من الاوراق . الازهار ٢٠٠٤ متر طولاً . القرنة عدسية
مثابة الدرز العلوي ٢٠٠٥ متر طولاً وغضونها متفارة - الربيع - اماكن رطبة . يروت . باناس . بر مصر

٤ *M. elegans*, Salzm. الحندقوق الحمن ⊙ الذنبات مخززية كاملة. الورقات
بيضة مقلوبة ومستطيلة اسينية. الأزهار صفراء ٢٠٠٤ متر طولاً. الراسيات أطول من الأوراق.
الفترة الهليجية حموية محبزة ومغضونها مستعرضة متفهمة - الربيع - عيتاب. الكرمل
٥ *M. parviflora*, Desf. الحندقوق ذو الزهر الصغير (القرط. الحبيبة) ⊙
الذنبات كاملة. الورقات السفلى بيضة مقلوبة والعليا مستطيلة اسينية. الراسيات أطول من الأوراق.
الأزهار ٢٠٠٢ متر طولاً. الفترة ٢٠٠٢ متر طولاً بيضة كالة - الربيع - المزارع. كثير الوجود
٦ *M. alba*, Degr. الحندقوق الابيض ⊙ أو ٢٤ الساق عال يبلغ أحياناً فامتين أو أكثر.
الذنبات هلبية. الورقات السفلى بيضة مقلوبة والعليا مستطيلة. الراسيات طويلة. الزناد مثل الكاس
طولاً أو أطول منها. الأزهار بيضاء ٢٠٠٥ متر طولاً. الفترة صغيرة ملساء بيضة مقلوبة محبزة حموية -
الصيف - مزروع في لبنان وفالت من الزرع

١٧ النفلة *TRIFOLIUM*, L.

اسنان الكاس أو خرطوم. الزورق كال. الاسدية ذات خوتين متحدة مع البتلات أو اقلة مع
السفلى منها متضخمة كثراً أو قل عند قمتها. الفترة بيضة أو مستطيلة ذات برة الى ٤ وغالباً غير منشقة
غشائية أو سبخانية متضمنة في الكاس المستقيمة أو الموج المستعجب - اعشاب أوراقها ذات ٢ ورقات
ريشية أو ٥ الى ٧

* حمرة الكاس مسدودة مجدبتين أو دائرة شعر

† معبرة

T. Cassium †

†† سنوية

‡ انبوبة الكاس ذات ٢٠ عصباً. الأوراق العليا دائماً متقابلة

T. hirtum ‡ *Oherleri* ‡ *lappaceum* ‡

‡‡ انبوبة الكاس ذات ١٠ اعصاب

§ الأوراق كلها مترادفة. الرؤوس انتهائية ذات زناد

T. arvense ⊙ *stellatum* † *angustifolium* † *purpureum* † *Palestinum* †

§§ الأوراق العليا متقابلة. الرؤوس ذات زناد أو مغلقة بالأوراق العليا

T. dichroanthum † • *formosum* † † *Latinum* † † *supinum* † † *Carmeli* † †

Alexandrinum | o Panormitanum | ٦ maritimum | ٧ plebeium | ٨ scutatum | ٩

clypeatum ٢٠

§ § § الأوراق العليا مترادفة أو متقابلة. الرؤوس جالسة والعليا منها مغلقة القاعدة

T. scabrum ٢١

** حنجرة الكاس عريانة

+ الأزهار الخارجية مثمرة ذات تويج والداخلية عقيمة بلا تويج تنمو فتكون رأساً مشعراً

T. subterraneum ٢٢ globosum ٢٣ eriosphaerum ٢٤ pilulare ٢٥

++ شفة الكاس العليا منتفخة بعد الإزهار مشتبكة. الرؤوس ابضية

‡ معبرة

T. fragiferum ٢٦ modestum ٢٧ physodes ٢٨

‡ _ سنوية

T. respinatum ٢٩ tomentosum ٣٠ bullatum ٣١

+++ الكاس منتفخة بعد الإزهار. الثلاث كثيرة المخطوط مستقيمة. الرؤوس انتهائية

T. spumosum ٣٢ Aintabense ٣٣ xerocephalum ٣٤

+++ الكاس غير منتفخة بعد الإزهار

‡ القرنة سنجيانية منبثقة قليلاً من الكاس ذات بزرتين

T. nervulosum ٣٥

‡ القرنة غشائية ذات بزرتين الى ٤

T. glomeratum ٣٦ Petrisavii ٣٧ Meneghinianum ٣٨ repens ٣٩

++++ الكاس ذات شفتين. القرنة ذات سوية وبزرة واحدة. الرؤوس ابضية

T. comosum ٤٠ stenophyllum ٤١ speciosum ٤٢ erubescens ٤٣ Boissieri ٤٤

agrarium ٤٥

T. Cassium, Boiss. | الفلة الاقريقية 2f ملازم الشعر. الذنبيات رمحية طويلة الطرف

مخرزية. الورقات اهلبيجية مضحلة الاجوان والعليا منها حادة. الرؤوس كبيرة كروية ثم مستطيلة ذات

زناد او جالسة. الكاس وبرية خرقها مخرزية ذات ٣ اعصاب واخيراً منعقفة والاربع العليا منها مثل

الانبوبة والسفلى ضعفاً طولاً. التويج وردي باهت اقل من ضعف انبوبة الكاس طولاً - الصيف -

جبل ميلان. الجبل الاقرق

T. hirtum, All. ٢ . النفلة العنائية ⊙ منفرج العناء ناعمة . السوق منشرة . الذنبات

شكل ١٠١



راس النفلة العنائية وورقة منها

شكل ١٠٢



راس النفلة اللاسية وورقتان منها

شكل ١٠٣



راس النفلة الحقلية مع ورقة منها

عشائية وجزوها المستقل عشبي رعي مخززي . الوريقات اسفينية بيضية مقلوبة . الرؤوس انتمائية كروية ثلثها السفلي مغلف بالذنبات العليا متسعة . الكاس اقصر قليلاً من التويج الارحواني وخرقها ضعف انبوبتها طولاً - الربيع - جبال شمالي سورية . وادي قنوين

T. Cherleri, L. ٣ . نفلة شرلر ⊙ منفرج العناء . السوق

متصاعدة او مستقيمة . الذنبات بيضية وجزوها المستقل مخززي قصير وفي الذنبات العليا مطول . الوريقات بيضية مقلوبة اسفينية وبعضها مخرومة . الرؤوس كروية منعطفة ونصفها السفلي مغلف بالذنبات العليا المتسعة . الكاس وبرية مثل التويج المبيض طولاً تقريباً وخرقها هلبية ضعف انبوبتها طولاً منتصبه - الربيع - من حلب الى بيروت

T. lappaceum, L. ٤ . النفلة اللاسية ⊙ قليل


العناء متفرقة . الفروع منفرجة . جزء الذنبات المستقل رعي مخززي . الوريقات بيضية مقلوبة . الرؤوس كروية ٢٠١٥ متر قطراً في الانغار وغالباً ذات زباد . الكاس مثل التويج طولاً تقريباً وخرقها منفرقة الاهداب ضعف انبوبتها طولاً متسعة عند قاعدتها ذات اعصاب ثم مستدقة الى طرف مخززي - الربيع - مزارع سواحل سورية وفلسطين البحرية وسموها الداخلية

T. arvense, L. ٥ . النفلة الحقلية (الحظ) ⊙ ناعم

العناء منفرجه . الساق منتصب منفرج نحول . جزء الذنبات المستقل طويل هلي او مخززي . الوريقات مستطيلة خطية والسفلى منها مفروضة . الرؤوس بيضية ثم اسطوانية . الكاس لحوية اطول من التويج الوردي المبيض وخرقها هلبية ضعفا انبوبتها الى ٢ اضعافها طولاً - نيسان الى تموز - ساحل سورية البحري . لبنان الى

١٢٠٠ متر

شكل ١٠٤



رأس النغلة النجمية أثناء الإثمار

شكل ١٠٥

٦. *T. stellatum*, L. النغلة النجمية ◉ ناعم الور.

السوق منتصب أو متصاعدة. جزء الذنبات المستقل يضي كال مسنن. الورقات بيضية مقلوبة اسفينية أو قلبية مقلوبة. الرؤوس كروية مسترسلة ثم بيضية مستطيلة. الكاس مثل التوبج الوردى أو الأبيض طولاً تقريباً وخرقها عريضة القاعدة متحدتها مستدقة إلى طرف مخززي ضعف الأنبوبة طولاً مندرجة أخيراً على هيئة كوكبية - الربيع - أماكن عشبية في سورية وفلسطين والبلقاء

٧. *T. angustifolium*, L. النغلة الضيقة الورق ◉

ملازم العفاء. الساق منتصب. الذنبات ضيقة مخططة وجزؤها المستقل مخززي. الأوراق متباعدة وورقاتها خطية. الرؤوس مستطيلة بيضية. الكاس أقصر قليلاً من التوبج الوردى وخرقها مخززية مشتبكة القمة عاريها والأربع العليا منها مثل الأنبوبة طولاً والسفلى منها أطول قليلاً من البقية - الربيع - ساحل سورية البحري. البقاع

٨. *T. purpureum*, Loisel. النغلة الأرجوانية ◉

عفائي. الذنبات غشائية والعليا منها عريضة متفتحة وجزؤها المستقل هلي طويل. الورقات اهليلجية أو مستطيلة أو خطية كالة أو حادة. الرؤوس بيضية ثم مستطيلة. الكاس نصف التوبج الوردى إلى ثلثه طولاً وخرقها مخززية غير متساوية الطول والسفلى منها أطول من الأنبوبة وجميعها مجذومة القمة - الربيع - مزارع ساحل سورية وفلسطين البحري. البلقاء

١. *genuinum*, Post. الحقيقية. الرؤوس كبيرة ٢٠٣ رأس النغلة الضيقة الورق مع ورقة منها

من طولاً ٢٠١ عرضاً في الإثمار. الورقات مستطيلة رحيمة أو خطية

٢. *angustifolium*, Post. الب. الضيقة الورق. الورقات خطية. السنبيل المثر ٢٠١ متر

عرضاً. خرقه الكاس السفلى أطول منها في المار ذكره - مع الحقيقي

٣. *laxiusculum*, Boiss. ت. المسترسلة. مثل المتقدم ذكره الآن أن السنبال المثمرة مسترسلة

- مع الحقيقي

Desvauxii, Post. ث. ديشو. الوريقات اهليلجية مستطيلة. الرؤوس متوسطة بين. ا. و. ب.

— مع الخيفي (*T. Desvauxii*, Boiss. et Bl.)

شكل ١٠٦

Roussseanum, Boiss. ج. الروسمانية. الرؤوس

قليلة الازهار كروية تقريباً — عيه

Blancheanum, Boiss. ح. البلانشيانية. الوريقات

قصيرة كالة كثيرا وقل. السنابل المثمرة بيضية كروية مغلقة عند

قاعدتها بالورقة العليا — جوانب الطرق في ساحل سورية البحري

prostratum, Post. خ. الملقاة. ملازم الارض كثيف

النوع قصير الوريقات اهليلجية او مستطيلة. الرؤوس الزهرة

كروية والمثمرة اسطوانية ٢٠٢ متر طولا و ٢٠١ عرضاً — جوانب

الطرق واماكن جافة في ساحل سورية البحري

T. Palestinum, Boiss. ٩. الفلة الفلسطينية

منفرج الحية ناعما. الذنبات مستدقة فجأة الى طرف هلي والعليا

منها منتفخة. الوريقات اهليلجية مستطيلة او خطية كالة. الرؤوس بيضية

ثم اسطوانية. الكاس لحوية ثلثة ارباع التوجج المبيض طولا وخرقها

مخرزية ضعف الانبوبة طولا تقريباً — الربيع — الرمل قرب غرة والخليل

corollatum, Post. ب. المتوجة. التوجج ضعف الكاس طولا وردي اللون — بيروت

T. dichroanthum, Boiss. ١٠. الفلة ذات الزهرة الملونة لونين ٥ ملازم الغناء.

السوق متكئة. الذنبات قصيرة الاطراف هليتها والعليا منها منتفخة. الوريقات اهليلجية خطية كالة.

الرؤوس بيضية ثم اسطوانية. الكاس لحوية ثلث التوجج طولا وخرقها مخرزية اطول من انبوتها. العلم

٢٠١٥ متر الى ٢٠٢ طولا وردي مصفر اطول كثيرا من الجناحين والزروق — الربيع — ساحل

سورية وفلسطين البحري

T. formosum, Urv. ١١. الفلة الجميلة ٥ ٢٣٠ متر علوا او اكثر ملازم الغناء او

منفرجة. الذنبات غشائية منتفخة وجزؤها المستقل رمي مستدق الى طرف مخرزي. الوريقات اهليلجية

مستطيلة حادة. الرؤوس بيضية في الازهار ٢٠٣٥ متر طولا و ٢٠٢ عرضاً وفي الاثمار مستطيلة ٢٠٥ متر

طولا و ٢٠٣ عرضاً. الكاس لحوية وخرقها غير متحدة القاعدة مخرزية اطول من التوجج الارجواني ضعف

الانبوبة طولا. منفرجة في الاثمار — الربيع — مزارع سورية وفلسطين



راس الفلة الارجوانية. ا. الخيفية
انحاء الازهار وورقة منها

- minuss, Post. ب. الصغرى. ١٥ متر علواً أو اقل. خرق الكاس ضعفاً انبويتها طولاً أو أكثر—ارز لبنان. بين بعلبك وبلودان. مور القدس. بين بيت جبرين وغزة. (*T. velivolum, Paine*)
- ١٢ T. Latium, Sebast. النغلة اللاتينية. ملازم الغناء. السوق متصاعدة متشعبة. جزء الذنبات المستفل خطي طويل. الوريقات خطية حموية. الرؤوس غالباً اثنان اثنان طويلة الزناد بيضية. الكاس نصف التويج الوردية طولاً وخرقها مثقلة القاعدة ثلثية الاعصاب مستدقة الى طرف مخززي وهي ضعف الانبوبة طولاً. الانبوبة متضخمة في الإثمار—حزيران—عيناك
- ١٣ T. supinum, Savi. النغلة النائمة. قليل الزغب. السوق ملانة متفرعة. جزء الذنبات المستفل رمحي خطي. الوريقات بيضية مقلوبة مستطيلة وكثيراً ما تكون مفروضة. الرؤوس طويلة الزناد أو قصيرة أو جالسة كروية تقريباً وفي الإثمار بيضية. الكاس اقل من نصف التويج الوردية طولاً وخرقها رحيمة هدية مستشبكة مثل الانبوبة طولاً أو أطول منها بإلا اعصاب واخيراً متضخمة القاعدة—من آذار الى حزيران—أماكن عشبية في سورية
- tuberculatum, Boiss. ب. الممدرة. الوريقات مستطيلة خطية. الرؤوس ذات ظروف عند قاعدتها. خرق الكاس ذات شعر كثيف ناشيء من درنات—صيدا
- pedunculatum, Post. ت. الزندية. الزناد طويلة—سورية وفلسطين
- ١٤ T. Carmeli, Boiss. نغلة الكرمل. متفرق الغناء عند السوق وملازمه عند الأوراق. الساق عالٍ متضخم ناصوري متشعب التفرع. جزء الذنبات المستفل أطول من المتصق رمحي. الوريقات كبيرة مستطيلة اهليجية والعليا منها حادة. الزناد طويلة. الرؤوس بيضية كروية مطولة في الإثمار. الكاس نصف التويج الأبيض المصفر طولاً وخرقها أخيراً متضخمة القاعدة بلا اعصاب مخززية القبة مثل الانبوبة طولاً الأسفل منها التي هي أطول من البقية—الربيع—الكرمل وجبل الطور
- ١٥ T. Alexandrinum, L. النغلة الاسكندرية (البرسيم). متفرق الشعر ملازمة. الساق عالٍ منتصب متفرع. جزء الذنبات المستفل رمحي مخززي. الوريقات كبيرة مستطيلة أو رحيمة. الرؤوس ذات زناد أو جالسة تقريباً بيضية وفي الإثمار مخروطية مستطيلة. الكاس نصف التويج الأبيض المصفر طولاً وخرقها رحيمة مخززية ذات ٢ اعصاب عند قاعدتها ومثل الانبوبة طولاً إلا أن السفلى منها أطول من البقية—الربيع—مزارع سورية وفلسطين. وفي القطر المصري بزرع لعلاف الخيل
- ١٦ T. Panormitanum, Presl. النغلة البلمرية. قليل الغناء ملازمة. الساق منتصب غليظ. جزء الذنبات المستفل خطي طويل. الوريقات مستطيلة وخطية. الرؤوس مستطيلة ذات زناد. الكاس ثلثة ارباع التويج الأبيض طولاً ذات شعرايض درني القاعدة وخرقها رحيمة خطية قاعدتها

ذات ٢ أعصاب. وأربع من الحرق مثل الانبوبة طولاً والخامسة أطول منها منعقفة - الربيع - يبروت. وربما الأنواع الأربعة من ١٢ - ١٦ نباتات نوع واحد

١٧. *T. maritimum*, Huds. النفلة البحرية ⊙ قليل الغناء أو املس. الساق منتصب أو منتهض والفروع الجانبية مثل القنار طولاً أو أطول. منها. جزء الذنبيات المستفل خطي جاد. الرؤوس ذات زناد أو جالسة بيضية. الكاس نصف التويج الأبيض أو الوردى الباهت طولاً وخرقها رحيمة قصيرة متساوية طولاً أو غير متساوية أقصر قليلاً من الانبوبة ثم منفرجة ومثلها طولاً ذات ٢ أعصاب - الربيع - يبروت

١٨. *T. plebeium*, Boiss. النفلة العامة ⊙ صوفي شعرة ناشي من درينات. السوق منشرة. جزء الذنبيات المستفل رحيمة قصيرة. الوريقات بيضية كاله. الرؤوس صغيرة بيضية وفي الإثمار مندججة ذات زناد قصيرة. الكاس ثلث التويج الأبيض المصفر طولاً وخرقها رحيمة مخززية وفي الإثمار مثلبة رحيمة منفرجة ذات ٢ أعصاب ومثل الانبوبة البيضية طولاً - الربيع - بين راشيا ودمشق

١٩. *T. scutatum*, Boiss. النفلة الهرسية ⊙ منفرج الغناء. السوق منتصب ومتكئة. الذنبيات غشائية مخططة خطوطاً بنفسجية وجزءها المستفل ورفي رحيمة. الوريقات بيضية مقلوبة وأحياناً مفروضة. الرؤوس المزهرة ٢.١٥ متر طولاً بيضية مستطيلة ذات زناد والمثمرة ٢.٢ متر طولاً. الكاس ثلث التويج الأبيض المصفر أو نصفه طولاً وخرقها رحيمة قصيرة مهدبة والسفلى منها ضعف البقية طولاً خطية رحيمة. والكاس المثمرة متضخمة مخروطية مقلوبة وبترية وخرقها بيضية مثلبة منعقفة ذات ٢ أعصاب إلى ٧ بأرزة - الربيع - أماكن عشية في سواحل سورية وفلسطين البحرية وإسافل الجبال

٢٠. *T. elypeatum*, Boiss. النفلة الجذبية (بزاز البقر) ⊙ منعنف الغناء منفرقة. السوق متكئة. الذنبيات نصف بيضية حادة. الوريقات بيضية مقلوبة أو مسند برة اسفينية القاعدة والسفلى منها مفروضة. الرؤوس المزهرة ٢.٢٥ متر طولاً وأكثر بيضية مقلوبة مسترسلة والمثمرة ٢.٢ متر طولاً وأكثر مندججة اهليلجية. الكاس ثلث التويج الوردى أو المبيض طولاً وخرقها ورقية رحيمة قصيرة والسفلى منها ٤ أضعاف البقية طولاً. الكاس المثمرة نامية وخرقها كثيرة

شكل ١٠٧



الأعصاب مشبكة الأوردة مثلبة بيضية حادة - الربيع - أماكن عشية في سورية وفلسطين - نوع طريف

٢١. *T. canabum*, L. النفلة المحرشة ⊙ ملازم الغناء. السوق يابسة متضاعلة أو مستطيلة. جزء الذنبيات المستفل مثلث قصيرة حموي. الوريقات تخنيمية بيضية مقلوبة مستطيلة. الرؤوس الباطية وإنشائية جالسة تقريباً منندرة بيضة. الكاس أطول قليلاً من التويج الأبيض وخرقها

راس النفلة المحرشة مع ورقة منها

غير متساوية رمحية يابسة حموية ذات عصب واحد واخيراً متفرجة مخنثية مثل الانبوبة طولاً - الربيع - اماكن جافة في سورية وفلسطين

٢٣. *T. subterraneum*, L. **النفلة التحت الارض** ♂ غثائي كثراً وقل. السوق مستتلفة. الذنبات نصف بيضية حادة. الوريقات قلبية مقلوبة. الرؤوس طويلة الزناد وفي الإثمار كروية مستعقفة ملازمة الارض. الازهار ذات التويجات ٢ - ٥ مصطفة صنّاً واحداً. الكاس نصف التويج الابيض المخطط بالوردي طولاً وخرقها هلبية مثل انبوتها طولاً. القرنة منبثقة نصفها من الكاس المشقوقه مثلثة مقلوبة قشرية مشبكة وحافتها العليا محزومة بمخچه - الربيع - حلب وشاليم

٢٤. *T. globosum*, L. **النفلة الكروية (نفل قطن)** ♂ غثائي. الذنبات بيضية مدببة. الوريقات اسفينية بيضية مقلوبة او قلبية مقلوبة. الرؤوس مع زنادها المنتضبة كالورقة طولاً او اطول منها. الازهار التويحية ٥ الى ٧ وكاسها ١/٤ تويجها الارجواني طولاً وخرقها هلبية اقصر قليلاً من انبوتها. القرنة بيضية مقلوبة غير منبثقة. خرق كاس الازهار العاقرة طويلة زغبية تكون رأساً اشقر قطره ٢.١ متر الى ٢.١٥ - الربيع - اماكن عشبية في سورية وفلسطين

٢٥. *T. eriosphaerum*, Boiss. **النفلة الصوفية الكرة** ♂ الذنبات بيضية حادة. الوريقات بيضية مقلوبة اسفينية. الرؤوس مع زنادها المخنثية اخيراً مثل الاوراق طولاً او اطول منها. الازهار التويحية ٥ - ٦ وكاسها صوفية ٢/٣ تويجها الارجواني او الوردي الباهت طولاً وخرقها خيطية مثل انبوتها طولاً. القرنة مستطيلة غير منبثقة. خرق كاس الازهار العاقرة صوفية هلبية تكون كرة يضاء قطرها اقل من ٢.١ متر - الربيع - القدس. الماء. الحبل

٢٦. *medusæum*, Post. **المدوسية**. التويج اطول ما في الرمز. القرنة منبثقة قليلاً -

شكل ١٠٨



لبنان والجبل الشرفي (*T. medusæum*, Bl.)

٢٥. *T. pilulare*, Boiss. **النفلة المحيية** ♂ الذنبات بيضية كالة. الوريقات صغيرة بيضية مقلوبة اسفينية. الزناد اخيراً مثل الاوراق طولاً. الازهار التويحية ١ - ٢ وخرق كاسها غثائية هلبية اطول من انبوتها ومن التويج الصغير الابيض. القرنة بيضية كالة غير منبثقة. خرق كاس الازهار العاقرة طويلة متمايلة زغبية تكون كرة برشاء قطرها

٢٥.٥ متر الى ٢.١ - الربيع - اماكن عشبية في سورية وفلسطين

٢٦. *T. fragiferum*, L. **النفلة الفرولوية** ٢٤ متفرق الغطاء او مستطلس. السوق زحافة. الذنبات رمحية مخززية القبة. الوريقات بيضية مقلوبة او اهليحية وقد تكون مفروضة. الزناد ابطينة اطول

من الاوراق . الرؤوس كروية ٢٠١ مترقطراً أثناء الإثمار ذات ظرف كثير المحرق مثل الكروثوس طولاً .

شكل ١٠٩



راس منبر من النفلة
الفرلوبة

شكل ١١٠



راس النفلة المتطيلة مع ورقة وذنبات

شكل ١١١



راس منبر
من النفلة المعكوسة مع ورقة وذنبات

الفليسات رحيمة أطول قليلاً من انبوبة الكاس . الكاس جالسة تقريباً ثلثا التويج الوردي طولاً وفي الإثمار منتفخة خوذية مشعرة والسنان العلويان منفرجان والثلة السفلى مستقيمة مثل الانبوبة طولاً - الصنف - اماكن جافة من مرعش الى لبنان والجبل الشرقي من سنجها الى تحت جردوها

T. modestum, Boiss. ٢٧ . النفلة المحشمة 2٤ امس حزمي

قزم . الذنبات رحيمة . الورقات صغيرة بيضية مقلوبة اسفينية . الزناد مثل

الاوراق طولاً . الرؤوس قليلة الازهار عادمة الظروف . الفليسات مستطيلة

اطول من الزنيدات القصيرة . الكاس نصف التويج الوردي الباهت طولاً وفي

الإثمار محدبة الظهر اسمها عفائي ووحشها امس . جميع الاسنان

أقصر من الانبوبة - الصنف - قم لبنان وجبل الشيخ - والارجح

انه تباين جردى من سابقه

T. physodes, Stev. ٢٨ . النفلة المتطيلة 2٤ امس .

السوق منتفخة . جزء الذنبات المستقل رحي في الذنبات السفلى

مستدق الى هلبة . الورقات عدسية او المثلجية او بيضية . الزناد

ابطية وانتهائية مثل الاوراق طولاً او اطول منها . الرؤوس كروية

٢٠٢ مترقطراً بلا ظرف . الفليسات صغيرة . الزنيدات قصيرة .

الكاس نصف التويج الوردي المبيض طولاً وفي الإثمار منتفخة خوذية

وبرية واسنان الشفة العليا رحيمة منفرجة والسفلى مستقيمة مخززية

اطول قليلاً من الانبوبة - الصنف - الاقاليم المتوسطة من جبال

عينتاب ومرعش الى لبنان

psilocalyx, Boiss. ب . الملساء الكاس . الكاس

ملساء - مع الرمز

T. resupinatum, L. ٢٩ . النفلة المعكوسة

امس . السوق مستقيمة او متصاعدة . الذنبات غشائية رحيمة مدبية .

الورقات بيضية مقلوبة حادة او كالة . الزناد مثل الاوراق طولاً

او اطول منها . الرؤوس كروية ذات ظرف متلويج . الازهار

جالسة تقريباً معكوسة بعد الإنباس . الكاس نصف التويج الوردي

طولا أوائل وبرية يتفتح ظهرا في الإثمار وينتهي بتخروط واضح ذي هليتين منفرجتين وإسنان الكاس الثلاثة العلوي اعرض منها رحيمة - الربيع - أماكن عشبية. كثير الوجود

majas, Boiss. ب. الكبيري. السوق أكثر ضخامة ناصورة. الزناد طويلة - مع الرمز

minus, Boiss. ت. الصغرى. جميع الأجزاء أصغر. الزناد نحيلة. جزء الكاس المتفتح أقصر

- مع الرمز

petiolatum, Post. ت. الرجيلية. السوق ضخمة. الرجيلات طويلة أطول من الزناد -

مرج دمشق

T. tomentosum, L. ٢٠. الفلة البادية @ امس. السوق منشرة. الذنبيات بيضية -

رحمة مدبة. الوريقات بيضية - مقلوبة مجذومة أو مفروضة. الزناد أقصر من الورقة وإحيانا مفقودة .

الرؤوس كروية مثلها في المتفرد ذكره حجا وظرف متلويح. الأزهار جالسة تقريبا. الكاس ثلثا التويج الوردية طولا وفي الإثمار متفخة لبادية كالة وإسنانها مخززية مخفية بالصوف اللبادي - الربيع - أماكن عشبية. كثير الوجود

T. bullatum, Boiss. et Haussk. ٢١. الفلة العجالية @ امس. السوق منشرة. الذنبيات

رحمة قصيرة التدب. الوريقات بيضية - مقلوبة - اسفنية مفروضة. الزناد خيطية أطول قليلا من الأوراق

وأخيرا منقضة. الرؤوس كروية مثلها في ٢٩ حجا وظرفها متلويح. الأزهار جالسة تقريبا. الكاس نصف

التويج الوردية طولا وفي الإثمار متفخة كالة جتا لبادية أو ورية وإسنانها العليا صغيرة جتا والسفلى

أطول مستطيلة - رحيمة - الربيع - المزارع بين عينتاب وحلب. عيه. الصنوبر يقرب عيم بسايا -

شكل ١١٢

وربا الأنواع الثلاثة (من ٢٩ - ٢١) تباينات نوع واحد فقط

T. spumosum, L. ٢٢. الفلة الزبدية @ امس .

السوق مثقلة منتصب أو منشرة. الذنبيات غشائية ذات اطراف

هليية. الوريقات كبيرة بيضية - مقلوبة أو اهليجية وبعضها مجذومة أو

مفروضة. الرؤوس كروية. الفليسات بيضية - مستطيلة حوية

أقصر من انبوبة الكاس. الكاس ملساء غشائية وأخيرا متفخة

بيضية وخرفا عريضة القاعدة مخززية القمة ثم منعقة ثلث انبوتها

طولا والانبوبة ذات ٢٠ عصبا وأوردة مستعرضة متفهمة بها -

الربيع - من حلب الى مرج ان عبر

رأس منظر من الفلة الزبدية

T. Aintabense, Boiss. et Haussk. ٢٣. الفلة العينتابية @ مستأس. السوق منشرة.



جزء الذنبات المستقل رمحي. الوريقات بيضية-منلوقة. الرؤوس بيضية ذات زناد. الفليسات مستطيلة حموية اقصر من انبوبة الكاس. انبوبة الكاس اسطوانية ملساء القاعدة ذات ٢٦ عصباً الى ٤٠ وخرق نصفها طولاً رحيمة القاعدة مخرزية القمة - الربيع - قرب عيتاب

T. xerocephalum, Fenzl. ٣٤. النفلة المجافة الراس © مستمسك. السوق منشرة متفرعة. جزء الذنبات المستقل رمحي مخرزي. الوريقات صغيرة بيضية - منلوقة اسفينية وبعضها مجذومة وكلها صغيرة الحمة. الرؤوس قصيرة الزناد او مغلقة القاعدة كروية ثم مستطيلة كثيفة الازهار. الفليسات اسفينية مستطيلة كالة او حموية مثل انبوبة الكاس طولاً. انبوبة الكاس اجاصية بالية متفتحة اخيراً ذات ٢٦ عصباً او اقل وصفين طويلين من الوبر وخرقها عريضة القاعدة مخرزية نصفها طولاً متفرعة - الربيع - من عيتاب الى لبنان ويبروت

minus, Boiss. ب. الصغرى. الرؤوس المثمرة اصغر واضيق. الفليسات اقصر من انبوبة الكاس. خرق الكاس ثلث انبوتها الى رومها طولاً - اماكن رملية تحت الجرد فوق زحلة

T. nervulosum, Boiss. et Held. ٣٥. النفلة العصية © اماس بلا غد. السوق

شكل ١١٢



منتصبه او منتصبه. الذنبات نصف بيضية غشائية عشبية الحوافي مخروقة - معسنة. الوريقات مستطيلة او اهليجية عصبية ذات سنينات. الزناد اطول كثيراً من الاوراق. الرؤوس بيضية بلا ظرف. الكاس ملساء نصف التويج الوردي طولاً وخرقها رحيمة - مخرزية متفرعة اخيراً مثل الانبوبة طولاً. الفترة متبثثة قليلاً ذات منقار منحرف مثلها طولاً - الربيع - سورية وفلسطين

Galilæum, Boiss. ب. الجليلية. الرؤوس كروية.

خلمان الكاس احياناً ذات شعرة او ٢. اسنانها اطول من انبوتها - قرب باناس

depaupertatum, Post. ت. المفقرة. قزم منشتر راس النشاء العصية. ب. الجليلية.

ورقة منها

- الجبل الشرقي. جبل قيصون

glanduliferum, Post. ث. الحاملة الغدد. عوايف الوريقات والذنبات وخرق

الكاس ذات غدد. الوريقات عدسية - مستطيلة او مستطيلة - خطية العلوي منها احياناً بيضية - منلوقة -

بين النبطية والقلبيات. القدس (*T. glanduliferum, Boiss.*)

deformatum, Post. ج. المعطوبة. الوريقات مستطيلة المحيط غير منتظمة الاصوص او


الاسنان . والأفئد ب - المحولة . صردة

٢٦. *T. glomeratum*, L. النفلة المعبأة ⊙ املس . السوق غخيلة منتصبة ومثشرة . الذنبات

بيضية وجزؤها المستقل مدبب هلي . الوريقات صغيرة بيضية - مقلوبة منيشيرية حسيكية . الرووس كروية ابطية وانتهائية جالسة مغلقة بالاوراق المتقابلة . الزنبات قصيرة جداً . الفليسات منلوجة . الكاس

شكل ١١٤

ثلاثا التويج الوردي طولاً واسنانها بيضية مدببة منفرجة اخيراً اقصر من انبوبتها والانبوبة ذات . اعصاب - الربيع - لبنان بين ديمان والحديث



٢٧. *T. Petrisavii*, Clem. نفلة پتريسافوس ⊙

املس . السوق منتفضة او متصاعدة غير مجعفة . الذنبات مدببة . الوريقات بيضية - مقلوبة واحياناً مجذومة . الزناد ابطية اطول كثيراً من الاوراق . الرووس كروية . الزنبات منعقة بعد الإزهار والداخلية منها مثل انبوبة الكاس طولاً او اطول منها . الكاس نصف التويج الوردي الباهت او اكثراً طولاً وخرتها عريضة الفاعة محززية القبة ضيقة الحافة البيضاء مثل الانبوبة طولاً وذات عصب واحد او ثلاثة اعصاب . الفرة ذات برتين - الربيع - من عيتاب وساحل سورية البحري الى بيروت - وزبما هوتباين من النفلة المسودة (*T. nigrescens*, Viv.)

٢٨. *T. Meneghinianum*, Clem. النفلة المنجنيمانية رأس نفلة پتريسافوس وورقة منها

⊙ املس . السوق متصاعدة ناصورية . جزء الذنبات المستقل مثلث هلي الطرف . الوريقات كبيرة بيضية - مقلوبة واحياناً مجذومة او محزومة . الزناد اطول كثيراً من الاوراق . الرووس كروية . الزنبات منعقة في الإثمار والداخلية منها اطول . الكاس . الكاس نصف التويج الابيض طولاً وخرتها رحيمة - محززية غير متساوية الطول والعلانية مثل الانبوبة طراً . الفرة ذات بذرة واحدة - الربيع - ساحل سورية وفلسطين البحري

٢٩. *T. repens*, L. النفلة الزحافة ب مستهلس . السوق زحافة متصاعدة . الوريقات كبيرة

بيضية - مقلوبة او معتدلة تقريباً . الذنبات شداية مسبة فجاة بناس او دلة . الزناد طويلة جداً اطول من الاوراق . الرووس كروية تقريباً ٢.٠ متر قطراً او أكثر . الزنبات منعقة واماخية منها اطول من الكاس . الكاس نصف التويج طراً وخرتها رحيمة والحرقنان العلبيان منها اطول من البنية مثل

الانبوبة طولاً . الفترة ذات ٣ بزور أو ٤ . أماكن رطبة في سورية وفلسطين حتى الجرد
٤٠ . *T. comosum*, Labill. . النفلة الكيسية ⊙ أملس إلا التفرع منتصب . الذنبيات

شكل ١١٥



راس النفلة الكيسية

مستطيلة رمحية حادة . الوريقات مستطيلة اسطوانية القاعنة . الزناد متفرقة الغشاء
أطول قليلاً من الأوراق . الرؤوس سنبلية . الزنيدات مثل انبوبة الكاس
طولاً . التويج مصفر باهت . العلم مستدير - الربيع - في الرمل الحديدي بقرب
بيروت

٤١ . *T. stenophyllum*, Boiss. . النفلة الضيقة الورق ⊙ ملازم

الزغب . السوق منتصب ومنتهضة متهايلة . الذنبيات مثثة رمحية حادة أو مدببة .
الوريقات مستطيلة - اهليجية وأخضية . الزناد ضعفاً الأوراق طولاً أو أكثر . الرؤوس
بيضية ثم مستطيلة ٢٠٢ متر طولاً و ٢٠١ عرضاً . الزنيدات ثلث انبوبة الكاس
طولاً إلى نصفها . التويج ورددي . العلم مستطيل ملوحي - الربيع - الرمل بقرب غزة

٤٢ . *T. speciosum*, Willd. . النفلة البهيجة ⊙ ملازم الغشاء منتصب . الذنبيات نصف -

شكل ١١٦



بيضية أو مستطيلة حادة . الوريقات اهليجية - مستطيلة والسفلى منها
مخرومة . الزناد ضعفاً الأوراق طولاً أو أكثر . الرؤوس بيضية
مسترسلة ٢٠٢ متر أو أكثر من ذلك طولاً و ٢٠١٥ عرضاً .
الزنيدات أطول قليلاً من انبوبة الكاس منعققة سريعاً . العلم
أرجواني يضي - مغلوب أطول كثيراً من الجناحين والورق المبيضة
- الربيع - لبنان والجبل الشرقي . فلسطين

٤٣ . *T. erubescens*, Fenzl. . النفلة المحمرة ⊙

ملازم الغشاء . السوق خضية منتهضة . الذنبيات مستطيلة حادة .
الوريقات بيضية - مغلوبة وأحياناً مخرومة . الزناد نحيلة ضعفاً الأوراق
طولاً أو أكثر . الرؤوس كروية ٢٠١ متر قطراً في الإثمار . الزنيدات
أقصر قليلاً من انبوبة الكاس . العلم ورددي مستطيل - ملوحي أطول راس النفلة البهيجة وورقة وذنبية منها
من الجناحين والورق البنفسجي - الربيع - أماكن صخرية في سورية وفلسطين

٤٤ . *T. Boissieri*, Guss. . نفلة بويصيه ⊙ متفرق الغشاء منتصب . الذنبيات رمحية - مخرومة

النفلة . الوريقات بيضية - مغلوبة - مستطيلة وأحياناً مخرومة . الزناد مثل الورقة طولاً تقريباً . الرؤوس
مستديرة تقريباً ٢٠١٥ متر قطراً . الزنيدات مثل انبوبة الكاس طولاً تقريباً . التويج أبيض - مصفر والعلم

شكل ١١٢



اطول من الجناحين - الربيع - اماكن جافة من انطاكية الى
حاصبيا وجبل الطور

T. agrarium, L. ٤٥ . الفلة البرانية © قليل

الزغب . السوق منتصبه او متصاعدة . الذنبات عريضة القاعدة
بيضية مدببة . الورقات بيضية معينة او مستطيلة . الزناد اقل
من الاوراق او مثلها طولاً واطول منها . الرؤوس بيضية مندججة
١٠ متر طولاً . الزنادات اقصر قليلاً من انبوية الكاس او مثلها

طولاً . التويج اصفر . العلم ذو صفحة مستديرة . بيضية مقلوبة ومغلب راس الفلة البرانية وورقة وذيتان منها
- الربيع - مزارع سورية وفلسطين

subsessile, Boiss. ب . المجالسة تقريباً . مستغبر . الرؤوس جالسة تقريباً . الازهار

احياناً باهتة - قرب حلب

١٨ الفيسنتيليس *PHYSANTHYLLIS*, Boiss.


الكاس انبوية ذات ٥ اسنان واخيراً منثججة . البتلات طويلة المخالب . الاسدية ذات خوتين .
المبيض ذو بويضتين . القرنة قرطاسية مستدقة الى سويقة مخنثقة بين البزور ذات غريفتين - اعشاب
سنوية

P. tetraphylla, L. . الفيسنتيليس الرباعي الورق © ويري . السوق مستلقية متفرعة
من العنق . الاوراق ريشية مفردة ذات زوج او زوجين والورقة الانتهائية كبيرة بيضية مقلوبة والجانبية
صغيرة . الازهار جالسة تقريباً مجمعة في الآباط . القرنة ويرية . البزور متدرة - الربيع - مزارع
سورية وفلسطين

١٩ الهيمنوكريس *HYMENOCARPUS*, Sav.


انكاس ذات ٥ خرق متساوية . البتلات مستقلة قصيرة المخالب والزورق ذو منقار . الامدية
ذات خوتين . المبيض ذو بويضتين . القرنة ذات سويقة وملثنة طولاً مقلطجة مخنثة الحافة الخارجية
محموجة بمجازر مستعرض يفصلها الى غريفتين - اعشاب سنوية
الهيمنوكريس المتنفس طولاً © ويري . السوق متصاعدة او

شكل ١١٨



فرتان من الهيمنوكريس المتنف طولا

شكل ١١٩



منشرة . الاوراق السفلى كاملة والبقية ذات زوجين الى ٤ والورقة
الانتهائية كبيرة . الازهار ٢ الى ٤ على قمة زند اطول من الورقة .
القرنة مستديرة وجناحها اعرض من تجويفها مشرشر الحافة -
الربيع - مزارع سورية وفلسطين

الهيمنوكريس *H. nummularius*, D. C. ٣

التفدي مثل المتقدم ذكره الآن الزند اقصر من الورقة وجناح
القرنة مثل تجويفها عرضاً تقريباً كامل الحافة - الربيع - مزارع
بحرية مصر - والاولى ان يعتبر تابئاً من النوع المتقدم

٢٠ السكويرجرا *SECURIGERA*, L.

الكاس جرسية ذات شفتين تقريباً والسنان العلويان متجان
الى قرب قمتهما . الزورق مستدق الى منقار . القرنة طويلة خطية
مقلقة ضخمة الحافتين موسومة بين البزور غير منفصلة الى قطع
ومنتهية بمنقار - اعشاب تشبه الكورونلا كهيئة تختلف عنها بعدم
انفصال القرون عند تفجها

s. Coronilla, D. C. السكويرجرا كورونلا

املس . السوق متصبه او منشرة . الوريقات ٥ ازواج الى ٧
اسفينية مجذومة او مخرومة . الزناد اطول من الاوراق ذات ٦ ازهار
الى ٨ صفراء . وجه القرنة حلبي ومنقارها شحي - الربيع - مزارع
ساحل سورية وفلسطين البحرية

٢١ السستيس *GYTISOPSIS*, Jaub. et Sp.

الكاس انبوية ذات شفتين والثنية العليا اطول من السفلى
ذات سنين والسفلى ذات ٣ اسنان . الثنات طويلة الخالب
والسفلى منها ملتصقة بالانبوية السدوية . الاسدية ذات خوتين .

المبيض ذو علة بويضات . القرنة خشبية اسطوانية مستقيمة مجرزة بين البزور - شجيرة ذات اوراق اصبعية
المتسويس *C. dorycnifolia*, J. et Sp. السستيس الدوركي الورقة مثبثك الفروع ملازم

الحريز فضية. الاوراق جالسة على قريص. الوريفات ٥ - ٧ خطية - ملوقة. الازهار مجمعة ٢ - ٣ على اطراف الخرايب جالسة تقريباً صفراء. الفترة اطول قليلاً من الكاس - اول الربيع - الصغور من جبل بيلان الى اقاليم لبنان المتوسطة. نادر

٢٢ الدوركنيوم *DOBYCNium, Tourn.*

الكاس خماسية المخرق او ذات شغتين. الجناحات مغامزان الى الامام او منحان مجهزان بشية طويلة او جذبة مستعرضة. الزروق كال. الاسدية ذات خوتين. الفلم مستدق القمة. الفترة بيضية او مستطيلة او خطية - اعشاب معبرة او نجيات وريقاتها السفلى قريبة الى منشأ الرجلة * الكاس خماسية الاسنان. الفترة محجزة بمجاذر مستعرضة

D. hirsutum ١ *rectum* ٢ *Kotschy* ٣

* الكاس ذات شغتين. الفترة ذات غرقة واحدة

D. Anatolicum ٤ *Hausknechtii* ٥

D. hirsutum, L. ١. الدوركنيوم العفائي ثغفاني أغبر. الفروع اسطوانية منتصبة. الاوراق جالسة تقريباً والوريفات بيضية - ملوقة. الزناد اطول من الاوراق. الازهار ٠.١ متر طولاً مجمعة - في رأس خرق الكاس وبرية اطول قليلاً من انبوبتها. العلم خطي - ملوقي اطول كثيراً من الجناحين والزروق. الفترة ٠.٦ متر طولاً حمراء مستطيلة منتفخة اطول قليلاً من الكاس - الربيع واول الصيف - انت وصغور من اسافل جبل اللكام الى لبنان وساحل سورية المجري *Syriacum, Boiss.* ب. السوري. قابل العفاء. الفترة مثل الكاس طولاً - فوق بيلان.

بين السويدية وانطاكية

D. rectum, L. ٢. الدوركنيوم المستقيم ٢٤ قصير العفاء. السوق زاوية عشبية عالية

شكل ١٢٠



مفرعة. الوريفات الثلث الاخيرة محمولة على رجلة والوريفات الذنبية بيضية اطول من الرجلة. الزناد مثل الاوراق طولاً ثم اطول منها. الازهار ٠.٢ متر طولاً مجمعة في رؤوس مندججة. خرق الكاس ضعف انبوبتها طولاً. العلم اطول قليلاً من الجناحين والزروق. الفترة نجيلة ٠.١ متر طولاً سوداء ٣ اضعاف الكاس طولاً - الصيف - من جبل اللكام الى دمشق وصينا

رأس قرون الدوركنيوم المستقيم *D. rectum, Boiss. et Reut.* ٣. الدوركنيوم

كوتشي ٢ طول الغشاء متفرقة . السوق عشبية تقريباً طويلة اسطوانية متفرقة . الرجلات قصيرة . الزناد اطول قليلاً من الاوراق . خرق الكاس اقصر من انبوتها . العلم اطول قليلاً من الجناحين والورق . القرنة كالة مستطيلة متفتحة ٢٠٠ متر (اي ضعف الكاس) طولاً واكثر - الصيف - جبل يبلان على علو ٨٠٠ متر تقريباً

٤. *D. Anatolicum*, Boiss. الدوركيوم الانضوي ٣ ملازم الغشاء او متفرجه . السوق متصبة ٢٣٥ متر علواً الاوراق جالسة ووريقاتها اصبعية خطية - ملوئية . الزناد قصيرة في الاول ثم مطولة . الزنيدات مثل انبوت الكاس طولاً واقصر منها . الازهار ٢٠٠٥ متر طولاً . خرق الكاس اقصر من انبوتها . القرنة مستطيلة حادة ٢٠٠٢٥ متر طولاً وذلك اكثر من ضعف طول الكاس - الصيف - جبال شمالي سورية والى الشمال

٥. *D. Haussknechtii*, Boiss. دوركيوم هو صنف ٣ ملازم المحرير . السوق متصاعدة او متصبة . الاوراق جالسة ووريقاتها اصبعية خطية - مستطيلة حادة . الروس قليلة الازهار طويلة الزناد . الزنيدات مثل انبوت الكاس طولاً . الازهار ٢٠٠٣ متر طولاً . خرق الكاس نصف انبوتها طولاً . القرنة حادة ٢٠٠٣ متر طولاً (وذلك ضعف طول الكاس) وفي ذات بذرة واحدة - الصيف - جبال شمالي سورية

Libanoticum, Boiss. ب . اللبناني . قزم مستلق . خرق الكاس ثلث انبوتها طولاً - اماكن جافة تحت جرود جبل صنين

٢٢ اللوتس LOTUS, L.

الكاس ذات ٥ خرق واحياناً شغوية . الزورق مخفي الى الاسفل تدريجياً او فجأة ذو منقار . الاسدية ذات خوين . القلم مستدق . القرنة مستطيلة او خطية بلا جناح وغالباً محموزة بين البزور - اعشاب او نجبات ووريقاتها السفلى مثل ذنبيات * الكاس جرسية - انبوتية . القرنة مستطيلة او خطية - اسطوانية

† معبرة

‡ الازهار صفراء

L. argenteus † *Oreticus* ‡ *corniculatus* † *tenuifolius* † *lamprocarpus* †

‡ الازهار ارجوانية او وردية

L. Gebelia † *lanuginosus* †

† † سنوية

‡ الأزهار ارجوانية اووردية

L. Arabicus | Schimper | glinoides | Conimbricensis |

‡ ‡ الأزهار صفراء

L. divaricatus | angustissimus |

* * الكاس ذات شنتين. الفترة خطية-اسطوانية ومنضغطة

L. peregrinus | Carmeli | pusillus | ornithopodoides |

* * * الكاس جرسية. الفترة ضخمة ذات غريفتين طويلتين ودرزها العلوي منعطف الى الداخل

L. edulis |

1. L. argenteus, L. اللوتس الفضي ♂ حريري فضي. الفروع مستقيمة. الاوراق كثيفة

جالسة وريقاتها خطية-مرحبة حادة. الزناد اطول قليلاً من الاوراق ذات ٢ ازهار جالسة الى ٦. خرق الكاس رحيمة مثل انبوتها طولاً واطول منها. التويج اصفر-مسمر مثل الكاس طولاً. الفترة اطول قليلاً من الكاس مستطيلة ذات برزتون او ٢ - الربيع - اماكن رملية بقرب الاسكندرية

٢. L. creticus, L. اللوتس الاكروتي 2م ملازم الشيب كثر او قل. السوق مستقيمة او منصاعة عارية القاعدة. الاوراق جالسة او قصيرة الرجلات وريقاتها بيضية-مقلوبة او مستطيلة-اسطوانية. الزناد طويلة ذات زهرة الى ٨ ازهار. خرق الكاس مستطيلة-مرحبة. الزورق مخنن تدريجاً الى الاسفل. الفترة اسطوانية ٢.٢ متر الى ٢.٠ طولاً - الربيع

a. genuinus, Boiss. الحقيقى. فضي حريري. السوق يابسة. الاوراق جالسة او جالسة

نقرى. الورقات مستطيلة-اسطوانية او خطية-اسطوانية - شاطئ حيفا وبافا وبحيرة مصر

b. cytisoides, Boiss. السبيه بالسيسيس. رمادي مخضر زغبى. السوق مخجلة. الاوراق

قصيرة الرجلات وريقاتها بيضية-مقلوبة - اسفينية. الزناد احياناً قصيرة - شاطئ سورية وفلسطين

c. collinus, Boiss. التلي. مخضر. السوق منصاعة. الاوراق قصيرة الرجلات.

الورقات بيضية-مقلوبة. الزناد مطولة-كثير الوجود في سورية وفلسطين من الشاطئ الى تحت الجرد

٣. L. corniculatus, L. اللوتس القرنية 2م امس او قليل الشعر. السوق منصاعة.

الورقات بيضية-مقلوبة او مستطيلة اطول من الرجل. الزناد اطول كثيراً من الاوراق ذات ٢ ازهار

الى ٥ تخضر عند جفافها. خرق الكاس مثقلة القاعدة مخزبة القبة متساوية مثل انبوتها طولاً.

الزورق مخنن على زاوية قائمة تقريباً. الفترة ٢.٢ متر طولاً اسطوانية - الربيع - دمشق. البقاع

alpinus, Boiss. ب. المجردى. عناني كثرا وقل. الاوراق جالسة تقريباً. خرق الكاس احياناً قصيرة واعرض قليلاً منها في الرمز - الصيف - جرود لبنان والجبل الشرقي وتحت جرودها ciliatus, Boiss. ت. المهذب. طويل الشعر منفرجه. الوريقات صغيرة - الصيف - جبل منيطري. صيدا

L. tenuifolius, Rechb. ٤. اللوتس التحيل الورق 24 املس او قليل الغطاء. السوق مستقيمة مطوّلة. الاوراق قصيرة الرجلات ووريقاتها خطية - يضيقة - مقلوبة وخطية. الزناد نحيلة اطول كثيراً من الاوراق ذات زهرة الى ٥ بلا فليسات او ذات فليسات قصيرة. خرق الكاس مثلية القاعدة مخززية القبة مثل انبوبتها طولاً. الزورق منحني على زاوية قائمة تقريباً. القرنة لمساء لماعة اسطوانية ٢.٢٥ متر طولاً - الربيع والصيف - من مرعش الى لبنان والنظر المصري

uniflorus, Boiss. ب. الاحادي الزهر. السوق قصيرة. الزناد ذات زهرة او ٢ -

تحت جرود لبنان

L. lamprocarpus, Boiss. ٥. اللوتس اللماع الشعر 24 منفرج اللحية رماديها. السوق منشرة طويلة متفرعة. الوريقات اطول من الرجلية يضيقة - مقلوبة حادة. الزناد نحيلة ذات زهرتين الى ٥ صغيرة وفليسات مثل الكاس طولاً او اطول منها. خرق الكاس رحمة - مخززية ضعف انبوبتها طولاً اقصر قليلاً من التويج. الزورق منحني تدريجياً الى الاسفل. القرنة لمساء لماعة ٢.١٥ متر طولاً - الصيف - الاقاليم المتوسطة من جبال شمالي سورية ولبنان. غور الاردن

L. Gebekka, Vent. ٦. اللوتس جبيليا 24 عالٍ مستغبر. السوق متصاعدة متمايلة متفرعة. الرجلية اقصر من الوريقات الذنبية. الزناد ضعف الاوراق طولاً او اكثر ذات فلسين او ٢ مثل انبوبة الكاس طولاً و ٢ ازهار الى ٦ خرق الكاس رحمة - مخززية اطول قليلاً من انبوبتها. التويج ٢.١ متر طولاً او اكثر وردي والزورق ارجواني الطرف. القرنة ٢.٠٢ متر طولاً او اكثر و ٢.٠٢ متر عرضاً مميزة مخنفة بين الزهور - الصيف -

genuinus, Boiss. ا. الحقيقي. املس - عيتاب

villosus, Boiss. ب. الوبري. وبري كثرا وقل - عيتاب. بعلبك

Libanoticus, Boiss. ت. اللبناني. لحوي. الازهار اصغر مما في الرمز. خرق الكاس

اقصر من انبوبتها - لبنان والبقاع

Hausknechtii, Boiss. ث. هو صكخت. الازهار باهتة صغيرة. خرق الكاس اقصر من

انبوبتها. النبات قليل الليبد. انبوبة الكاس لمساء وخرقها مهدبة - الجبل الغربي قرب دمشق

L. lanuginosus, Vent. ٧. اللوتس الكثير الصوف 24 منفرج الليبيد كثيفة. السوق مستطيلة متفرعة كثيفة الاوراق. الوريقات ٢٥-٣٠ متر طولاً الى ٥٠٠ يضية-مقلوبة او قلبية-مقلوبة جالسة تقريباً. الزناد ضعفا الورقة الى ٤ اضعافها طولاً ذات ٢ فلوس وزهرة الى ٢. الكاس لحوية وخرقها رحيمة القاعدة مخززية القبة. التويج ارجواني غامق. زاوية الزورق قائمة مخنجة - الربيع - بادية سورية. شمالي بادية النبه

L. Arabicus, L. ٨. اللوتس العربي (الخضيرة) © ملازم الغناء قليلاً مستغير. السوق مستطيلة او متصاعدة طويلة متفرعة. الوريقات يضية-مقلوبة-اسفينية كالة. الزناد ضعفا الاوراق طولاً ذات ٣ ازهار الى ٥ وفلوس كالكاس طولاً او اطول منها. خرق الكاس خطية-رحيمة اطول من انبوبها. التويج ضعف الكاس طولاً تقريباً. الفترة ١٥-٢٠ متر الى ٢٠٢ طولاً - الشتاء والربيع - ارباب النيل. شاطئ البحر الاحمر. بادية سينا

L. Schimperii, Steud. ٩. لوتس شمبير © ملازم الغناء قليلاً مستغير. السوق مستطيلة بسيطة تقريباً متعاقبة. الوريقات يضية-مقلوبة كالة. الازهار جالسة صغيرة مجمعة ٢-٣ في الاباط. خرق الكاس خطية-مخززية مثل انبوبها طولاً. التويج مثل الكاس طولاً تقريباً. الفترة ١٠-٢٠ متر طولاً - الربيع - بين قصير ورأس بناس

L. glinoides, Del. ١٠. اللوتس الشبيه بالكليمنس © ملازم الشيب. السوق قرية مستطيلة. الوريقات يضية-مقلوبة-اسفينية. الازهار ابضية منفردة غالباً ٥٠٠ متر طولاً قصيرة الزند وردية. خرق الكاس رحيمة مثل انبوبها طولاً. التويج ضعف الكاس طولاً تقريباً. الفترة معقدة ١٥-٢٠ متر طولاً او أكثر قليلاً - الربيع - بادية سينا. جزائر النيل

L. Conimbricensis, Brot. ١١. اللوتس الكومبري © امس او متفرق الغناء. السوق منتصبة او متصاعدة. الوريقات معينة او يضية-مقلوبة. الزناد ضخمة ذات زهرة او ٢ وفلوس انصر من الكاس. خرق الكاس رحيمة - مخززية اطول من انبوبها. التويج ايضاً اطول من الكاس. الفترة ٤-٢٠ متر الى ٥٠ طولاً مخنجة على هيئة نصف دائرة - الربيع - طرابلس. ابل السقي. المحولة

L. divaricatus, Boiss. ١٢. اللوتس المشطر © منفرج الحية. السوق منتصبة سافلة متشعبة. الوريقات الذنبية يضية-نصف-قلبية والبقية يضية-مستطيلة مستدقة القاعدة. الزند ضعف الورقة طولاً ذو زهرتين الى ٢. الفلوس مدببة مثل الكاس طولاً. خرق الكاس هلبية مهدبة ضعف انبوبها طولاً او أكثر. التويج ضعف الكاس طولاً تقريباً. الفترة ٤-٢٠ متر طولاً - الربيع - يبروت

L. angustissimus, L. ١٣. اللوتس الاضيض © منفرج الشعر. السوق منتصبة او

متصاعدة. ورققات الأوراق السفلى بيضية - مقلوبة والعليا مستطيلة - خطية حادة. الزناد محيطية ضعف الأوراق طولاً ذات زهرة أو ٢. اللوتس خطية - رجمية. خرق الكأس رجمية مدببة أطول من أنبوبها. التويج أطول قليلاً من الكأس. الفترة ٢.٢ متر طولاً - الربيع - ساحل سورية البحري. من الجبل الأقرب إلى لبنان

L. peregrinus, L. ١٤. اللوتس المرتحل © ملازم الغناء حريري تقريباً. السوق منشرة. الرجلات قصيرة. الورقات بيضية - مقلوبة - اسفينية كالة والذنبية منها بيضية. الزناد مثل الأوراق طولاً أو أقصر منها ذات زهرة إلى ٤ وأخيراً متضخمة. الفرون منتصب أو منفرجة قليلاً ٢.٢ متر إلى ٢.٥ طولاً و ١.٥ متر عرضاً اسطوانية مخنجة قليلاً معقدة قليلاً محوية القمة - الربيع - ساحل سورية البحري وإسافل الجبال

longipes, Post. ب. الطويل الزند. الزناد ضعف الأوراق طولاً. الفرون أطول وأكثر

نظماً مما في الرمز - مع الرمز

L. Carmeli, Boiss. ١٥. لوتس الكرمل © قليل الزغب ملازمة أخضر. الورقات بيضية -

مقلوبة - اسفينية كالة والذنبية منها بيضية. الزناد ضعف الأوراق طولاً ذات زهرة واحدة. الفترة ضخمة ٢.٢ متر عرضاً مستقيمة اسطوانية معتدلة قليلاً - الربيع - أماكن عشية في جبل الكرمل. والأرجح أنه تباين من سابقه

شكل ١٢١



قرنتان من اللوتس المنحني

L. pusillus, Viv. ١٦. اللوتس المنحني © ملازم

الليبيد. السوق مستقيمة. الورقات صغيرة بيضية - مقلوبة -

مستطيلة والذنبية منها بيضية. الزناد ضعف الورقة طولاً أو ٢

ذات زهرة إلى ٢. الفرون نحيلة متصاعدة منفرجة ٢.٢ متر إلى

٢.٣ طولاً مخنجة معقدة قليلاً - الربيع - بادية التيه

major, Boiss. ب. الأكبر. جميع الأجزاء أكبر مما في

الرمز - ساحل سورية وفلسطين البحري. بادية التيه ومصر.

يقطن هذا التباين *macranthus*, Boiss. ت. الكبير الزهر أيضاً

L. ornithopodoides, L. ١٧. اللوتس الشبيه بالاورنثويس © ملازم الزغب.

السوق منشرة. الورقات بيضية - مقلوبة ومعينية. الزناد أطول من الأوراق وأخيراً متضخمة ذات ٣

أزهار إلى ٥. الفرون منعقفة خطية مفالطة ٢.٢ متر طولاً و ٢.٣ متر عرضاً مخنجة قليلاً مفالطة معقدة -

الربيع - ساحل سورية وفلسطين البحري

L. edulis, L. ١٨ . اللوتس المأكول ⊙ زغبي . السوق متصاعدة او منتشرة . الوريقات
الذنبية قلبية حادة أطول قليلاً من الرحلة والبقية بيضية - مقلوبة - اسفينية . الزناد ضعفا الاوراق الى
٢ اضعافها طولاً ذات زهرة كبيرة او ٢ . الفترة ٢.٢ متر الى ٢.٣ متر طولاً و ٢.٥ عرضاً و ٢.٢ سمكاً
مخفية على هيئة نصف دائرة وميزرة الدرزين حموية - الريح - ساحل سورية البحري

٢٤ التتراكونولوبس TETRAGONOLOBUS, Scop.



الكاس ذات ٥ خرق . الزورق مخفي الى الاسفل ذو منقار .
الاسدية ذات خوتين . الفلم ضخ من الاعلى مستدق الى سمة . الفترة
اسطوانية واعصابها الدرزية متمعة على هيئة اجنحة ورقية - عشب شبيه
باللوتس هيئة

T. purpureus, Mönch. . التتراكونولوبس الارجواني

⊙ عفاي . السوق متصاعدة . الوريقات الذنبية بيضية متحدة قليلاً مع
الرحلة والبقية بيضية - مقلوبة - معينية . الزناد مثل الورقة طولاً ذو زهرة او ٢ .
الكاس ثلثا التوج طولاً وخرقها رحيمة - خطية اطول من انبوبها . اجنحة
الفترة متموجة عريضة - الريح

قرنة التتراكونولوبس
Palæstinus, Post. . ب . الفلسطيني . (اصابع العروس) الارجواني . ب . الفلسطيني

الزناد اقصر من الورقة . خرق الكاس خطية مدبية . التوج اطول قليلاً من الكاس . اجنحة الفترة
ضيقة مستقيمة تقريباً - مزارع سورية وفلسطين (*T. Palæstinus, Boiss.*)

٢٥ البسوراليا PSORALEA, L.

الكاس جرسية ذات ٥ فصوص . الثلاث متساوية طولاً والزورق كال . المبيض ذو بويضة واحدة
والفلم خطي والسمة رؤسية . الفترة غير منشنة ذات بزة ١ - اعشاب او شجيرة غدية منقطعة ازهارها راسمية
او مرتبة رؤساً

P. pilcata, Del. ١ . البسوراليا المغضنة ⊙ السوق مستقيمة عسجية غدية - ثلوية . الاوراق

نفلية ووريقاتها ملازمة الغشاء مستطيلة جونبة - متموجة . الراسيات مسترسلة والفقرات متمبسة مستشيك .
الازهار صغيرة منعقفة قليلاً ٢ - ٣ في كل دولا ب . الفترة متضمنة في الكاس بيضية بلا منقار - الريح
- بادية ارض الصعيد

P. Janbertiana, Fenzl. ٢ . البسوراليا الجوبرتية 2/ ملازم الشبيب . انسوق ضخمة

القاعدة متباعدة متصاعدة . الأوراق نثلية وورقاتها مستديرة اسطوانية القاعدة بيضية جونية . الراسيات
اطول كثيراً من الأوراق مسترسلة . الأزهار صغيرة ٢-٥ في كل دلوام . الفترة متضمنة في الكاس
بيضية بلا منقار - الصيف - من عيتاب الى حلب وانطاكية

٢. *P. bituminosa*, L. . البسوراليا الزرقية (العوينة . العوارينة) ملازم الغناء .
السوق متصبة . الأوراق نثلية وورقاتها كاملة والسفلى منها بيضية مستديرة والعلوية رحيمة وورحيمة مستطيلة
وخطية . الرؤوس ذات فلوس ثلثية المخرق مخزيتها . الفترة بيضية منتبهة بمنقار طويل منبثق من الكاس
- الربيع والصيف - اماكن مقفرة في سورية وفلسطين

٢٦ الاندكوفرا (نبات النيل) INDIGOFERA L.

الكاس قصيرة مخرفة ذات ٥ اسنان . العلم كال . الزورق ذات حذبة او مهاز على كل من
جانبيه . حامل الاثنيات متباعدة او حمة . المبيض ذو بويضة او اكثر . القلم خطي والسمة راسية -
اعشاب او القمح مجهزة غالباً بشعر مندغم بمتصفوا وورقاتها ريشية ورأساتها ابطية
١. *I. ornithopodoides*, Hochst. . الاندكوفرا الشبيهة بالارنثوپيس ٥ مُسَرَّقٌ -
مستشيب . السوق نخيلة منشرة . الورقات زوج او ٢ بيضية - مقلوبة ومستطيلة كالة . الزناد قصيرة .
الراسيات قصيرة جداً . الفترة مُسَرَّقَةٌ ذات ٥ بزور الى ١٠ مغضنة غرضوناً مستعرضة - الصيف - مزارع
ارض الصعيد

٢. *I. Arabica*, Jaub. et Sp. . الاندكوفرا العربية ٥ مُسَرَّقٌ - حريري . السوق
منشرة . الورقات زوجان الى ٢ بيضية - مقلوبة - مستطيلة حموية . الزناد قصيرة . الراسيات قصيرة .
الفترة ذات بزورتين الى ٥ والمصرعان محيزمان - الصيف - بادية التيه

٣. *I. paucifolia*, Del. . الاندكوفرا القليلة الاوراق ٥ ملازم الغناء رمادية . السوق
متصبة متفرعة . الورقات زوج الى ٢ مستطيلة منعقفة القبة قليلاً حموية وغالباً مترادفة . الراسيات
اطول كثيراً من الاوراق . الفترة معقدة ذات ٦ بزور الى ٨ - الصيف - ارض الصعيد

٤. *I. argentea*, L. . الاندكوفرا الفضية ٥ ملازم الشيب منتصب . الورقات زوجان
او ٢ بيضية - مقلوبة كالة . الراسيات مسترسلة اقصر من الاوراق . الفترة قلادية ٢٠٠٧ متر طولاً ذات
٢ بزور او ٤ - الصيف - وادي النيل جنوبي القاهرة . شاطئ البحر الاحمر . يُزَرَعُ في القطر المصري

٢٧ الكليكا GALEGA, L.

الكاس جرسية ذات ٥ اسنان . جميع الاسدية متحدة في انبوبة مغلقة والاثنيات سرحاء . المبيض

جالس كثير البويضات . القلم خيطي والسمة راسية . القرنة خطية اسطوانية ذات اعصاب متوازية طويلة — اعشاب معبرة ذات اوراق ريشية مفردة وراسيات ابضية وانتهائية

G. officinalis, L. الكليكا المخزنية 24 املس . الساق عالٍ متعرج . الوريقات ٥

ازواج الى ٧ مستطيلة - رجمية او كالة او مفروضة حموية . الذنبات نصف سهمية . الراسيات اطول من الازواق . القرون متصبغة مخضنة بين البنور - الصيف -

albiflora, Boiss. ب . البيضاء الزهر . الازهار بيضاء - مزارع الشركة الفرنسية في شتورة .

والارجح انه قد دخل هناك صدفة

٢٨ التفروسيا *TEPHROSIA*, Pers.



شكل ١٢٣

الكاس جرسية غير متساوية الاسنان . العلم متسع حريري والزورق كال . الاسدية متحدة في الاول ثم ينفصل الخويط العلوي الى قاعدتين . المبيض ذو بويضات متعددة . السمة انتهائية . القرنة خطية مغلطحة - اعشاب وانجم اوراقها ريشية - مفردة وراسياتها مقابلة الازواق وانتهائية

T. Apollinea, Del. التفروسيا الابولينية ٣ ملازم

ازهار التفروسيا الابولينية

شكل ١٢٤



الشيب . الفروع متعرجة . الوريقات زوجان الى ٥ بيضية - مستطيلة مخرومة . الراسيات مقابلة الازواق اطول منها مسترسلة قليلة الازهار . التويج ارجواني مزرقي . القرنة خطية مغلطحة ملازمة العناق - الربيع - بادية سينا . ارض الصعيد

٢٩ القسنور *COLUTEA*, L.

الكاس جرسية ذات ٥ اسنان وسنّاها العلويان اطول من الثلاثة السفلى . العلم مستدير تقريباً ذو ثنية او حدة على وجهه الانسي اعلى مخبئ . الجناحان مغلطان - مستطيلان . الزورق مغني كال . الاسدية ذات خوتين . المبيض ذو ٣ بويضات واكثر . القلم ملغج طولاً من الانسية شصي القمة وسمة بيضية موضوعة بين الشعر الذي في ثنيته .

قرنة التفروسيا الابولينية

القرنة غشائية متفتحة غير منشقة ذات سويقة . القلم ازهارها صفراء

C. arborescens, L. ١. القصور المستشجر. الورقات ٤ أزواج الى ٦ اهليلجية - بيضية - مقبوبة مستتلة من الاعلى عناقية باهتة من الاسفل. الراسيات اقصر من الاوراق ذات ٢ ازهار الى ٦. حديق العلم قصيرتان متوازيتان تقريباً. الجناحان مقلخان مثل الزورق الكال طولاً - من نيسان الى حزيران - من جبل اللكام الى لبنان. نادر

C. Haleppica, Lam. ٣. القصور الحلبي. الورقات ٤ أزواج الى ٦ متباعدة وغالباً مترادفة صغيرة اهليلجية. حديق العلم متحدتان على هيئة U. الجناحان ملتفتان معاً اطول من الزورق المجنوم القبة - الربيع - اماكن محجرة في بادية سينا. مزروع في دار دبر النخيل

٣٠ السيسبان *SESBANIA*, Pers.

الكاس جرسية متسعة مجذومة غير متساوية الاسنان. العلم يضي - مستدير منفرش. الزورق مخن - طويل المخالب. الاسدية ذات خوتين. المبيض كثير البويضات والسمة راسية ملساء. القرنة خطية - اسطوانية محجوزة بين البنور - انجم اوراقها ريشية - شغعية كثيرة الأزواج راسياتها ابضية

S. Aegyptiaca, Pers. ١. الميسبان المصري. الفروع عسلجية. الورقات ٩ أزواج الى ١٠ مستطيلة - خطية كالة. الأزهار صفراء. القرون معتدة - الصيف والشتاء - بر مصر. وربما ليس وطنياً هناك

٣١ السوس *GLYCERHIZA*, L.

الكاس شقوية والسنان العلويان متحدان اكثر من الاسنان السفلى. العلم ضيق. الجناحان حادان. انزورق حاد. الاسدية ذات خوتين. المبيض كثير البويضات. القلم املس وقته مخنفة. السمة انتهائية راسية. القرنة مخنفاية خطية مقلخة او قلاوية او بيضية متفتحة - اعشاب معبرة غالباً غدية ذات جذر حلو واوراق ريشية - شغعية وازهار زرقاء او بنفجية مرتبة في راسيات او رؤوسات ابضية

G. glabra, L. ١. السوس الاملس. الورقات ٤ أزواج الى ٧ مستطيلة او اهليلجية - رمية كالة او حادة. الراسيات مسترسلة. القرون خطية مقلخة - الصيف -

G. typica, Reg. et Herd. ١. الرمزي. مستملس. الورقات دبقية من الاسفل. القرنة ملساء

- شالي سورية قرب مرعش

violacea, Boiss. ب. البنفسجي. مستملس. الورقات اهليلجية او عدسية. القرنة ثولوية -

مستتلة ذات ٤ بزور الى ٧ - ماردن

glandulifera, Reg. et Herd. ت. الغدي . زغبي أو غدي حرش . القرنة حسيكية -

غدية كثيرة البنور أو قصيرة ذات برزتين أو ٢ - أماكن مقفرة في سورية ولا سيما في جبال اللاذقية والمجل الشرقي . ساحل بيروت

G. echinata, L. ٢ . السوس القَدَّادي 2٤ مستطلس . الورقات ٥ أزواج الى ٦

مستطيلة أو اهليلجية حموية . السنابل مندمجة رأسية قصيرة الزناد . القرون بيضية - مقلوبة - مستطيلة توتوبة ذات برزتين - الصيف - ثنائي سورية وساحلها البحري

٢٢. السوسي^٢ GLYCYRRHIZOPSIS, Boiss, et Bal.

الكاس كما في المتقدم ذكره . الجناحان والزروق كالة اقصر من العلم المستطلي . الاسدية ذات خوتين . المبيض ذو بويضتين . القلم املس مغني القمة . السمة رأسية . القرنة مستطيلة مقلوبة قليلاً مستوية - عشب معبر ازهاره صفراء ومصاريع قروته مبرومة بعد انشقاقها

G. flavescens, Boiss. السوسي المستصفر 2٤ زغبي ثم مستطلس . الساق متعرج حشفي

القاعدة . الورقات ٤ أزواج الى ٧ اسنوية - بيضية واهليلجية حموية ذات رُجِيَّلات . الذنبيات غشائية رحيمة . الراسيات مندمجة أطول قليلاً من الأوراق ذات زناد . القرون مستطيلة - معينية منحرفة المحبة - الربيع - جبل اللكام والاقرق

٢٣. الاستراغالس (اصابع العروس . القَدَّاد) ASTRAGALUS L.

الكاس جرسية أو بلبلية أو انبوبية غير متغيرة بعد الازهار أو مزققة أو متفتحة واسنانها ٥ متساوية كلياً أو تقريباً . الزروق كال وناذراً حاد وابتداً غير مدبب أو نابي . مخالب الجناحين والزروق سائبة كلياً أو تقريباً أو متحدة كثر أو قل مع القند السدوي . القلم والسمة غالباً بلا لحة وإحياناً ذات لحة . القرنة ذات مصراعين والدرز الظهري غالباً مثنى الى الداخل بحيث قد يفصل القرنة كثر أو قل الى غريفتين طويلتين وقد يثنى الدرز الوجهي أيضاً الى الداخل بحيث يتقارب الى الدرز الظهري - اعشاب سنوية أو معمرة أو عجيئات أو تنجم أوراقها ريشية مفردة أو شفعية

السلسلة الأولى الاحادية الإثمار سنوية كانت أم محولة

السلسلة الأولى . ذات شعر متشعب أو مندغم اعلى قاعدتي والحجز السفلي كال

A. prolixus | Arabicus ٢ epiglottis ٢

السلسلة الثانية . الشعر بسيط ناشي لا من قاعدتي

١. الذنيبان غير متعدتين

١. الازهار مرتبة رؤوساً

* مصراعاً القرنة غير محيزمين

A. tribuloides ٤ pseudostella ٥ cruciatus ٦ radiatus ٧ triradiatus ٨ Schimperii ٩

* * مصراعاً القرنة محيزمان

A. oxyglottis ١٠

ب. الازهار راسمية

A. falcinellus ١١ eremophilus ١٢ corrugatus ١٣ tennirugis ١٤ Damascenus ١٥

Mareoticus ١٦ trimestris ١٧ Gyzensis ١٨ commixtus ١٩ hispidulus ٢٠

callichrous ٢١ annularis ٢٢ Bæticus ٢٣ anlacolobus ٢٤ conduplicatus ٢٥

٢. الذنيبات ولا سباً السفلى منها متحدة

A. hamosus ٢٦ brachyceras ٢٧ Dorcocras ٢٨ tuberculosus ٢٩ bombycinus ٣٠

Berytheus ٣١ peregrinus ٣٢

السلسلة الثانية المعبرة

النسم الاول . الشعر بعيط ناشي * من قاعدته

* الكاس غير منتفخة في الاثمار او قليلة الانتفاخ من الاسفل

+ اعشاب رجلايتها بلا حسك ازهارها جالسة تقريباً وغالباً مرتبة رؤوساً

‡ اعشاب بلا سوق زنادها جريدية ووريفاتها لبادية متراكبة او متباعدة

§ الوريفات ٦ ازواج الى ١٠ متراكبة في الاول ثم متباعدة

A. hirsutissimus ٣٣ lanatus ٣٤

§ § الوريفات ١٥ زوجاً الى ٤٠

A. chrysophyllus ٣٥ macroscepus ٣٦ Cedreti ٣٧ emarginatus ٣٨ cretaceus ٣٩

‡ ‡ اعشاب ذات سوق ووريفاتها غير متراكبة وتوبجها ساقط او مستمر

A. vexillaris ٤٠ nanus ٤١

‡ ‡ ‡ بلا سوق تقريباً او ذات سوق منخفضة توبجها مستمر . الكاس قليلة الانتفاخ

A. Antilibani ٤٢ Tauricolus ٤٣ Fresenii ٤٤

+ ‡ اعشاب رجلايتها بلا حسك او حسيكية ازهارها ذات زنيبات ومرتبة في راسيات على الغالب

‡ الذنبيات مستقلة او مقاربة من الاستقلال

A. Lusitanicus ٤٥ stramineus ٤٦ macrocarpus ٤٧ Aleppicus ٤٨

diphtherolobus ٤٩ neurocarpus ٥٠

‡ ‡ الذنبيات متحدة بالرجلة

§ القرنة قرطاسية او مخفياية . اعشاب بلا سوق تقريباً

A. platyrhaphis ٥١ Alexandrinus ٥٢ Amanus ٥٣ nummularius ٥٤

pinetorum ٥٥ brachystachys ٥٦

§ § القرنة لحمية او خشبية

A. sparsus ٥٧ acinaciferus ٥٨ Sieberi ٥٩ tomentosus ٦٠ trigonus ٦١

+++ النجم دلالية ازهارها جالسة وكاسها حسكية كثر او قل . الپتلات مستمرة

! الپتلات متحدة الى قرب اعلى الانبوبة السدوية

A. gummifer ٦٢

++ الپتلات مستقلة من الانبوبة السدوية

A. Rousseanus ٦٣

+++ الپتلات ملتصقة بقاعدة الانبوبة السدوية فقط

A. echinus ٦٤ argyrothamnus ٦٥

+++ الپتلات الداخلية ملتصقة بواسطة محالبها الى اعلى الانبوبة السدوية

§ الفلوس كبيرة ساقطة . الفليسات مفقودة . الشوك قصير على الغالب

A. psilodontius ٦٦ ambiguus ٦٧ psilameos ٦٨ Zachlensis ٦٩ cruentiflorus ٧٠

stromatodes ٧١ Kurdicus ٧٢ Bethlemiticus ٧٣ lepidanthus ٧٤

argyrophyllus ٧٥

§ § الفلوس كبيرة ساقطة . الفليسات ٢ او ساقطة او ملتصقة بانبوبة الكاس . الشوك متوسط

A. andrachnefolius ٧٦ Andrachne ٧٧ hilaris ٧٨ Aintabicus ٧٩ Seytunensis ٨٠

Drusorum ٨١

§ § § الفلوس ضيقة مستمرة ملتصقة بالكاس والفقار . الفليسات مفقودة . الشوك طويل

A. Hasbeyanus ٨٢ deinacanthus ٨٣ dipodurus ٨٤ oxyphyllus ٨٥ Gaillardoti ٨٦

* * الكاس منتفخة في الإثمار واحياناً في الأزهار . اعشاب بلا شوك او انجم مشبكة

+ الأوراق ريشية شفعية . الرجلات مستشبكة . القرنة ذات غرينة واحدة

* انجم شوكة بعض اوراقها مسنبر شوكة الرجلية والبعض الآخر غرض ساقط حبيكي الرجلية

A. Forskahlei ٨٧ Russelii ٨٨

† † نجيلات بلاسوق تقريباً ذات زناد جريدية وأوراق متشابهة

A. coluteoides ٨٩

† † الأوراق ريشية مفردة . الرجلات غير مستشبكة . القرنة ذات غرينتين

A. ocephalus ٩٠ pectinatus ٩١ macrocephalus ٩٢ Echinops ٩٣ Kahiricus ٩٤

النسم الثاني . الشعر منشعب ناثي من منتصفه

* اعشاب احياناً خشبية القاعة

A. Kotschyannus ٩٥ trifoliolatus ٩٦ schizopterus ٩٧ ancistrocarpus ٩٨

angulosus ٩٩ dictiocarpus ١٠٠

** * انجم رجيلاتها غير مستشبكة

A. gladiatus ١٠١ sanctus ١٠٢ Amalecitanus ١٠٣

** * * انجم رجيلاتها مستشبكة

A. angustifolius ١٠٤ Hermoneus ١٠٥

A. prolixus, Sieb. ١ . الاستراغلوس المجدد رمادي . السوق نجيلة منتفضة . الوريقات

٥ أزواج الى ٦ صغيرة قصبة الشعر من الاعلى بيضية - مقلوبة - مستطيلة . الراسيات ابضية وزنادها اقصر من الأوراق . شعر الكاس ابيض واسنانها اقصر من انبوبتها ومن العلم . القرون منفرجة قليلاً عفاثة مستطيلة قليلة الانتفاخ - الربيع - بادية ارض الصعيد

A. Arabicus, Ehr. ٢ . الاستراغلوس العربي رمادي ملازم العناء . السوق نجيلة منتفضة .

الوريقات ٧ أزواج الى ٨ صغيرة بيضية - مقلوبة مشعرة على الوجهين . الراسيات قصيرة وزنادها اقصر من الأوراق . شعر الكاس ابيض واسنانها اطول من انبوبتها مثل التوجج طولاً . القرون منفرجة عفاثة مستطيلة قليلة الانتفاخ - الربيع - بادية التيه

A. epiglottis, L. ٣ . الاستراغلوس لسان الزمار ملازم الشيب . السوق قصيرة

بيضة والجانبية منها مستطيلة - متصاعدة . الوريقات ٤ أزواج الى ٨ خطية - مستطيلة مرسة . الرووس بيضية قصيرة الزناد ذات ٦ ازهار الى ١٠ . الكاس جرسية واسنانها مخززية مثل انبوبتها طولاً . القرون متعقبة ملازمة العناء . ثالثة قليلة ذات ٣ زوراو ٤ - الربيع - ساحل سورية البحري

٤. *A. tribuloides*, Del. الاستراغلس الشبيه بالتريبولس (الرخيبي . القداد)

⊙ ملازم الحرير . العنق كثير الفروع المستقيمة على الأرض في الغالب . الورقات اهليجية ٦ أزواج الى شكل ١٢٥



١٠ . الرؤوس ذات ٢ ازهار الى ٦
جالسة كلياً او تقريباً . الكأس انبوية
واسنانها مخرزية متجالة . القرون كوكبية
النظام مستطيلة - رحيمة ٢٠٠٧ متر
الى ٢٠١ طولاً ملازمة العنقا وقاعدتها
مخرومة ذات حذبتين - الربيع -

بادية سورية واليه وسينا

حزمة قرون الاستراغلس الشبه بالتريبولس وورقة منه

minutus, Boiss. ب . القبي . الأزهار صغيرة . القرون ٢٠٠٥ طولاً - بادية القبة وسينا

leiocarpus Boiss. ت . الاملس الثمر . السوق قصيرة جداً مطبورة في الرمل متبسة .

القرون لمساء مستعرضة الورد - بادية القبة على حدود فلسطين

٥. *A. pseudostella*, Boiss. الاستراغلس الكوكب الكاذب ⊙ ملازم الشعر سنجاية .

السوق قصيرة منشرة . الورقات اهليجية ٨ أزواج الى ١٠ . الرؤوس جالسة ذات ٥ ازهار الى ٦ .

الكأس جرسية انبوية واسنانها كانبوبتها طولاً . القرون كوكبية مستطيلة - مثانة حادة ٢٠١ متر طولاً

او اكثر منفرجة الشعر - الربيع - بادية سيناء ومصر

٦. *A. cruciatus*, Link. الاستراغلس المتصالب (خزام القط) ⊙ ملازم الشعر

شكل ١٢٧

شكل ١٢٦



رمادية . السوق مستقيمة او متعاعدة . الورقات

اهليجية ٦ أزواج الى ١٠ . الرؤوس ذات ٢ ازهار

الى ٦ فنادها اطول من القرون واحياناً من

الاوراق . اسنان الكأس مثل انبوبتها طولاً . العلم

٢ اضعاف الكأس طولاً (٢٠٠٧ متر) . القرون

كوكبية خطية - رحيمة منحية ملزمة الشعر وقاعدتها

ذات حذبتين - الربيع - اماكن جافة من شمالي

سورية الى الوادي الابيض في بادية القبة

٧. *A. radiatus*, Ehr. الاستراغلس

شكل ١٢٦ . قرون الاستراغلس المتصالب قل نصعها

شكل ١٢٧ . قرون الاستراغلس المتصالب بعد نصعها

المتشعب ⊙ ملازم التيب . السوق منهضة بحيلة . البر . امت اهليجة ٦ أزواج الى ١ . الزناد اقصر من

الأوراق ذات ٥ أزهار إلى ٩. أسنان الكاس أقصر من أنبوبتها. العلم ضعف الكاس طولاً تقريباً (٢٠٠ متر). القرون كوكبية قصيرة عريضة القاعدة محدبتها ملازمة الشعر - الربيع - من حدود فلسطين الجنوبية إلى الاسكندرية

٨. A. triradiatus, Big. الاستراغلس الثلاثي الأشعة Ⓞ ملازم الشعر أو منفرج.

السوق مستقيمة أو متصاعدة. الورقات اهليلجية ٥ أزواج إلى ٧. الزناد منفرجة الشعر سوداوة مثل القرون طولاً أو أطول منها. الرؤوس ذات ٢ أزهار إلى ٦. الكاس جرسية وأسنانها مثل أنبوبتها طولاً تقريباً. العلم ضعف الكاس طولاً. القرون كوكبية ٢٠١٥ متر طولاً رحيمة - مثلبة محدبة مجهزة بشعر منفرج منعطف درفي المنشأ - الربيع - أماكن عشية بنرب حلب وشرقها

٩. A. Schimper, Boiss. استراغلس شمبر (الكريدموم الأسود) Ⓞ ملازم

الليبد. السوق مستقيمة. الورقات مستطيلة - اهليلجية كالة ٤ أزواج إلى ٦. الزناد مثل القرون أو الأوراق طولاً ذات زهرتين إلى ٥. أسنان الكاس مثل أنبوبتها طولاً هلبية. العلم مستدق ضعف الكاس طولاً. القرون ٢٠١٢ متر إلى ٢٠١٤ طولاً منفرجة لحوية خطية - مستطيلة - اسطوانية مستدقة القمة فجأة - الربيع - بادية سبنا

١٠. A. oxyglottis, Stev. الاستراغلس الحاد اللسان Ⓞ ملازم الرغبة قصيرة. السوق

متشعبة. الورقات ٥ أزواج إلى ٨ اسفينية مجذومة أو مخرومة. الزناد أقصر من الورقة. الرؤوس ذات ٤ أزهار إلى ٧. الكاس جرسية وخرقها مثلبة ثلث أنبوبتها طولاً. القرون كوكبية ملساء أو ملازمة الشيب رحيمة حادة مسنعة الأوردة ذات ٩ برور إلى ١٢ والمصاريع موروثة الحيازيم - الربيع - الجبل الأبيض بين حماه وتدمر

١١. A. falcinellus, Boiss. الاستراغلس السنجيلي Ⓞ ملازم الشيب ٢٣ متر علواً.

السوق متصببة منفرفة. الورقات ٧ أزواج إلى ٨ مستطيلة كالة. أسنان الكاس خطية مثل أنبوبتها طولاً. الأوراق أطول كثيراً من الجناحين. القرون متصببة منجلية ملازمة الشعر مخنثة مخنثة الدرز الوجبي ذات ١٨ بررة إلى ٢٠ - الربيع - المزارع بين القاهرة والأهرام

١٢. A. eremophilus, Boiss. الاستراغلس المحب القفر Ⓞ منفرج الصوف سنجاية.

السوق مطولة مستقيمة. الورقات ٤ أزواج إلى ٦ بيضية - مقلوبة مخرومة. الراسيات مسترسلة ذات زهرتين إلى ٤ وزنادها أقصر من الورقة. أسنان الكاس مثل أنبوبتها طولاً. القرون منفرجة مخنثة حادة هشة نصف دائرة منفرجة الوبر مخنثة الدرز الوجبي - الربيع - بادية سبنا ومصر

١٢. *A. corrugatus*, Bertol. الاستراغلوس المجمع © ملازم الغناء قليلة. السوق مستقيمة. الورقات ٥ أزواج إلى ٨ خطية - اسينية مخرومة. الزناد مثل الورقة طولاً وأطول منها. الراسيات ذات زهرة إلى ٤. أسنان الكأس نصف انبويها طولاً. القرون منتصبه مخنية على هيئة نصف دائرة منتبهة بشصٍ وجميع سطحها مستعرض الغضون وبرورها ١٨ إلى ٢٠ - الربيع - بادية التيه وسينا ومصر وشرقها

brevipes, Post. ب. القصير الزند. الزناد نصف الأوراق طولاً - وادي فيران. ١٤. *A. tenuirugis*, Boiss. الاستراغلوس التحيل الغضون © ملازم الغناء قليلة. السوق مستقيمة. الورقات ٦ أزواج إلى ٧ مستطيلة - اسينية مخرومة. الراسيات ذات زهرة إلى ٥ وزنادها مثل الورقة طولاً وأطول منها. أسنان الكأس ثلث انبويها طولاً. القرون منتصبه مخنية غير بارزة الغضون مشتبهها مفالطة الدرز الوجبي منتبهة بحمة قصيرة مخنية وذات ٢٠ بررة إلى ٢٢ - الربيع - بادية التيه وسينا - قريبة إلى المقدم ذكره

١٥. *A. Damascenus*, Boiss. et Gaill. الاستراغلوس الدمشقي © ملازم الغناء قليلة. الساق منتصب. الورقات ٦ أزواج إلى ٧ مستطيلة أو خطية مخرومة. الذنبيات بيضيه مخرفة. الراسيات ذات ٢ أزهار إلى ٦ وزنادها أقصر من الورقة. أسنان الكأس رحيمة أقل من نصف انبويها طولاً. القرنة صاعدة ٤. متر طولاً مستقيمة تقريباً ملازمة الشعر بسيطة وقليلة منتبهة بحمة شصية ودرزها الوجبي كال - الربيع - من حلب إلى دمشق

١٦. *A. Mareoticus*, Del. الاستراغلوس المريوطي © منفرج الغناء. السوق مستقيمة. الورقات صغيرة متقاربة ٦ أزواج إلى ٨ بيضية - مثقوبة - اسينية مخرومة. الراسيات قصيرة الزناد ذات ٢ أزهار أو ٤. خرق الكأس رحيمة مثل انبويها طولاً. القرون صاعدة ٢.٥ متر طولاً مخنية على هيئة دائرة وقصيرة الحمة قليلة الشعر ملازمة بسيطة. حافتا الثلم الظهري كالتان - الربيع - بادية مصر من الاسكندرية إلى القاهرة

١٧. *A. trimestris*, L. الاستراغلوس ذو الثلاثة أشهر © منفرج الغناء. السوق منشرة. الذنبيات صغيرة عريضة القاعدة مخزبة. الورقات صغيرة متقاربة ٨ أزواج إلى ١٠ اهليلجية مخرومة. الراسيات ذات زهرتين إلى ٥ وزنادها مثل الأوراق طولاً. أسنان الكأس نصف انبويها طولاً تقريباً. القرون ٤. متر مخنية على هيئة نصف دائرة وهي حادة قصيرة الحمة ملازمة الشعر بسيطة وقليلة. حافتا الثلم الظهري محيزمتان - الربيع - اماكن رملية في بحرية مصر

١٨. *A. Gyzensis*, Del. الاستراغلوس الجيزي © كثيف الشعر رمادية ملازمة. السوق

شكل ١٢٨



قرون الاستراغلس المجزي

مستلقة. الوريقات زوج اوزوجان متباعدة مستطيلة او اهليجية مخرومة والانتهائية منها غالباً اكبر. الراسيات مسترسلة ذات ٢ ازهار الى ٥ زنادها اقصر من الاوراق. اسنان الكاس رمجية نصف انبوبتها طولاً تقريباً. القرون ٢.٠٢٥ متر طولاً مخنية على هيئة نصف دائرة منتبهة بمجمة مخنية وشعرها نوعان بعضه ملازم قصير والبعض اطول درني القاعدة - الربيع - بادية النيه وسينا ومصر

١٩. *A. commixtus*, Bige. الاستراغلس المجزج

٥. مستشيب عادم الساق تقريباً. الوريقات ٤ ازواج الى ٧ مستطيلة - اهليجية كالة. الراسيات ذات زهرتين الى ٥ زنادها

جريدة اطول كثيراً من الاوراق. اسنان الكاس اكثر قليلاً من نصف انبوبتها طولاً. صفحة العلم منتبهة فحاة بمعلقة خطية كالة. الثرون صاعدة مخنية اسطوانية شصية القبة مشتبكة الورد ملازمة الشعر مزدوجة ٢.٠٢ متر طولاً - الربيع - قلدون شمالي دمشق

٢٠. *A. hispidulus*, D. C. الاستراغلس القصير اللحية ٥ منفرج اللحية. السوق

منشرة. الوريقات ٦ ازواج او اهليجية - مستطيلة كالة. الراسيات ذات ٢ ازهار الى ٤ زنادها اطول قليلاً من الاوراق. خرق الكاس مخززية ثلث انبوبتها طولاً. صفحة العلم مستدقة. القرون صاعدة اسطوانية منفلطحة قليلاً نخيلة ٢.٠٢ متر طولاً مخنية على هيئة نصف دائرة مستوية ملازمة الهليب مزدوجة ذات ٢٠ برة الى ٤٠ - الربيع - من شمالي بادية النيه الى بادية بحرية مصر

٢١. *A. callicirous*, Boiss. الاستراغلس الظريف الوجه ٥ منفرج الشعر. السوق

منشرة. الوريقات ٧ ازواج الى اهليجية - خطية او خطية - شعرية كالة. الراسيات مندجبة ذات ٥ ازهار بنفسيه الى ١٠ زنادها مثل الورقة طولاً واطول منها. خرق الكاس خطية هلية نصف انبوبتها طولاً. صفحة العلم مستطيلة مستدقة. الثرنه صاعدة اسطوانية منفلطحة قليلاً نخيلة ٢.٠٤ متر طولاً مخنية على هيئة نصف دائرة ملازمة الشعر مزدوجة ذات ٢٠ برة الى ٤٠ - الربيع - ساحل غزة. بين القدس واربما

٢٢. *A. annularis*, Fensk. الاستراغلس الحلقي ٥ منفرج الغناء. السوق مستلقة.

الوريقات زوج الى ٢ بيضة - منقوبة كالة. الراسيات ذات زهرتين الى ٤ زنادها مثل الاوراق طولاً. خرق الكاس اقصر من انبوبتها. القرون منفرجة مخنية على هيئة حلقة او نصف دائرة ضخمة شصية الحمة ذات هليات ساقطة اخيراً ولطحات حمراء غير منتظمة - الربيع - من جنوبي فلسطين الى بادية القاهرة والاسكندرية

٢٢. *A. Baeticus*, L. الاسترغالس البيثكي ○ متفرق العفاء مخضر. الساق منتصب مستعمل. الورقات ٦ أزواج الى ١٥ مستطيلة او خطية مخرومة. الزند اقصر من الورقة. الراسيم مندمج ذوات ازهار الى ١٥. اسنان الكاس مخززية مثل انبوبتها طولاً. القرون منتصبه متبسة ٢.٢ متر طولاً و ٥.٠ متر غلظاً قصيرة الشعر ملازمة منتبها بحمة خضبة - الربيع - من ساحل سورية البحري الى الاسكندرية

٢٤. *A. antecolobus*, Poiss. الاسترغالس الثلي القرنه ○ املس. السوق متضاعفة. ٣ متر علواً. الورقات ٦ أزواج الى ٧ مستطيلة - اسفينية مخرومة. الراسيات ذات ٣ ازهار الى ٤ مسترسلة وزندها مثل الورقة طولاً. خرق الكاس اطول قليلاً من انبوبتها ذات شعرايض واسود. الزورق بنفسي القيمة. القرون منعقة مخفية كنصف دائرة قليلة الانضغاط مدبة ٢.٠٢ متر طولاً وغالباً ملتصقة بلطخات سبراء والدرز الوجي كال الثلم والظهري حاد الحيزمين - الربيع - عيتاب وجنوبها وشرقيها

٢٥. *A. conduplicatus*, Bertol. الاسترغالس المزدوج ○ مستمسل. السوق منتصب او منتهضة. الورقات ٦ أزواج او اقل من ذلك خطية - اسفينية مخرومة او قلبية - مقلوبة. الزناد مثل الاوراق طولاً واطول منها ذات زهرة الى ٤ مسترسلة. خرق الكاس رحيمة - مخززية اطول من انبوبتها ذات شعرايسود. التويج مبيض. القرنه منفرجة او منعقة مخفية قليلاً ١.٥ متر الى ٢.٢ طولاً ملتصقة بلطخات سبراء ودرزها الوجي مخيم قليلاً والظهري حاد الحيزومين - الربيع - الصغور من نواحي حلب الى دمشق

شكل ١٢٩



٢٦. *A. hamosus*, L. الاسرغالس الشحي (القرن) قرتان من الاسترغالس المزدوج ○ ملازم الزغب. السوق منتصب او منتشرة. الورقات ٨ أزواج الى ١٢ بيضية - مقلوبة او مستطيلة مخرومة. الزناد اقصر من الاوراق. اسنان الكاس مخززية اطول قليلاً من انبوبتها. العلم طويل. القرون منعقة اسطوانية مخفية على هيئة صنارة السبك ٤.٤ متر طولاً ذات ٢٠ برة الى ٣٠ - الربيع - جوانب الطرق واماكن عشية. كثير الوجود

٢٧. *A. brachyceras*, Ledeb. الاسترغالس القصير القرنه ○ ملازم الزغب. السوق قصيرة منتشرة او منتصب. الورقات ٨ أزواج الى ١٢ خطية - اسفينية مخرومة. الراسيات قصيرة جداً وزنادها غالباً اطول من الاوراق. خرق الكاس اقصر قليلاً من انبوبتها. القرون منفرجة اسطوانية مستدقة مخفية على هيئة نصف دائرة ذات ١٢ برة الى ١٧ - الربيع - اماكن عشية بقرب حلب

٢٨. *A. ...* الاسترغالس الغزالي القرنه ○ ملازم العفاء. السوق

متصاعدة او منشرة. الوربقات ٩ أزواج الى ١١ مستطيلة-اسفينية مخرومة. الراسيات ذات ٣ ازهار الى ٧ وزندها نصف الورقة طولاً. اسنان الكاس اطول من انبوتها. القرون طويلة صناعية حلقية تقريباً ذات ٢٨ بزة الى ٢٢ - الربيع - قرب حلب وشرقيها. وربما هذه الانواع الثلاثة تباينات نوع واحد
 ٢٩. *A. tuberculosus*, D. C. الاستراغلس الدرني ⊙ متفرق الشعر. السوق متعددة

شكل ١٣٠



مستطيلة مطولة. الوربقات ٨ أزواج الى ١٢ قلبية-مقلوبة اوبيضية - مقلوبة مخرومة او مستطيلة مخرومة. الذنبيات مثlette مدببة. الراسيات كثيرة الازهار وزندها اطول من الورقة. اسنان الكاس اقصر من انبوتها. الازهار ١٥. متر طولاً مضفرة. القرون رحمة-مستطيلة مخنجة ١٥. متر الى ٢٠. طولاً درنية مشبكة الغضون قليلة الشعر

الايض الاعلى الدرزين منتبهة بحمة شصية وسطحها الوجهي محرم قليلاً فرتنان من الاستراغلس الدرني والظهري عميق الفم - الربيع - اماكن عشبية من عنتاب الى جنوبي فلسطين وإلى الشرق

٣٠. *A. bombycinus*, Boiss. الاستراغلس القري (الدريس) ⊙ متفرق الصوف

مقابلة. السوق مستطيلة. الوربقات ٦ أزواج الى ٨ مستديرة - بيضية - مقلوبة مخرومة صغيرة متقاربة. الراسيات مسترسلة ذات زهرتين الى ٤ وزندها مثل الورقة طولاً واقصر منها. اسنان الكاس مثل انبوتها طولاً تقريباً. الازهار ١٠. متر طولاً صفراء. القرون مستطيلة - رحمة مخنجة ١٥. متر الى ٢٠. طولاً مستعرضة الغضون مشبكها كثيرة الشعر الايض على كل سطح القرنة مثlette الظهر محزمة الوجه منتبهة بحمة شصية - الربيع - بادية النيب وسينا ومصر

٣١. *A. Berytheus*, Boiss, et Bl. الاستراغلس البيروتي ⊙ متفرق العنفاء قصبة.

السوق مستطيلة مطولة. الوربقات ٧ أزواج الى ٨ صغيرة مستطيلة-اسفينية. الذنبيات مثlette مدببة. الراسيات ذات ٧ ازهار الى ٨ راسية وزندها مثل الورقة طولاً تقريباً. اسنان الكاس نصف انبوتها طولاً. القرون رحمة - مثlette مخنجة قليلاً ٢٠. متر الى ٢٠. طولاً ضيقة الفم الظهري محزمة الوجه درنية خشنة عفاثة - الربيع - الرمل حول يرموت

٣٢. *A. peregrinus*, Vahl. الاستراغلس المرتحل ⊙ ابيض الوير متفرقة. السوق

مستطيلة. الوربقات بيضية - مقلوبة - اسفينية مخرومة. الذنبيات مثlette حادة. الراسيات مسترسلة ذات زهرة الى ٥ وزندها اقصر من الورقة. اسنان الكاس اقصر قليلاً من انبوتها. القرون رحمة - خطية مخنجة قليلاً ٢٠. متر طولاً او اكثر مثlette الظهر محزمة الوجه درنية مشعرة - الربيع - من ساحل غزة الى الاسكندرية والقاهرة

٣٢. *A. hirsutissimus*, D. C. الاستراغلس الاكثر عفاً 2٢ قزم بلا ساق كثيف الحبر
الذي نبات رحيمة متحدة قليلاً. الاوراق رحيمة المحيط ووريقاتها الكبرى ١.٠ متر طولاً وكلها ٩ أزواج الى ١.٠ متفارة
مستطيلة. الجرائد مثل الاوراق طولاً تقريباً. الرؤوس مندحجة وبرية بيضية. الفلوس رحيمة مثل انبوبة
الكاس طولاً. اسنان الكاس نصف انبوتها طولاً. القرنة كثيفة اللحية بيضية - مستطيلة منتهية بمنفار
نصفها طولاً - آخر الصيف - قمة لبنان اعلى الارز

٣٤. *A. lanatus*, Labill. الاستراغلس الصوفي 2٤ قزم بلا ساق سبخاني الغناء ملازمة
وعلى الجرائد اسوده. الذي نبات رحيمة متحدة قليلاً. الاوراق خطية رحيمة. الوريقات 6 أزواج الى ٨ صغيرة
٢.٠ متر طولاً بيضية او اهليجية كاله او حادة. الجرائد اطول من الاوراق. الرؤوس بيضية. الفلوس
مستطيلة ثلث انبوبة الكاس طولاً. شعر الكاس ابيض واسود وخرقها ثلث انبوتها طولاً. القرنة
مستطيلة - مثلية منضغطة مستدقة الى منفار مستقيم قصير - آخر الصيف - قم لبنان اعلى الارز. قمة
صنين

٣٥. *A. chrysophyllus*, Boiss. الاستراغلس الذهبي الورق 2٤ بلا ساق نقرى
حزبي ملازم الحبر مصفر. الاوراق خطية ٢.٠ متر طولاً الى ٢.١. الجرائد اطول قليلاً من الاوراق.
الوريقات 2٨ زوجاً الى ٣٥ بيضية مخرومة. الرؤوس كروية. الفلوس خطية اطول من انبوبة الكاس.
اسنان الكاس نصف انبوتها طولاً. القرنة لحوية بيضية - مثلية منضغطة منتهية بمنفار مثلها طولاً -
الصيف - جبال عنتاب

٣٦. *A. macrocephus*, Boiss. الاستراغلس الكبير الجريدة 2٤ قصير الساق لبدي
مسهر. الاوراق ١٢ متر الى ١٦ طولاً ووريقاتها ٣٠ زوجاً الى ٤٠ بيضية - مستديرة مخرومة. الجرائد
ضخمة ١٢ متر الى ٢٠ طولاً. الرؤوس مندحجة جتاً بيضية. الفلوس خطية هلية مثل الكاس طولاً.
اسنان الكاس مثل انبوتها طولاً. التوج اطول قليلاً من الكاس. القرنة مثلية - بيضية مستدقة الى
منفار مثلها طولاً - الصيف - جبل صوفضاغ

٣٧. *A. Cedreti*, Boiss. الاستراغلس الارزي 2٤ بلا ساق قصير اللباد رمادي اللون.
الجذبات عارية. الاوراق خطية ووريقاتها ٢٠ زوجاً الى ٣٥ بيضية - مستطيلة مخرومة. الجرائد ٢.٠
متر الى ٣.٠ طولاً. الرؤوس بيضية مندحجة. الفلوس خطية - هلية مثل انبوبة الكاس طولاً. اسنان
الكاس ثلث انبوتها طولاً. التوج وردي - الصيف - جرود لبنان والجبل الشرقي

٣٨. *A. emarginatus*, Labill. الاستراغلس المفروض 2٤ قصير الساق ملازم اللباد
مصفر ومادبة. الاوراق خطية المحيط ووريقاتها ١٨ زوجاً الى ٣٥. الجرائد ضخمة ضعف الاوراق طولاً

تقريباً. الرووس بيضية- مستطيلة. الفلوس خطية- رحيمة. اسنان الكاس مثل انبوبتها طولاً تقريباً. القرنة حمرة لحيوية بيضية قصيرة المحمة ٢.٠٩ متر طولاً - الصيف - لبنان وجبل الشيخ

٢٩ *A. cretaceus*, Boiss. et Ky. . الاستراغلس الطباشيري 2٤ قصير الساق صوفي مصفر رمادي. الاوراق خطية ذات ١٨ زوجاً الى ٢٥ مستطيلة كالة . الجرائد مثل الاوراق طولاً او اطول منها قليلاً. الرووس بيضية- مستطيلة مندمجة. الفلوس خطية. اسنان الكاس ثلث انبوبتها طولاً. القرنة لحيوية مستطيلة منضغطة ٢.١٢ متر الى ٢.١٤ طولاً مستدقة تدريجياً الى مفار تجميل - الصيف - من حلب وتدمر الى الدهرية

٤٠ *A. vexillaris*, Boiss. . الاستراغلس العلي 2٤ ملازم الغناء قليلة مخضر. السوق متصاعدة او متشرة. الوريفات ١٥ زوجاً الى ٢٠ مستطيلة كالة . الزناد ضخمة مثل الاوراق طولاً تقريباً. الرووس بيضية مندمجة. الفلوس رحيمة- هلبية مثل انبوبة الكاس طولاً. اسنان الكاس مخززية نصف انبوبتها طولاً. القرنة جالسة تقريباً بيضاء البور نصف- بيضية منتهية بحمة مخنجة - الربيع - عيتاب وشرقيها

٤١ *A. nanus*, D. C. . الاستراغلس القزم 2٤ كثيف الغناء هلبية لماع. السوق قصيرة كثيفة الاوراق لحيوية. الاوراق ٢.٠٢ متر طولاً ووريفاتها ٦ ازواج او متقاربة. الزناد اقصر من الورقة والراس. الراس كروي. الفلوس رحيمة مهدبة- مشطية اطول من انبوبة الكاس. انبوبة الكاس قمعية واسنانها مخززية اطول من انبوبتها تعلق العلم قليلاً. القرنة اقصر قليلاً من الكاس مستطيلة ثلثية الزوايا مستدقة الى حمة قصيرة - الصيف - جبال شمالي سورية

٤٢ *A. Antilibani*, Bge. . استراغلس الجبل الشرقي 2٤ قصير الساق اخضر. الوريفات ١٢ زوجاً الى ١٤ مستطيلة كالة لمساء من الاعلى ملازمة الغناء قليلته من الاسفل. الجريدة اقصر من الورقة. الراسيات مستطيلة. الفلوس خطية مثل انبوبة الكاس طولاً. اسنان الكاس نصف انبوبتها طولاً. التويج ٢.١٥ متر طولاً. القرنة اطول قليلاً من الكاس نصف- بيضية وقمتها شصية - الصيف - جرد منشورة فوق بلودان

٤٣ *A. Tauricolus*, Boiss. . الاستراغلس الساكن الطورس 2٤ بلاساق تقريباً كثير الجذيعات ملازم الحريز. الوريفات ٩ ازواج الى ١٤ بيضية- مستطيلة وغالباً حادة. الجرائد ضعف الورقة طولاً او اكثر ذات شعر اسود من اعلاها. الراسيات بيضية- مستطيلة ثم اسطوانية. الفلوس خطية اقصر من انبوبة الكاس. اسنان الكاس ثلث انبوبتها او ربعها طولاً. التويج مصفر ٢.٢ متر طولاً تقريباً. العلم اطول كثيراً من الجناحين. وقمتها ارجوانية. القرنة اطول قليلاً من

الكاس ملازمة الورب يضاؤه نصف - بيضية ثلثية الزوايا منتهية بناب مخن - الصيف - دبر عطية وقلدون

٤٤. *A. Fresenii*, Decaisne. استراغلس فرسينيوس 24 حريري مستشيب بلاساق او ذوساق قصير. الجذيعات متعددة. الوريقات 12 زوجاً الى 15 بيضية - مقلوبة كالة. الزناد اطول من الاوراق مسودة الشعر عند قمتها. الرؤوس بيضية ثم اسطوانية. اللوس خطية اقصر كثيراً من الكاس. الكاس انبوية منتفخة قليلاً واسنانها ربيع انبويتها طولاً. التوج بنفجي - ارجواني ٢٠١٨ مترالى ٢٠٢ طولاً والعلم اطول من الجناحين. القرنة جالسة ويرية بيضاء منتهية بحبة قصيرة - الربيع - جبل موسى في بادية سينا

٤٥. *A. Lusitanicus*, Lam. الاستراغلس البرتغالي 24 ملازم الخمل. الساق متر علواً مغطى زاي. الوريقات الكبرى ٢٠٢ متر طولاً 7 ازواج الى 12 اهليجية - مستطيلة. الراسيات ابطية قصيرة الزناد. الازهار منفضة مائلة الى جانب. الفليسات مخزنية نصف انبوية العكاس طولاً. الكاس جرسية مفخرة مجذومة واسنانها اقصر من انبويتها. القرون ٢٠٦ متر طولاً و٢٠١٥ متر عرضاً منتفخة قصيرة اللباد حموية - الربيع - سكة الشام فوق خان كحالة

٤٦. *A. stramineus*, Boiss. et Ky. الاستراغلس القشي 24 مستشيب. السوق ٢٦ متر علواً ضخمة. الذنبات قشية مثلثة - رمحية مدبية. الوريقات ٢٠١٥ مترالى ٢٠١٨ طولاً 7 ازواج الى ٨ اهليجية - خطية كالة او مخرومة. الراسيات طويلة مسترسلة وزنادها قصيرة ضخمة متبسة. الكاس ملازمة الغشاء يضاؤه واسنانها ربيع انبويتها طولاً. القرون مدلاة ملساء قصيرة المويقات ٢٠٢ متر طولاً و٢٠٠٤ متر عرضاً مخفية خطية مثلثة الزوايا عريضة القلم - الربيع - البساتين قرب بلودان وزيدانة

٤٧. *A. macrocarpus*, D. C. الاستراغلس الكبير الثمر 24 ٢٣ مترالى ٢٥ علواً ملازم الغشاء الذنبات رمحية - مخزنية. الوريقات 12 زوجاً الى 1٥ وهي ٢٠١ مترالى ٢٠١٥ طولاً مستطيلة - اهليجية او بيضية مخرومة. الكاس طويلة اللحية يضاؤها وخرقها رمحية نصف انبويتها طولاً. القرنة ٢٠٢ متر طولاً ٢٠٢ غلظاً كالة صلبة غير منتظمة الفضون منتهية بمقار ٢٠٠٧ متر طولاً واكثر - الربيع - صردة. ساحل غزة

٤٨. *A. Aleppicus*, Boiss. الاستراغلس الحلبي 24 ٢٣ متر علواً واكثر. مستشيب قصير الشعر. الوريقات 1٥ زوجاً الى ٢٠ مستديرة او اهليجية ٢٠٢ متر طولاً الى ٢٠٠٦. الراسيات ابطية جالسة ذات زهرة الى ٤. الكاس بيضاء اللحية واسنانها رمحية مخزنية ثاث انبويتها طولاً. القرون منتفخة

٢٠٢ متر طولاً و ٢٠١٢ متر عرضاً منضغطة مضغطة قصيرة الحية متجهة بمقار ٢٠٠٧ متر طولاً الى ٢٠٠٨
- الربيع - من حلب الى تدرو دمشق والبقاع

A. diphtherolobus, Bge. ٤٩. الاستراغلس الصخنياني في القرنه 24 مثل المتقدم ذكره
علقاً . الذنبيات مخزنية مطولة . الوريقات ١٥ زوجاً الى ٣٠ . الكاس بيضاء الحية واسنانها مخزنية
اطول من انبوبتها . التويج ٢٠٢ متر طولاً . النرون ٢٠٢ متر طولاً تقريباً مستطيلة منتفخة الظهر محزنية
الوجه مستوية وبرية - لبادية متقارها ٢٠١ متر طولاً - الربيع - جبال شمالي سورية

وربما هذا النوع وسابقة تباينان من الاستراغلس الخريستاني (*A. Christianus*, L.)

A. neurocarpus, Boiss. ٥٠. الاستراغلس العصي الثمر 24 ٢٠٦ متر علقاً . الساق
مستطيل . الوريقات اقل من ١٦ زوجاً بيضية - مستطيلة مخرومة قليلة الغناء على وجهها السنلي .
الذنبيات متسعة القاعدة هليية . الراسيات ذات زهرتين او ٣ متقاربة . الكاس بيضاء الوري واسنانها مثلية
خمس انبوبتها اوريها طولاً . القرنه ٢٠١ متر طولاً و ٢٠٠٥ متر عرضاً نصف - بيضية منحنية قليلاً مضغطة
مشبكة ومتقارها ٢٠٠٣ متر طولاً - الربيع - من عينتاب الى حلب

A. platyraphis, Fisch. ٥١. الاستراغلس العريض الابرة 24 اخضر منفرج الغناء .
الذنبيات رحيمة مهدبة . الوريقات ٢٠٠٣ متر طولاً الى ٢٠٠٥ وهي ١٢ زوجاً الى ١٦ بيضية او اهليجية لمساء
من الاعلى . الراسيات ذات ٥ ازهار الى ٧ وحريدها غير معادلة الرجيلات طولاً . الكاس كثيفة الحية
واسنانها ربيع انبوبتها الى خمسها طولاً . القرنه ذات سوية وملساء وذات شعر قليل من الامام مخنيانية
مستطيلة مثلية الحيازيم ٢٠٢ متر طولاً عدا سويتها وحمتها و ٢٠٠٥ متر عرضاً - الربيع - من عينتاب
وحلب الى دير عطية والى الشرق

A. Alexandrinus, Boiss. ٥٢. الاستراغلس الاسكندري 24 منفرج الحية . الوريقات
١٢ زوجاً الى ١٥ بيضية - اهليجية كالة او مخرومة ٢٠٠٥ متر طولاً الى ٢٠١ . الكاس لحوية واسنانها
ثلث انبوبتها طولاً او نصفها . القرنه قصيرة السويقة طويلة الحية منفرقتها بيضية مثلية الزوايا تقريباً قصيرة
الحمة - الربيع - اماكن رملية من دمشق والبقاع الى الغور وبادية النيه ومصر - متقارب الى سابقه
وربما هو تباين منه

A. Amanus, Boiss. ٥٣. الاستراغلس اللكاهي 24 بلا ساق تقريباً مستطيل . الذنبيات
رحيمة مهدبة القمة . الوريقات معتدلة المحجم بيضية - مستديرة ٦ ازواج الى ١٢ مهدبة الحوافي والضلع
المتوسط وبقيتها لمساء وكلها ذات رجيلات . الراسيات ذات زهرة الى ٤ قصيرة الزناد . انبوبة الكاس
ملساء واسنانها مهدبة ونصف الانبوبة طولاً . القرنه بضمة كالة الزوايا لذلك كالة الطرف حموية لحوية

— الصيف — جرد جبل اللكام. ويرجح انه تبائن املس من النوع الآتي ذكره

parvifolius, Post. ب. الصغير الوريقات. الوريقات اهليجية مستديرة — قمة جبل صتين

A. nummularius, D. C. ٥٤. الاستراغلس النعدي 24 مترق الور ناعمة وحري

والجذيعات مطورة نجيلية. الذنيبات رحيمة وبرة. الوريقات نحو ٢٠٠٥ متر طولاً ٨ أزواج الى ١٢ اهليجية — مستديرة مخرومة او كالة لحوية على وجهيها. الأزهار جالسة تقريباً. الكاس وبرة واسنانها نصف انبوبتها طولاً. العلم غالباً زغبى يعلو الجناحين الاملسين. الفترة ٢٠٠٨ متر طولاً و ٢٠٠٥ عرضاً جالسة وبرة قصيرة الناب مخرفة محزومة الدرزين — الصيف —

macrophyllus, Post. ب. الكبير الورق. الوريقات متساعة واكبرها ٢٠٠٨ متر طولاً

و ٢٠٠٥ عرضاً — جرد حسرون

trichopterns, Post. ت. المشعر الجناح. الوريقات مستطيلة — اهليجية ابيضية — مقلوية

او مستديرة تقريباً طولها من ٢٠٠٢٥ متر الى ٢٠٠٥ وعرضها من ٢٠٠٢ الى ٢٠٠٣. العلم املس والجناحان لحويا الخوافي — جرد لبنان والجبل الشرقي (A. trichopterus, Boiss.)

A. pinetorum, Boiss. ٥٥. استراغلس غابب الصنوبر 24 بلا ساق منفرج اللحية.

الجذيعات تحت الارض نجيلية. الذنيبات مستطيلة. الوريقات ١٥ زوجاً الى ٢٠ اهليجية كالة. الراسيات متعددة ذات ٣ ازهار الى ٥ جالسة تقريباً. الكاس لحوية واسنانها رحيمة نصف انبوبتها طولاً. الفترة لحوية مستطيلة منضغطة مثلثة الزوايا ٢٠١٥ متر طولاً و ٢٠٠٥ عرضاً مستدقة الى حمة مخنية ودرزها الوحيي محيزم والظمري مثل قليلاً — الربيع — الجرد اعلى ارض لبنان واعلى بلودان

A. brachytachys, D. C. ٥٦. الاستراغلس القصير الراسم 24 الساق ٢٠٢ متر

الى ٢٠٤ طولاً قصير الخمل زغبى. الذنيبات رحيمة عنائية. الوريقات ٨ أزواج الى ١٢ بيضية كالة ٢٠١ متر طولاً. الراسيات بيضية ذات ٥ ازهار الى ٧ زندها اقصر من الورقة. خرق الكاس رحيمة ربع انبوبتها طولاً. الفترة زغبية بيضية منتخبة حادة ٢٠٢ متر طولاً ذات سوية اقصر من الكاس وحمة قصيرة — الربيع — اماكن جافة من عينتاب الى حلب وشرقيها

A. sparsus, Decaisn. ٥٧. الاستراغلس المتفرق 24 منفرج اللباد ايض. السوق

طويلة مستطيلة. الذنيبات عشبية مدبة. الوريقات ١٠ أزواج الى ١٥ متقاربة ٢٠١٥ متر طولاً بيضية — مستطيلة كالة مطوية. الراسيات جالسة تقريباً ذات ٤ ازهار الى ٥ الكاس وبرة واسنانها رحيمة اقصر قليلاً من انبوبتها. الثرون منفرجة كوكبية قشرية منفرجة اللحية رحيمة مخنية قليلاً مستدقة الى مقدار طولها مع مقارها ٢٠٢ متر الى ٢٠٤ وعرضها ٢٠٠٥ متر — الربيع — بادية التيه وسينا

A. acinaciferus, Boiss. ٥٨. الاستراغلس الحامل السيف ث بلاساق تقريباً مُسترق قليلاً ايض. الذنبات متراكمة مثلية قصيرة. الرجيلات بلاشوك. الورقات ٢٠ زوجاً او اقل ٢٠٠٣. مترطولا بيضية مخرومة مطوية. الازهار ١ او ٢ ابضية قصيرة الزناد. اسنان الكاس خمس انبوبتها طولاً. الفرنة ٢٠٥ مترطولا مع متقارها مسترقة قليلاً ثم مستهلمسة خطية مخنية مستدقة الى متقار حاد وذات اعصاب طويلة متعائلة - الربيع - بادية اثية

A. Sieberi, D. C. ٥٩. استراغلس سيبير ث السوق قصيرة كثيفة الاوراق ملازمة الشيب. الذنبات مدنية لحوية. الرجيلات مستشبكة. الورقات ٢٠ زوجاً الى ٢٥ متقاربة بيضية مخرومة مطوية ملساء من الاعلى وملازمة المليب من الاسفل ٢٠٠٢٥ مترطولا الى ٢٠٠٣. الازهار ابضية جالسة تقريباً. اسنان الكاس مهدبة ربع انبوبتها المستهلمسة الى خمسها طولاً. الفرنة مسترقة ثم مستهلمسة ثلثية الزوايا مخنية مستدقة الى متقار طويل مفضضة ٢٠٣ متر الى ٢٠٤ طولاً - الربيع - بادية سيناء ومصر

A. tomentosus, Lam. ٦٠. الاستراغلس اللبادي ث لبادي ايض السوق مطولة. الذنبات كبيرة رحيمة. الورقات ٢٥ زوجاً الى ٣٠ مستديرة قلبية - مقلوبة ٢٠٥٥ مترطولا. الازهار ثلثة ثلثة او اربعة اربعة جالسة في الآباط ٢٠١٥ مترطولا. الكاس جرسية وبرية واسنانها رحيمة مثل انبوبتها طولاً. الفرون منفردة لبيدية متصلة مخنية ٢٠١٥ مترطولا مستدقة الى متقار طويل - الربيع - بحيرة مصر

A. trigonum, D. C. ٦١. الاستراغلس المثلث الزوايا ث كثيف الفروع مستشبكة دلدلي مشبك. الذنبات مثلية حادة قصيرة. الورقات ٥ ازواج الى ٧ صغيرة بيضبة - مستديرة مخرومة ملساء من الاعلى. الازهار مفردة ١ و ٢ معاً جالسة في الآباط. الكاس ملازمة للحبة واسنانها ثلث انبوبتها طولاً. الفرنة ملازمة الشيب مخنية قليلاً مثلية الزوايا تقريباً مدبية ٢٠١٢ مترطولا و ٢٠٠٣ عرضاً - الربيع - بادية اثية ومصر

A. sumatrensis, Labill. ٦٢. الاستراغلس الحامل الصغ ث ٢٥٠ متر علواً الى ٢٦٠ كثيف الفروع مستشبكة عارياً لبادي بين الشوك. الذنبات ملساء معبرة رفيعة عريضة القاعدة رحيمة القبة. الشوك ٢٠٢ مترطولا الى ٢٠٣. الورقات ملساء ٤ ازواج الى ٦ بيضبة - مستطيلة مطوية سرحاء او حورية اقصر من طرف الشوك. الازهار مجمعة ٢ - ٣ في الآباط. الميلوس بيضبة - مستديرة زورقية وقمتها زجاجية منفرجة مجذومة. الكاس وبرية جداً واسنانها اقصر من انبوبتها - الصيف - جرد لبنان والجبل الشرقي ونحت جردوها

A. Flourensianus, Boiss. ٦٣. الاستراغلس الروسياني ث ٢٦٠ متر علواً الى ٢٠٨

بسيط الفروع صوفي بين الذنبيات . الذنبيات بيضية - رحيمة لحوية . الشوك ٢.٠٣ متر طولاً أو أطول قليلاً . الورقات ٧ أزواج إلى ٩ متراكمة مطوية خطية سرحاء ملازمة للحية . الأزهار ٢ في الأباط عمترجة بالاوراق على طول الفروع . الفلوس مخززية لحوية القبة . الفلوسات هلبية أقصر من انبوبة الكاس . الكاس وبرية وإسنانها أقصر من انبوتها - الصيف - من حلب إلى البقاع وإلى الشرق

٦٤ *A. echinus*, D. C. **الاستراغلس القدادي** شوك كثيف الفروع نصف - كروي الهبة شوك متراكم ٢.٠٢ متر طولاً أو أقل . الذنبيات مثلثة مدببة ملساء مدببة . الورقات ٥ أزواج إلى ٧ مستطيلة - رحيمة ملازمة الشيب حوية أقصر من طرف الشوك . الأزهار متراكمة في رويسات كروية ٢.٠١ متر طولاً . الفلوس خطية . إسنان الكاس مخنفة بالوبر مثل انبوتها طولاً - الصيف - جرود لبنان والجبل الشرقي وجبال سينا

virans, Boiss. **ب. الأخضر** الشوك ٢.٠٤ متر طولاً . الورقات مخضرة - بين بشري وإهدن

٦٥ *A. argyrotamnus*, Boiss. **الاستراغلس الفضي** الاثث ٢ دلدلي مشبك الفروع نصف - كروي الهبة الشوك كثيف ٢.٠٣ متر طولاً . الذنبيات بيضية مدببة مهدبة . الورقات ٤ أزواج إلى ٥ بيضية كالة ٢.٠٠٢ متر طولاً حوية فضية الشيب أقصر من الشوك الانتهاءي . الأزهار ٢ أو أقل معاً متراكمة في رويسات كروية عند قواعد الاوراق . الفلوس بيضية عريضة زورقة كالة . إسنان الكاس مخنفة في وبرها مثل انبوتها طولاً . التويج ١٥.٠١ متر طولاً بتفجي - الصيف - في السهل بين زبدانة والباق

٦٦ *A. psilodontus*, Boiss. **الاستراغلس العاري** الشوك ٢ ملازم الشيب كثيف الفروع مسترسل الاوراق . الشوك ٢.٠٣ متر إلى ٢.٠٤ طولاً عارٍ قرب طرفه . الورقات ٦ أزواج إلى ٧ متفاربة ٢.٠٢ متر طولاً متصاغرة مطوية بيضية حادة سرحاء . الذنبيات بيضية - رحيمة عريضة المحافة زجاجيتها لحوية الظهر . الأزهار ٣ - ٥ مجتمعة في باقات ابطية متباعدة قليلاً . الفلوس مستطيلة مجعفة زجاجية المحافة مثل انبوبة الكاس طولاً . الكاس لحوية وإسنانها أطول من انبوتها ومن التويج المستمر - الصيف - أسافل الجبل الشرقي

٦٧ *A. ambiguus*, Bge. **الاستراغلس الملتبس** ٢ الفروع قصيرة ملساء مخيلة . الشوك كثيف ٢.٠٢ متر طولاً أو أطول قليلاً . الذنبيات رحيمة مدببة مهدبة . الورقات ٧ أزواج إلى ٩ بيضية - مغلوبة مطوية قصيرة المحمة ٢.٠٢ متر طولاً تقريباً منفردة المحمة أقصر قليلاً من الشوك الانتهاءي . الأزهار ٢ معاً في الأباط مجتمعة في رويسات كروية عند قواعد الفروع . الفلوس مستطيلة - رحيمة زورقية ملساء القاعدة وبرية القبة أقصر من الكاس قليلاً . الكاس وبرية وإسنانها مخززية أطول من انبوتها -

الصف - شمالي جبل اللكام

A. psilacmos, Bge. ٦٨. الاستراغلس العاري القبة الفروع قصيرة ضخمة مستعسلة. الشوك ٢.٤ متر إلى ٢.٦ طولاً منفرج. الذنبات بيضية مديبة وبيضة القاعة. الوريقات متباعدة ٥ أزواج إلى ٦ مستطيلة - رحيمة نايبة القبة ملازمة الشيب عصية من الأعلى ٢.١ متر طولاً أو أكثر. الأزهار ١٠ - ١٣ مجمعة في رأس أكبر من المجوزة. الفلوس بيضبة - اسنيلية عريضة مجوفة لمساء القاعدة لبادية القبة كالة حموية اطول من انبوبة الكاس. الكاس طويلة الوبر كثيفة واسنانها اطول قليلاً من انبوتها - الربيع - قرب مرعش

A. Zachlensis, Bge. ٦٩. الاستراغلس الزحلاوي الفروع قصيرة ضخمة حريرية بين الشوك. الشوك ٢.٤ متر طولاً إلى ٢.٦. الذنبات بيضبة حادة مهدبة ثم مستعسلة. الوريقات ٤ أزواج ٢.٠٨ متر طولاً مستطيلة - رحيمة مشبكة محيضة ملازمة الحبر يضاً أقصر من الشوكة الرجلية. الأزهار ٥ - ٧ معاً مجمعة عند قواعد الفروع في رؤوس بيضبة او مستطيلة كثيفة مختلطة بالاوراق. الفلوس بيضبة - مستطيلة حادة زورقية لبادية الظهر والقبة اطول من انبوبة الكاس. اسنان الكاس ضعف انبوتها طولاً - الربيع - تحت جرود لبنان والجبل الشرقي

A. cruentiflorus, Boiss. ٧٠. الاستراغلس العندي الزهر دلدلي. الفروع كثيفة قصيرة كثيرة الشوك لبادية بين الذنبات. الشوك ٢.٢ متر طولاً أو أكثر. الذنبات غضة زجاجية مثلكة حادة مهدبة. الوريقات ٤ أزواج إلى ٧ متقاربة حموية القبة حريرية ٢.٠٣ متر طولاً. الأزهار حمر ٤ - ٥ مجمعة قرب قم الفروع في رؤوس كروية يعلوها الاوراق العليا. الفلوس بيضبة مجوفة حادة غشائية لبييدية على منتصف ظهرها اطول من انبوبة الكاس. الكاس ذات لحية يضاء متابلة واسنانها مخرزية القبة ضعف انبوتها طولاً - الصف - جرود لبنان والجبل الشرقي وتحت جرودها

A. stromatodes, Bge. ٧١. الاستراغلس اللحافي دلدلي. الفروع مسودة من الاسفل. الشوك كثيف ٢.٠٢ متر طولاً إلى ٢.٠٣ اصفر. الذنبات بيضبة مديبة مهدبة والجديده منها ملازمة الرغب. الوريقات ٥ أزواج مستطيلة رحيمة نايبة مطوية ملازمة الحبر فضية ٢.٠٥ متر إلى ٢.٠٨ طولاً. الأزهار ٤ - ٥ معاً مجمعة في رؤوس كروية عند قواعد الفروع. الفلوس بيضبة زورقية لبييدية على منتصف ظهرها اطول من انبوبة الكاس. اسنان الكاس مخرزية ضعف انبوتها طولاً - الصف - جبال مرعش. ويؤخذ منه صمغ كالكثير

A. Kurdicus, Boiss. ٧٢. الاستراغلس الكردي دلدلي. الفروع عارية والمخراص ملازمة الشوك العتيق سوداؤه. الشوك ٢.٢ متر إلى ٢.٠٣ طولاً. الذنبات رحيمة مرتفعة

الاعصاب مهدبة الثمة. الوريقات مقلّطة أو مطوية قليلاً اهليلجية - رحيمة مشبكة ملازمة المحرير ٢٠٠٥ متر إلى ٢٠٠٧ طولاً. الأزهار ٢-٦ في الأباط مرتبة في سنبل مسترسل عند قواعد الاوراق. الفلوس بيضية زورقية لبيدية الظهر اطول من انبوبة الكاس. اسنان الكاس مخززية اطول من انبوتها - الصيف - تحت جرد جبال مرعش

A. Bethlemiticus, Boiss. ٧٢. الاستراغلس البيتلحي \varnothing مخفض. الشوك ٢٠٣ متر إلى ٢٠٤ طولاً متين لبييدي. الذنبيات بيضية لبيدية مهدبة الثمة. الوريقات ٤ ازواج إلى ٥ اهليلجية ناية ملازمة المحرير ٢٠٠٣ متر إلى ٢٠٠٤ طولاً. الأزهاره اواقل معاً مجمعة بقرب قم الفروع. الفلوس بيضية عريضة مجوفة قصيرة الحمة اطول من انبوبة الكاس. الكاس لحوية واسنانها ثلثة اصعاف انبوتها طولاً - الصيف - من دمشق والبقاع ولبنان الى جنوبي فلسطين

A. Iepidanthus, Boiss. ٧٤. الاستراغلس البرصي الزهر \varnothing ٢١٥ متر إلى ٢٣٠ طولاً دلدي. الشوك كثيف ٢٠٢ متر إلى ٢٠٣ طولاً. الذنبيات بيضية غنائية رحيمة الطرف السائب. الوريقات ٣ ازواج ٢٠٠٥ متر او أكثر طولاً مستطيلة - رحيمة مطوية طويلة الناب ملازمة المحرير. الأزهار ٤-٥ معاً مجمعة عند قم الفروع او متباعدة. الفلوس بيضية عريضة مجوفة قصيرة الحمة لبيدية. الكاس لحوية واسنانها كانبوتها طولاً - الصيف - بين ادلب وحلب

A. argyrophyllus, Boiss. et Gaill. ٧٥. الاستراغلس الفضي الورق \varnothing دلدي. الذنبيات لبادة بيضية - مثلبة مدبة. الوريقات زوجان او ٣ مقلّطة او محززة بيضية او اهليلجية طويلة الناب ٢٠١ متر او أكثر طولاً ملازمة المحرير. الأزهار ٤-٥ معاً مسترسلة الوضع عند اعلى الفروع. الفلوس بيضية - مستديرة زورقية لبيدية. اسنان الكاس اطول من انبوتها - الصيف - من عنتاب الى دمشق والجبل الشرقي

A. andrachnefolius, Fenzl. ٧٦. الاستراغلس الاندراخني الورق \varnothing ٢١٥ متر علواً الساق قصير عاري. الفروع قصيرة. الذنبيات وريية بيضية مستدقة قليلاً. الشوك ٢٠٨ متر إلى ٢١٢ طولاً. الوريقات ١٢ زوجاً إلى ١٨ لحمية بيضية حموية ملساء الا بعض الشعير على سطحها السفلي. الأزهار كثيرة في الأباط مجمعة على هيئة كرة ٢-٣ متر قطراً. الفلوس بيضية - مستطيلة كالة لبادة من الاعلى مثل انبوبة الكاس طولاً. الكاس كثيفة الشعر متابلثة واسنانها اقصر من انبوتها - الصيف - من عنتاب الى حماه

A. Andrachne, Bge. ٧٧. الاستراغلس اندراخنة \varnothing مخفض. الذنبيات بيضية - رحيمة مدبة وريية. الشوك طويل. الوريقات ١٠ ازواج إلى ١٥ مستديرة - بيضية - مقلوبة او مستطيلة

ملساء حموية. الأباط كثيرة الأزهار مجتمعة في رؤوس ضخمة بيضـة ٢.٤ متر طولاً. الفلوس مستطيلة مدببة غشائية محززة وهرية من الأعلى. الكاس طويلة الوبر مستقيمة وأسنانها أطول من أنبوبها - الصيف - من حلب وجبل اللكام إلى دمشق والبقاع

A. hilaris, Bge. ٧٨. الاستراغلس الفرخان ^١ مخفض أو يري بين الذنبيات. الفروع قصيرة. الشوك كثيف ٢.٦ متر إلى ٢.٨ طولاً. الذنبيات بيضـة مدببة لبييدية القاعدة مهدبة القمة. الورقات ٧ أزواج إلى ٨ مستطيلة خضراء بيضـة - مقلوبة - مستطيلة ٢.٠٧ متر طولاً كالة قصيرة المحبة. الأباط ذات ٥ أزهار إلى ٦ مجتمعة في رؤوس كروية أكبر قليلاً من المجوزة. الفلوس بيضـة عريضة زورقية. أسنان الكاس أطول قليلاً من أنبوبها - الصيف - جبال شمالي سورية

A. Aintabicus, Boiss. ٧٩. الاستراغلس العيتابي ^٢ مخفض مستطيل الفروع. الشوك ٢.٦ متر إلى ٢.٨ طولاً. الذنبيات مثلية مدببة عصوية مهدبة. الورقات متباعدة ٦ أزواج إلى ٧ مستطيلة - اهليلجية ٢.١ متر طولاً كالة مشبكة عصوية خضراء قليلة الزغب من الأسفل. الأباط ذات ٣ أزهار إلى ٥ مجتمعة في رؤوس بيضـة عند قواعد الفروع. الفلوس عريضة بيضـة محجوة مدببة زورقية مثل الكاس طولاً لبييدية الظهر. الكاس كثيفة اللباد قصبة وأسنانها عارية القمة أقصر من أنبوبها - الصيف - قرب عنتاب

A. Seytunensis, Bge. ٨٠. الاستراغلس الريثوني ^٣ الفروع ضخمة مطولة كثيفة الشوك العتيق. الشوك ٢.٠٣ متر طولاً إلى ٢.٤ لبادي من الأسفل. الذنبيات بيضـة عريضة ملساء مهدبة. الورقات ٥ أزواج ملازمة الحرير مستطيلة - رحيمة مستوية مستدقة إلى حسيكة. الأباط ذات ٤ أزهار إلى ٦ مجتمعة في رؤوس بيضـة - مستطيلة ٢.٠٣ متر طولاً تقريباً مختلطة بالاوراق. الفلوس خطية زورقية حادة ملساء القاعدة لبادية القمة. الكاس طويلة المحبة وأسنانها ضعف أنبوبها طولاً - الصيف - حول مرعش

A. Drusorum, Boiss. ٨١. استراغلس الدرور ^٤ (القطط) منشتر مخفض. الفروع لبادية بين الشوك. الشوك ٢.٠٤ متر إلى ٢.٧ طولاً. الذنبيات بيضـة وجزؤها السائب مثلث مهدب. الورقات ٨ أزواج إلى ١٠ بيضـة - مستطيلة حموية سفجاية أو خضراء. الأباط ذات زهرتين أو ٣ مرتبة على هيئة سنبل ٢.٤ متر إلى ٢.٥ طولاً في الإثمار مختلطة بالاوراق. الفلوس خطية عارية القاعدة مشعرة القمة. الفليسات ملتصبة بالكاس. أسنان الكاس مثل أنبوبها طولاً - الربيع والصيف - لبنان وساحل سورية المجرى

Maroniticus, Boiss. et Bl. ب. الماروني. الشوك أقصر منه في الرمز. الساق

مقصرة الى رؤوس بيضية - لبنان

٨٢. *A. Hasbeyanus*, Boiss. الاستراغلس الحاصباني σ° مخفض. الرجلات ٢٠٨ متر طولاً الى ١٢ منتهية بشوكة قصيرة. الذنبيات مثثة - رحيمة عصبية مهدبة. الورقات ٩ أزواج الى ١١ يابسة باهنة ملازمة الغشاء بيضية قصيرة الحبة. الرؤوس بيضية اصغر من بيضة الدجاجة. الفلوس مستطيلة - خطية وبرية من الاعلى مثل الكاس طولاً. الكاس كثيفة الوريد واسنانها عارية القبة تقريباً ثلث انبوبتها طولاً - اول الصيف - فوق حاصيا

٨٣. *A. deinacanthus*, Boiss. الاستراغلس المائل الشوك σ° مخفض. الرجلات

٢١٢ متر الى ٣٠ طولاً منتهية بشوك متين. الذنبيات مثثة - رحيمة عصبية مهدبة. الورقات متباعدة ٤ أزواج الى ٨ يابسة عصبية مستطيلة - رحيمة ٢٠١٥ متر الى ٢٠١٨ طولاً منتهية بمسكة صفراء. الرؤوس بيضية مثل بيضة الحبيشة حجمًا ثم احياناً ١٢٣ متر طولاً. الفلوس خطية مدببة لحوية مثل الكاس طولاً. الكاس كثيفة اللحمية يضاؤها واسنانها مثل انبوبتها طولاً او اطول منها - اول الصيف - من حلب الى دمشق والباق ولبنان

٨٤. *A. dipodurus*, Bge. الاستراغلس الديبودورس σ° مخفض. الرجلات ٢٠٣

متر طولاً عارية من الاسفل قصيرة الشوكة. الورقات ٦ أزواج الى ٨ لبادية ٢٠٢ متر الى ٢٠٢ طولاً و ١٥٠ عرضاً. الذنبيات رحيمة مطولة غشائية من الاعلى. الرؤوس بيضية واسطوانية ٢٠٦ متر الى ٢١٢ طولاً. الفلوس خطية مفضنة لمساء القاعدة صوفية الظهر مثل الكاس طولاً. الكاس كثيفة اللباد يضاؤها واسنانها أكثر من نصف انبوبتها طولاً - اول الصيف - اماكن عشية بقرب عيناب

٨٥. *A. oxyphyllus*, Boiss. et Haussk. الاستراغلس الحاد الورق σ° مخفض لبادي.

الرجلات ٢١٥ متر الى ٢٢٠ طولاً حاملة وريقات من قرب قاعدتها طويلة الشوكة. الذنبيات رحيمة لحوية مدببة. الورقات ٦ أزواج الى ٧ مستدقة القاعدة ٢٠٣ متر طولاً و ٢٠٠ عرضاً مستطيلة رحيمة مستدقة الى حسيكة. الرؤوس بيضية اكبر قليلاً من بيضة الدجاج. الفلوس خطية طويلة التدبب مفضنة لحوية الا عند قاعدتها اقصر قليلاً من الكاس. الكاس وبرية واسنانها مثل انبوبتها طولاً - اول الصيف - اماكن عشية حول عيتاب

٨٦. *A. Gaillardoti*, Bois. استراغلس كلياردوت σ° مخفض. الرجلات ٢١٠ متر

طولاً منتهية بمسكة طويلة. الذنبيات مثثة القاعدة مدببة غشائية مهدبة ٢١٠ متر طولاً. الورقات ٥ أزواج الى ٦ متباعدة يابسة ملازمة الزغب عصبية مستدقة فجأة الى حسيكة ٢١٥ متر طولاً و ٢٠٠٥ عرضاً. الرؤوس نصف بيضة الدجاج حجمًا. الفلوس خطية مدببة مفضنة ملازمة الغشاء من الاعلى

اطول من الكاس. الكاس لحوية واسنانها متمايلة مثل انبوتها طولاً - الصيف - جبل الشيخ بقرب قلعة جندل

٨٧. *A. Forskahlei*, Boiss. استراغلس فورسكال (الشجرة) ٥٥ متر علواً واكثر ملازم الشيب. شوك الفروع القديمة يابس ٢٠٣ متر او ٢٠٤ طولاً متباعد الوريقات ساقطها. الوريقات الابضية ٤ ازوج او ٥ متقاربة وجميع الوريقات بيضية - مقلوبة سرحاء. الزناد ابضية ذات زهرة او ٢. الكاس لبادية وفي الإثمار بيضية متفتحة ذات ٤ عصباً او اقل واسنانها خطية ربع انبوتها طولاً وخمسها - الربيع - من دمشق الى بادية سيناء ومصر

viridis, Post. ب. الاخضر. الوريقات خضراء قليلة الغطاء - بادية مصر

٨٨. *A. Russellii*, Boiss. استراغلس رسل ٥ كثيف الفروع. الشوك الحوي في الاول ثم امس اخضر. الوريقات ٤ ازوج الى ٦ والشوكية منها متباعدة والابضية متقاربة وجميعها مستطيلة او خطية - اهليجية كالهجومية. الزناد ذات زهرة او ٢. الكاس المثمرة مجمرة ملازمة الغطاء قصيرة الاسنان كروية في الإثمار ذات ١٠ اعصاب - الربيع - من عيتاب الى حلب وشرقها

٨٩. *A. coluteoides*, Willd. الاستراغلس القنوري ٥ لبادي. الشوك منتصب ٢٠٦ متر الى ٢١٠ طولاً. الذنبيات زجاجية متبوجة بيضية اورمية. الوريقات ١٥ زوجاً الى ٢٠ مقلطة بيضية متصاغة. الزناد جريدة. ثل الاوراق طولاً تقريباً. باقات الازهار غالباً مسترسلة. الفليسات خطية مهدبة نصف انبوبة الكاس طولاً. الكاس ملازمة الشعر يضاهي انبوتية وفي الإثمار بيضية - كروية مخططة خطوطاً حمراء واسنانها ربع انبوتها الى ثلثها طولاً - الصيف - جرود لبنان والجبل الشرقي وتحت جرودها

٩٠. *A. ocephalus*, Boiss. الاستراغلس البيضي الرأس ٢٤ متر علواً مستبلس. الذنبيات عريضة القاعدة ثم خطية هليمة. الوريقات ١٥ زوجاً الى ٢٠ بيضية كالة. الرووس ٢٠٣ متر طولاً الى ٢٠٤ بيضية كروية مندججة. الفلوس مخززية اقصر قليلاً من الكاس. الكاس انبوتية - جرسية طويلة الغطاء واسنانها خطية - مخززية اقصر قليلاً من انبوتها - اول الصيف - من حلب الى جبال انطاكية

٩١. *A. pectinatus*, Boiss. استراغلس المشطي ٢٤ مخفض متفرج الحية. الذنبيات مثثة - رمية. الوريقات ٢٠ زوجاً الى ٤٠ مشطية مطوية مستطيلة كالة ملساء من الاعلى. الراصات قصيرة الزناد مستطيلة اسطوانية مسترسلة ٢٠٦ متر الى ٢٠٨ طولاً. الفلوس مخززية اطول من انبوبة الكاس. الكاس طويلة الحية انبوتية - متفتحة واسنانها رمية اطول من انبوتها. التوج صفراء ثم ارجوانية - اول الصيف

— مقاطعة مرعش

٩٢. *A. macrocephalus*, Willd. الاستراغلس الكبير الراس 24 الساق مبيض متمايل الملس. الذنبات عشية مثثة مدية. الوريقات ١٢ زوجاً الى ١٥ مستطيلة-رحمية ملازمة الشعر عند حوافها ثم لمساء. الرؤوس ابضية كروية وزندها اطول منها. الكاس جرسية لحوية واسنانها مثل انبوتها طولاً. القرون اجاصية ٨. ٢٠٠ متر طولاً و ٠.٦ عرضاً عند قمتها لحوية حموية مثثة الظهر—اول الصيف—من جبال شمالي سورية الى قلدون

٩٣. *A. Echinops*, Boiss. الاستراغلس اخينوبس 24 مخلي. الذنبات غشائية رحمية. الوريقات ١٠ أزواج الى ١٤ بيضة ١٥. ٢٠ متر طولاً. الرؤوس ٢-٤ في الآباط العليا مثل زندها طولاً تقريباً. الفلوس سفينة لبادية مثل الكاس طولاً. الفليسات دبوسية اطول من اسنان الكاس. الكاس ملازمة الشعر طويلة ولها اسنانها مثثة قصيرة. القرون ١. ٤٠ متر طولاً ملازمة للباد بلبلية فطرية مجذومة القمة ومخرقة الحمة—الصيف—من عنتاب ومرعش الى دمشق والبناع

٩٤. *A. Kahircus*, D. C. الاستراغلس القاهري 24 قصير الباد. السوق مطوية ضخمة متمتعة متعرجة. الذنبات خضراء عشية مثثة حادة. الوريقات ٥ أزواج الى ٩ مستديرة ٢. ٢٠ متر طولاً او أكثر وهي غالباً مخرومة لمساء من الاعلى. الراسيات ابضية مسترسلة اسطوانية قصيرة الزناد. الفليسات مخززية اقصر كثيراً من انبوبة الكاس. الكاس لبادية وفي الاثمار متفتحة واسنانها خمس انبوتها طولاً. القرون لمساء بيضية مخزفة مخزفة محيزنة الظهر مثثة الوجه—الربيع—بادية التيه ومصر

٩٥. *A. Kotschyannus*, Boiss. الاستراغلس الكوتشيانى 24 ملازم الشيب ٢٠. متر الى ٥٠ علواً. السوق منشرة. الذنبات قصيرة مثثة متعدة الفاعة. الوريقات ٦ أزواج الى ٩ خطية-اهليجية ٥. ٢٠ متر طولاً وفي الاوراق السفلى بيضية-مستطيلة. الزناد نخيلة ضعف الاوراق طولاً واكثر الرؤوس بيضية-كروية وفي الاثمار مستطيلة. افلوس خطية اطول قليلاً من الزندبات. اسنان الكاس نصف انبوتها طولاً او اطول قليلاً. القرون ملازمة الغشاء ٥. ٢٠ متر طولاً اطول قليلاً من الكاس—الربيع—من جبال شمالي سورية الى دمشق والجبل الشرقي والبقاع

viridis, Post. ب. الاخضر. اللبس قليل منفرد. الوريقات خضراء مستمسة ١. ٢٠ متر

طولاً خطية. الذنبات مدية—الجبل الشرقي

٩٦. *A. trifoliolatus*, Boiss. الاستراغلس الثلاثي الوريقات 24 ملازم الشيب خشبي الفاعة. السوق عسلجية طويلة عارية تقريباً ٦. ٢٠ متر الى ٨. ٢٠ علواً. الذنبات قصيرة صفراء مسهرة متعدة. الوريقات قليلة خطية نفلية قصيرة الرجيلات والعليا منها جالسة بسيطة. الزناد اطول من الاوراق.

الراسيات بيضية قصيرة مسترسلة قليلة الازهار. الفلوس مستطيلة - خطية ضعف الزيدات طولاً. اسنان الكاس رحيمة نصف انبوبتها طولاً تقريباً. القرون ضعف الكاس طولاً (٢٠٠.٨ متر) ملازمة الشيب - الصيف - قلدون وشمالى البقاع

٩٧. *A. schizopterus*, Boiss. الاستراغلس المشطر الجناح 24 اغبر اخضر الأوجه الاوراق العلوي وهو ملازم الهليب قليلة. الذنبات رحيمة مدببة عفائية. الوريقات 7 ازواج الى ٥ بيضية - مستديرة مخرومة نحو ٢٠٠.٥ متر طولاً. المجرائد اقصر من الاوراق مستطيلة منتهية براسيات مسترسلة. اسنان الكاس نصف انبوبتها طولاً. الجناح ذو فصين. القرون ٢.٢ متر طولاً و ٢٠٠.٣ متر عرضاً مساء - الصيف - اسافل الجبل الاقصر

٩٨. *A. ancistrocarpus*, Boiss. et Haussk. الاستراغلس الصناري الشرب 24 ملازم الهليب مستشيب. الذنبات مثثة - رحيمة عفائية. الوريقات ٥ ازواج الى ٨ متباعدة لمحبة بيضية - منلوية ٢٠١ متر طولاً. المجرائد اقصر من الاوراق منتهية براسيم مستطيلة مسترسلة في الاثمار. الفلوس مثثة - رحيمة ضعف الزيدة طولاً. اسنان الكاس مثثة خمس انبوبتها طولاً. القرون منفرجة قليلة الهليب ٢.٣ متر طولاً فاكثر و ٢٠٠.٢ متر عرضاً مخنجة شصية القبة مستدقها - الربيع - الجبل الابيض بين حماه وتدمر الى الشرق

٩٩. *A. angulosus*, D. C. الاستراغلس الكثير الزوايا 24 ١٢ متر علواً ملازم الشيب مصفره. الذنبات صغيرة مثثة عفائية. الوريقات ٨ ازواج الى ١٠ بيضية حادة او كاله ٢٠٠.٥ متر طولاً. المجرائد اطول من الاوراق. الراسيات بيضية - مستطيلة مسترسلة في الاثمار ذات ٢٠ زهرة فدون. الفلوس مثثة - رحيمة ثلث انبوبة الكاس طولاً. اسنان الكاس قصيرة جداً. القرون ٢.١ متر طولاً او اكثر و ٢٠٠.٥ عرضاً مستطيلة مثثة الزوايا دبوسية تقريباً ذات منقار منحرف نصفها طولاً - الربيع - من دير عطية الى دمشق والجبل الشرقي ولبنان. عين جدي

١٠٠. *A. dictyocarpus*, Boiss. الاستراغلس المشبك الشرب 24 قزم ملازم الشيب حزمي من ام جنور ضخمة. الذنبات رحيمة قصيرة. الوريقات 4 ازواج الى ٧ بيضية حادة او كاله ٢٠٠.٣ متر الى ٢٠٠.٣ طولاً. المجرائد متصاعدة نخيلة اطول قليلاً من الاوراق. الراسيات مسترسلة قليلة الازهار. الفلوس رحيمة - مستطيلة مثل الزند طولاً. الكاس يضاء الشعر او سوداء واسنانها مثثة قصيرة. القرون منفرجة قليلة الهليب مشبكة الاعصاب منضغة بيضية او مستطيلة - معينية قصيرة الحبة مخرفتها محبزة الدرزين ٢.١٧ متر طولاً و ٢٠٠.٨ عرضاً - الصيف - جرود لبنان

١٠١. *A. gladiatus*, Boiss. الاستراغلس السيفي ٢ متر علواً واكثر ملازم الشيب

خشبي القاعدة . السوق عسجية منتصبة . الذنبيات رحيمة قصيرة حريرية . الوريقات ٦ أزواج او اقل
اهليجية - خطية . الزناد ضعفا الورقة الى ٢ اضعاها طولاً . الراسيات طويلة مسترسلة مائلة الى جانب
واحد . الفلوس مخززية اقصر من الزنيدات . أكثر شعر الكاس ايضاً واسنانها خمس انبوتها طولاً .
القرون ٢.٤ متر الى ٢.٦ طولاً منفرجة او منغضة خطية - الصيف - جرد لبنان فوق الارز
١٠٢ . *A. sanctus*, Boiss. . الاستراغلس المقدس ٢ قدم ١٢ متر علواً . ملازم الشيب
حريرية . السوق قصبة . الذنبيات صغيرة مثثة سوداء الشعر . الوريقات ٥ أزواج الى ٦ اهليجية او
مستطيلة او خطية . الزناد مثل الاوراق طولاً تقريباً . الراسيات قصيرة مسترسلة ذات ٢ ازهار الى ٧ .
الفلوس مستطيلة مثثة اطول قليلاً من الزنيدات . الكاس كثيرة الشعر الاسود وقليلة الابيض واسنانها
خمس انبوتها طولاً . القرون منعقة خطية مخنجة ٢.٣ متر الى ٢.٤ طولاً ملازمة الغشاء - الربيع - من
الثلول الجافة حول دمشق الى فلسطين وبادية التيه

١٠٣ . *A. Amalecitanus*, Boiss. . الاستراغلس العالقي ٢ ملازم الشيب حريرية .
حزبي خشبي القاعدة وسوقه منتصبة ٢.٦ متر علواً . الذنبيات طويلة صفراء مهدبة ملساء ذات سنين .
الوريقات ٣ أزواج الى ٤ متقاربة مستطيلة حادة ٢.٣ متر طولاً . الزناد اطول قليلاً من الاوراق ذات
٤ ازهار او ٥ مرتبة في راس . الفلوس خطية - رحيمة ثلث الكاس طولاً . الكاس ذات شعر ايضاً واسود
واسنانها ثلث انبوتها طولاً . القرون مستطيلة ٢.١ متر طولاً او أكثر طويلة الخنجة بيضاؤها - الربيع -
ساحل غزة

١٠٤ . *A. angustifolius*, Lam. . الاستراغلس الضيق الورق ٢ مثبك الفروع .
الشوك ٢.٣ متر طولاً . الوريقات ٦ أزواج الى ١٠ مستطيلة او خطية مطوية ٢.٥ طولاً . الزناد
اقصر كثيراً من الاوراق او اطول منها . الراسم قليل الازهار قصيرة . الفلوس مثل الزنيدة الى ٣
اضعاها طولاً . الكاس ملازمة الشعر بيضاؤها واحياناً سوداؤها واسنانها نصف انبوتها او ثلثها طولاً .
القرون اطول من الكاس مستطيلة ملازمة الشيب حموية - الصيف -

A. genuinus, Boiss. . الحقيقي . الفروع مستشعبة بين الذنبيات والاوراق . الزناد اقصر
من الاوراق . الفوج ايضاً مصفر والزورق احياناً بنفسجي - جرد لبنان
A. glabrescens, Boiss. . ب . المستطيل . الوريقات مخضرة قليلة الزغب او مهدبة فقط .
اسنان الكاس قصيرة جداً - قمة جبل صني

١٠٥ . *A. Hermonensis*, Boiss. . استراغلس جبل الشيخ ٢ كثيف جداً لدلي . الشوك
٢.١٥ متر طولاً الى ٢.٢ متناوب جداً عريض القاعدة . الوريقات ٧ أزواج الى ٨ بيضية مقنوبة كالة

مطوية ٢٥٠٢٥ متر طولاً قليلة الغناء مخضرة . الزناد اقصر من الاوراق منتهية في راسيات قصيرة ذات ٢ ازهار الى ٤ . الفلوس رحيمة سوداء الغناء اقصر من الزينات . الكاس ملازمة الشعر الاسود قليلة واسنانها ربع انبوبتها طولاً الى خمسها . القرون ٨٠٠٨ متر طولاً مستطيلة اسطوانية حموية لمساء او قليلة الزغب - الصيف - جرود لبنان والجبل الشرقي

٢٥ البيسرولا *BISERRULA*, L.

شكل ١٢١



قرنة البيسرولا بَلَشِينُس

الكاس جرسية متساوية الاسنان تقريباً . العلم يضي . الجناحان سائبان . الزورق كال اقصر قلباً من الجناحين . القرنة خطية غير منشقة مفطحية محجوزة بمجاذر طولي ضيق يمتد بين الدرزين . حوافي المصراعين خليجية مسننة - عشب سنوي

B. Pelecinus, L. البيسرولا بَلَشِينُس ٥ ملازم الغناء . السوق

منشرة . الوريقات ٨ ازواج الى ١٥ يضيّة - مقلوبة - مستطيلة مخرومة . الراسيات قليلة الازهار . الكاس ذات شعر اسود واسنانها مخززية اطول من انبوبتها . القرنة ملازمة الغناء او لمساء - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

٢٦ السكوربيوروس *SCORPIURUS* L.

الكاس جرسية قصيرة وسناتها العلويان اكثر النخاماً من الثلاثة السفلى . الزورق ذو منشار . القرنة ملتفة طولاً ومثابة ومضلعة طولاً . الفلتان طويلتان مبرومتان - اعشاب سنوية اوراتها بسيطة كاملة مستطيلة - ملوقية حادة

S. muricata, L. ١ . السكوربيوروس التوتويوي ٥ الزناد طويلة ذات زهرتين او ٢ .

القرنة لمساء او زغبية طلبية مسترسلة الالتفاف والاضلاع الوحشية ذات درينات مخروطية قصيرة - الربيع - قرب القاهرة

S. laevigata, Boiss. ب . المسوّي . القرون اقل النفاً والاضلاع اقل تدرناً منها في الربيع

- اماكن رطبة في خربة البقاع في البناة

S. sulcata, L. ٢ . السكوربيوروس المثلث ٥ الزناد ذات زهرة الى ٤ . القرنة لمساء

مسترسلة الالتفاف واضلاعها الوحشية ذات ابر قصيرة متباعدة القواعد مستقيمة او شعبة القمة .

البنور مخططة قليلاً - الربيع - مزارع سورية ومصر

٣. *S. subvillosa*, L. السكوربيوروس القليل الوبر © الزناد ذات زهرتين الى ٤ .

القرون شديدة الالتفاف لمساء او عنائية واضلاعها الوحشية كثيفة الوبر الطويلة النضبة القبة. البنور كلوية مخططة - الربيع - مزارع سورية - ولا راجح ان هذه الانواع الثلاثة نباتات نوع واحد

٢٧ المهتولويوم ^س *HAMMATOLOBIUM*, Fenzl.

الكاس جرسية - انبوية وخرقها متساوية تقريباً. الزورق حاد. القرنة خطية منحنية فلادية حموية او منقارية وتفاصيلها بيضية منتفخة قليلة الانضغاط مشبكة قليلاً - اعشاب معبرة تشبه التراكونولوبوس
H. lotoides, Fenzl. المهتولويوم اللوثي 2٤ ويري. السوق مستطيلة. الوريقات ٥ وقد تكون اصبعية الترتيب نثرياً لنصر الفنار وهيئتها بيضية - مقلوبة. الزناد اطول قليلاً من الاوراق ذات زهرة الى ٢. الفلج ذو ٢ وريقات. الكاس لحوية وخرقها رحبة - محرزبة اقصر قليلاً من انبويتها. النويج ذهبي. القرون عنائية ذات تصليبتين الى ٨ واذا قلت التفاصيل طال المنقار - الربيع - غابات الجبل الاقصر

٢٨ الأورثويس ^س *ORNITHOPUS*, L.

الكاس انبوية - جرسية وسننها العلويان متعدان اكثر من الثلثة المنلى. الزورق كال. القرنة خطية - اسطوانية او منضغطة متعددة التفاصيل - اعشاب سنوية تزهرها صيواني وزنادها طويلة عارية القبة او ذات فلس

١. *O. ebracteatus*, Brot. الأورثويس العادم الفلج © قليل الغناء ملازمة .

السوق نحيلة متصاعدة. كل الاوراق ذات رجيلات. الوريقات ٥ ازواج او ٦ مستطيلة - خطية. الزند خيطي اطول من الورقة عاري القبة. خرق الكاس رحبة اقصر كثيراً من انبويتها. القرون لمساء نحيلة منحنية مغضنة منتهية بمنقار قصير نحني قليلاً - الربيع - راس يروت

٢. *O. compressus*, L. الأورثويس المنضغط © ملازم الوبر ناعمة. السوق متصاعدة.

الاوراق العليا جالسة. الوريقات ٦ ازواج الى ١٥ مستطيلة - اهليلجية. الزند مثل الورقة طولاً ذو ٣ ازهار الى ٥ وفلس ريشي اطول من الازهار. خرق الكاس خطية - محرزبة مثل انبويتها طولاً. القرون زغبية منضغطة خطية مشبكة - مغضنة منتهية بمنقار شصي طويل - الربيع - مزارع ساحل سورية وفلسطين البحري واسافل جبالها الى جهة البحر.

٣٩ الكورونلا
CORONILLA, L.

الكاس جرسية قصيرة وسنّاها العلويان مخدّان أكثر من الثلثة السفلى. الزورق حاد او ذو منقار. القرنة طويلة مستقيمة او منحنية اسطوانية او رباعية الزوايا مخنطة قليلاً عند العقد. البزور مستطيلة - اعشاب او انجم اوراقها ريشية - مفردة

١. *C. Emeroides*, Boiss. et Spr. الكورونلا الشبيهة بالأمروس ثملس او قليل

العفاء ملازمة. الذنبيات صغيرة مثلثة. الوريقات زوجان الى ٤ بيضة - مقلوبة. الزناد ضعفا الورقة الى ثلثة اضعا فيها طولاً والصوبان ذو ٨ اثمار الى ٨. اسنان الكاس قصيرة هدية. مخالب البتلات ضعف الكاس طولاً. القرون خلية - اسطوانية منضغطة مخططة قليلة الاختناق بين البزور - الصيف - من عيتاب الى مرعش. تحت جرد لبنان

٢. *C. varia*, L. الكورونلا المتنوع 2٢ ثملس. السوق عنقية زاوية ناصورية منشرة او متصاعدة. الذنبيات سائبة صغيرة رحيمة - خلية. الوريقات ٧ ازواج الى ١٢ مستطيلة كاله حوية والسفلى منها شبيهة بالذنبيات. الزناد اطول من الاوراق والصوبان ذو ١٥ زهرة الى ٢٠. القرون مستقيمة تقريباً وتفاصيلها ٣ - ٩ رباعية الزوايا - ابار - عيتاب وشالها

٣. *C. pauciflora*, Boiss. ب. القليلة الزهر. الوريقات ٥ ازواج الى ٦ صغيرة. الزناد طويلة

نحيلة ذات ٥ اثمار الى ١٠ - تحت جرد لبنان

٤. *C. Cretica*, L. الكورونلا الاكرثية ٥ ثملس او قليل العفاء. السوق منشرة او

متصاعدة. الذنبيات مستطيلة - رحيمة. الوريقات ٥ ازواج الى ٨ بيضة - مقلوبة - مستطيلة مخرومة. الزناد ذات ٣ اثمار الى ٧. القرون مستقيمة تقريباً منبهة بمنقار مخن قليلاً او مستقيم - الربيع -

ساحل سورية البحري. الحولة. وجه لبنان البحري

٥. *C. parviflora*, Post. ب. الصغيرة الزهر. الوريقات

٤ ازواج الى ٥. الذنبيات بيضة. الازهار اصغر منها في الرمز. القرون منحنية على هيئة نصف دائرة معتدلة - مع الرمز

(*C. parviflora*, Willd.)

٦. *C. scorpioides*, L. الكورونلا العقريية ٤

املس اغبر. الساق المحوري منتصب والسوق الجانبية متصاعدة.

الذنبيتان مخدّتان الى واحدة قبال الورقة ذات سنين. الوريقات

٢ الحمية والجانبين منها صغيرتان مستديرتان شبيهتان بذهنيتين

شكل ١٢٢



قروتان من الكورونلا العقريية

والانتهائية كبيرة بيضبة قصيرة الرجيلة . الزناد ذات زهرتين الى ٤ صغيرة . القرون منفردة مخفية
معتدة - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

٤. الهبوكريس *HIPPOCREPIS*, L.

الكاس جرسية قصيرة وسناها العلويان متحذان أكثر من الثلاثة السفلى . الزروق مدبب - مقاري .
القرنة مقلعة غالباً مخفية وحافتها العليا مجوفة عند كل بذرة فتتفصل القرنة قطعاً على هيئة U . البزور
مخفية - أعشاب سنوية أوراقها ريشية - مفردة وإزهارها صفراء

١. *H. uniflora*, L. . الهبوكريس الاحادي القرنة ○ مستبلس . الوريقات ٤
ازواج الى ٧ اسنينة - مستطيلة مخرومة . الأزهار غالباً منفردة في الأكباط . القرون مستقيمة او مخفية .
البزور مخفية على هيئة حلقة والخيلجان غير مغلقة - الربيع - مزارع
سورية وفلسطين



٢. *biflora*, Post. . ذو الزهرتين . الأزهار غالباً ٢ معاً .
فراض القرنة مغلقة - مزارع سورية وفلسطين
(*A. biflora*, Spreng.)

٣. *H. multisiliquosa*, L. . الهبوكريس الكثير

القرون ○ ملازم الغشاء قليلة او املس . الوريقات ٤ أزواج الى ٧
مستطيلة - خطية . الزناد مثل الاوراق طولاً او اطول منها ذات
زهرتين الى ٦ . القرون مخفية واحياناً دائرية وخيلجانها متجهة الى
ضلعها الظاهر - الربيع - مزارع ساحل سورية وفلسطين البحري
٤. *H. ciliata*, Willd. . الهبوكريس المهذب ○

ملازم الغشاء قليلة . الوريقات ٤ أزواج او ٥ خطية مجذومة او مفروضة . الزناد مثل الورقة طولاً تقريباً
ذات زهرتين الى ٥ . القرون مخفية وخيلجانها متجهة الى ضلعها الباطن المقعر - الربيع - شاطئ البحر
الاحمر عند قصير

٤. *H. cornigera*, Boiss. . الهبوكريس الحامل القرن (المداهين) ملازم الغشاء
قليلة . الوريقات ٢ أزواج الى ٥ خطية مخرومة . الزناد اطول قليلاً من الاوراق ذات زهرتين الى ٤ .
القرون حليمية ملتفة دورة او دورتين والتفاصيل متنية بقرنتين طويلتين منرجين - الربيع - بادية
اليه وسينا ومصر

٤١ الهديساروم *HEDYSARUM, L.*

الكاس جرسية ذات ٥ أسنان. العلم ضيق القاعدة. الجناحان قصيران او طويلان. الزورق مجذوم
القمة منحرفا. السداة العلوية مستقلة. المبيض ذو بويضات متعددة والقلم خطي او السمة جالسة تقريباً.
الفرقة شرافية الدرزين وتفاصيلها واحدة او متعددة مستديرة او مربعة تقريباً غير منشقة - اعشاب وانجم
اوراقها ريشية - مفردة وازهارها في راسيات او سنابل ابطية ذات زناد

١. *II. spinosissimum, L. et S.* الهديساروم الكثير الحسك ٥ ملازم الرغب.

الذنبات غشائية. الوريقات ٤ ازواج الى ٧ ملاء من الاعلى وزغبية من الاسفل مستطيلة مخرومة او
مجذومة. الزناد اطول من الاوراق. الازهار ٥ - ٨ راسية راسية. الكاس مثل التويج الودي طولاً
تقريباً او اقصر منه وخرقها ضعف انبوتها طولاً او اكثر. تفاصيل الفرقة مستديرة زغبية شصية الحسك
- الربيع - جنوبي فلسطين. الفطر المصري

٢. *II. atomarium, Boiss.* الهديساروم الذري ٢٤ قليل الغناء ملازمة. السوق

منعرجة متفرعة من الاسفل. الوريقات ٥ ازواج الى ٦ لحمية بيضية او مستطيلة ٢.٠٢ متر طولاً تقريباً.
الذنبات مسمرة. الزناد اطول قليلاً من الاوراق. الراسيات مندمجة بيضية ثم مستطيلة. الكاس اقصر
كثيراً من التويج الارجواني وخرقها اطول من انبوتها. تفاصيل القرون ٢ - ٣ بيضية - مستديرة مشبكة
- مغطنة مستوية او قليلة الدرنات المهيمة - الربيع - بين داركوش وانطاكية

٣. *suffruticens, Boiss.* ب. النجبي من الاسفل. اسفل الوريقات مستشيب تقريباً

- عيتاب وشالها

٤. *II. pogonocarpum, Boiss.* الهديساروم اللخوي الشمر ٢٤ لبيدي مستشيب.

الوريقات ٦ ازواج الى ٧ اهليلجية كالة نحو ٢.٠٥ متر طولاً. الزناد مثل الاوراق طولاً او اطول منها.
الراسيات مستطيلة ثم مطولة. الكاس ربع التويج الاصفر طولاً وخرقها اطول قليلاً من انبوتها. تفاصيل
الفرقة ١ - ٢ اهليلجية مستشبية مجهزة بلب طويل مسمر - الصيف - عيتاب وشالها

٥. *II. pannosum, Boiss.* الهديساروم الملبد ٢٤ بلاساق تقريباً لهادي ايض.

الوريقات ٦ ازواج الى ٩ بيضية او مستطيلة - اهليلجية كالة او حادة ١.٠ متر الى ٢.٠٢ طولاً. الزناد ضخمة
ضعف الاوراق طولاً. الراسيات طويلة مسترسلة. الكاس ثلث التويج الاصفر اربعة طولاً وخرقها رجيحة
مثل انبوتها طولاً. تفاصيل الفرقة ١ او ٢ بيضية لبادية وذات هلب طويل مسمر - الصيف - من عيتاب
الى الجبل الابيض في بادية سورية والى الشرق

ONOBRYCHIS, Gaertn.

٤٢ الأونوبريخس

الكاس جرسية واسنانها متساوية تقريباً. الجناحان قصيران. الزورق مجذوم النبة منحرفاً مثل العلم طولاً وأطول منها. السداة العلوية مستقلة القاعدة متحدة عند منتصفها بالبقية. القلم خطي. السبة انتهائية. القرنة منبثقة جالسة أو ذات سويقة غير منفصلة نصف - مستديرة أو مستديرة - ملتفة سحائية وقرصها شهدي وحافتها عرقية أو حسكية - أعشاب أو نجيلات أوراقها ريشية - مفردة وأزهارها مرتبة في راسيات أو سنابل أبوية ذات زناد

* سنوية. نباتات بلاشوك

O. Crista-Galli | Gaertneriana | æquidentata | Caput-Galli ٤

** معبرة

† القرنة ذات بذرة واحدة

‡ بلاشوك

O. inogataphros o sativa | gracilis | Cadmea | Kotschyana †

‡ نجيلات شوكية

O. cornuta | .

† † القرنة ذات بذرتين. نجيلات بلاشوك

O. Ptolemaica | | Gaillardoti | aurantiaca | hemicycla | ٤

O. Crista-Galli, L. | . الأونوبريخس عرف الديك ⊙ ملازم الشيب. الوريقات

أزواج إلى ٨ خطية كالة أو مخرومة حموية. الزناد أقصر من الأوراق ذات زهرتين إلى ٤. خرق الكاس ٤ أضلاع أنبوبتها إلى ٥ ومثل التويج الوردي الباهت طولاً. المبيض ذو ٣ بويضات. القرنة عفاية وقرصها سحقي وإحياناً ذوابر. العرف مخروقة إلى ٢ خرق أو ٤ رمية حادة مسننة وعلى كل من جانبيه عرف اضافي صغير - الربيع - مزارع سورية وفلسطين ومصر

O. Gaertneriana, Boiss. ٣. الأونوبريخس الكبير ثمري ⊙ ملازم الشيب. الوريقات

٨ أزواج إلى ٩ مستطيلة - اسطوانية مجذومة أو قلبية - مقلوبة. الزناد أقصر قليلاً من الأوراق ذات زهرة إلى ٣. خرق الكاس ٤ أضلاع أنبوبتها إلى ٥ طولاً أقصر من التويج الوردي الغامق. القرنة قليلة الهليبات ملازمهم اسطوانية القرص وقصيرة الأبر ذات ٣ بزور. العرف مخروق إلى ٢ خرق أو ٤ كالة مسننة - الربيع - من عيتاب إلى القدس وإلى الشرق. والاولى ان يُعتبر تبايناً من المتقدم ذكره

٢. *O. æquidentata*, S. et S. . الانوبريخس المتساوي الاثنان ○ مستطلس او ملازم الهلب مستطيب . الوربقات ٦ ازواج الى ٨ مستطيلية - اهليلجية وخطية . الزناد اطول كثيراً من الاوراق . الازهار ٢-٩ متباعدة . خرق الكاس ثلثا التويج الارجواني او مثله طولاً . المبيض ذويويضة واحدة . الفترة لمساء او ملازمة الهلب سنجية القرص بلا حسك او ذات حسك قصير . العرف مخروق الى ٥ خرق مثلية حادة كاملة متساوية تقريباً - الربيع - حلب . سفح جبل الكرمل

٤. *O. Caput-Galli*, L. . الانوبريخس واس الديك ○ ملازم الغناء قليلة . الوربقات ٥ ازواج الى ٧ مستطيلة ومستطيلة - خطية - اسفينية . الزناد مثل الاوراق طولاً او اطول منها ذات ٢ ازهار الى ٥ مسترسلة . خرق الكاس ضعف انبوتها ومثل التويج الوردي طولاً . الفترة زغبية سنجية القرص وكثيفة الابر شصبتها والعرف طويل الابر مخزبها - الربيع - من حلب الى طرابلس والى الشرق

٥. *O. megataphros*, Boiss. . الانوبريخس الكبير المحفرة 2٤ ملازم الغناء . العوق متعرجة . الوربقات ٤ ازواج الى ٦ مستطيلة - اهليلجية كالة . السنابل طويلة مسترسلة . خرق الكاس ضعفا انبوتها الى ٣ اضعاها طولاً . التويج وردي . الفترة اطول من الكاس وقرصها ذو ٧ اسناخ او ٨ والسفان الحرفيان اكبر من البنية واعرافها ٢ والمتوسط منها مشقوق الى منتصفه الى ٧ ابر الى ٩ رحيمة - مخززية وكل من الجبانيين ذو ٥ ابر او ٦ - الربيع - عنتاب وشرقيها

٦. *O. sativa*, Lam. . الانوبريخس المزروع 2٤ ملازم الغناء او مستطلس . السوق متصاعدة او منتصبة . الوربقات ٦ ازواج الى ١٢ اهليلجية او اهليلجية - خطية . السنابل مستطيلة مندحجة . خرق الكاس ضعفا انبوتها طولاً تقريباً . التويج وردي مخطط . الفترة اطول من الكاس غير متساوية الاسناخ بلا حسك او درنية - حسيكية والعرف ذو سنينات حسيكية - الربيع - مزارع سورية وقد يزرع *obovata*, Post. ب . البضي - المقلوب . الوربقات صغيرة بيضية - مقلوبة مخرومة ٥ ازواج الى ٧ . الراسم غير مندحج - بين بعابك وزبانة

٧. *O. gracilis*, Bess. . الانوبريخس الدقيق 2٤ ملازم الشيب . السوق نجيعة . الوربقات ٥ ازواج الى ٨ اهليلجية او خطية . السنابل طويلة مسترسلة . الازهار صغيرة وردية . خرق الكاس ضعف انبوتها طولاً . الفترة صغيرة غير متساوية الاسناخ عميقها وعرفها ضيق ذو ٥ سنينات الى ٦ - الربيع - من جبل اللكام الى طرابلس

٨. *O. Cadmea*, Boiss . الانوبريخس الكدمي 2٤ ملازم الحرير مستطيب . السوق متصاعدة . الوربقات ١٠ ازواج الى ١٢ مستطيلة - اهليلجية او خطية . الزناد متشعبة . السنابل طويلة

مسترسلة . الأزهار وردية - مصفرة متوسطة الحجم . خرق الكأس ضعف أنبوبها طولاً وأطول من ذلك . القرنة نصف - كروية ملازمة للبييد أقصر من الكأس غير متساوية الاسناخ ذات ٤ أبراو ٥ على القرص وعرفها منقسم إلى ٢ أسنان مثثة أو ٤ - الربيع - من حلب إلى تدمر دمشق والجبل الشرقي *longiaculeata*, Boiss. ب . الطويل الأبر . أبر القرص والعرف طويلة - الجبل الشرقي

٩. *O. Kotschyana*, Fenzl. الأنوبريخس الكوتشيانى 2٤ ملازم الغاء . السوق منتصبه او مستقيمة متعرجة من الأعلى . الوريقات ٣ أزواج إلى ٧ مستطيلة - اهليلجية او خطية . الزناد منشعبة . السنايل طويلة مسترسلة . الأزهار وردية - باهتة . الكأس نصف التوج طولاً وخرقها رحيمة - مخززية ضعف أنبوبها إلى ٢ أضعافها طولاً . القرنة ملازمة العنابيصية - مقلوبة قليلة الاسناخ القرصية غير حسكية او ذات ٢ حركات إلى ٥ . العرف مجنوم القمة دوسين إلى ٤ - أيار وحريران - من حلب إلى البقاع وشرقيها ١٠. *O. cornuta*, L. الأنوبريخس القرني ٢٤ لدلي ملازم الغاء منشبيب . الشوك متفرع وفروعه ٢٠٠٥ متر إلى ٢٠٣ طولاً . الوريقات زوجان إلى ٤ خطية - رحيمة . الزناد قليلة الأزهار . الكأس ثلث التوج الوردي طولاً وأكثر وخرقها رحيمة - مخززية مثل أنبوبها طولاً تقريباً . القرنة ضعف الكأس طولاً نصف - مستديرة حادة بلا حرك غير متساوية الاسناخ القرصية كاملة العرف ضيقته - الصيف - قم لبنان وجبل الشيخ

١١. *O. Ptolemaica*, Del. الأنوبريخس البطولي 2٤ ناعم الوبر . السوق قصيرة متصاعدة . الوريقات ٤ أزواج إلى ٨ مستطيلة او اهليلجية مستملمسة من الأعلى . الراسيات طويلة كثيرة الأزهار . الكأس اقل من نصف التوج طولاً وخرقها ضعف أنبوبها طولاً . التوج اصفر مخطط خطوطاً سمراء . القرنة مستديرة صوفية سنية النرص ذات ابروصيقة العرف حسكية - الربيع - بادية النيه وسبنا ومصر

١٢. *O. Girardinotii*, Boiss. الأنوبريخس ككلياردو 2٤ منفرج الور . السوق قصيرة منتصبه . الوريقات ٥ أزواج إلى ٦ بيضية كاله لمساء من الأعلى ملازمة الغاء من الأسفل . الزناد ضخمة . الراسيات طويلة . خرق الكأس مثل أنبوبها طولاً . التوج اصفر مخطط بارجواني . القرنة صوفية بيضاء قصيرة الأبرعد القرص وقليلها والعرف ضيق قصير الأسنان - أيار - من تدمر إلى دمشق ١٣. *O. auranziaca*, Boiss. الأنوبريخس البرتغالي 2٤ السوق ضخمة . منفرجة الشعر او منعققة . الوريقات ٤ أزواج إلى ٧ بيضية او مستطيلة ٢٠٣ متر إلى ٢٠٤ طولاً كاله حوية لمساء من الأعلى ومستملمسة من الأسفل . الراسيات طويلة . خرق الكأس مثثة - مخززية القمة أطول قليلاً أنبوبها . التوج برتغالي غير مخطط ٢٠١٥ متر إلى ٢٠٣ طولاً . القرنة لبيدية وحافتها ذات تحدباد

قصيرة مثثة وسخ قرصها المركزي أكبر قليلاً من البنية - الربع - من انطاكية وجبل اللكام الى عيتاب وبين النهرين

lanata, Post. ب. الصوفي. ملازم الغناء. صوف القرص طويل ينحني الاسناخ والابر تقريباً

- عيتاب (O. galegifolia, Boiss.)

١٤. O. hemicycla, Bl. الانوبريغس النصف - دائري 24 منفرج الوبر. الساق

نجيل منتصب. الوريقات ٨ ازواج الى ١٠ بيضية - مقلوبة ٢٠٠٥ متر الى ٢٠٠٨ طولاً ملازمة الوبر على الوجهين. الراسيات قصيرة قليلة الازهار. خرق الكاس ضعف انبوعها طولاً. القرنة نصف دائرة (مشابهة لشكل ١١٨ هيئة) ملازمة الغناء بلا حسك ذات سخ الى ٢ وابر قليلة عند القرص وعريضة العرف مسنته - الربع - من بياره فاضل بين حماه وتدمر الى بلدان

٤٣ العاقول ALHAGI, Desv.

الكاس جرسية قصيرة الاسنان. العلم بيضي - مقلوب والمجناحن منجليان والرووق مخنن تدريجياً اطول من المجناحن قليلاً. السداة العلمية سائبة. المبيض جالس تقريباً كثيراً البويضات. العلم خيطي مخنن. السمة صغيرة انتهائية. القرنة ضخمة اسطوانية مستوية مخننة بين البزور قلادية - شجيات كثيفة الفروع ذات شوك ناشي من الابطاط واوراق بسيطة كاملة وذنبات مخززية منفصلة

A. Maurorum, D. C. ١. عاقول المغاربة - الخراعيب والشوك دقيقة وناعمة الغناء.

شكل ١٣٤



قرتان من عاقول

الجمال. ب. الاتراك

الاوراق مستطيلة - بيضية - مقلوبة ملازمة الزغب. الكاس ملازمة الزغب. المبيض حريري. القرنة قليلة الغناء او مستملسة ضخمة اسطوانية واحياناً مضطربة الاختناق بين البزور - الصيف - اماكن جافة. كثير الوجود

A. Camelorum, Fisch. ٢. عاقول الجمال (الحاج) ٥

الخراعيب والشوك ضخمة قصيرة الغناء ثم مستملسة. الاوراق بيضية - مقلوبة - مستطيلة. الكاس مستملسة. المبيض اماس. القرنة ملساء مستقيمة المحافة العليا ومخننة السفلى واحياناً ذات بزرة واحدة فقط - الصيف - اماكن جافة

في سورية

Turcorum, Boiss. ب. الاتراك. اسنان الكاس حادة - دمشق الى بيروت

٤٤ الحبص Cicer, L.

انبوية الكاس منفردة او ذات حدة واسنانها رمجية حادة. العلم بيضي او مستدير. المجناحن

مستقلان. الفلم خيطي بلا لحم وإسمة انتهائية. الفترة منتفخة - اعشاب اورنجيات غدية - زغبية على الغالب وأوراقها ريشية - مفردة أو شعبة

١ - ٧. البورقات ٦ - ٧. *C. pinnatifidum*, J. et Sp. ١. الحبص الريشي المحرق ○ قزم. البورقات ٦ - ٧

اسفينية - بيضية - مقلوبة أو مستطيلة مسنة أو ريشية المحرق. الذنبات ريشية المحرق. التوجج بنفجي صغير. الفترة ٢٠١ متر طولاً و ٢٠٠٧ عرضاً. البزور مقلبة ذات حدين عند قاعدتها - الربيع - سورية وفلسطين

٢. *C. arifetinum*, L. الحبص الكبشي (القضامة) ○ الساق منتصب ٢٢ متر طولاً أو

أكثر. البورقات ٧ أزواج إلى ١٥ مستطيلة مسنة. الذنبات ذات خرقين أو ٢. التوجج ايضاً أو مرقق. الفترة ٢٠١٢ طولاً و ٢٠٠٨ عرضاً. البزور بيضية - مقلوبة كروية - الربيع - مزرع في جميع الاماكن ومنفلت من الزرع

٣. *C. ervoides*, Sieb. الحبص العدسي ٢٤ قزم. ام الجذور ضخمة والجذيعات مستدقة

عارية. البورقات ٢ أزواج إلى ٧ اسفينية مروحية المحرق. الذنبات مقصوفة أو مسنة. التوجج بنفجي. الفترة بيضية - مسينية ٢٠٠٨ متر طولاً و ٢٠٠٥ عرضاً. البزور بيضية - مقلوبة ناعمة الدرينات *Libanoticum*, Boiss. ب. اللباني. الذنبات مثل الرجيات طولاً - جرود لبنان

وتحت جرود

٤٥ الكرسنة VICIA, L.

قاعدة انبوبة الكاس غالباً منحرفة واسنانها متساوية أو غير متساوية. العلم مخروم أو مستطلي. الجناحان ملتصقان بالزورق. فم الغد السدوي منحرف. الفلم كله عفاً من الاعلى أو ذو حزمة شعر تحت قمتها نادراً أملس. السمة انتهائية. الفترة منضغطة كثر أو قل ذات بزرتين أو أكثر - اعشاب سنوية أو معمرة أوراقها ريشية - شعبة نادراً مفردة

* الازهار ١ أو ٢ جالسة تقريباً في الآباط ونادراً راسمية. نباتات سنوية

† الفترة غير مسنة الدرزين

‡ ندبة البزور مقابلة الجذر

o Noeana ٤ galeata ٣ sericocarpa ٢ lutea ١ hybrida V.

‡ ‡ ندبة البزور قريبة الجذر أو ملازمته

. الكاس قياسية

V. sativa ٦ angustifolia ٧ lathyroides ٨ cuspidata ٩

§ § الكاس غير قياسية

V. mollis ١ • peregrina ١١ Michauxii ١٢ Aintabensis ١٣

† † القرنة مسنة الدرزين

V. Narbonensis ١٤ serratifolia ١٥

** الازهار راسمية ونادراً مفردة ذات زناد كثر طولها او قل

† معبرة

V. Cassubica ١٦ canescens ١٧ Cracca ١٨ tenuifolia ١٩

† † سنوبة او احادية الاثمار

‡ التلم مفلطح

V. Cassia ٢٠ calcarata ٢١ varia ٢٢ villosa ٢٣ Palestina ٢٤

‡ القلم خيطي

V. Ervilia ٢٥ gracilis ٢٦

V. hybrida, L. ١. الكرسنة النغلية ٥ الورقيات ٥ ازواج الى ٧ بيضية-مقلوبة ومستطيلة

شكل ١٢٥



قرنة الكرسنة النغلية

مخرومة. الذنبيات نصف - طبرية ارجحية. خرق الكاس خطية -

رحمية مستقيمة والمخرقة السفلى اقصر من الانبوبة. التوج اصفر مخطط

بارجواني. العلم ملازم الغشاء. القرنة منعقفة مستطيلة - معينة وشعرها

غير درني القاعدة تقريباً - الربيع - مزارع سررية وفلسطين

V. Faba, L. ٢. الكرسنة الاصغراء ٥ مشعر. الورقيات

٥ ازواج الى ٨ مستطيلة - خطية او خطية كالة. الذنبيات مثلبة-مقلوبة

منشعبة الى خرقين. خرق الكاس السفلى مخززية اطول من انبوتها

والارباع العليا قصيرة متغامزة الى الاجلي. التوج اصفر. العلم امس. القرنة

مستطيلة - معينة وشعرها ناشي ٢ من درنات - الربيع -

hirta, Boiss. ب. الب. الحوية. السوق منتصب. التوج اصفر باهت او مائل الى

الارجواني - مزارع ساحل سورية البحري. النظر المصري

V. verticarpa, Fenzl. ٣. الكرسنة الكويرية الشمر ٥ ملازم الشعير. الورقيات

٥ ازواج الى ٨ مستطيلة - خطية مجذومة او مخززية حورية. الذنبيات نصف - طبرية والسفلى منها

ذات سنينات عند قاعدتها . خرق الكاس رحيمة - مخزنية مستقيمة والخرقة السفلى مثل الانبوبة طولاً .
التويج اصفر . العلم املس . القرنة مدلاة مستطيلة ملازمة المحرر وقواعد الشعر غير درنية - الربيع -
مزارع سورية وفلسطين

microphylla, Boiss. ب . الصغيرة الورق . الوريقات صغيرة اسطوانية - قلبية - مقلوبة .

الكاس لبادة وسنبا السفلي نحو نصف انبوتها طولاً - من حلب الى دير عطية وإلى الشرق
٤ . *V. galeata*, Boiss. . الكرسنة الخوذية (العديسة) ⊙ السوق مخططة متعرشة .
الوريقات ٤ أزواج الى ٦ اسطوانية - بيضبة - مقلوبة او مستطيلة عريضة انحرمت متصاغرة . الراسيات
ذات زهرتين الى ٤ . خرق الكاس السفلي عريضة القاعدة مخزنية القبة اقصر قليلاً من انبوتها والاربع
العليا مثلبة متغامزة الى الاعلى . العلم املس . القرنة مستطيلة ويريدة ملساء - الربيع - مزارع سورية
وفلسطين

٥ . *V. Noeana*, Reut. . الكرسنة الذيمانية ⊙ السوق منتصبه قليلة التعرش . عنم الاوراق
قصير . الوريقات ٥ أزواج الى ٦ خطية كالة او مخرومة حوية . الذنبيات نصف - طيرية او متشعبة .
الراسيات قصيرة الزند ذات زهرتين الى ٤ . الكاس ارجوانية وخرقتها السفلى ثلث انبوتها طولاً والاربع
العليا اقصر مقيهة الى الاعلى . التويج اصفر مسمر ثم نحاسي . القرنة ملساء مستطيلة - الربيع - حول
عينتاب وشمالها

٦ . *V. sativa*, L. . الكرسنة المزروعة (الباقية) ⊙ منتصب او متعرش قليلاً . الوريقات
٦ أزواج او ٧ بيضبة - مقلوبة او مستطيلة كالة او مخرومة . الذنبيات نصف - طيرية مسننة او مخروقة
ونادراً كاملة . الكاس نصف التويج البنفسجي طولاً وخرقتها متساوية مثل انبوتها طولاً . القرنة صفراء
زغبية او مستمسة مسرة خطية معقنة - الربيع - المزارع . مزروع لعلف الخيل

٧ . *V. angustifolia*, Roth. . الكرسنة الضيقة الورق ⊙ السوق منتصبه او متعرشة .
الوريقات ٤ أزواج الى ٧ والسفلى منها بيضبة - مغاربة مخرومة والبقية او الكل خطية مخرومة واحدة .
الذنبيات نصف - طيرية مسننة - مخروقة . الكاس ثلث التويج البنفسجي طولاً وخرقتها مستقيمة متساوية
ومثل انبوتها طولاً . القرنة مسيرة او مسودة خطية - الربيع - مزارع سورية وفلسطين ومصر . ويرشح
كونه تباين من المتقدم ذكره

albiflora, Boiss. ب . البهضاء الزهر . الازهار بيضاء - مزارع فلسطين وبحيرة مصر .
cordata, Boiss. ت . القلبية . أكثر الوريقات قلبية - مقلوبة او اسطوانية مخرومة - من حلب

amphicarpa, Boiss. ث. المحاط الثمر. الوريقات اسفينية او خطية - قصيرة. بعض

الفروع السفلى ستولونية عارية حاملة ازهار عديمة التويج وقرون بيضاء احياناً بيضية ذات بذرة واحدة - فلسطين قرب غزة

٨. *V. lathyroides*, L. الكرسنة اللثيرية © منفرج الخمل قليلة. السوق سافلة.

الاوراق منتحية بسبل او غنمة قصيرة. الوريقات زوجان الى ٤ بيضية - منقوبة - مستطيلة او مستطيلة مجذومة او مخرومة او حادة حوية. الذنبات نصف - سهية كاملة. الازهار صغيرة. اسنان الكاس مستقيمة مثل انبوبتها طولاً. الفترة ٢.٠٢ متر طولاً خطية مستقيمة حوية - الربيع - جرد حدث في لبنان

٩. *V. cuspidata*, Boiss. الكرسنة النابية © عفائي. السوق قزمة متصاعدة. العنم قصير

بسيط او مزدوج. الوريقات ٤ ازواج او ٥ بيضية - منقوبة او اسفينية او خطية مخرومة نابية. الذنبات نصف - بيضية او نصف - سهية مسننة. الازهار اكبر ما في السابق ذكره. اسنان الكاس مستقيمة مثل انبوبتها طولاً. الفترة ٢.٠٢ متر طولاً خطية منحنية قليلاً ذات منقار منحن - الربيع - من الجبل الشرقي الى جنوبي غزة

١٠. *V. mollis*, Boiss. et Haussk. الكرسنة الناعمة © ناعم الوبر. السوق سافلة.

الاوراق منتحية بعنمة بسيطة او حمة. الوريقات ٤ ازواج الى ٦ اسفينية او اسفينية - خطية مخرومة حوية. الذنبات نصف - سهية كاملة. الكاس وبرية وخرقتها السفلى نصف انبوبتها طولاً والاربع العليا اقصر منقبة الى الاعلى. التويج اصفر مسمر. الفترة ٢.٠٢ متر طولاً مستطيلة ووبرها ملازم غير درني الناعمة - الربيع - حلب

١١. *V. peregrina*, L. الكرسنة المرتحلة © متعرش ملازم الزغب. السوق نحيلة.

الاوراق ذات عنم. الوريقات ٢ ازواج الى ٧ خطية مجذومة او مخرومة حوية. الذنبات صغيرة مثثة - منقوبة متشعبة شعبتين مخزنتين. الكاس ملازمة العناء وخرقتها السفلى مثل انبوبتها طولاً والاربع العليا اقصر منها منقبة الى الاعلى. التويج ارجواني. الفترة مستطيلة ٢.٠٢ متر طولاً وفتحها منقبة الى الاعلى - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

١٢. *V. Michauxii*, Spreng. كرسنة ميشو © ملازم الزغب متعرش. العنم متعرج.

الوريقات ٥ ازواج الى ٧ خطية مجذومة القنة او مخرومة حوية. الذنبات صغيرة نصف - طرية. الكاس ملازمة العناء وخرقتها السفلى اقصر من انبوبتها والاربع العليا منقبة الى الاعلى. التويج مصفر. العلم ملين مخطط خطوطاً حمراء. الفترة مستطيلة ملازمة الزغب. البزور ٢ او ٣ عدداً ٢.٠٠ متر طولاً او اكثر - الربيع - حلب وشرقيها

١٣. *V. Aintabensis*, Boiss. et Haussk. الكرسنة العيتابية © ملازم الزغب أو مستمسك متعرش. العنق قصير. الوريقات ٥ أزواج الى ٧ مثلية - مقبولة أو خطية مخرومة. الذنبيات نصف - طبرية أو مثلية متشعبة أو رحيمة. الكاس عفائية عصبية وخرقتها السفلى مثل انبوتها طولاً والأربع العليا متجهة الى الأعلى. التويج اصفر املس. الفترة مستطيلة - معينة حادة. البزور ٥ الى ٦ عدداً و ٢.٠٠ متر طولاً - الربيع - من عيتاب الى بيروت

١٤. *V. Narbonensis*, L. الكرسنة الناربونية (النعمانة البرية) © منفرج الغطاء. الساق ضخيم متعصب. الاوراق السفلى ذات زوج واحد بلا عنق وريقاتها بيضيه - مقبولة والعليا ذات زوجين الى ٣ وعنق وريقاتها اهللجية كاملة. الذنبيات كبيرة نصف - مستديرة. الزناد ذات زهرة الى ٢. التويج ارجواني. الفترة خطية. البزور مستوية - الربيع - في المزارع. كثير الوجود

١٥. *V. serratifolia*, Jacq. الكرسنة المنشارية الورق © كثير الشعر. الساق ضخم. الاوراق السفلى ذات زوج واحد بلا عنق والعليا ذات زوجين الى ٣ وعنق والوريقات بيضيه - مقبولة واهللية مسننة من قاعدتها أو متصفاً. الذنبيات نصف - بيضيه مسننة. الزناد ذات زهرة الى ٥. التويج ارجواني. الفترة خطية. البزور حبيبية السطح - الربيع - المزارع. والأرجح انه تباين من المتقدم ذكره

١٦. *V. Cassubica*, L. الكرسنة الكسوية 24 املس أو ناعم الغطاء. الجذر زحاف. الساق متعرش متعرج. العنق متفرع. الوريقات كثيرة مستطيلة أو اهللجية - خطية كالة. الذنبيات نصف - طبرية كاملة. خرق الكاس السفلى مثل انبوتها طولاً والأربع العليا قصيرة جداً. التويج بنفسجي. الفترة معينة ذات برة أو ٢ ولاثرة شاغلة نلت محيط البزرة - الصيف - جبل اللكام

١٧. *V. canescens*, Labill. الكرسنة المستشبية 24 كثيف الصوف وكثير السوق متعصبها. الاوراق ريشية - مفردة ونادراً للعليا منها عنق قصير. الوريقات ٨ أزواج الى ١٢ خطية - اهللجية كالة او حادة. خرق الكاس متساوية تقريباً. التويج اسمانجوني. الفترة مستطيلة حادة الطرفين عفائية - الصيف - قم الميزاب في جبل مكل

١٨. *V. Cracea*, L. الكرسنة كراكا 24 ملازم الغطاء. الوريقات مستطيلة وخطية ٩ أزواج الى ١٢. الذنبيات نصف - مهيمة وخطية - رحيمة. الراسيات مسترسلة كثيرة الازهار. الكاس عفائية نلت التويج طولاً وخرقتها السفلى مثل انبوتها طولاً تقريباً والأربع العليا اقصر متجهة الى الأعلى. صفيحة العلم مثل مخالبه طولاً. الفترة مستطيلة - الربيع - اثنت شمالي سورية

١٩. *V. tenuifolia*, Roth. الكرسنة النحيلة الورق © ملازم الغطاء. السوق مبرزة متبسة

عالية متعرشة. الوريقات رحيمة او خطية ٩ ازواج الى ١٠. الذنبات نصف - طبرية. الراسيات مندمجة. الكاس اقل من ثلث التويج طولاً وخرقتها السفلى اقصر من انبوبتها والاربع العليا صغيرة جداً متغامزة. صفيحة العلم ضعف محلب طولاً. الفترة مستطيلة - خطية - الصفيحة - لبنان والجبل الشرقي stenophylla, Boiss. ب. الصفيحة الوريقات. الراسيات مسترسلة. الوريقات خطية - شمالي سورية الى لبنان والجبل الشرقي

٣٠. *v. Cassia*, Boiss. الكرسة الاقريقية © مستمس او قصير العناء. السوق غضة متعرشة. العنق منفرج. الوريقات ٦ ازواج الى ٧ متباعدة اهليلجية - خطية مجذومة القبة او مخروماتها. الذنبات صغيرة نصف - سهبية او رحيمة. الراسيات مسترسلة ذات ٥ ازهار او ٦. الكاس ربع التويج طولاً وانبوبتها محدبة. الفترة ملساء خطية - معينة ذات منفرج. الاثره ثمن محيط البذر طولاً - الصفيحة - غابات سفح الجبل الاقوى

٣١. *v. calcarata*, Desf. الكرسة المبهمة © قليل الزغب. السوق منتصبه او متعرشة واحياناً غليظة. الوريقات ٥ ازواج الى ٨ خطية - مستطيلة او خطية كاله. الراسيات قصيرة قليلة الازهار والزناد احياناً ذات سبل. الذنبات صغيرة نصف - طبرية كاملة. الكاس ثلث التويج طولاً. الفترة خطية مستطيلة - الربيع - مزارع مصر cinerea, Boiss. ب. الرمادية. رمادي الزغب. الوريقات خطية. الازهار والفرون اصغر ما في الرمز - من دمشق الى غزة والى الشرق

٣٢. *v. varia*, Host. الكرسة المتنوعة © او © ملازم العناء. السوق مستثلثة او متعرشة. الوريقات ٦ ازواج الى ٨ خطية او مستطيلة كاله او حادة. الراسيات كثيرة الازهار او قليتها. الكاس محدبة. الفترة ٢٠١ متر طولاً مستطيلة - معينة - الربيع - ساحل سورية البحري ٣٣. *v. villosa*, Roth. الكرسة الوبرية © او © متفرق الوبر. السوق متعرشة. الوريقات ٨ ازواج الى ١٠ خطية او مستطيلة - خطية كاله او حادة. الذنبات نصف - سهبية او رحيمة. الراسيات كثيرة الازهار مسترسلة. الازهار ١٢. ٢٠ متر طولاً. الفترة مستطيلة - خطية ١٥ ٤٠ متر الى ٢٠٢ طولاً ذات ٦ بزور - الربيع - مزارع سورية وفلسطين. وربما هو تباين من المتقدم ذكره

٣٤. *v. Palaestina*, Boiss. الكرسة الفلسطينية © ملازم العناء. الوريقات ٥ ازواج الى ٩ خطية حادة. الذنبات نصف - طبرية ورحيمة. الزناد ذات زهرين الى ٥. الازهار ٢٠٠ متر طولاً. الفترة ٢٠١ متر طولاً مستطيلة - معينة والبزور ٢ الى ٣. الاثره ربع محيط البذر طولاً - الربيع - صخور سورية وفلسطين

٢٥. *Vicia Ervilia*, L. الكرسنة ارثيليا (الكرسنة) © ملازم الرغبة. السوق

متنصة متفرعة متبسة. الاوراق متبسة بسبل. الوريقات ٨ ازواج الى ٢ مستطيلة - خطية كالة او مخرومة. الذنبات نصف - طبرية هلبية الاسنان. الزناد ذات زهرتين الى ٤ وسبل. اسنان الكاس مخروزة مثل انبوبتها طولاً. الفترة ٠.٢ متر الى ٠.٤ طولاً قلادة ذات ٢ بزور الى ٤ - الربيع - مزروع - في كل سورية وفلسطين

٢٦. *V. gracilis*, Loisel. الكرسنة الدقيقة © مستجلس. السوق نخيلة متعرشة بعن.

الوريقات ٣ ازواج الى ٥ خطية او اهليجية - مستطيلة. الذنبات نصف - طبرية كاملة. الزناد خيطية ذات زهرتين الى ٥ وسبل. اسنان الكاس متساوية تقريباً اقصر من انبوبتها. الفترة ٠.١ متر طولاً ٥٠٠.١ عرضاً خطية ذات ٥ بزور الى ٦ - الربيع - ساحل سورية البحرية

٤٦ العدس *ERVUM*, L.

خرق الكاس متساوية تقريباً. العلم يضي - مغلوب. الجناحان ملتصقان بالزروق. ثم الانبوبة السدوية مغرف. وجه القلم العلوي لحوي والسفلي امس. الفترة قصيرة ذات بزرة او ٢ - اعشاب سنوية

١. *E. Lens*, L. العدس عدس © زغبي. الاوراق العليا ذات عنم. الوريقات ٥ ازواج الى ٦ خطية ومستطيلة. الذنبات رُحمية كاملة. الزناد مثل الاوراق طولاً ذات زهرة الى ٢ وسبل. خرق الكاس مثل التوبج طولاً. التوبج ايض مخطط خطوطاً بنفسجية. الفترة ٠.٠٦ متر طولاً و ٥٠٠.٥ عرضاً بيضية - معينة ملساء. البزور عدسية - الربيع - مزروع في كل المشرق ومثلت من الزرع

٢. *E. Orientale*, Boiss. العدس الشرقي © ملازم الفناء. السوق متنصة او متصاعدة.

الاوراق متبسة بسبل او عنم. الوريقات ٢ ازواج الى ٦ اهليجية - خطية. الذنبات مستطيلة - رُحمية كاملة. الزناد ذات زهرة الى ٢. التوبج اسماخجوني. الفترة بيضية - مغلوبة - معينة ٠.١ متر طولاً - الربيع - من حلب الى بيروت. وادي النيل

٣. *E. Lentianum*, Schreb. العدس عديسة © ملازم الزغب. السوق نخيلة متنصة.

الورقة متبسة بسبل او عنم بسيط. الوريقات زوجان الى ٤ اهليجية او مستطيلة او خطية. الذنبات كاملة او مسننة القاعدة. الزناد سرحاء او حموية ذات زهرة او ٢. التوبج اسماخجوني. الفترة ٠.٠٨ متر طولاً بيضية - مغلوبة - معينة زغبية - الربيع - من دمشق الى لبنان وطرابلس وجبل الطور

٤٧ الثيرس *LATHYRUS*, L.

ثم انبوبة الكاس مغرف على الغالب . العَلَم يضي - مغلوب - عريض او مستدير . الجناحان ملتصقان قليلاً بالزورق . ثم انبوبة الاسدية قياسي . الفلم متضخم من الاعلى وحرفته العلوي مفلطح وملتح وبقيته ملمساء . والفرقة خطية مفلطحة كثيراً وقل - اعشاب سنوية او معمرة اوراقها ريشية - شفعية او نادراً مفردة والرجيلة ذات عزم ونادراً ذات سبله وقد تكون عديدة الوريقات . وكثيراً ما تتنازع انواعه بعضها الى بعض بحيث يعسر تمييزها

* الرجولات السفلى بلا وريقات شبيهة باوراق والعليا ذات وريقات

L. Ochrus ١

* * كل الرجولات بلا وريقات شبيهة بعنم

L. Aphaca ٢ *stenolobus* ٢

* * * كل الرجولات بلا وريقات شبيهة باوراق

L. Nissolia ٤

* * * * كل الرجولات ذات وريقات

+ نباتات احادية الاثمار سواء كانت سنوية او محولة

‡ القرون ملمساء

L. annuus ٥ *Hierosolymitanus* ٦ *Cicera* ٧ *amœnus* ٨ *stenophyllus* ٩

marmoratus ١٠ *sativus* ١١

‡ ‡ القرون ملمساء ذات شعر قليل

L. erectus ١٢

‡ ‡ ‡ القرون ذات اهداب

L. blepharicarpus ١٣

‡ ‡ ‡ ‡ القرون درنية - عنائية

L. chrysanthus ١٤ *chloranthus* ١٥ *hirsutus* ١٦

+ نباتات معمرة

L. tuberosus ١٧ *pratensis* ١٨

١ *L. Ochrus*, L. . الثيرس او خرّس ٢ املس مستغبر . السوق مستليفة او متعرشة

ذات اجنحة. الرجلات السفلى ورقية عريضة بلا وريقات ذات ذنبات مستطيلة وعمم والعليا ذات ورقة الى ٥ بيضيه. الزناد سرحا ذات زهرة واحدة اقصر كثيراً من الورقة. خرق الكاس مثلية - رحيمة مثل انبوتها طولاً تقريباً. التويج اصفر باهت. القرنة مستطيلة وحافتها العليا ذات جناحين عريضين. البزور ٥ - ٧ كروية لمسا - الربيع - حنول الساحل الجبلي وسفح الجبال في سورية

L. Aphaca, L. ٢. اللثريس افكا. (شوارب البسينة) Ⓞ املس مستغير. السوق

شكل ١٣٦



مستطيلة او منصاعة ذات زوايا. الذنبات كبيرة بيضيه مجذومة القاعدة ذات اذنبات طبرية. الزناد اطول من العم ذات زهرة واحدة. خرق الكاس رحيمة - خطية حادة ضعفا انبوتها طولاً. التويج اصفر. القرنة خطية مقلية. البزور بيضيه مفلطحة قليلاً لمسا - مخضرة وندبتها بيضيه - الربيع - في الحنول. عام في سورية ومصر

biflorus, Post. ب. الثنائي الزهر. بعض الزناد ذات زهرتين.

الذنبات بيضيه - مستديرة او كالة. انبوة الكاس ثلثا خرقها طولاً - كسب.

صردة بقر بمجرة الحولة

marmoratus, Post. ت. المرخم. خرق الكاس اقل من ضعفي قرنة اللثريس افكا

انبوتها طولاً. البزور متلخ بسواد. الندبة مستطيلة - بيروت (*L. polyanthus*, Boiss. et Bl.)

L. stenolobus, Boiss. ٢. اللثريس الضيق القرنة Ⓞ املس او ملازم الغناء قليلة.

السوق مستدقة منشرة ذات زوايا. الذنبات رحيمة - مستطيلة حادة ذات اذنبات طويلة حادة عند قاعدتها. الزناد طويلة جداً ذات زهرة واحدة. خرق الكاس رحيمة مثل انبوتها طولاً. التويج اصفر. القرنة مستقيمة خطية ضيقة. البزور صغيرة مستطيلة مفلطحة قليلاً وندبتها مستطيلة - حزيران - غابات الجبل الاقرب

L. Nissolia, L. ٤. اللثريس نسوليا Ⓞ املس اوزغي قليلاً. السوق نخيلة منية متصبية

بسيطة الذنبات صغيرة جداً مخززية. جميع الرجلات شبيهة باوراق خطية - رحيمة سرحا بلا وريقات. الزناد خطية ذات زهرة او نادراً ٢ اقصر من الرجلية. خرق الكاس قليلة الغناء خطية - مخززية غير متساوية مثل انبوتها طولاً. التويج محمر ضعفا الكاس طولاً او اكثر. القرنة خطية طويلة ذات اعصاب طويلة وعناء ناعم ملازم. البزور ١٢ - ١٨ بيضيه ثؤلولية - الربيع - حنول لبنان والجبل الشرقي الى علو

٣٠٠٠ متر

٥. *L. annuus*, L. الثيرس السنوي ⊙ املس . السوق منصاعة ضيقة الاجنحة من الاعلى . الذنبات نصف - سهبية ضيقة جدًا اقصر من الرجلية والرجلية ذات جناح ضيق . الوريقات زوج خطية - رمحية مدببة . الزناد اقصر من الاوراق ذات زهرة صفراء او ٢ . خرق الكاس عريضة القاعدة رمحية مثل انبوبتها طولاً . التويج اصفر . اقترنة مفالطة خطية مستقيمة ملساء مشتبكة الاوردة منزلة المحافة العليا ذات ٦ بزور . البزور ذات زوايا ودرنات كبيرة وتندبها مستطيلة - الربيع - الحقل من حلب الى ارض بشارة

٦. *L. Hierosolymitanus*, Boiss. الثيرس القدسي ⊙ املس . السوق منصاعة والرجليات عريضة الاجنحة . الذنبات نصف - سهبية مخززية وغالبًا اقصر من الرجلية . الوريقات زوج خطية - رمحية . الزناد اقصر من الورقة ذات زهرة او ٢ . خرق الكاس مثثة - رمحية مدببة مثل انبوبتها طولاً . التويج وردي . القترنة غديدية في الاول ثم ملساء مفالطة مشتبكة الاوردة خطية وحافتها العليا ذات ٣ حيازيم . البزور ٦ - ١٠ غير منتظمة الغضون مستطيلة الدبة - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

Cassius, Post. ب. الاقري . اجنحة السوق ضيقة . الذنبات احيانًا قصيرة . البزور كبيرة الدرنات - مزارع سورية (*L. Cassius*, Boiss.)

٧. *L. Cicera*, L. الثيرس تششير ⊙ املس . السوق منصاعة ذات اجنحة ضيقة . الذنبات نصف - سهبية رمحية مثل الرجلية طولاً والرجلية ذات جناح ضيق . الوريقات زوج واحد رمحية - خطية حادة . الزناد اقصر من الورقة ذات زهرة واحدة ومنفصل اعلى منتصفها . خرق الكاس رمحية اقل من ضغفي انبوبتها طولاً . التويج احمر . القترنة مستطيلة ٢.٢ متر طولاً مشتبكة مفالطة الاوردة ملساء ذات ٤ بزور واقل وحافتها العليا مستقيمة ذات ميزاب وجناحيت ضيقين . البزور ملساء ذات زوايا وتندبها بيضة - الربيع - مزارع سورية وفلسطين ومصر

٨. *L. amoenus*, Fenzl. الثيرس المبعج ⊙ املس . السوق منشرة ضيقة الاجنحة . الذنبات نصف - سهبية مستطيلة - رمحية وحيانًا اطول من الرجلية المحففة . الوريقات زوج واحد مستطيلة - رمحية حادة . الزناد مثل الورقة طولاً تقريبًا ذات منفصل قرب طرفها وزهرة واحدة . خرق الكاس رمحية مدببة ضعف انبوبتها طولاً . التويج اصفر - محبر . القترنة خطية منضغطة مشتبكة الاوردة ذات ٥ بزور الى ٨ وحافتها العليا ذات ٣ حيازيم - الربيع -

١. *typicus*, Post. الرمزي . التويج ٢.١ متر طولاً . الوريقات خطية - رمحية - مزارع سورية

grandiflorus, Post. الكبير الزهر. التويج ٢٠١ متر طولاً أو أطول من ذلك. الوريقات

رحمة - مستطيلة - مع الرمز

stenophyllus, Post. ت. الضيق الورق. الوريقات خطية. اخنجة السوق عريضة -

مع الرمز. وادي النيل وربما النوع مع تباينات تباينات النوع السابق وربما ينضم النوع الآتي للتباين الأخير

L. stenophyllus, Boiss. et Held. ٩. الليثوس الضيق الورق © املس. السوق

زاحنة متعددة خطية ذات زوايا جاحية. الذنبيات نصف - سهبية رحمة - خطية مثل الرجلية طولاً أو

أطول منها. الوريقات زوج واحد خطية حادة. الزناد مثل الأوراق طولاً ذات زهرة واحدة أو أطول

منها ذات مفصل قرب طرفها. خرق الكاس رحمة - خطية حادة مثل انبوتها طولاً. التويج ٢٠٠٧ متر

طولاً ارجواني - بنفسجي ولون العلم اقم. الفترة ملساء مفلطحة خطية ذات اوردة مضخلة و ٤ بزور او و

وحافتها العليا محدبة قليلاً ذات ٢ حيازيم. البزور ملساء مفلطحة قليلاً مصفرة - الربيع - مواضع

عشبية في الساحل البحري ولبنان والجبل الشرقي وسهل الشام

L. marmoratus, Boiss. et Bl. ١٠. الليثوس المرخم © املس. السوق نحيلة

منشرة ضيقة الاخنجة. الذنبيات نصف - سهبية مستطيلة او رحمة مثل الرجلية طولاً. الوريقات زوج

رحمة - خطية حموية. الزناد اقصر من الورقة ذات زهرة واحدة ومفصل تحت قمتها. الكاس ملساء

وخرقها ضعف انبوتها طولاً. التويج وردية - بنفسجي باهت. الفترة ٢٠١٦ متر طولاً مفلطحة ملساء.

خطية - معبئية ذات اوردة مضخلة وحافتها العليا محدبة قليلاً ذات جناحين ضيقين. والبزور ٢ - ٤

ملس كروية مفلطحة بلطح صدائية وسود وتنبها بيضيه - اول الربيع - اماكن رملية في ساحل سورية

البحري ولبنان، الاسكندرية

L. sativus, L. ١١. الليثوس المزروع (الجلبان) © املس. السوق زاحنة او متعشدة

ذات اخنجة ضيقة. الذنبيات نصف - سهبية - رحمة اقصر من الرجلية والرجلية ذات جناح ضيق.

الوريقات زوج واحد رحمة - مستطيلة او رحمة. الزناد اقصر من الورقة غالباً ذات زهرة واحدة ومفصل

قرب قمتها. خرق الكاس ضعف انبوتها طولاً. التويج ٢٠١ متر طولاً وردي - مزرق او مبيض. الفترة

٢٠٢ متر طولاً مفلطحة مستطيلة ملساء مشبكة الاوردة قليلاً ذات ٤ بزور او اقل وحافتها العليا منحنية

ذات جناحين. البزور ملساء صفراء منضغطة ذات زوايا - الربيع - بين المزروعات او مزروع في

القباقومصر

stenophyllus, Boiss. ب. الضيق الورق. الوريقات اضيق ما في الرمز خطية - بين

المزروعات بقرب حلب

١٢. *L. erectus*, L. اللبيري المنتصب ⊙ املس او عنائى قليلاً. السوق منتصبه نحيلة

ذات زوايا. الذنبيات نصف-سهبية-رحمية. الرجلية قصيرة جدًا منتبهة بسيلة قصيرة مستقيمة رحمية ومخيلة. الوريقات زوج واحد باسبة خطية-رحمية حادة. الزناد سرحاء ذات زهرة واحدة ومفصل اقرب قاعدتها وهي مثل الرجلية طولاً واقصر منها. خرق الكاس رحمية-مخرزية مثل انبوبتها طولاً. التويج مزرق ٢٠٠٨ متر طولاً اطول من الكاس. الفترة ٢.٤ متر طولاً خطية تحت اسطوانية مثبتكة قليلاً لمساء او عنائية قليلاً وقنفاً مخفية قليلاً. البنور كروية تقريباً مجذومة قليلاً لمساء-الربيع-المنزروعات حول حلب. يبروت. القدس

١٣. *L. blepharicarpus*, Boiss. اللبيري الجفني الثمر (الحليينة) ⊙ منفرج

العفاء. السوق منتشرة ضيقة الاجنحة. الذنبيات نصف-سهبية-رحمية مثل الرجلية طولاً تقريباً. الرجلية ذات سبول او عثم. الوريقات زوج واحد اهليجية-مستطيلة او رحمية-خطية. الزناد مثل الاوراق طولاً ذات زهرة واحدة. خرق الكاس رحمية مدببة ممدبة اطول من انبوبتها. التويج ٢٠١ متر طولاً ارجواني. الفترة ٢.٢ متر طولاً ٢٠٠٨ متر عرضاً لمساء ممدبة المحافن وحافنها العليا ذات جناحين عربضين ورقين. البنور ٢-٤ كروية سوداء غير بارزة الدرنات-الربيع-مزارع سورية وفلسطين. ويلتذ الاولاد بأكل بزور هذا النوع الحلو

١٤. *L. chrysanthus*, Boiss. اللبيري الذهبي الزهر ⊙ قصيرة النحبة. الساق كثير

النوع ضيق الاجنحة. الذنبيات صغيرة نصف-سهبية خطية-رحمية اقصر كثيراً من الرجلية والرجلية ذات جناحين. الوريقات زوج واحد رحمية-مستطيلة جونية حموية ذات ٥ اعصاب الى ٧. الزناد سرحاء اطول كثيراً من الاوراق ذات زهرتين او ٣. الكاس ملازمة العفاء وخرقها رحمية-مثلثة مثل انبوبتها طولاً تقريباً. التويج ٢٠١ متر طولاً ذهبي املس. الفترة خطية نحو ٢.٣ متر طولاً مخفية قليلاً مندرنة-عنائية ولا سما على المحافن ذات ٦ بزور الى ١٠-الربيع-يقرب بملك

١٥. *L. chloranthus*, Boiss. اللبيري الاخضر الزهر ⊙ منفرج العفاء. ام المجذور

زاحفة. السوق مطولة متكئة ذات اجنحة ضيقة. الذنبيات صغيرة رحمية-خطية والسفلى منها نصف-سهبية اقصر كثيراً من الرجلية والرجلية ضخمة ذات جناحين ضيقين. الوريقات زوج واحد كبيرة اهليجية-مستطيلة كالة ذات ٣ اعصاب. الزند بطول الورقة او اطول منها ذو زهرة وناذر ٢ وسيلة طويلة. الكاس مندرنة عنائية وخرقها رحمية-مثلثة مدببة اطول قليلاً من انبوبتها. التويج ٢.٢ متر طولاً تقريباً اخضر-مصر والعلم عنائى من الخارج. الفترة ٢.٣ متر طولاً او أكثر خطية مفلطحة مندرنة-عنائية مستقيمة تقريباً. البنور ذات درنات صغيرة-توز-الجبال يقرب مرعش

١٦ *L. hirsutus, L.* . الثيرس العفائي ⑤ قليل الغناء . السوق متعرشة ذات اجنحة ضيقة . الذنبيات نصف - سهمية . الرجلية منتهية بعنق منفردة . الورقات زوج واحد رحيمة - خطية أو مستطيلة . الزناد ضعفا الورقة إلى ٢ اضعافها طولاً ذات زهرة إلى ٢ وسيلة . خرق الكاس مستطيلة مدبية مثل انبوبتها طولاً . التويج ارجواني - مزرقي باهت . القرنه ٢٠٢ متر طولاً متفتحة خطية مستقيمة تدترن - مشعرة . البزور ثلثية زبدتها قصيرة مستديرة - الصيف - مزارع مصر

١٧ *L. tuberosus, L.* . الثيرس البضاقي 2f املس مستغبر . ام الجذور زاحفة مجهزة ببضايض كبيرة . السوق مستطيلة او متعرشة ذات زوايا . الورقات زوج واحد اهليلجية . الذنبيات نصف - سهمية - رحيمة بطول الرجلية والرجلية قصيرة بلا اجنحة ذات عنق طويلة . الزناد اطول من الورقة ذات ٢ ازهار إلى ٦ . خرق الكاس غير متساوية والسفلى منها مثل انبوبتها طولاً والعليا اقصر مثلثة . التويج ارجواني . القرنه ملساء خطية - مستطيلة متفتحة مشبكة الاوردة . البزور مضطحة الدرنات - اول الصيف - بين الانجم في الجبال حول مرعش

١٨ *L. pratensis, L.* 2f املس او ملازم الغناء . ام الجذور زاحفة . السوق قصيرة متعرشة ذات زوايا . الورقات زوج واحد رحيمة مدبية ذات ثلثة اعصاب . الذنبيات كبيرة رحيمة - مستطيلة ذات زائدتين غير متساويتين عند القاعدة . الرجلية مثل الذنبيتين طولاً بلا اجنحة . الزناد اسرح اطول كثيراً من الورقة . الازهار ٤ - ١٠ منفردة . خرق الكاس رحيمة - مخروزة اطول قليلاً من انبوبتها . التويج اصفر . القرنه ٢٠٢ متر طولاً ملساء او ملازمة الغناء سوداء خطية مخفية قليلاً عند قمتها ذات اوردة مخرفة . البزور كروية ملس - الصيف - تحت الجرد في مقاطعة الحجة في لبنان

٤٨ الأروبس *OROBUS L.*

انبوبة الكاس منمندة قليلاً عند قاعدتها وفيما منحرف قليلاً . العلم بيضي - مقلوب - عريض او مستدير . الجناحان ملتصقان قليلاً بالبحرثوم . فم انبوبة الاسدية متساو . الفم خطي او منضخم من الاعلى غير مبروم ووجهه العلوي ملتصق طولاً وبقيته ملساء . القرنة خطية مقلطية - اعشاب معبرة اوراقها ريشية - شعبة ونادراً مفردة والرجلية عادية العلم منتهية بسيلة مستقيمة

١ *O. serrillifolius, Sibth. et Sm.* . الأروبس الجالس الورق 2f املس . السوق منصاعدة ذات زوايا . الاوراق السفلى مركبة من زوجين من الورقات والعليا من زوج ٢ وفي خطية او رحيمة او مستطيلة حادة . الرجلية قصيرة جلتاً او مقنودة تقريباً . الذنبيات نصف - سهمية - رحيمة . الزناد دقيقة اطول كثيراً من الاوراق ذات ٥ ازهار إلى ١٠ . خرق الكاس متساوية تقريباً رحيمة انصر

قليلاً من انبوتها. التوج ارجواني. الثمرة خضبة - مستطيلة مستدقة القاعدة وقمتها مخبئة قليلاً حادة - الربيع - اماكن مخبئة وغابات في لبنان والجبل الشرقي وجبال مواب

٣ *O. hirsutus, L.* الأورويس العفائي 24 ناعم الوبر او مستمس. السوق متصاعدة مخبئة ذات زوايا. الوريقات زوج اهليجية حادة او مدببة بطول الرجلة تقريباً. الذنبيات بيضية مدببة ذات اذنية عند قاعدتها ومثل الوريقات مساحة. الزناد ذات زهرتين الى ٥ اطول قليلاً من الاوراق. خرق الكاس متساوية تقريباً رمية مدببة هدية ضعف انبوتها طولاً. التوج بنفسجي. الثمرة ملازمة العناء خضبة حادة مخبئة قليلاً - ابارو حزران - غابات جبل اللكام والجبل الاقصر ولبنان

٢ *O. grandiflorus, Boiss.* الأورويس الكبير الزهر 24 امس. السوق منتصبه مستقيمة ذات زوايا. الوريقات ٢.٤ متر طولاً واكثر و ٢.٢ متر عرضاً واكثر ٢ ازواج او ٤ وقد تكون العليا منها مفردة ورجلاتها قصيرة عفائفة ووجها السفلي لماع وهيئتها بيضية او بيضبة - مستطيلة حادة او مدببة قليلاً. الذنبيات مستطيلة - سهمية مدببة ذات سنيينات عند قاعدتها. الزناد اطول قليلاً من الاوراق ذات ازهار كثيرة. الكاس ملساء وخرقها غير متساوية. التوج كبير اصفر - مبيض جاف مستسمر. الجناحان اقصران قليلاً من المحزوم. الثمرة خضبة ملساء مستدقة تدريجياً قرب قمتها - الصيف - الغابات بقرب بيلان واهدن

٤٩ البرّلا *PISUM, L.*

انبوبة الكاس مخرفة القاعدة. العلم بيضي - مغلوب او مستدير. الجناحان ملتصقان بالمحزوم. ثم انبوبة الاسدية متساوية. وجه القلم السفلي محزوم - مئزب والعلوي لحوي. الثمرة خضبة مفلطحة كثر او قل - اعشاب سنوية او معمرة اوراقها ريشية - شنيعة ورجلاتها ذات سبل او عثم

١ *P. sativum, L.* البرّلا المزروعة (البسلة) ٢ امس مستغير. الذنبيات بيضبة - نصف - قلبية مسننة بغير انتظام عند قواعدها بطول الزناد والزناد ذات زهرة واحدة على الغالب. الوريقات زوجان او ٢ بيضبة او اهليجية. الازهار يضاء. الثمرة ٢.٦ متر طولاً واكثر. البذور كروية ملساء - الربيع - يزرع في كل موضع وقد يبلت من البساتين

٢ *P. arvense, L.* البرّلا الحقلية (البسلة) ٢ امس مستغير. الذنبيات بيضبة - نصف - قلبية مسننة بغير انتظام عند قواعدها. الزناد اطول من الذنبية ذات زهرة واحدة على الغالب. الوريقات زوجان او ٢ بيضبة. الازهار مزرقه والجناحان ارجوانيان غامقان. الثمرة ٢.٦ متر طولاً واكثر. البذور ملساء ذات زوايا - الربيع - الساحل البحري وقد يزرع

٣. *P. elatius*, M. B. البزلا العليا ⊙ املس مستغبر. السوق مستلفية. الذنبات بيضية نصف-قلبية مسننة بغير انتظام عند قواعدھا. الزناد ضعفا الذنبية او ٢ اضعافها طولاً ذات زهرة الى ٣. الوريقات زوجان او ٢ بيضية او اهليجية كاملة. الازهار كبيرة ارجوانية-بنفسجية وجناحاها ارجوانية غامقة. البزور كروية محببة سنجابية مطلخة لثماً سماء-الربيع-اماكن نجمية في الساحل البحري ولبنان *serratum*, Post. ب. المتشارية. السوق سافلة. الوريقات مسننة او جونية. الزناد اطول قليلاً من الذنبات - بيروت. بعلبك. بلودان

humile, Post. ت. السافلة. السوق منخفضة متعرجة. الزناد بطول الذنبات او اطول منها قليلاً. الازهار صغيرة. العلم باهت اللون. الفترة ٢٠٢ متر طولاً الى ٢٠٣ - اماكن صخرية بقرب عيتاب وحب. النهر المحاصبي (*P. humile*, Boiss. et Noe.)

٤. *P. fulvum*, Sibth. et Sm. البزلا البرشاء ⊙ املس مستغبر. السوق نحيلة متعرجة الذنبات بيضية او مستديرة نصف-قلبية مسننة عند قواعدھا او على كل محيطها او مقصوفة. الوريقات زوج الى زوجين ونادراً ٣ بيضية-مستطيلة. الزناد اطول قليلاً من الذنبات ذات زهرة او ٢. الازهار صغيرة صفراء. العلم مخروم او ذو فصين. الفترة ٢٠٢ متر طولاً الى ٢٠٣. البزور كروية سوداء خلية-كاذبة منقطة فنوطاً صغيرة-الربيع-اماكن صخرية في سورية وفلسطين *incisum*, Post. ب. المتقصوفة. السوق نحيلة. الذنبات والوريقات كبيرة الاسنان او مقصوفة - بيروت

٥. *P. forficatum*, Stev. البزلا الجعيلة 26 املس تقريباً. ام الجذور نحيلة طويلة ذات جنوع خطية عريانة تحت الارض منتبجة بسوق قصيرة بسيطة زاحفة. الذنبات نصف-بيضية-سهبية اقصر كثيراً من الرحلة. الوريقات زوج واحد ٢٠١ متر طولاً واضحة الاوردة بيضية-مقلوبة كاملة حوية. الرحلة منتبجة بسيطة. الزناد ضعف الورقة طولاً ذات زهرة واحدة. التولج كبير محمر عند جفافه. الفترة ٢٠٢ متر طولاً الى ٢٠٣ ملءاء. البزور بيضية لمساء-الصيف-ثم لبنان فوق الارز

٥. الماش VIGNA, Savi.

سناً الكاس العلويان ملصقان. العلم مستدير مجهز عند قاعدتيه بأذيتين مخبئتين. الجناحان مئيحيان اقصر قليلاً من العلم. المحزوم مخنٍ بلا منقار او متين بمنقار قصير مخنٍ. المبيض ذو بويضات عديدة. الفلم ذو لحية طويلة من الاعلى. الفترة خطية اسطوانية تقريباً منفصلة بين البزور-الشمثفة اوراقها ذات ٣ وريقات مجهزة بذنبات صغيرة جداً. الازهار مجمعة عند قمة الزناد الابطية

V. Nilotica, Del. الماش النيلبي ٢٤ زغبي. الوربقات بيضة مديبة. الزناد اطول من الاوراق. الكاس قصيرة واسنانها مثلثة مديبة. النويج اصفر-مخضر. القرنة ملازمة الغشاء اسطوانية مقلطحة قليلاً متدلية. البنورسمر متلطيخ بلطخ سوداء - اباروحرران - اماكن رطبة في ساحل سورية البحري وبحرية مصر

٥١ الريخوسيا *RHYNCHOSIA*, Lour.

خرقما الكاس العلويتان ملتصقتان كثر او قل. العلم بيضي - مقلوب - مستدير مجهز عند قاعدته باذينات مخنية. الجناحان ضيقان. الحنوروم مغني القمة. المبيض ذو بويضتين او بويضة واحدة. الفلم مغني والسمة صغيرة انتهائية. القرنة مقلطحة ذات مصراعين غير منفصلة بين البنور - النجم لافة مستطيلة اوراقها ذات ٢ وربقات وازهارها في راسيات ابطية *R. Memnonia*, L. الريخوسيا المهنونية ٢٤ مستطلي الخراعيب خجلي مبيض او حريري. الوربقات بيضة - مقلوبة - معينة. الراسيات اطول من الاوراق. الكاس عفاية منقطة بغديلات وخرقتها رحيمة مثل انبويتها طولاً. النويج اصفر والعلم وردي عفاي. القرنة ملازمة الغشاء بيضة - مقلوبة - مستطيلة مخنية قليلاً. البنور اهليجية صفراء - الشتاء - ارض الصعيد

٥٢ الكسيا *CASSIA*, L.

انبوبة الكاس قصيرة جداً. السيلات والثلثات متراكبة. الاسدية ٥ او ١٠ منفصلة والثلثات العليا منها اصفر من البقية عاقرة. الاثنيبرات مرتكزة على قاعدتها وتنفخ بمسامتين عند قمتهما. القرنة مقلطحة غير مشققة ذات حواجز - النجم اوراقها ريشية - شفعية *C. obovata*, Collad. ١ الكسيا البيضية - المقلوبة (الغيرية. السنا المكى) ٢٤ السوق عشية متصاعدة. الوربقات ٤ ازواج الى ٧ بيضة - مقلوبة كانه. الذنبات رحيمة مستمرة. الراسيات مسترسلة اطول قليلاً من الاوراق. القرنة منجلية كالة الفاعة والقمه وحافتها السفلى ذات جناح عريض - كانون الثاني الى اذار - اودية سينا. ارض الصعيد *C. lanceolata*, Forsk. ٢ الكسيا الرحيمة (السنا المكى) ٢٤ السوق متصاعدة عشية نكرياً. الوربقات ٢ ازواج الى ٧ مستطيلة - رحيمة او رحيمة حادة. الذنبات مستمرة مخززية. الراسيات اخيراً اطول من الاوراق. القرنة ملءاء او ملازمة الغشاء قليلته اهليجية - مستطيلة مخنية قليلاً كالة الطرفين ذات جناح عريض - من ٢ الى اذار - ارض الصعيد بقرب اصوان

٥٣ الخرنوب CERATONIA, L.

الازهار ذات مسكنتين. انبوبة الكاس بلبلية قصيرة واسنانها ٥ ساقطة. البتلات مفقودة. الاسدية مستقلة وخويطاتها طويلة وانثيراتها متقلبة. الفترة خطية ضخمة مخنثانية مفلطحة غير منشقة منقسمة من الداخل بين البزور ببرازخ لية محنوية على مادة سكرية—شجرة اوراقها ريشية—شغوية وازهارها صغيرة محبرة *C. Siliqua, L.* الخرنوب الخرنوبي (الخرنوب) ٦ بلاشوك وريثانه بيضبة—مقلوبة مخنثانية. الراسيات قصيرة محبرة على الاغصان المحولة منفردة او باقية. الفترة عريضة خطية ضخمة عند الدرزين—الصيف—الساحل البحري والجبال الى علو ٨٠٠ متر في سورية وفلسطين

٥٤ الزمرريق CERCIS, L.

الكاس جرسية مخرفة قليلاً ذات ٥ اسنان عريضة قصيرة. البتلات ٥ شبيهة بالفراشية غير ان العلم محاط ببقية البتلات. الاسدية منعققة منفصلة. المبيض دوسويقة مستفل في قعر الكاس. الفترة مفلطحة رقيقة—اشجار اوراقها كاملة وازهارها وردية اللون مربعة في راسيات قصيرة على الاغصان العتية *C. Siliquastrum, L.* الزمرريق الخرنوبي ٦ املس. الاوراق مستديرة قلبية القاعدة ذات رجيلات واعصاب كثية. الجناحان والمخندوم معادلة طولاً والعالم اقصر منها. الفترة طويلة خطية ودرزها العلوي ذو جناح ضيق—الربيع والصيف—اماكن صخرية في الساحل البحري ولبنان وفلسطين

٥٥ الجنبوط PROSOPIS L.

الازهار غالباً جالسة. الفترة ضخمة مفلطحة مخنثانية—اسفنجية محبوزة من الداخل بين البزور—اشج حسكية اوراقها ريشية—ثنائية وسنابلها اسطوانية *P. Stephaniana, Willd.* الجنبوط الاسفنجاني ٦ الحسك قليل مخروطي. الخراعيب والرجيلات زغية. الرياش ٤ ازواج الى ٥ والورينات ٥ ازواج الى ١٢ صغيرة خطية—مستطيلة زغية من الاسفل. السنابل اطول من الاوراق. المبيض املس. الفترة بيضبة—مستطيلة ضخمة مخنثية قليلاً او غير منتظمة—الصيف—مواضع محجرة من مرعش الى فلسطين

٥٦ الميموسا MIMOSA, L.

الكاس صغيرة. البتلات مخنثة كثرا وقل مصراعية. الفترة مستطيلة او خطية وفي الاكثر مفلطحة

وينفصل المصراعان من الحافة المحيطة بالمنهرة وهما منتشان الى تقاصيل - النجم ذات اوراق ريشية - ثنائية
M. polyacantha, Willd. • الميوسا الكثيرة الحسك ♂ هلي لحوي ذوا بر منقعة.
 الرياش ٨ أزواج الى ١٠ والوريقات خطية كثيرة الأزواج. الزناد اقصر كثيراً من الورقة. الرووس
 كروية والعليا منها في راسيات قصيرة. الأزهار رباعية الاجزاء. الكاس طويلة مغزوقة - هدية. القرنة
 خطية - مستطيلة كالة هلبة لحوية - الشتاء - النظر المصري

٥٧ السنت ACACIA, Willd.

الكاس جرسية او ذات ٥ سبلات. البتلات غالباً متحدة كثر او قل. الاسدية متباعدة. القرنة مخنلة
 الهية اسطوانية او مفلطحة مستقيمة او ملتوية - النجم او اشجار ذات اوراق ريشية - ثائية
 * الأزهار في رووس كروية

A. Nilotica ١ *spirocarpa* ٢ *tortilis* ٣ *Seyal* ٤ *Ehrenbergiana* ٥ *Farnesiana* ٦

** الأزهار سنبلية

A. albidula ٧ *laeta* ٨

A. Nilotica, Del. ١. السنت النيل ♂ الحسك الذي طويل مستقيم ابنوسي وفي الاغصان
 الزهرية غير كامل او مفقود. الرياش من ٤ أزواج الى ٨ والوريقات ١٥ زوجاً الى ٢٧ زغبية خطية كالة
 مستقيمة. الزناد ذات فلوس يقرب منتصفها او اعلى منه. القرنة ملساء طويلة مفلطحة قلادية وتماصليها
 معينة - مستدبرة - الشتاء والربيع - طورينا. وادي النيل

A. spirocarpa, Hochst. ٢. السنت اللولي الثمر ♂ ٥ متر الى ١٥ علواً. الحسك
 الذي زغبى مخفف الهية بعضه طويل مستقيم والبعض الآخر قصير اعنف قليلاً. الاوراق عنفاة -

شكل ١٢٧



قرنة السنت المعروف

لبادية والرياش من ٥ أزواج الى ١٠ والوريقات ١٠
 أزواج الى ١٥ صغيرة مستطيلة - خطية كالة. الزناد
 ذات فلوس تحت منتصفها. التربة صوفية خطية لولية
 مخنلة بين البزور طولها ٢.٤ متر الى ٢.١٢ - الربيع -
 قفراض الصعيد بقرب البحر الاحمر

A. tortilis, Hayne et Schweinf. ٣

السنت المفلوف (شجرة السبال) ♂ الحسك
 الذي املس بعضه طويل مستقيم وما يتخلله صغير اعنف.

الأوراق ملمس والرياش زوجان الى ٦ والوريقات ٥ أزواج الى ١٢ مستطيلة-خطية كالة. الزناد ذات فلوس الى منتصفها. القرنة خطية مفلطحة معقدة لمساء لولية كثراو قل ذات اعصاب بارزة-الربيع-أودية سينا. قفر مصر. اصوان

ineimis, Post. ب. بلا شوك. الفروع قليلة الحسك. الثرون عريضة قليلة الاختناق بين

البنور-شجرة قد تبلغ حجم الخرنوبة في اودية سينا. ومنها شجرة كبيرة في وادي فيران

٤. A. Seyal, Del. السنط السيال الحسك طويل افقي ابنوسي ونادراً مفنود. الأوراق

زغبية او ملمس والرياش ٢ أزواج الى ٥ والوريقات ٨ أزواج الى ١٢ مستطيلة-خطية حادة قليلاً.

الزناد ذات فلوس ساقطة تحت منتصفها. القرنة لمساء خطية مخجلة مخنقة بين البنور مدينة الطرفين

ولاسما عند الطرف السائب-الربيع-الاقصر واصوان. ورجح كونه تباين من السابق ذكره

٥. A. Ehrenbergiana, Hayne. et Schweinf. سنط ايرنبرغ (الزرم) الشوك

مستدق طويل افقي وقد يكون مفنوداً. الأوراق صغيرة زغبية او ملمس والرياش زوج او زوجان

والوريقات ٨ أزواج الى ١٠ صغيرة مستطيلة-خطية كالة. الزناد ذات فلوس ساقطة تحت منتصفها.

القرنة لمساء خطية مخجلة مخنقة بين البنور حادة-الربيع-قناراض الصعيد وشاطي البحر الاحمر.

وربما هو أيضاً تباين من السنط الملفوف ٢

شكل ١٢٨



السنط الفارنيزياني

٦. A. Farnesiana, Willd. السنط

الفارنيزياني (العنبر. القرظ) الشوك

قصير. قم الخرا عيب وكل الرجالات والزناد زغبية.

الرياش ٥ أزواج الى ٨ والوريقات ٥ أزواج الى ٢٠ خطية

لمساء. الرؤوس ابطة وكثيراً ما يكون اثبات في ابط

واحد زنادها غير متساوي الطول. القرنة اسطوانية

مستدقة الطرفين ولاسما الرأس مخجلة كثراو قل غير

مخنقة بين البنور-الصيف-اماكن رطبة مستوطنة في المشرق من جزيرة سينت دومنكو في الهند

الغربية

١. A. albidia, Del. السنط المبيض الشوك الاغصان بيضاء لمساء. الحسك مخروطي متين

مستقيم واحياناً مفنود. الأوراق لمساء مستقيمة. الرياش ٤ أزواج او ٥ والوريقات ٧ أزواج الى ١٢

مستطيلة مخرفة كالة. السنابل مسترسلة اطول من الورقة. القرنة مفلطحة قليلاً غليظة بيخانية لية

ملتوية كثراو قل على هيئة لولب بسيط-آخر الشتاء-الوعدة جنوبي جبل. قرب صلا. ارض الصعيد

٨. *A. Isela*, R. Br. السط البهج ٥ ملمس مستغير. الحسك قصير اعقف قليلاً أو مفود. الرياش زوجان الى ٣ متباعدة. الوريقات ٣ أزواج الى ٥ وفي ٢٠٠٧ متر الى ٢٠١ طولاً أسفينية مستطيلة منحرفة كالة. السنايل نوامية تقريباً ابضية بطول الاوراق. الكاس جالسة تقريباً مسنة - منصفة نصف التويج طولاً. القرنة مستطيلة وغالباً خليجية مسددة القاعدة حادة القبة او كالتها غشائية لمساء - الشتاء - اصوان

٥٨ الألبتريا *ALBIZZIA*, Durazz.

الكاس جرسية او انبوية مسنة. التويج فقي والبتلات متحدة اعلى منتصفها. القرنة خطية عريضة مستقيمة ملفطية رقيقة غير منشقة او ذات مصراعين بدون لب والمصراعان غير مرتين وغير ملفوفين *A. Lebbek*, L. الألبتريا اللبخ (اللبخ) ٥ بلا شوك قليل الزغب. الرياش زوجان الى ٤ والوريقات ٦ أزواج الى ٨ مستطيلة ٢٠٢ متر طولاً نصفها غير متساوين. رؤوس الازهار كروية ذات زناد ومجموعة في عنقود انتهائي. القرنة ملفطية ٢١٥ متر الى ٢٢٥ طولاً و ٢٠٢ الى ٢٠٣ عرضاً ذات سوقية صغيرة وطرفها السائب نابي - الشتاء - مزروع في جهات وادي النيل

الرتبة السادسة والثلاثون الوردية *ROSACEÆ*.

الازهار قياسية وغالباً خشوية. انبوبة الكاس مستقلة او ملتصقة بالمبيض وهدبها ذو ٥ اسنان. البتلات بعدد تقاسيم الكاس مندغمة على حافة القرص الذي يبطن انبوبة الكاس وقد لا توجد. الاسدية مستقلة مندغمة مع البتلات وغالباً غير محدودة وقد تكون محدودة. التبريات ١ او اكثر مستقلة او متحدة وملتصقة كثر او قل بانبوبة الكاس ذات غرقة واحدة وبويضتين مقلوبتين. البزير بلا البيومن - اعشاب او الخم او اشجار اوراقها مترادفة او نادراً متفابلة ذات ذنبات. وتضمن هذه الرتبة جانباً عظيماً من الاثمار اللذيذة الطعم كالتفاح والاحاص والمشمش والدراقن والخوخ والكرز والفرولا وكثير غيرها السبط الاول. اللوزيات *AMYGDALÆ*. الكاس مستقلة ساقطة ذات ٥ اقسام.

الشمر نووي او جوزي - الخم او اشجار

١. *Amygdalus*. الازهار جالسة تقريباً. الشمر نووي خضراء تستقبل عند نضجها الى جوزية

٢. *Cerasus*. الازهار جالسة او ذات زناد اوراسمية. الشمر نووي ملمس بلا غبرة

٣. *Prunus*. الازهار ١ او ٢ من برعم واحد ذات زناد. الشمر نووي ملمس مكسب بقشرة


السبط الثاني. العليقيات. **Rubee.** الكاس منفردة. الثمرات عديدة مستقلة عن الكاس مندغمة في تحت محذب او مخروطي او مستطلي. الاثمار نووية (شكل ١٢٩ د د)

٤. **Rubus.** العليق المهود وهو نجمة حسكية ذات ازهار وردية واثمارها كبوش

السبط الثالث البوتنتليات. **Potentillee.** فصوص الكاس غالباً ذات فلوس. الثمرات غير محدودة تكون ففريات مندغمة على ظاهر التفح. القلم قاعدي او نائشي. من نصف الثمرة (شكل ١٢٩ ب ت ث)

٥. **Geum.** القلم مستمر عنائى. التفح المثير جاف. الاوراق ريشية-مقصوفة
٦. **Fragaria.** القلم مستجف. التفح المثير لحمي صالح للاكل. الاوراق نفلية
٧. **Potentilla.** القلم مستجف. التفح المثير جاف. الاوراق اصبعية او نفلية او ريشية

شكل ١٢٩



ب. نوات الفرولا. ث. نصف زهرة منها بعد نزع البتلات ترى فيها لاندغام الاسدية في الكاس وانتفاخ التفح الذي يحمل على سطحه الففريات. ث. ففيرة واحدة مع قلبها الجانبي النائشي من قاعدتها. ج. غصن من العليق. د. الثمر. ذ. ذلك مقطوع طولاً ترى ان التفح مستطلي والاثمار نووية. ح. مقطوع الدواة المحنوبة على البذر الذي يري فيه اللفطان الكبيران. خ. زهرة نوع تريب للدلان مكبرة. ر. ثمرة ترى انه مكثف بالكاس الخالدة لككة ليس يلتصق بها. اما البزرة فنهلاً القفيرة

السبط الرابع. البليات **POTERIEE.** انبوبة الكاس جوية وفيها متقارب الانغلاق. المثلثات احياناً مفقودة. السميرت ١-٢ مستقلة. القلم انتهائي والسمعة متسعة. الفتحات محاطة بانبوبة الكاس (شكل ١٢٩ ر)

۸. *Alchemilla*. بلا پتل. الاسدية ۱-۴. الکاس ذات ۸ خرق

٦. Agrimonia. البتلات ٥. الاسدية ١٥. الكاس هلبية ذات ٥ خرق

١٠. **Poterium**. الأزهار مزوجية. الاسدية ٢٠ - ٣٠. الكاس ذات ٤ خرق

السبط الخامس. الورديات. **ROSEAE.** انبوبة الكاس جرتة فيها منفارب الانفلاق.


الفئيرات محاطة بأنبوبة الكاس اللحمية عند فئجها (شكل ١٤٠ ا ب ت)

۱۱. Rosa. انجم حسکیہ اور اقما ریشیہ ازهارها بیضاء و صفراء اور ردیہ

السبط السادس. النيوراديّات. NEURADE L. الكاس مستعرة وانوبتها ملتصقة

بالتميزات بعد الابتسام

۱۲. Neurada. الاسدية ۱۰. الثميرات ۵-۱۰ دولية. النهر نصف-کروي. عتب



١. مقطوع عبودي من زهر الورد قبل انسامه . ب. ثمر الورد عند نصيبه . ت. ذلك مقطوع طولاً بظهر فيه القبرات مدغمة في الفرس المطس الكاس والاسدية المدغمة في حافته . ث. مقطوع عبودي من ثمر السعرج نرى فيه الكاس الخبيبة التي في الجرد المأكول من الثمر وداخلها قطعة من المبيض وفيها الثورور . ح. بررة واحدة مئة . ح. جنيها . خ. مقطوع النعاج عرصاً . د. غصن نوع من الاحاص عليه (ذ) رعم غير مفتوح (ر) رهرة مفتوحة (ز) ورقة

- السبط السابع. التفاحيات. **POMEÆ**. أشجار والنجم. انبوبة الكاس ملتصقة بالمبيض. المبرعني وغريفاة غشائية رقيقة او تفاحي وغريفاة قرطاسية او زعروري وغريفاة عجيبة
١٢. **Pyrus**. الثميرات ٥ غصروفية او غشائية محاطة بكاس لحمية. (شكل ١٤٠ ث)
١٤. **Sorbus**. الثميرات ٢-٥ تكون تفاحية صغيرة. الاقلام ٢-٥
١٥. **Crataegus**. الثميرات ١-٥ على هيئة عجات محاطة بكاس لحمية. اشجار اوراقها منضصة
١٦. **Cotoneaster**. الثميرات ١-٥ على هيئة عجات محاطة بكاس لحمية. النجم اوراقها كاملة

١ اللوز **AMYGDALUS, L.**

- النوعية خضراء تسحب الى جوزية عند نضجها. النواة ملساء او خشنة و احياناً ذات ثقب - النجم او اشجار صغيرة اوراقها مطوية في الربيع وازهارها جالسة تقريباً. والزناد المثمرة قصيرة ضخمة
١. **A. spartioides, Spach.** اللوز الوزالي ثاملس مترالى مترين علواً. الخراعيب ذات زوايا. الاوراق مستطيلة - رمحية حادة شرافية مستدقة الى رجلة. البتلات مستطيلة - ملوقية. النوويات ملساء تقريباً بيضية - مستطيلة حادة مفالحة قليلاً. النواة ذات حيزوم صغير مستوية بلا ثقب - الربيع - الجبال قرب مرعش. الجبل الغربي والبقاع
٢. **A. agrostis, Boiss.** اللوز البري ثاملس. الخراعيب اسطوانية. الاوراق رمحية شرافية - مسنة مستدقة الى رجلة قصيرة جداً الى حمة مخنقة قليلاً. النوية ملازمة الزغب بيضية - كروية حموية. النواة ذات حيزوم صغير مشبكة الاعصاب مسنوية تقريباً بلا ثقب - الربيع - حنول متروكة بين بعلبك وزحلة
٣. **A. communis, L.** اللوز العام ث بلا شرك. الاوراق مستطيلة او رمحية - مستطيلة غدية - شرافية رجليتها مثل عرض شترتها طولاً او اطول. النوية بضية مفالحة لبادية. النواة مستوية ذات ثقب وحيزوم - الربيع - الاقاليم المتوسطة من جبل الشيخ من ١٠٠٠ مترالى ٢٠٠٠
٤. **A. Orientalis, Ait.** اللوز الشرقي ث كثيف الفروع متشعباً مستشيكاً. الاوراق بيضية - مقلوبة او بيضية - مستطيلة كالة كاملة شباه على الوجهين مستدقة الى رجلة طولها مختلف. النوية بيضية او مستطيلة مفالحة قليلاً مدببة مستشبة ثم مستلسة. النواة ذات اوردة مضطحة وحيزوم صغير سطحيها بلا ثقب - الربيع - مرعش وعيتاب والجبل الشرقي
٥. **A. alba, Spach.** اللوز الموحيثي ث الفروع كثيرة ملساء يابسة متفرقة مشبكة القبة. الشراعيب رمادي. الاوراق خطية - رمحية ٢٠١ مترالى ٢٠٢ طولاً حادة مشبكة الاوردة

مستدقة القاعدة جالسة . انبوبة الكاس منتخفة قليلاً عند قاعدتها ٢ اضعاف خرقها طولاً . الاسدية اقل من ١٥ تندغم ١٠ منها في الحفرة وه اسفل ذلك قليل . النوية ٢٠١ متر طولاً بيضيه - مستطيلة مخيلة مقلطحة حموية . النواة مشبكة بلا ثوب مخزومة - الربيع - قرب عتتاب

٢ الكرز Cerasus, L.

النوية كروية لحمية غير منشقة ملساء بلا غبرة . النواة كروية تقريباً مضغنة او مستوية - اشجار او انجم اوراقها مطوية في الربيع

شكل ١٤١



زمرة الكرز مقطوعة طولاً

١ . *C. microcarpa*, C. A. Mey. الكرز

الصغير الشمر ٢ متر الى ٣ علواً . الفروع طويلة منتصبه .
الاوراق احياناً ٢٠٢ متر طولاً خضراء ملساء بيضيه كاله
ذات اسنان حادة والرجلة اقصر قليلاً من الشفرة .
الزناد غالباً اطول من الزهرة . خرق الكاس مستطيلة

اقصر من انبوبتها الملساء . البتلات ملوقيه - مستطيلة وردية مثل انبوبة الكاس طولاً . النوية اصغر
من البتلات بيضيه . النواة مستوية - الصيف - فوق زبدانة

٢ . *C. tortuosa*, Boiss. et Haussk. الكرز المتعرج ٢ متر علواً . الفروع منشعبه

ملتوية . الاوراق ٢٠٠٦ متر الى ٢٠٠٨ طولاً مستطيلة او اهليجية كاله ذات اسنان حادة ورجلات
قصيرة . الزناد مثل الكاس طولاً . خرق الكاس مثلثه - مستطيلة اقصر من انبوبتها الملساء . البتلات
ملوقيه - مستطيلة مستدقة القواعد وردية اطول قليلاً من انبوبة الكاس . النوية صغيرة بيضيه . النواة
مستوية - الصيف - صوفياغ

Colesyriaca, Post. ب . البقاعي . الفروع خضراء منفردة الوبير . الاوراق مستطيلة

٢٠٠٨ متر طولاً حادة الاسنان اطول من رجلاها زغبية . الازهار غالباً زوج ٢٠٠٧ متر طولاً اقصر
من زنادها . الكاس صينية متباعدة القاعدة وخرقها بيضيه مستديرة نصف انبوبتها طولاً . الثمر *** -
اول الصيف - قب الياس في البقاع . ثنقب فروعهُ وتستعمل لاصطناع الغلابين

٣ . *C. prostrata*, Lacill. الكرز الملتى (العنبيّة) ٢ مستلق . الفروع ملتوية منشعبه

مشبكة . الاوراق صغيرة بيضيه او بيضيه - مستطيلة او مستديرة حادة الاسنان قصيرة الرجلات لباديه
بيضاء من الاسفل . الازهار جالسة تقريباً . خرق الكاس مستطيلة كاله كامله او مسننه قليلاً ثلث الانبوبة
الملساء طولاً . النوية بيضيه - كرويه ملساء ٢٠٠٥ متر طولاً . النواة مفرية قليلاً - من نيسان الى آب -

اماكن صخرية من جبال بيلان الى جبال الناصرة من علو ٤٠٠ متر الى ٢٠٠٠
concolor, Boiss. ب. المتساوي اللون. الاوراق ملساء الوجهين - الجبل الابيض بين

حماه وتدمر

٤. *C. Mahaleb, L.* الكرز المحلب في الفروع منفرجة قليلاً. الاوراق ٢٠٢ متر الى ٢٠٣
 طولاً بيضية او بيضية - مستديرة مدببة قليلاً كالة الاسنان وقد تكون فلية القاعدة قليلاً. الازهار بيضاء
 مرتبة في كورنبات محدبة بسيطة. النوبة ٢٠٠٥ متر طولاً بيضية وكثيراً ما تكون ذات حمة - من
 نيسان الى حزيران - مرعش. دوما

اما الجمارك او الجمارك المزروع في بساتين سورية فيرجح انه نوع من الكرز

٢ الخوخ *PRUNUS, Tourn.*

النوبة لحمية غير منشقة مكتسية بغبرة. النواة بيضية - كروية مفلطحة قليلاً مضغنة او مستوية -
 اشجار او اثمارها ملثمة معاً في التبريع

١. *P. monticola, C. Koch.* الخوخ الساكن الجبل في بلاد شوك امس الا الرجالات
 وفي احياناً زغبية. الاوراق اهلجية مدببة قليلاً مسننة اسنينة القاعدة. الازهار ازواج. الزناد دقيقة مثل
 الثمر طولاً او اطول منه. النوبة ٢٠١ متر طولاً بيضية مفلطحة ذات حمة مخرفة - جبال شمالي سورية
 ٢. *P. ursina, Ky.* الخوخ الدثني (البرقوق. البرقوق) في الفروع متعصبه معوجة
 مستشكة. الخرايب خملية. الاوراق بيضية - اهلجية شراقة مستديرة القاعدة او مستديرة رجلياتها
 وسطها السنلي عفاية. الازهار منفردة. الزناد قصيرة جداً خملية. النوبة كروية قطرها ٢٠١٥ متر
 طولاً بنفسجة - حمراء - من ايار الى آب - لبنان والجبل الغربي من ١٠٠٠ متر الى ٢٠٠٠. اما ثمره فحامض
 جداً وقابض يكاد لا يؤكل

flava, Boiss. ب. المصفرة. النوبة صفراء - اماكن نجمية في اكرضاغ وصوفضاغ ولبنان

٣. *P. Cerasia, Bl.* الخوخ قرصيا (القرصيا) في الفروع ملساء واحياناً مستشكة.

الاوراق بيضية - مقلوبة اهلجية احياناً ٢٠٠ متر طولاً ملساء الا رجلياتها واصلها المتوسط متبشيرية. الازهار
 منفردة او ازواج. الزناد مثل الثمار طولاً. النوبة بيضية زرقاء - سوداء ٢٠١ متر طولاً او اكبر قليلاً
 حسن الطعم حامض - الربيع - يزرع في بساتين سورية. ويرجح انه نبات من الخوخ البيني

P. domestica, L. او الخوخ الدمشقي *P. Damascena, Auct.*

٤ العليق (الباطس) RUBUS L.

الكاس بلا فلوس وفصوصها مستمرة. الاسدية مندغمة مع البتلات الخمس في الكاس. الاقلام انتهائية تقريباً والسمة بسيطة اوراسية. الذويّات ذات بزرة واحدة وغلافها المتوسط لحبي ونواعها عظمية مغضنة والتمبرات مجمعة على هيئة كبوش (شكل ١٢٩ دد) - انجم حسكية تمتد غالباً بأشيايت سوفها مبرقة زاوية واوراقها مترادفة ذات ذنبيات وثلاثية المنشأ وريشة ذات ورققات وازهارها في عناقيد انتهائية

R. tomentosus, Borekh. ١. العليق اللبادي ث لبادي كثراو قل. الحسك قصير تحيل ثبلل الانحناء. الورقات خضراء وشبهاء من الاعلى وشبهاء من الاسفل بضية - معينية او مستطيلة - معينية. الرجلية ميزبة من الاعلى. التلات يضاء - الصيف - من اكرضاغ الى لبنان والجبل الشرقي والى الشرق

R. collinus, D. C. ٢. العليق التلي (بوكرتلن) عفائي. الحسك متين مخن. الورقات رمادية من الاعلى لبادية - شبهاء من الاسفل بضية - معينية او بيضية - مثلوبة. الرجلية مفلطحة من الاعلى. البتلات يضاء. الثمر صغير - الصيف - سورية وفلسطين

R. cuneifolius, W. et Nees. ٣. العليق المتلون ث خمل ارمستشيب. الحسك متين مخن. الورقات يضية - مقلوبة او مستدبرقو كثير اما تكون الانتهائية منها مستدقة فجأة. الرجلية محدبة قليلاً من الاعلى. البتلات وردية. الثمر كبير - الصيف - سورية وفلسطين ومصر. والارجح ان هذه الانواع الثلاثة تباينات نوع واحد وحبيها تنمو في اماكن صخرية جافة غير انها لا تنبرافاراً صالحة للاكل ولذينة الطعم الا اذا نبتت بقرب الماء

٥ الحجيم GEUM, L.

انبوية الكاس مقعرة او بلبلية ذات ١٠ اخرق مصطبة صفيين والخمس الخارجية اصغر من الداخلية. البتلات ٥. التخت اسطواناني - مخروطي باس. الثمبرات منتهية بعد الاتساق بالاقلام الطويلة العفائية او الملساء - اعشاب خالدة واوراقها مقصوفة - ريشية - منردية وقطعنها الانتهائية اكبر من البقية G. urbanum, L. ١. الحجيم المدني 2٤ الفروع غياء دقيقة. قطع الاوراق ٥ - يضية - مستطيلة مقصوفة - مسنة. الازهار منصبة. التلات صفراء اطول قليلاً من الكاس. حامل المبيض مقنود. التخت والتمبرات عفائية - ايار وحزيران - عنباب. فوق بيان. تحت جرد لبار.

٢. *G. heterocarpum*, Boiss. . الحبيوم المختلف الثمر 24 السوق متصاعدة متشعبة القمة. القطع الجانبية للأوراق الجذرية صغيرة والقطعة الانتهائية كبيرة كlobة قليلة. الأزهار منغضة قليلاً. التويج جري والبتلات بيضاء مصفرة أقصر من قطع الكاس المتصبية. حامل المبيض مثل انبوبة الكاس طولاً. الثميرات منفردة على هيئة كوكب - حزينان - تحت جرود لبنان والجبل الشرقي

٦ الفرولا FRAGARIA, L.

الكاس منفردة مخروقة الى عشر خرق مصطفة صفين والمخرق الخارجية اصغر من الداخلية. البتلات ٥. الاسدية عديدة. الثميرات متعددة مرتكزة في الفتح والفتح لحمي في الثمر. القلم جانبي ساقط - اعشاب خالدة اوراقها نغلية وازهارها بيض وام جذورها ذات ستولونات *F. vesca*, L. . الفرولا المأكولة 24 الرجبلات والزناد عنائية. كل الفتح حامل ثمرات - ابار - غابات الأبيزا على بيلان

٧ البوتنتلا POTENTILLA, L.

الكاس منفردة مخروقة الى عشر خرق مصطفة صفين والمخرق الخارجية اصغر من الداخلية. البتلات ٥ ونادراً ٤. الاسدية عديدة. الثميرات متعددة مندغبة في فتح محدد او مخروطي جاف. القلم جانبي قصير وقفي - اعشاب خالدة ونادراً النجم * معبرة

P. Libanotica 1 anserina ٢ hirta ٣ Kotschyana ٤ geranioides ٥ reptans ٦

** سنوية

P. supina ٧

١. *P. Libanotica*, Boiss. . البوتنتلا اللبنانية 24 عنائية - غدية. الجذع فخم وقمة حرشية. السوق قصيرة ورقية. الرجبلات الجذرية طويلة والساقية قصيرة والورقات ثلثية المنشأ بيضيه - مقلوبة من قاعدة اسفينية شرافية - منشارية. الأزهار في كورنبات مندجبة. خرق الكاس متساوية تقريباً بيضية - مثلثة - الصيف - جبال ارض لبنان

٢. *P. anserina*, L. . البوتنتلا الأوزية 24 السوق كراحية زاحنة متاصلة عند ركبها - الأوراق ريشية - منقطعة ذات ازواج كثيرة فضية - حريرية من تحت او على الوجهين والورقات ذات

اسنان حادة. الازهار منفردة في المركب ذات زناد طويلة. خرق الكاس الخارجية كاملة او مقصوفة بطول الداخلية البيضية المستطيلة تقريباً - الصيف - على قعر بحيرة يوتة بعد جفافها

٣. *P. hirta*, L. البوتنتلا العفائية 24 ذات شعر طويل منشتر ناشئ من درن وزغب قصير غير غدي. الفروع الزهرية انتهائية. الورقات كفية ذات شعر كثيف من الاسفل بيضية - مقلوبة - اسفينية مقصوفة - مسننة والساقية منها خطية - اسفيلية. الازهار كورنية. خرق الكاس رمية مدبية والخارجية منها اضيق من الداخلية. الثمرات ذات غضون مخفية محزومة مخززية - الربيع - *pedata*, Koch. ١. الرجلية. السوق مستطيلة. الورقات مسننة الى قرب قاعدتها - من

جبال طوروس الى الجبل الاقرق ولبنان

٤. *P. Kotschyana*, Fenzl. البوتنتلا الكوتشيانية 24 مشعر. السوق متصاعدة منشعبة تكون قية ورقية. الفروع الزهرية ابطية. الاوراق السفلى خماسية المشط والورقات بيضية - مقلوبة - اسفينية ذات اسنان كالة عند قتها. الاوراق العليا ثلثة المشط رمية او مستطيلة - اسفينية مقصوفة كثر اوافل. الزناد المقررة عفاء. خرق الكاس رمية متساوية تقريباً والخارجية منها كاملة او مخروقة الى خرقين او ٢ - الصيف - جبل اللكام

٥. *P. geranioides*, Willd. البوتنتلا الجوزانية 24 عنائية مستشبية. المجدوع صلبة حزمية مستطيلة. السوق قصيرة متكئة منشعبة قية ذات ازهار قليلة. الاوراق السفلى ذات رجلات طويلة والورقات سباعية المشط او خماسية مروحة مفصلة الى قطع خطية. خرق الكاس رمية حادة غير متساوية قليلاً - الصيف - قم لبنان والجبل الشرقي وجبل الشيخ

٦. *P. reptans*, L. البوتنتلا الدابة 24 ملازم العفاء قليلة. السوق كراجية مستطيلة مناصلة عند المركب. كل الاوراق ذات رجلات وخماسية المشط ونادراً سباعية والورقات اسفينية - بيضية - مقلوبة مسننة. الازهار ٢٠١ متر عرضاً الى ٢٠١٥ منفردة ناشئة من المركب طويلة الزناد. خرق الكاس الهليجة حادة متساوية تقريباً - ابار الى تموز - مواضع جافة. كثير الوجود في سورية *major*, Post. ب. الكبرى. الورقات ٢٠٢ متر الى ٢٠٣ طولاً. الازهار ٢٠٢ متر عرضاً.

السوق ضخمة - كسب. مرج دمشق

٧. *P. supina*, L. البوتنتلا الناعمة ٥ ملازم الزغب اخضر - باهت مستشيب. الفروع منشعبة كثيرة الاوراق زاحنة ونادراً متصبية. الاوراق السفلى ريشية ذات ٣ ازواج الى ٥ والعليا ثلثة المشط والورقات مستطيلة مسننة - مقصوفة. الزناد منفردة وازواج منعقة في الاثمار. خرق الكاس الخارجية رمية والداخلية بيضية حادة اقصر من الخارجية قليلاً واعرض. الثمرات مغمضة - من ك ٢ الى ابار

— مواضع رطبة في الديار المصرية

٨ الأَخِيمِيلَا *ALCHEMILLA, L.*

انبوبة الكاس جرسية تقريباً. وهدبها منصل الى ٨ خرق والمخارجية منها اقصر من الداخلية فتخلها. الاسدية ١ - ٤ مندغة في طوق خجيرة الكاس. الثمرات ١ - ٤ اقلامها جانبية. الثمرات ١ - ٢ غشائية مضمنة في الكاس - اعشاب معبرة او سنوية ازهارها صغيرة خضراء
A. vulgaris, L. ١. الأَخِيمِيلَا الاعْتِمَادِيَّة 2٤ الاوراق الجذرية كلوبة ذات ٥ فصوص الى ٩ نصف - دائرية حادة الاسنان - الصيف -

genuina, Boiss. ١. الحقيقية. خرق الكاس مثل انبوتها طولاً - عين الصواعير
A. arvensis, L. ٢. الأَخِيمِيلَا المَحَلِّيَّة ٥ السوق عديدة متصاعدة منخفضة. الاوراق صغيرة مروحية ذات ٣ فصوص اسفلية الناعمة مخروقة الى ٢ خرق او ٤. الاوراق الجذرية مستعفة بسرعة. خرق الكاس الداخلية بيضبة والمخارجية صغيرة شبيهة باسنان - الربيع - الساحل البحري في سورية

٩ الأَكْرِيْمُونِيَا *AGRIMONIA, L.*

الكاس بلبلية وهدبها مخروق الى خمس خرق تنقبض اخيراً وتحت الهدب حمك كثيف اعنف نام متصلب. البتلات ٥. الاسدية ١٥ مندغة مع البتلات في الحوبة حول خجيرة الكاس. الثمرات اثنتان والتم انتهائي. الثمرة واحدة لعدم باروغ الاخرى وهي مضمنة في الكاس المتصلبة - اعشاب خالدة عالية ازهارها مرتبة في راسيات سنبلية وذات فلبسات عند منتصف الزناد وعند الانثمار منعقفة
A. Eupatoria, L. الأَكْرِيْمُونِيَا اُوِيَا تَوْرِيَا 2٤ الجذر غير زاحف. الاوراق ريشية - متقطعة والوريفات الكبيرة اهليجية - مستطيلة مسنة والصغيرة بيضبة مسنة - الصيف - مواضع نجبية وحول في سورية

١٠ البَلَّان *POTERIUM, L.*

الازهار مزواجية. فاعة انبوبة الكاس ذات فلوس وهدبها ذو ٤ فصوص. الاسدية ٢٠ - ٣٠ مندغة في الحوبة الغدية المحيطة بخجيرة الكاس. الثمرات ٢ - ٣. القلم انتهائي. المسبة شبيهة بفرشاة كثيرة الخرق. البويضات عفاة. الثمرات ٢ - ٣ مضمنة في انبوبة الكاس - اعشاب خالدة او انجم ازهارها جالسة مرتبة في رؤوس او سنابل ولاثوية منها انتهائية والذكرية او الخنثوية سفلى

١. *P. villosum*, Sibth. et Sm. **البلان الوبري** 24 الورقات صغيرة عفاثة ذات اسنان طويلة حادة. **الرويسات** في راسيات عنقودية يابسة. **الفهر** صغير مستطلي ذو اربع زوايا مسطوحة مضحلة الغضون ذات زغب قصير اصفر - محمر - الصيف - قنر شمالي سورية بقرب اورفا

٢. *P. compactum*, Boiss. **البلان المدمج** 24 ام الجذور خشبية ينمو منها حزم مندحجة قطرها ٢-٤ متر الى ٢٠.٨. السوق متصاعدة مستدقة قصيرة ذات فروع قليلة من الاسفل فقط. الورقات صغيرة لمساء مفصولة - مسننة. **الرويسات** بحجم نصف حبة البنزلا ذات ازهار قليلة صغيرة. **الشعر** ٢٠٠١ متر طولاً اهليجي مستوي ذو زوايا كالة - تموز - تحت الجرد فوق زحلة مع الورد وندرون *Rhododendron Ponticum*. **البطي**

٣. *P. Gallardoti*, Boiss. **بلان كياردو** 24 الورقات لمساء غيراء طويلة الاسنان حادتها. **الرويسات** مرتبة في عنقود طويل راسمي. **الشعر** صغير اهليجي ذو اربع زوايا تكون اضلاعاً بيضاء مسطوحها ذات غضون سرية وحسك او بدون حسك - الصيف - مواضع صخرية جافة في جبل اللكام ولبنان والبقاع والجبل الشرقي

٤. *P. muricatum*, Spach. **البلان التوتويوي** ٥ الورقات مفصولة - مسننة. **الرويسات** عنقودية - كورنية. **الفهر** مستطلي ذو ٤ زوايا ممتدة الى اعراف جناحية كاملة تقريباً مسطوحة توتوية - عريفة - اول الصيف - شمالي سورية ولبنان

٥. *P. verrucosum*, Spach. **البلان الشولوي** 24 **الرويسات** كبيرة عنقودية - راسمية. **الشعر** كبير يضي او كروي ذو اربع زوايا مضحلة وكثيف التاليل الطويلة الكالة واعراف الزوايا مشنوقة الى تأليل مثل البقية - الصيف - من سورية الى بادية سينا

microcarpum, Boiss. **ب. الصغير الشعر**. **الشعر** ٢٠٠١ متر طولاً - بيروت - دمشق

٦. *P. spinosum*, L. **البلان الشوكي (البلان)** ٥ مشنوك الفروع املس عفاثي. **الشوك** مشنعب. **الاوراق** خطية **ريشية** **والورقات** صغيرة بيضية كاملة او مسننة لمساء من الاعلى وعفاثة من الاسفل وكثيراً ما تكون مجلية. **السنابل** انتهائية - الربيع - اماكن صخرية. كثير الوجود في سورية وفلسطين

١١ الورد ROSA L.

ثم انبوبة الكاس مضيق محاط بحوية غدية وخرقها ٥ كاملة اوريشية النصوص. **البتلات** ٥ وقواعدها بلا مسام. **الشعيرات** ذات شعر طويل الى الجهة المخالفة للفم - انجم ذنباتها ملتصقة بالرجيلة واورانها

ريشية - مفردة (شكل ١٤٠ ا ب ت)

* الافلام مستقلة غير منبثقة او منبثقة قليلاً من انبوبة الكاس

R. lutea | *glutinosa* | *canina* | *rubiginosa* ٤

** الافلام متحدة منبثقة من انبوبة الكاس

R. Phoenicia ٥

١. *R. lutea*, Mill. الورد الاصفر عال. الحسك نوعان. الوريقات ٥ - ٩ اهلجية

قليلة الغدد. الازهار مفردة او مجمعة ٢ - ٤. الثمر اصفر. الثمر منتصب كروي - الربع - سياجات مرعش وعينتاب والبنافع

٢. *R. glutinosa*, Sibth. et Sm. الورد الدبق د مخفض. الحسك كثيف وهو نوعان دقيق وغليظ. الوريقات ٥ - ٧ صغيرة مستديرة تقريباً او بيضية ونادراً بيضية - اهلجية كاله كثيرة الغدد. الازهار مفردة صغيرة وردية. الثمر كروي او بيضي - مستطلي هلي السطح ١٠٠ متر او اكثر طولاً - تموز الى ايلول - لبنان من ١٦٠٠ متر الى ٢٧٠٠

٣. *R. canina*, L. الورد الكلبى د عالٍ طويل القروع مخفيها. الحسك متشابه قوي متسع القاعدة منجلي اذنف. الوريقات ٥ - ٧ اهلجية او بيضية. الازهار ١ - ٤ صفراء - مبيضة مرتبة في كورنيات. الثمر انيقس عريان بيضي - جري او مستدير اقراص كبير - من ايار الى آب - *R. vulgaris*, Koch. ١. الاعتيادي. الرجالات والوريقات والزناد ملساء - زبدانة

collina, Boiss. ب. الثلج. الرجالات مشعرة. الزناد بلا حسك او ذات ايرات. الوريقات زغبية من الاسفل كثرا وقل. البتلات بيضاء تقريباً *Hausknechtiana*, Boiss. ت. الموصى به. مثل التلي الا ان الوريقات صغيرة -

السياجات من مرعش الى عينتاب

٤. *R. rubiginosa*, L. الورد البصع (الورد القوي) د معتدل العلو. الحسك نليل غير متساو. الوريقات متوسطة ٥ - ٧ بيضية او اهلجية - مستديرة ووجهها السفلي قليل الزغب كثير الغدد. الازهار ١ - ٢ وردية غامقة. الزناد غالباً ذات ابر. انبوبة الكاس ملساء او ذات ابر قليلة وغدية وخرقها اخيراً ساقعة. الثمر عريان بيضي - كروي ٨٠٠ متر طولاً -

Arabica, Boiss. ب. العربي. ابرية الكاس عنقاية كثرا وقل - جبل كترينا في سينا

٥. *R. Phoenicia*, Boiss. الورد الفينيقي ٤ الحسك متفرق متين مخني. القروع

طويلة متصاعدة. الوريقات ٥ او ٣ بيضية - اهلجية زغبية. الازهار مرتبة في عنقود كورني مركب.

انبوبة الكاس ملءاء اهليجية ضيقة . البتلات يضاء - من ابار الى آب - مواضع رطبة في سورية وفلسطين

١٢ النيرودا NEURADA, L.

الكاس بيضية مخروقة الى ٥ خرق وفيها مغلق في الاول ثم منفرد وقاعدتها مفلحة وفيها مخروطة منخفضة توتوية . البتلات ٥ صغيرة مدغمة مع الاسدية القصيرة في حجرة الكاس . الاقلام مخروزة في الاول ثم تستطيل وتتشبك فتنبثق من الكاس . البزور مخفية - اعشاب سنوية مستطيلة اوراقها ذات ذنبات صغيرة

N. procumbens, L. . النيرودا المتكئة ٥ صوفي . الفروع منشرة على الارض على هيئة دولابية واخيراً منصبة . الاوراق بيضية ريشة المخرق كالنهار . الازهار منفردة ابضية ذات زناد - الربيع والصيف - الرمال بقرب مصب نهر اقلبياس . مارسابا . بادية سينا . بحرية مصر

١٣ الاجاص PYRUS L.

الكاس ذات خمس خرق . البتلات ٥ يضاء . المبيض ذو ٥ غريفات والاقلام مستقلة . الثمر قنطرة ذات ٥ غريفات في كل منها برة او زناد والفلاف الداخلي غضروفي رقيق - اشجار اوراقها بسيطة ساقطة . وغلاف الثمر المتوسط . البتلات بيضيات مخبرية كثرا وقل . الانبورات وردية - بنفسجية

P. syriaca, Boiss. ١ . الاجاص السوري (الانجاص البري) ٥ ٦ متر علوا الى ١٠ واحياناً مستشيك . البراعم ذات اهداب . الاوراق مثل رجلياتها طولاً رحيمة شرافية والجديدة منها عنكبوتية والعتيقة ملساء . الكورنيات ذات ازار كثيرة . الزناد ذنبية دبوسية منتهية بقمر بليلي اقصر منها ٢٠٢ متر طولاً - من شباط الى نيسان - سورية الى المو . ١٦ متر

P. Enearea, Decaisne. ٢ . الاجاص البوقي ٥ البراعم كروية ملساء من الخارج . الاوراق خطية اورمجة - مستطيلة حادة كاملة . الثمر كروي نصف الزباد طولاً - الربيع - الجبال بين بعلبك ودمشق . ويرجح انه تبائن من المتقدم ذكره

١٤ المخلص C. latifolia, L.

الكاس ذات ٥ خرق . البتلات ٥ . المبيض ذو غريفتين الى ٥ والاقلام ٢ الى ٥ . الثمر شبيه بعصية ذو غريفتين الى ٥ غير منقسمة ذات برارضين تنفخ برؤفة واحدة منها فقط والفلاف الداخلي

غشائي-قشري - اشجار او اوراقها كاملة او ريشية

١. *S. trilobata*, Labill. . المخلص الثلاثي الفصوص ٣ الاوراق لمساء الوجهين

خضراء مستديرة المحيط قلبية القاعدة كفية ذات ٣ فصوص متفرقة-مسبة. الكورنيات انتهائية بسيطة
الثمر ٢٠ متر طولاً بيضي-كروي امامس مكمل مجرق الكاس الطويلة للبادية صالح للاكل - الصيف
- اماكن صخرية في لبنان من ١٠٠٠ متر الى ١٧٠٠

oxyloba, Boiss. ب. الحاد الفصوص. خرق الاوراق الاولى رحيمة حادة ومن ثم الاوراق

سباعية المشبك كنية-منصلة- فوق بيلان بعلاً ١٠٠٠ متر

٢. *S. Arica*, Crantz. . المخلص الآري ٣ الاوراق بيضية-مقلوبة ابيضية-مستطيلة شبيه

لبادية من الاسفل ذات اسنان مزدوجة. الكورنيات متفرقة. الثمر بيضي احمر ٢٠٠٧ متر طولاً
ذو غريفتين - الصيف

Græca, Boiss. ب. اليوناني. اعصاب الاوراق ٥-٨ على كل جانب - جرود لبنان والمجل

الشرقي وحمى جرودها

٣. *S. torrefacta*, L. . المخلص المنفص. الاوراق لمساء الوجهين خضراء بيضية منصصة


والنصيص حادة ذات سننات غير متساوية. الثمر بيضي او كروي صدائي ذو غريفتين - الصيف-
pinatifida, Boiss. ب. الريشي المشرق. فصوص الاوراق طويلة. الثمر بيضي-مستطيلي

- فوق بيلان

١٥ الزعرور *Spiraea*, L.

خرق الكاس ٥ قصيرة. البتلات ٥. المبيض ذو غريفة او ٢ ونادراً ٣-٥ وللغريفة بويضتان

شكل ١٤٢



زهرة الزعرور مقطوعة طولاً

وعدد الاقلام كعدد الغريفات والثمر زعرورية
والقرص ذو سرة وفصوص الكاس المسحقة مكحلة الثمر
- اشجار او اشجار كثيرة ما تكون ذات شوك

١. *S. Azarolae*, L. . الزعرور ازارولس

٣ الخراعيب لبادية. الاوراق متينة قرطاسية غبراء

زغبية محيطها بيضي-مقلوب- اسفيني غير منقسم او

ذو ٣ فصوص او مخروق ٣ خرق الى ٥ ريشية كاملة

او ذات سنين او ٢ قرب راسها. الكورنيات متفرقة لبادية. الثمر ١٠ متر قطراً كروي احمر او اصفر ذو

عجمتين الى ٢ - من نيسانت الى حزيران - سورية وفلسطين الى علو ١٢٠٠ متر. وكثيراً ما يُزرع
فهكبر ثمره ويصير لذيذاً وتصبح اوراقه عريضة كبيرة

٢ *C. sinica, Boiss.* الزعرور السينوي ذو الفروع متشعبة ملساء. الاوراق قرطاسية
مقننة ملساء محيطها بيضي - مقلوبة - اسفني بعضها كاملة وغورها ذات ٢ فصوص الى ٥ او قطع شرافية
الغمة او مسلتها. الكورنات بسيطة ذات ازهار قليلة ملساء. الثمر صغير بيضي - اهليلجي ذو عنق ضيق
وعجمة الى ٢ - الصيف - د. الرحيل في طورسينا

٣ *C. monogyna, Willd.* الزعرور الاحادي المدقة ذو الفروع ملساء. الاوراق زغبية
او مستمسة اسفنية القاعدة بيضية او بيضبة - مقلوبة المحيط مخروقة الى ٢ خرق او ٥ مقصوصة او مسننة.
الكورنات زغبية او مستمسة. القلم ١. الثمر ٤٠٠ متر طولاً كروي ذو عجمة واحدة - الربيع واول
الصيف - كثير الوجود في سورية (وربما هو ثباين من الزعرور المحاد الشوك *C. oxyacantha, L.*)

١٦ الكوئنياستر *COTONEASTER, Merl.*

حرق الكاس ٥ قصيرة مستمرة. البتلات ٥. المبيض ذو غريفتين الى ٥ في كل منها بويضتان.
الاقلام ٢ الى ٣. الثمر زعرورية. العجبات ٢ - ٥ وفي كل منها بذرة واحدة والثمر ملتصق بالكاس
الحبيبة الا ان ثمة مستقلة - النجم بلا شوك ازهارها كورنية يضاء او وردية باهتة
C. rotundifolia, F. et M. الكوئنياستر النقيدي ذو الاوراق اقل من ٢٠ متر
طولاً كاملة مستديرة - بيضبة - مقلوبة او مستديرة - اهليلجية مستمسة من الاعلى لبادية من الاسفل.
الثمر بيضي ٢.٣ متر طولاً منتصب احمر ناصع - الصيف - اماكن صخرية في جبال سورية وسينا

الرتبة السابعة والثلاثون السكسفر اجية *SAXIFRAGACEÆ.*

الازهار خنثوية قياسية. الكاس ذات ٥ قطع مستقلة او ملتصقة بالمبيض. البتلات ٥. الاسدية ٥
او ١٠ مندغمة مع البتلات. القرص اعلى المبيض او اسفله. المبيض مستقل او ملتصق اكثر او اقل
بالكاس والغريفتان ١ - ٢. والثمر جبية او نووية والبذر ذو البيرمن - اعشاب او انجم
Vallia. ١. اعشاب ذات ٥ اسدية. المبيض ذو غريفة واحدة وقلين
Saxifraga. ٢. اعشاب ذات ١٠ اسدية. المبيض ذو غريفتين وقلين
Ribes. ٣. انجم بلا شوك وازهارها راسمة يكاسها انبوبة

١ الثاليا Vahlia, Thunb.

انبوبة الكاس نصف - كروية ملتصقة بالمبيض وهدبها ذو خمسة فصوص . الثلاث ٥ . الاسدية ٥ مندغبة في حافة القرص الذي اعلى المبيض . المبيض ذو غريفة واحدة والاقلام ٢ والعنايات راسية . الجيب كروي تقريباً مكمل بفصوص الكاس وثلاثة ذات مصراعين . البرور مندغبة في مشيمات صفيحة معلقة من قمة الغريفة - اعشاب سنوية ازهارها بيضاء واوراقها متفالة

V. Woldenii, Rechb. قالها ولدن ٥ قزم لرج . الفروع كثيفة متشعبة . الاوراق جالسة

رحمة - مستطيلة وبيضية . الازهار اطية منفردة قصيرة الزناد . الخوصطات طويلة عناقية والاقلام متباعدة - الشتاء - اماكن رملية بقرب حجر سلسلة واصوان في ارض الصعيد

٢ السكسفراكا Saxifraga, L.

الكاس مستبيرة ملتصقة بالمبيض او مستقلة ذات ٥ عروق او قطع متراكبة . الثلاث غالباً متعاقبة مندغبة تحت المبيض او حوله . الاسدية ١٠ مندغبة مع الثلاث . المبيض علوي او نصفه سفلي ذو غريفتين وقلبين . الجيب ذو متقارن . البرور متعددة مندغبة في مشيمات اطية - في اقاليمنا اعشاب سنوية

S. triacetylites, L. ١ . السكسفراكا الثلاثية الاصابع ٥ غدي . الساق متعصب مفرد

مخفف دقيق بسيط او متفرع كثير الاوراق . الاوراق الجذرية ملوقة - بيضية - متفاوتة كاملة او مخروقة ٢ خرق وذات رجالات . الازهار مرتبة ثماً غير تيامية . الزناد اطول كثيراً من النهر . الكاس ملتصقة بالمبيض - الربيع - مواضع جافة رملية بقرب عينات وفي لبنان والجبل الشرقي

S. hederacea, L. ٢ . السكسفراكا الصمغية ٥ امس او غدي - عنائى قزم . قاعدة

الاوراق اسفينية او مجذومة او قلبية تقريباً والاوراق السلي عريضة ذات ٣ فصوص كاله الى ٥ والعليا بيضية ذات ٣ فصوص او كاملة . الكاس مستقلة . الثلاث بيضاء . الجيب كروي اطول قليلاً من الكاس . الاقلام طويلة منفرجة قليلاً - الربيع - الصخور والسيحان الشاذنة في السواحل البحرية واسافل الجبال

في سورية

S. aizoides, Boiss. ٣ . السكسفراكا المتبعة الهيم ٥ امس . العروق غضة مشبكة .

الاوراق شذازية قليلة الشاذنة او مجذومة اجنوبة او ذات ٧ فصوص الى ٩ كاله والعليا منها ذات ٣ فصوص او كاملة بيضية . الثلاث كبريتية . الجيب اطول قليلاً من الكاس - الربيع - من حلب الى الجبل الاقصر وروثا وسواحل البحر المسطوح

٣ الرئيس RIBES, L.

انبوبة الكاس بيضبة ملتصقة بالمبيض وهديها مشقوق ٤ خرق الى ٥ قياسية. البتلات ٤-٥ مندغمة عند حافة حنجرة الكاس مترادفة بمخرقها. الاسدية ٤-٥ مندغمة بين البتلات. المبيض ذو غريفة واحدة وبويضات كثيرة والمشيتمان متقابلتان جناريمان. النلمان منفصلان او متحان. العنينة لبية مكللة بالكاس. البزور افقية ذات زوايا قليلة البروز والتشر هلامي من الخارج وسلب من الداخل - انجم بلا شوك ازهارها راسية واوراقها مغضنة

R. orientale, Poir. الرئيس الشرقي ث ثنائي المسكن ذو هلب ارج غدي كثر طولة او قل. الاوراق مستديرة - كلوية ذات ٣ فصوص الى ٥ كالة الاسنان. الراسيات منتصبية والاشوية اقصر من الذكرية. الفنار غدي - عفائي. الفلوس رحيمة - مستطبية اطول من الزناد. البنية حمراء هلبية - من ايار الى حزيران - اعالي لبنان والجبل الشرقي

الرتبة الثامنة والثلاثون. الكراسيولية CRASSULACEÆ.

الازهار قياسية خشوبة. الكاس مستقلة مشققة او مفصلة. البتلات كالمسات عدداً تفصلها مستقلة او متحدة. الاسدية مندغمة حول المبيض او تحته تقريباً مثل البتلات او ضعفها عدداً مستقلة او متحدة بالبتلات ومندغمة معها في الكاس. الثبورات بعدد البتلات ذات غريفة واحدة مستقلة او متحدة من الاسفل وتحتهما قُلَيْس. البويضات مندغمة بدرز الثميرة الوجهي متعددة على الغالب ونادراً مفردة. الاجرية غشائية او غشائية تشق على الدرز الوجهي. البزور ذات البيومن - اعشاب او انجم لحمية عادمة الذنبيات

١. *Tillæa*. رباعي الاعضاء. اعشاب قزمة واوراقها متفائلة

٢. *Umbilicus*. خماسي الاعضاء الا الاسدية وهي ١٠. التويج انبوبي او جرمي - جري

٣. *Sedum*. السيلات ٤-٥. البتلات ٤-٧. الاسدية ١٠ او ٥. الجيب كثير البزور

٤. *Telmisa*. السيلات والبتلات والاسدية ٢-٥. الاجرية منفصلة ذات بزرة واحدة

١ الثليا TILLÆA, J.

الكاس ذات ٣ خرق او ٤. التويج ٣ بتلات او ٤. الاسدية ٢-٤. الثبورات ٢-٤ مستقلة

مختلفة بين البزورين - اعشاب سنوية صغيرة ملساء واوراقها متفائلة

T. muscosa, L. الثليا الاشنية ☉ السوق ٢.٢ متر الى ٢.٣ علواً متصاعدة بسيطة الى

منفرعة قليلاً حاملة أزهار من قاعدتها وكثيراً ما تكون حرة. الأوراق رحيمة - مستطيلة حموية متحدة عند قاعدتها. الأزهار باطية جالسة. خرق الكأس رحيمة حموية - الربيع -
trichopoda, Post. ب. الشعرية الزناد. الزناد بطول الكأس - مواضع رملية في ساحل سورية البحري. سور القدس (*T. trichopoda*, Fenzl.) وكثيراً ما تكون الأزهار السفلى ذات زناد والعليا جالسة

٢ الأميلكس *UMBILICUS*, D. C.

الكأس ذات ٥ خرق. التويج انبوبي - جرمي او جرمي مشقوق كثير اقل. الاسدية ١٠ مندغمة في انبوبة الكأس. الفلوس تحت الملباض ٥. الثميرات ٥ تكون حبيبات كثير البذور - اعشاب خالدة او سنوية اورافها لحمية

* الأوراق المجذرية محجمة او قلبية ذات رجيلات

U. erectus | *pendulinus* †

* * الأوراق المجذرية جالسة متراكمة على هيئة زهر الورد

U. globulariaefolius ‡ *Libanoticus* § *lineatus* ٥

U. erectus, D. C. ١. الأميلكس المنتصب 24 الساق غليظة من علواً. الأوراق المجذرية كلوية - مستديرة قلبية محجمة تقريباً شرافية. الأوراق الساقية صغيرة جالسة تقريباً بيضيه حادة مسننة. الأزهار متصببة مرتبة في سنانيل مندجمة طويلة بسيطة او منفرعة من الاسفل. الفلوس رحيمة - خطية اطول من الزناد القصيرة. قلع الكأس رحيمة حادة. التويج اصفر مشقوق الى منتصفه - الصنف - مواضع صخرية في لبنان شمر علو 10 متر

U. ponceanellii, D. C. ٢. الأميلكس المدالي 24 الساق منتصب. الأوراق المجذرية مستديرة محجمة مقعرة جرونية - شرافية. الأوراق الساقية النما صغيرة خطية - اسفينية. الأزهار مدلاة مرتبة في سنانيل مسترسل! سنانيل او منفرع من الاسفل. الزناد اطول من الفلوس. التويج قطني - الصنف -
intermedius, Post. ب. المتوسط. (خبز النفاق) الأوراق العليا رحيمة - مستطيلة مسننة. الزناد نصف الاناريس طولاً - نابت من المحيطان والصخور في سورية وفلسطين وجبل موسى في سيناء (*U. intermedius*, Boiss.)

U. foliosus, Post. ت. الورقي. الأوراق الساقية كثيرة والسفلى منها قلبية - مستديرة والوسطى بيضيه مقلوبة جونية - مسننة واسينية - مقلوبة والعليا رحيمة - مستطيلة - ابل العقي والخاصاني
U. globulariaefolius, Fenzl. ٣. الأميلكس الكلويولاري الورق 24 زغبي ومن

الاعلى غدي . السوق غليظة تحمل من قاعدتها عنقوداً سميكة - سنبلياً ورقياً طوله ١٢ مترالى ٢٥ .
الاوراق العليا مستطيلة . التويج جري ارجواني مشقوق الى منتصفه وخرقة رحمة حادة مذبذبة ثم غضبية
مخرزية متغامزة القمة - الربيع - اماكن صخرية بفرب انطاكية وسويدية

٤. *W. Libanoticus, Labill.* . الامبلكس اللبناني ٢٤ اخضر وكثيراً ما يكون زغي -
غدي . الاوراق العاقية خطية . العنقود راسي مسير . التويج ارجواني - وردي مشقوق الى اقل من
منتصفه وخرقة مستطيلة حموية معقنة القمة قليلاً - ١١ . بق - شوقي الصغور في لبنان والجبل الشرقي
الى بانياس

g. glaber, Boiss. ب . الامبلكس حجازي الارواق سنبلياً ١٥ - ١٥ الكاس التي قد
تكون قليلة الرغبة - مع الرز

٥. *Boiss.* . الامبلكس حجازي ٢٤ اخضر حليبي عناقلي - غدي . الاوراق
الساقية لسانية . التويج غدي - عناقلي وقد يصير راسياً فقط . التويج وردي مخطط حليبي - عناقلي
جرسي مشقوق الى ثلثي طوله وخرقة مثمنة - بيضبة حادة - ايار وحريان - عين زحل . شاطي بحر طبرية

٢ حي العالم *Boiss., L.*

الكاس ذات ٥ فصوص ونادراً ٤ . البتلات ٥ ونادراً ٤ او ٦ - ٧ مسقطة او مقعرة القاعة .
الاسدية ١٠ او ١٢ ونادراً ٥ مدغمة حول المبيض البتلات والبتلات و٢٠ من بتلاتها . الكاس تحت
المبيض ٥ . الثمرات ٥ تكون جيباً وبزورها كثيرة - اغصان خالدة ٥ سنو او اوراقها لسمية
شكل ١٤٣ شكل ١٤٤



شكل ١٤٣ . زهرة حي العالم ترى فيها ثلثاً من سبلاتها وخمساً من بتلاتها وتسعاً من اسديتها وجيبها المركب
من ٥ ثمرات
شكل ١٤٤ . بعض هذه الاعضاء متصلة لكي ترى نسبتها بعض الى بعض وكيفية اندغامها في القف

* الجذر معبر حامل حزمة سوق مزهرة وفروع ورقية عائرة

S. stoloniferum ١ *album* ٢ *Laconicum* ٣ *altissimum* ٤ *amplexicaule* ٥

* * سنوية . الاوراق اسطوانية منفردة

١ . الازهار ذات ١٠ اسدية الى ١٢

† الثلات يضاء ارجوانية او وردية

S. glaucum ٦ *Stendelii* ٧

† † الثلات صفراء او صفراء مبيضة

S. littoreum ٨ *Palæstinum* ٩ *Assyriacum* ١٠

ب . الازهار ذات ٥ اسدية

S. rubens ١١ *cespitosum* ١٢

S. stoloniferum, Gmel. ١ . حي العالم الحامل السقولونات 2٤ اسفل السوق طويل

مستلق متاصل . الاوراق متعاقبة معينة - اسفنية كالة قصيرة الرجلات جونية - شرافية . اقم كورنية
مسترسلة وفروعها طويلة منفردة . الازهار وردية - باهنة . السبلات حادة . الثلات رمحية حادة ضعف
الكاس طولاً - الصيف - فوق بيلان

S. album, L. ٢ . حي العالم الابيض 2٤ اخضر املس حرمي . الجذوع زاحنة . السوق
المزهرة متصاعدة متعاقبة والعائرة قصيرة غيباء مندججة الاوراق . الاوراق اسطوانية مفلطحة من الاعلى
خطية كالة منفردة جالسة متساوية القاعدة . الكورنب مندج . السبلات كالة . الثلات يضاء متعقدة
القاعدة قليلاً رمحية كالة ٢ اضعاف الكاس الى ٤ طولاً - الصيف - جبل اللكام ولبنان ٢٠٠ مترفاً فوق

S. Laconicum, Boiss. et Held. ٣ . حي العالم اللاكوني 2٤ قزم املس حرمي . السوق
المزهرة متصاعدة حاملة قمبات ابطية قصيرة جالسة ذات زهرتيف الى ٤ على هيئة راسم ٥٠٢ متر الى
٤ طولاً تحت التربة الانتهاية الصغيرة . السوق العائرة قصيرة مندججة الاوراق . الاوراق خطية اسطوانية
تقريباً متساوية القواعد جالسة تقريباً . الثلات رمحية ضيقة مدببة ضعف الكاس طولاً - من ايار الى
نوز - رحلة . بانياس . قرب الناصرة

S. altissimum, Poir. ٤ . حي العالم الاعلى 2٤ املس اغبر نجبي القاعدة منفردة .
السوق ٢٢ متر الى ٥٠ طولاً متصبية . الفروع العائرة غيباء مندججة الاوراق . الاوراق مستطيلة ورمحية نصف
- اسطوانية مدببة متصبية . الثبات مندججة وفروعها عقرية . الازهار جالسة تقريباً . خرق الكاس يضاءة
قليلة الحدة . الثلات منفردة خطية - مستطيلة كالة ضعف الكاس طولاً الى ٢ اضعافها - الصيف -

صغور لبنان والساحل المجرى الى القدس

S. amplexicaule, D. C. ٥. حي العالم المعانيق 24 و ٢١ متر علواً امس متفرع القاعدة صلبها. السوق متصاعدة. الفروع العاقرة منتبجة ببرعم اسطوانى . اوراق السوق المزهرة اسطوانية خطية مخززية مهازية القاعدة ساقطة باكراً . اوراق البراعم متراكبة مندجة مخززية شاكّة متمعة القاعدة معانقة الساق . فروع النجبة ٢-٣ مسترسلة . الازهار جالسة تقريباً . خرق الكاس رجمية حادة . الازهار ٢٠٠٧ متر الى ٢٠٠١ عرضاً . البتلات احياناً ٨ الى ١٠ ضعفا الكاس او اكثر طولاً خطية مدببة - الصيف - لبنان من ١٦٠٠ متر الى ٢٢٠٠ . الجبل الشرقى

S. glaucum, W. K. ٦. حي العالم الاغبر ٥ امس او غنبدى . مشعر من الاعلى . الساق غالباً متفرع من قاعدته . الاوراق اسطوانية مسطحة كالة . فروع النجبة ٢-٣ عفرية . الازهار مائلة الى جانب جالسة تقريباً وغالباً ذات ٦ تفاصيل في كل صف . خرق الكاس بيضية حادة . البتلات رجمية ناية يضاء او مصفرة قليلاً وحيزومها وودى . الثمبرات مخروطية منضغطة صغيرة الدرناات - الربيع - جبال شمالي سورية

eriocarpum, Boiss. ب. الصوفي الثمر . الثمبرات عنائية كثرا وقل - سواحل سورية.

لبنان . فلمطبن

polypetalum, Boiss. ث. الكثير البتلات . خرق الكاس رجمية . البتلات ٧-٩

باهجة . الثمبرات كبيرة الدرناات لمساء - ساحل سورية المجرى

pallidum, Post. ث. الباهت . الازهار ذات ٥ بتلات و ٥ بتلات و ١٠ اسدية - ساحل

سورية المجرى ولبنان (*S. pallidum*, M. B. I.)

S. Stendellii, Boiss. ٧. حي العالم لستودل ٥ الساق متخض بسيط او متفرع تحت منته ٢٠٠٠.

الاوراق لمساء نصف - اسطوانية مستطيلة كالة . فروع النجبات مزدوجة قصيرة قليلة الازهار . الاوراق الزهرية اطول من الازهار . الكاس لمساء وخرقها بيضية حادة . البتلات وردية - مبيضة لمساء مذببة نحو ثلثة اضعاف الكاس طولاً . الاثبرات مصفرة قليلاً . الثمبرات رجمية حادة غدبدية - عنائية - نيمان - الصغور حول حلب

S. Hircanum, Guss. ٨. حي العالم الساحلي ٥ امس . الساق بسيط او متفرع . الاوراق

ملوقية - اسطوانية نصف - اسطوانية كالة . فروع النجبة ١-٣ منعققة اخيراً . الازهار جالسة مائلة قليلاً الى جانب واحد مسترسلة . خرق الكاس غير متساوية نصف - اسطوانية بيضية كالة . البتلات صفراء باهتة رجمية حادة اطول من الكاس والحيزوم احياناً شمير - الربيع - ساحل سورية المجرى

٩. *S. Palæstinum*, Boiss. حي العالم الفلسطيني ① املس او ذو غديبات صغيرة من الاعلى . الساق بسيط او متفرع من القاعدة قزم متبقية مندج ذات شعبتين او ٢ . الفروع عفرية . الاوراق اسطوانية - خطية كالة . الازهار جالسة ذات ٥ تقاصيل . خرق الكاس بيضية - منثلة حادة . الپتلات ستة اضعاف الكاس طولاً مصفرة باهتة عند جفافها ذات ناب قصير وكثيراً ما يكون الحينوم محمراً . الثمرات رمجية جالسة الغدد - الربع - لبنان . سواحل سورية . جبل اللكام

١٠. *S. Assyriacum*, Boiss. حي العالم الاشوري ① املس . الساق متفرع . الاوراق نصف - اسطوانية طويلة والزهرية منها مثل الازهار طولاً او اطول منها . الازهار متفارية مائلة الى جانب واحد . الزنيدات مثل الكاس طولاً تقريباً . خرق الكاس رمجية حادة . الپتلات صفراء اهليجية - رمجية كالة او حادة ثلثة اضعاف الكاس طولاً الى ٤ . الثمرات ملساء - الربع -

minus, Boiss. ب. الاصفر ٠٢ متر علواً . الازهار صغيرة . الپتلات حادة - الجبل الشرقي ١١. *S. rubens*, L. حي العالم الاحمر ① غديدي - زغبى من الاعلى . الساق قزم بسيط او متفرع . الاوراق منفرجة نصف - اسطوانية غليظة كالة . فروع القمية الكورنية مائلة الى جانب . الازهار جالسة . خرق الكاس الغدية مثثة حادة . الپتلات وردية غالباً ارجوانية الحينوم عفاية رمجية مدبية ثلثة اضعاف الكاس طولاً . الاسدية ٥ . الثمرات منفرجة متدنة وغالباً غديدية - نيسان - ساحل سورية البحري . الصغور يقرب القدس

١٢. *S. cespitosum*, Cav. حي العالم الحزمي ① املس . الساق قزم بسيط او متفرع قليلاً . الاوراق بيضية كالة متراكمة . القمية متببسة ذات شعبتين او ٢ وازهار قليلة جالسة مائلة الى جانب واحد . خرق الكاس الملساء رمجية . الپتلات يضاء رمجية ضعفا الكاس طولاً تقريباً . الاسدية ٥ . الثمرات منفرجة مستوية ميزبة طولاً ضيقة - نيسان - اماكن رملية وصخرية بقرب حلب ودمشق

٤ التلسمسا ^ك TELMISSA, Fenzl.

الكاس ذات ٢ خرق الى ٥ . الپتلات ٢ - ٥ مستتلة . الاسدية ٢ - ٥ مندجمة حول المبيض مغالبة خرق الكاس . المحراشف تحت المبيض ٥ دبوسية - خيطية . المابيض ٢ - ٥ والبويضة مفردة معلقة من القمية . الاحربة ٢ - ٥ مستقلة ذات بزره واحدة - اعشاب سنوية صغيرة

T. microcarpa, Smith. التلسمسا الصغيرة الشمر ① املس قزم بسيط او متفرع من الاسفل . السوق غليظة . الاوراق اسطوانية كالة . فروع القمية الانتهائية ٢ - ٣ طويلة سنبلية مسترسلة وفي الاثمار متببسة ورقية . الازهار ٢ . متر طولاً جالسة خارجة الآباط . خرق الكاس صغيرة بيضية

شبيهة بأسنان. الثلاث يضاء - مصفرة مستطيلة ثلثة اضعاف الكاس طولاً. الثميرات منشورية منقطة - مندرة حموية - من اذار الى نيسان - اماكن صحيرية من حلب الى القدس والبلقاء

الرتبة التاسعة والثلاثون الدروسرية DROSERACEÆ.

الازهار خنثوية قياسية. الكاس ذات ٥ تقاصيل مستقلة في التصيف. الثلاث مندغبة تحت المبيض مستقيمة. الاسدية ٥ تحت المبيض مستقلة واثيراتها وحشية. القرص مفقود. المبيض مستقل ذو غرفة واحدة مشابها جدارية والبويضات عديدة. الاقلام ١ - ٥ بسيطة. الثمر جيب غشائي ينشق على منتصف المصراع. الزور ذات اليومن - اعشاب غدية - لرجة

الدروسرا DROSERÆ, L.

الكاس مخروقة خمس خرق عميقة. الثلاث ٥. الاسدية ٥. الاقلام ٢ - ٥ متشعبة شعبيية. الجيب ذوسويقة وغرفة واحدة ٢ مصاريع الى ٥ عند قمته تنشق عند نضج الثمر. الزور عديدة صغيرة معطيلية وقشرها مشبكة قليلاً - اعشاب نابتة في اماكن رطبة اشنية اوراقها مرتبة على هيئة وردة عند اسفل الجريدة غدية هدية ملقنة طولاً في التصيف ازهارها يضاء محمولة على جريدة قمية راسمية *D. rotundifolia, L.* الدروسرا المستديرة الورق 24 الاوراق مستديرة مستدقة فجأة الى رجليات ملبسة شعراً منفرجاً. الجريدة طويلة. الزور مغزلية وقشرها مرتجة عسافية - الصيف - بكفها. عين السواخير

الرتبة الاربعون الهالوراجية HALORAGÆ.

الازهار خنثوية او احادية المسكن. انبوبة الكاس ملتصقة بالمبيض وهدبها مجذوم او منفصل تفصيلتين الى ٤. الثلاث بعدد قطع الكاس مترادفة بها مندغبة في خنجيرها. الاسدية ١ او ٤ الى ٨. المبيض ذو غرفة ١ الى ٤ ذات بويضة واحدة منتصبة معلقة. الاقلام مفقودة او ١ الى ٢ والسماك بعدد غرفات المبيض. الثمر جوزية او نورية غير منشقة ذات غرفة ١ الى ٤ او منشقة الى عجات. الزور ذات اليومن - اعشاب مائة ازهارها صغيرة

الميريوفلم MYRIOPHYLLUM, L.

الازهار احادية المسكن. السدوية. انبوبة الكاس قصيرة كروية وهدبها ذو ٤ تقاصيل ساقطة. الثلاث ٤ ساقطة. الاسدية ٨. الملقية. انبوبة الكاس ذات ٤ زوايا وهدبها صغير. الثلاث صغيرة

متلوجة معقنة . السمات ٤ وبرية معمرة . المبيض ذو ٤ غريفات في كل منها بويضة . النووية عادمة
العصار منفصلة أخيراً الى ٤ عججات - اعشاب مائية اوراقها دولانية

M. spicatum, L. . الميريوفلم السفلي 2٤ الاوراق ريشية منفصلة هلبية النطع . الازهار جالسة

دولانية مرتبة في سنابل انتهائية متعصبة منقطعة عريانة النمة . الاوراق الزهرية السفلى مسننة ومثل الازهار
طولاً والعليا اقصر منها كاملة - الصيف - في الجبيلات والاقنية والانهار . كثير الوجود

الرتبة الحادية والاربعون . الاسية MYRTACEÆ.

الازهار قياسية خشوية . انبوبة الكاس ملتصقة بالمبيض وخرقها متراكبة . البتلات معادلة خرق
الكاس عدداً مندغمة في خنجريها . الاسدية مندغمة في خنجرة الكاس غير محدودة مستقلة . المبيض سفلي
ذو غريفات عديدة مشابها محورية . القلم واحد والسمة بسيطة . البويضات كثيرة . الثمر شبه - نوري
والزور عادمة الاليومن - اثم

الأس MYRTUS, L.

انبوبة الكاس كروية تقريباً ذات ٥ خرق حتى في البرعم . البتلات ٥ منفردة . الاسدية متعددة
مصطفة صفوفاً كثيرة مستقلة وغريفات الاثيرات متوازية . النووية ذات غريفتين او ٢ مكلفة بهذب
الكاس ذات بزور كثيرة كلوية - شجيرة اوراقها عطرية

M. communis, L. . الأس العام . (الريمان) ٥ الاوراق متغابلة مخنثانية قصيرة الرجلات
بيضية - رمحية مدببة منقطة نفوطاً شفافة . البتلات بيضاء . النووية كروية تقريباً سوداء مزرقه - الربيع
- كثير الوجود في سورية الى نحو ١٠٠٠ متر

الرتبة الثانية والاربعون الحنائية LYTHRÆACEÆ.

الازهار خشوية قياسية . الكاس مستقلة مستهزقة وفصوصها مصراعية في التصيف متغللة اوراقاً باسنان
اضافية . البتلات مندغمة في اعلى انبوبة الكاس بين فصوصها ار مفتوحة وكثيراً ما تكون مجعدة . الاسدية
مستقلة مندغمة في انبوبة الكاس محدودة العدد . المبيض مستقل ذو غريفتين الى ٦ كثيرة البويضات .
المشيمات محورية . والبويضات متعصبة . القلم خيطي . الجيب محاط بالكاس غشائي وقد يكون ذا غريفة
واحدة لزوال المحاجز . الزور عادمة الاليومن - اعشاب او اثم

Amorpha, L. الكاس ٥ ، البتلات ٥ ، الاوراق ١٠ ، اذات اعشاب معمرة

٢. *Lythrum*. الكاس انبوية ذات ٨ أسنان الى ١٢. اعشاب معبرة او سنوية
٣. *Lawsonia*. انبوبة الكاس قصيرة بلبلية لا يتخلل اسنانها سنيئات. الشجر

١ الأمانيا ^{٧٥} *AMMANIA, L.*

الكاس جرسية وفصوصها ٤ وقد يحول بينها أسنان اضافية مضحلة. البتلات ٤ او مفقودة.
الاسدية ٤ او ٨. القلم واحد واللمة راسية. الجيب ذو غريفة او غريفتين وبزور كثيرة - اعشاب سنوية
اوراقها متباعدة وازهارها باقية في الآباط

١. *A. verticillata, Lam.* الأمانيا الدولابية ^{٧٦} املس مستعبر متصب بسيط او متفرع.
الاوراق جالسة رحيمة او مستطيلة مستدقة القاعدة. الازهار جالسة في آباط الاوراق متراكمة. البتلات
ارجوانية صغيرة وغالبا وقية. الاسدية ٤ - الربيع
شكل ١٤٥



ت

ب

ب. كاس الأمانيا الاذينية منشورة تظهر كيفية اندغام
الاسدية في انبوتها. ت. الجيب يحاط بالكاس البلبلية

- في مستنعات مرعش ومصر
A. auriculata, Willd. ٢. الأمانيا

الاذينية ^{٧٧} املس. الساق منتصب متفرع ذرع
زوايا. الاوراق جالسة خطية رحيمة وكثيرا ما تكون
الصفلى منها مستدقة القاعدة وذات اذينات او قاعدة
قلبية اكبر او اقل وضوحا. الكورنيات ابضية جالسة

تقريبا. الازهار ذات زهيدات. البتلات ٤ وردية بيضة - مقلوبة اطول من الكاس ذات مخالب وقد
تكون مفقودة. الاسدية ٤ الى ٨ - الربيع -

subsessilis, Boiss. ب. الجمالسة تقريبا. الازهار جالسة تقريبا. البتلات مفقودة -

قرب دمياط

٢ اللثروم ^{٧٨} *LYTHRUM, L.*

الكاس انبوية مضلعة ذات ٨ أسنان الى ١٢. البتلات ٤ - ٦ مندغبة في اعلى انبوية الكاس.
الاسدية ٨ - ١٢ او اقل مندغبة في اسفل الكاس او متصفا. القلم خيطي واللمة راسية. الجيب ذو
غريفتين وبزور كثيرة ينفخ على الحاجر او يمزق بغير انتظام. المشيمان ضخمتان ملتصقتان بالحاجر -
اعشاب خالدة او سنوية او ارقها متباعدة او مترددة وازهارها ارجوانية ابضية او مرتبة قميات سنبلية دولابية
١. *L. Salicaria, L.* اللثروم سليكاريا ^{٧٩} زغى او مستعبر. اساق متصب عال.

الاوراق قليلة القاعدة رحيمة حادة متفالة او دولاية . قممات العنقود متفالة واحياناً متراكمة . الكاس ذات ١٢ عصباً وستة اسنان داخلية مثثة وستة خارجة اطول منها مخرزية . البتلات احياناً ٢٠١ متر طولاً اهليجية - ملوكة . الاسدية ١٢

Syriacum, Boiss. et Gaill. ب. السوري . امس الآحوا في الاوراق والمحراشف الموجية

— وادي البردة بقرب دمشق

tomentosum, D. C. ت. اللبادي . لبادي او منشيب . اسنان الكاس غالباً متساوية

تقريباً — أكثر وجوداً في سورية من الرمز

L. Graefferi, Ten. ٢. **الثلثوم كريف** 24 السوق طويلة منتصبه او منشرة . الاوراق مترادفة والسلى منها اهليجية او مستطيلة واحياناً قلبية القاعدة والعليا خطية - رحيمة . الازهار منفردة ابضية . الكاس اسطوانية ذات ١٠ خطوط او ١٢ واسنانها متساوية تقريباً مثثة متصبه . البتلات ٦ يضية - مقلوبة مستطيلة . الاسدية ١٠ او ١٢ منبثة — الصيف — اماكن رطبة . كثير الوجود في سورية الى علو ١٠٠٠ متر

linearifolium, Post. ب. المخطي الورق . الاوراق خطية مدببة ٢٠٢ متر طولاً واكثر

— رحلة

L. hyssopifolium, L. ٣. **الثلثوم الزوفي الورق** 24 السوق منتصبه والاوراق متراكمة واكثرها مترادفة والسلى منها خطية - مستطيلة والبقية خطية مستدقة . الازهار منفردة ابضية . الكاس انبوية ذات ١٠ خطوط او ١٢ و ٥ اسنان او ٦ طريلة مخرزية يغلها سنينات . البتلات ٤ الى ٦ اطول من الكاس . الاسدية ٥ او ٦ متضمنة في التويج — من ابار الى تموز — اماكن رطبة في ساحل سورية البحري والبقاع وبقرب دمشق

L. bibracteatum, Salzmann. ٤. **الثلثوم الثنائي الفلوس** ⊙ الساق منتصبه قزم منشعب . الاوراق متفارية كاله خشنة الاحوا في والسلى مستطيلة - خطية والبقية خطية . الازهار منفردة جالسة تقريباً تكون سنابل ورقية وتحت كل زهرة فلسان عشيان اهليجيان او مستطيلان . الكاس طويلة اسطوانية ذات ١٠ خطوط او ١٢ واسنانها ١٢ والداخلية منها مضحلة تقريباً والخارجية قصيرة مثثة كاله . البتلات مستطيلة - خطية اطول من الكاس . الاسدية ٥ او ٦ متضمنة في التويج — اول الصيف — بحرية مصر

٣ الحناء LAWSONIA, L.

انبوية الكاس قصيرة جداً بليلة ذات ٤ زوايا وفصوصها الاربعة منفردة يضية عريضة بلا امنان

اضافية. البتلات ٤ مجمدة مندغمة في القرص الجري عند قمة انبوبة الكاس. الاسدية ٨ مندغمة ازواجاً عند قاعدة انبوبة الكاس ترادف البتلات. القلم خطي والسمة راسية. الحبيب كروي ذو سوية واربع غريفات تنشق بغبر انتظام. البنور متعددة مندغمة في مشبات ضخمة ملتصقة بالبقار — نجمة ملساء اوراقها متقابلة وازهارها بيضاء

L. alba, Lam. الحناء البيضاء. الفروع متقابلة اسطوانية وقد تستعمل الى شوك. الاوراق

قصيرة الرجيلات بيضة - مقلوبة - رحيمة كاملة. التزهير عنقودي — من ايار الى ايلول — اصلها من بر مصر غير انها مزروعة في جميع المشرق

الرتبة الثالثة والاربعون الانوناكرية. ONAGRARIÆ.

الازهار خنثوية قياسية. انبوبة الكاس ملتصقة بالمبيض ذات ٤ فاصل الى ٦. البتلات كقطع الكاس عدداً تحتلها وهي مبرومة في النصف. الاسدية محدودة مندغمة مع البتلات في خنجر الكاس. المبيض سفلي ذو غرقة واحدة. القلم خطي والسمة راسية او ذات ٤ فصوص. البويضات منتصبة مفردة او متعددة في الغريفات. المخرجي — اعشاب

١. الاييلويوم. EPILORIUM, L.

جزء انبوبة الكاس المقتد قليلاً فوق المبيض وهدبها منفصلان من قمة المبيض بعد الانقسام. البتلات ٤. الاسدية ٨ واثراها خطية او مستطيلة. القلم خطي وسمانه الاربع منفرجة على هيئة صليب او مخدعة على هيئة دبوس. الحبيب طويل خطي ذو ٤ غريفات وتنصل مصاربه من العهود الرباعي الزوايا الحامل البذر. البنور كثيرة منتصبة تنتهي بشعر طويل، — اعشاب، خالدة اوراقها مترادفة او متقابلة وازهارها سنبلية اوراسمية وردية اللون

E. spicatum, Lam. ١. الاييلويوم السنبلي 2٤ ام الجذور ذات ستولونات طويلة راحنة.

الساق عالي. الاوراق رحيمة - خطية كاملة. الراسم انتهائي طويل عادم الاوراق او ذواوراق عند قاعدته فقط. البتلات بيضة - مقلوبة قصيرة الخالب - النصف - ثم لبنان فوق الارز

E. Euphraticum, L. ٢. الاييلويوم العقائي 2٤ ام الجذور غليظة لحمية. الساق عالي.

الشعر نوعان بسيط طويل وغديدي قصير. الاوراق مستطيلة - رحيمة معانة منشارية نائية. الراسيات ذات اوراق. قطع الكاس رحيمة ذات سبل. الازهار اكثر من ١٠٠ متر عرضاً وردية غامقة - الصيف
tonenosum, Boiss. ٣. النلبادي. مستقيم لبادي كثير اوراق غالياً

قصيرة اقل حدة من الرمز - سورية الى علو ١٥٠٠ متر. بر مصر
maximum, Post. ت. الأكبر. قليل الرغبة. الاوراق كبيرة ٢٠٤ متر طولاً. الازهار ٢٠٢

متر عرضاً تقريباً ارجوانية - تحت جرد لبنان

٢. *E. parviflorum*, Schreb. الايولوجيوم الصغير الزهر 2f زغبي. الاوراق السفلى
ذات رجيلات والبقعة جالسة رحيمة حادة صغيرة الاسنان. الراسيات ذات اوراق. الازهار ٢٠٢ متر
طولاً بيضاء او وردية منتصبه قبل الابتسام. قطع الكاس رحيمة حادة سرحاه - الصيف - ساحل سورية
البحري وجبالها الى علو ١٢٠٠ متر

menthoides, Boiss. ب. النعنع. الاوراق قصيرة بيضية مستطيلة حادة او كالة - تحت

جرد لبنان

٤. *E. tetragonum*, L. الايولوجيوم الرباعي الزوايا (اذئاب القطة) 2f الساق
صلبة عسوية كثيرة الفروع مخططة خطين الى ٤ بارزة. الاوراق رحيمة او مستطيلة - رحيمة منشارية
واسنانها غير متساوية. الازهار منتصبه قبل الابتسام ٢٠٠ متر طولاً ارجوانية وردية. قطع الكاس رحيمة -
خلفية مدببة حادة - الصيف - اماكن رطبة في الساحل البحري ولبنان الى علو ٢٠٠٠ متر
Tournefortii, Post. ب. تورنפורت. الساق اغلظ والاوراق اعرض والازهار اكبر كما في

الرمز - من عنتاب الى الشرق. لبنان الى ٢٠٠٠ متر. (*E. Tournefortii*, Michx.)

٥. *E. roseum*, Schreb. الايولوجيوم الوردي 2f مستملس. الساق متفرع مخطط
خضوطاً بارزة. الاوراق مستطيلة حادة الطرفين ذات رجيلات واسنانها متساوية وحرافها واردمها
زغبية. الازهار ٢٠٢ متر طولاً منصفرة قبل الابتسام ثم وردية - الصيف - حسرون
subsessilum, Boiss. ب. المجالس تقريباً. الاوراق بيضية - مستطيلة والعليا منها جالسة

تقريباً - تورين. ديمان. (*E. Smyrnezum*, Boiss.)

٢ الجوسيا JUSQUIEA, L.


انبوبة الكاس غير مطوية فوق المبيض وقصصها حادة مستنيرة. الجفلات ٥ منفردة. الاسدية
٨ - ١٢ وانثرانتها بيضية او مستطيلة. القلم خطي والسمة راسية ذات ٤ فصوص الى ٦. الجيب مكمل
بالكاس اسطواني او ذوزوايا منشق على المصارع ذو ٤ غريقات الى ٦. البزور عديدة عريانة مدغمة
في حوافي المصارع وفي مشيمات منفصلة من المصارع - اعشاب مسنة او اوراق مترادفة وازهارها
ليونية اللون

J. repens, L. . الجوسيا الزحافة ٢٤ ملمس عائم مجهز بحواصل وجذبرات عند العقد .
الاوراق بيضية - منقوبة او مستطيلة اورمحية ذات رجيلات . الازهار ٢.٠ متر عرضاً ابطية منفردة ذات
زناد - الصيف - في الماء في ساحل سورية البحري وبحيراتنا الداخلية . بر مصر

الرتبة الرابعة والاربعون اليقطينية CUCURBITACEAE.

شكل ١٤٧

شكل ١٤٦



الازهار ذات مسكن واحد او
مسكين . انبوبة الكاس ملتصقة بالمبيض
ذو ٥ فصوص . البتلات ٥ مستقلة او
متحدة من الاسفل مندغمة في مدب
الكاس . الاسدية ٢ - ٥ مستقلة او
ذات خوة واحدة . الانثريات ملتصقة
بالخويوط مستقلة او متحدة . المبيض سفلي
ذو ٢ غرفات الى ٥ ومشابهاة جنارية
متحدة بزوايا الغريفات الخارجية . الثمر
لحمي وغريفاته قد تنصير واحدة بزوال
الحواجز - اعشاب متعشرة او مستلقية

شكل ١٤٦. ت . اسدية اليقطين وهي ثلثية المتخوة وسنجيرية اي متحدة
الانثريات . ث . مقطوع الانثريات المستعرض . اخيرا البتغ وهو
متعرج على هيئة عرسى

شكل ١٤٧. ثمر اليقطين منقطع عرضاً يظهر فيه المشيمات الثلاث الجدارية

١. *Cucumis* . الاسدية ٢ . الازهار السدوية غالباً باقية والمدقية منفردة . العنم بسيط

٢. *Citrullus* . الاسدية ٢ . الازهار احادية المسكن وكلها منفردة . العنم متشعب

٣. *Ecballium* . الاسدية ٢ . الازهار السدوية راسمية والمدقية منفردة . العنم مفنود

٤. *Bryonia* . الاسدية ٥ ذات ٢ خوات . الازهار راسمية او باقية . العنم بسيط على الغالب

١. الجلهاثا CUCUMIS, L.

الازهار ذات مسكن واحد وكثيراً ما تكون السدوية منها حزمية والمدقية منفردة . انبوبة الكاس
جرسية عريضة وقاعدتها بلا حراشف ومدها ذو ٥ فصوص . النويج مخروق الى اكثر من منتصفه
جرسي تقريباً وخرقة مستطيلة - بيضية حادة - السدوية . الاسدية ٢ مستقلة وخويطاتها قصيرة وانثرياتها
مستطيلة وواحد منها ذو غريفة والاثنتان الآخريان ذوا غريفتين والغريفات متعرجة كثر او قل والموصل
بينها يعلمها على هيئة زائدة حلمية . المدقية . عادمة الاسدية المثلوجة . المبيض بيضي والمشيمات ٢ .

القلم قصير والسما ٢ كالة والبويضات عديدة افقية. الثمر لحمي كثير البذور مضغوطا - اعشاب متعرشة او مستلقية عنها بازهارها صفراء

١. *C. prophetarum*, L. **جلثا الانبياء (النافعة)** 2٤ رمادي خشن . ام الجذور اخيرا خنثية منفردة . السوق متعددة مستلقية دقيقة مبرزة ذات زوايا وركب عند العقد . الاوراق ٢٠١ مترالى ٢٠٢ طولاً كنية النصوص مسننة . الازهار منفردة صغيرة . الثمر يضي - اهليجي كنيف المحسك محط خطوطاً بيضاء - الربيع - طور سيناء . بر مصر عند البحر الاحمر

٢. *C. trigonus*, Roxb. **الجلثا الثلثية الزوايا** 2٤ خشن مندرن . السوق عديدة دقيقة مستطيلة . الاوراق ٢٠٢ مترالى ٢٠٣ طولاً كنية النصوص والاعلى منها ذات اسنان حادة . الازهار السدوية ٢-٣ والمدقية اكبر منها منفردة . المبيض وبرى الهيئة صوفي . الثمر خوخي صغير مخلي ذواتلام طولية - الربيع - قرب مرعش
ومن هذا الجنس الحيار *C. sativus*, L. والبطيخ *C. Melo*, L. والبطيخ الاصفر *C. Dudaim*, L.

٢ الحنظل *CITRULLUS*, Schrad.

الازهار احادية المسكن منفردة . انبوبة الكاس جرسية عريضة بلا حراشف عند قاعدتها وهدبا ذوه فصوص . النويج ذوه فصوص من منتصفه . السدوية . الاسدية ٢ وخويطاتها قصيرة مستقلة . الانثيرات متحدة قليلاً وواحد منها ذو غريفة والاثنتان الآخران ذوا غريفتين والغريقات متعرجة ولا يعلوها الموصل بينهما . المدقية . ذات اسدية متلوحة قدية . المبيض يضي والمشيئات ٢ والقلم قصير والسما ٢ ضخمة كlobة والبويضات عديدة افقية . الثمر كروي لحمي او جاف غير منشق - اعشاب مستلقية عنها منشعب وازهارها صفراء

C. Colocynthis, L. **الحنظل كولوسينثيس** 2٤ خشن جلاً سنجاني . الجذر ضخيم متصب . الاوراق مثلفة المحط ريشية النقص وفصوصها مفصصة او مخروقة وخنجانها مستديرة . الثمر كروي ٢٠٨ متر قطراً متلخ بخضرة وصفرة فطري مرّجداً والبذور ملساء لامعة قليلاً غير محرّفة - الصيف - رمال الشاطئ في سورية ومصر

٣ الأكيلوم *ECBALLIUM*, Rich.

الازهار احادية المسكن والسدوية منها في راسيات والمدقية منفردة . انبوبة الكاس قصيرة جرسية ذات ٥ خرق . النويج جرسى عريض ذوه فصوص مستطيلة حادة . السدوية . الاسدية ٢ وخويطاتها قصيرة مستقلة وواحد من انثيراتها عريض ذو غريفة واحدة والاخران ذوا غريفتين معوجتين والموصل

بينها غير ممد اعلاها . المدقية . الاسدية غير كاملة . المبيض مستطلي والمشيئات ٣ والقلم قصير
والسما ٢ متشعبة شعبيت والبيضات عديدة افنية . الثمر مستطلي قوتوي وعصاره مائي واذا نضج
انفصل عن زنده واخرج برزء وعصاره من ثوب قاعدي حقناً . البرور مستطولية - اعشاب مستلقية
بلا عنم ازهارها صفراء

E. Elaterium, L. . الأكلبيوم الاثيريوم (قشاء الحمار) 2٤ ضخم لحمي خشن مندور .
الاوراق طويلة الرجيلات شبيهة من الاسفل قليلة - بيضية او مثانة غير منتظمة الاسنان او ذات ٣
فصوص . الازهار ابضية والراسبات السدوية ذات زناد والازهار المدقية منفردة على الغالب وقد تشأ
من آباط الراسبات السدوية . الثمر منغض يضي زغي وقوتوي - كل السنة - بجانب الطرق شائع

٤ البريونيا ERYONIA, L.

الازهار ثنائية المسكن او احادية راسمية اوباقية والاثوية منها نادراً منفردة . الكاس جرسية ذات
٥ فصوص . التويج جرسى ذو ٥ فواصل . السدوية . الاسدية ٥ مرتبة في ٣ خوات وغريقات
السما ٢ خطية متعرجة . المدقية . القلم ذو ٣ شعب والبيضات عديدة افنية . الثمر عيني كروي غير
منشق - اعشاب خالدة متعرشة جذورها غليظة بضباضية وعنها غالباً بسيط

E. multiflora, Boiss. et Held. ١ . البريونيا الكثيرة الزهر 2٤ ثنائي المسكن .
الاوراق خضراء خشنة قصيرة الرجيلات قليلة ذات ٥ فصوص الى ٧ او مقصوصة فكثيراً ما تكون
الفصوص منقصعة . الازهار المدقية ذات كاس اقصر من التويج مرتبة في راسيات ذات زبيدات وقد
تفرع بقرب منشأها . القلم منشق قليلاً . السما ٢ خشنة . العنبة مصفرة - من حزيران الى آب -
مواضع صخرية وغابات في سورية الى علو ١١٠٠ متر

laxiflora, Post. ب . المسترسلة الزهر . الراسيات المدقية مسترسلة . الاوراق كاملة او
جوية او مضحلة الفصوص - اللاذقية

E. Syriaca, Boiss. ٢ . البريونيا السورية 2٤ ثنائي المسكن لحمي عنائي . الاوراق قليلة
- بيضية جوية الاسنان او مضحلة الفصوص . الازهار المدقية صغيرة ١ او ٢ في كل ابط ذات زناد
والكاس بطول التويج . القلم غير منشق . السما ٢ خشنة . العنبة حمراء - من ٢ الى ايار - مواضع نخبية
من يبروت وراشبا الى القدس

redunculata, Post. ب . الزندية . زناد الازهار المدقية ضعفا الثمر او ثلثة اضعافه طولاً

الأوراق كبيرة - يروت

racemosa, Post. . ت. الراسمية . الأزهار الانثوية ٢ - ٣ راسمية . الزناد قصيرة بطول

الشهر - يروت . عيبه . مرج عيون

والاوى ان يعتبر هذان النوعان مع تبايناتها تباينات النوع الاخير

الرتبة الخامسة والأربعون الداتسكية DATISCEÆ.

الأزهار قياسية ذات مسكنين . السدوية . الكاس انبوية قصيرة فصوصها ٤ - ٩ غير متساوية .
البتلات مفقودة . الاسدية ٩ - ١١ مندغمة على الغالب قبال فصوص الكاس . المدقية . الكاس
بيضاء . المبيض متحد بانبوبة الكاس ذو غرقة واحدة وقيمها مقروحة او مغانة . المشيات جلارية . البويضات
متعددة متقصة . الاقلام بعدد المشيات . الثمر جبي . البزور عديدة صغيرة والالبوم قليل - اعشاب

الداتسكا DATISCA, L.

اوصافه كما ذكر في شرح العائلة - عشب هيئة كهيئة القنب وثمره كثمر الخزام

D. cannabina, L. . الداتسكا القنبية 24 ا.لس . الساق منتصب عال . الأوراق ريشية -

مفردة وورقها ريمحة مدية طويلة الاسنان وكثيراً ما تكون العليا منها مفصولة الى ثلث فصوص
وراجعة عند قاعدتها . الأزهار في راسيات طويلة ابضية متخاللة باوراق خطية كاملة تقريباً . الجيب مدلى
- الصيف - مواضع رطبة الى علو ٢٠٠٠ متر

الرتبة السادسة والأربعون FICOIDÆE.

الأزهار قياسية خشوية . البتلات غير محدودة مندغمة في انبوبة الكاس او مفقودة . الاسدية مندغمة
حول المبيض في انبوبة الكاس وغالباً غير محدودة . المبيض ملتصق بانبوبة الكاس او مستقل متضمن
فيها ذو ٥ غرقات . الجيب فليي او صلب - اعشاب لحبية تنبت في اماكن رملية او على الصخور

٢ المسبريانثيم MESEMBRYANTHEMUM, L.

انبوبة الكاس ملتصقة بالمبيض ذات ٥ فاصيل . البتلات عديدة خطية مندغمة في انبوبة الكاس .
الاسدية غير محدودة مندغمة مع البتلات . الجيب ذو خمس زوايا وخمس غرقات محاط بانبوبة الكاس
وقمة منخفضة تنشق على هيئة كوكب

١. *M. crystallinum*, L. المسبرياتهم البلوري ☉ أو ☉ زاحف ذو حلقات شفافة كبيرة. الساق متشعب. الأوراق متردفة مسطحة بيضية والجذرية منها عريضة متقابلة ذات رجليات والعليا جالسة. الازهار جالسة تقريباً ابوية وانتهائية. خرق الكاس بيضية غير متساوية الجنبين. الپتلات يضاء اطول من الكاس - الربيع - الرمال بقرب الاسكندرية

٢. *M. nodiflorum*, L. المسبرياتهم العقدية الزهر ☉ زاحف او متساعد حلبي. الفروع متشعبة. الأوراق متقابلة ومتردفة خطية نصف - اسطوانية كالة هدية القواعد والجذدية منها مذبذبة. الازهار ابوية وانتهائية جالسة تقريباً. خرق الكاس خطية نصف - اسطوانية غير متساوية. الپتلات اقصر من الكاس يضاء الا قاعدتها وهي صفراء - الربيع - بجانب الطرق وفي المواضع الرملية بقرب الشاطئ في سورية وطورسينا وبر مصر. تدمر

٣. *M. Forskahlei*, Hochst. مسبرياتهم فورسكال. (الفاصول) ☉ حلبي. الفروع قصيرة ضخمة لحية متشعبة. الأوراق متقابلة صفيحة اسطوانية مذبذبة مخروطية والعليا منها راجعة. الزناد في نطق التشعب او انتهائية. خرق الكاس مخروطية متساوية الطول تقريباً. الپتلات اطول من الكاس قليلاً - الربيع - رمل الشاطئ بقرب ذهب في طورسينا. قصير

٢ الياشنيد *AIZOON*, L.

انبوبة الكاس بلبلية او نصف - كروية غير ملتصقة بالبيض ذات ٥ تناصيل. الپتلات مفقودة. الاسدية عديدة مندغبة في حجرة الكاس مجموعة حزاماً تتخلل فصوصها. الجيب قلبي او سنجاني محاط بالكاس المستمرة ذو ٥ غربات تنشق عند قمتها على هيئة كوكب - اعشاب سنوية


١. *A. Hispanicum*, L. الياشنيد الاسبانيولي ☉ حلبي. الساق منتصب متشعب. الالوارق متقابلة جالسة رحيمة كالة. الازهار ذات زناد. انبوبة الكاس يضاء من الداخل - الربيع - مواضع جافة من حلب الى طورسينا

٢. *A. Canariense*, L. الياشنيد الكناري ☉ مائل الى 2 حلبي وبري. الساق زاحف وقد يكون متصلباً متعرجاً مترداف الخرايع. الالوارق متردفة بيضية - مقلوبة - ملوقية اسفينية الفاعدة ذات رجلة. الازهار جالسة في الالباط متقاربة. انبوبة الكاس مصفرة من الداخل - الربيع - حقول واماكن رملية في بادية مصر

الرتبة السابعة والاربعون الصيوانية *UMBELLIFERAE*. Juss.

الازهار خنثوية او مزوجية قياسية او الپتلات المخارجية شعاعية غير قياسية. التزهر صوباني ونادراً

راسي. انبوبة الكاس ملتصقة بالمبيض وهدبها مضحل او ذو اسنان. الپتلات مندغبة في حافة الكاس والتصيف متراكب ونادراً مصراعي. الاسدية مندغبة مع الپتلات او متخالفاً. المبيض ذو غريفتين ونادراً واحدة والبويضة منفردة في الغرقة متعصب. حاملات الفلپن (اي قاعدتها) متنفخان يكونان قرصين اعلى المبيض. الثمر ذو ١ اعصاب او اخمعة تسمى الاضلاع الاولى وبينها اوراب وفيها انايب زيتية على الغالب تسمى فتات غير انها قد تستتر تحت الاضلاع. وقد توجد في قعر الاوراب اضلاع ثانوية موبتنصل الثمر عند نضجه الى نصف ثمر ويسمى الخط الموصل بينها الدرز والمجر الحاملها حامل الثميرة. والبزر ملتصق غالباً باغلفة الثمر - رتبة كبيرة طبيعية اكثر نباتاتها اعشاب عطرية وبعضها سامة جداً



١. صوان مركب من الكونيوم المتطخ حالة الإثمار. ب. قطعة من ساق المتطخ وورقة منه ثلثية التركيب الريشي
ث. صويوين واحد حالة التزهر. ث. زهرة واحدة مكبرة. ج. الثمر الناضج. ح. مقطوعه المستعرض. خ.
مقطوع نصف الثمر الطولي يظهر فيه المحبين الصغير قرب قمة الاليوم

مفتاح الاسباط

* الصوانات بسيطة

السبط الاول. الهيدروكوتيليات. HYDROCOTYLEÆ. الثمر مضغوط مجانب

السبط الثاني. السانكيوليات. *SANTICULEÆ*. الثمر مستدير ومضغوط ظهراً

** الصليوانات مركبة

+ الاضلاع الاولى بارزة وقد تُفقد الفئات في الاوراب

السبط الثالث. الاخينوفوريات. *ECHINOPHOREÆ*. زهرة الصليان المحورية مدقية،
الازهار الشعاعية سدوية ذات زنبقات. الثمر مغلف بزنبقات الازهار السدوية

السبط الرابع. السميرنيات. *SMYRNEÆ*. الثمر بيضي عريض او توائج مضغوط
مجانبة ونادراً مستدير. وجه الثمرة الانسي مئذب ومحفور

السبط الخامس. الامينيات. *AMMINEÆ*. الثمر مضغوط مجانبة كثر او قل بيضي-
مستطلي او توائي وقد يكون خطياً قصيراً. الاضلاع الثانوية غالباً واضحة. وجه الالبوم من الانسي
مسطح او محرف قليلاً

السبط السادس. السكانديسينيات. *SCANDIACINEÆ*. الثمر مضغوط مجانبة
مستطلي او خطي. وجه الالبوم من الانسي مئذب ونادراً محرف

السبط السابع. السسلينيات. *SESSILIFLOREÆ*. فقطوع الثمر المستعرض مستدير تقريباً
او مضغوط ظهراً. الدرز عريض. الاضلاع الجانبية ممتازة او متحدة في حافة عصبية ارفينية

السبط الثامن. الپيوسدانيات. *PIEUSIDANEÆ*. الثمر مفطح الظهر او عديم
مضغوط. الاضلاع الثانوية مفقودة. الالبوم من المسطح من الانسوة ونادراً محرف
+ + الاوراب التي تقطعي الفئات متضخمة او مجهزة باضلاع ثانوية

السبط التاسع. الكركلينيات. *CARCULENEÆ*. الثمر مضغوط مجانبة او ظهراً اسطوانياً
تقريباً. الاضلاع الاولى والثانوية منتهية باعراف، فصصة او جهاب او حسان ونادراً كاملة والثانوية
منفرجة اكثر من الاولى على الغالب

السبط الاول الهيدروكوتيليات. *HYDROCOTYLEÆ*

الهيدروكوتيلة. *HYDROCOTYLE*

اسنان الكاس مضخمة. البتلات بيضية كاملة حادة غير مخبئة الى الداخل. الثمر مضغوط مجانبة.

نصف الثمر بلا ثنات ولا ضلاع ه خيطية وكثيراً ما يكون الضلع المحزوي والضلعان المجانبان مضحلة والموسطان مخبيين . حامل الثمرتين غير منقسم — اعشاب معمرة مستقيمة متصالبة عند العقد . *H. natans*, Cyr. المهيدروكوتيلة الساجحة 24 املس رخاف . الاوراق طويلة الرجيلات . متندبة — كلوية ذات فصوص شراغية . الزناد قصيرة ضخمة . الازهار ٥ — ٦ قصيرة الزنيدات راسية صوانية . الثمر نوامي واضلاعه غير واضحة — اصيف — عائم في المهنقعات والاخاديد قرب الحولة

السبط الثاني . الساكيويات . SANICULÆ.

* كل الازهار جاملة

١ . *Thymifera*. الازهار خنوية في رؤوس مندبة . اعشاب غالباً مشبكة

* * كل الازهار او السدية منها ذات ثنيدات

٢ المبيض ذو غرينتين

٣ . *Aethnoloma*. الازهار ذات ظرف كبير

٤ . *Caricula*. الازهار ذات ظرف صغير

٥ + المبيض ذو غريفة واحدة وبويضة واحدة

٦ . *Lageria*. الكرات كثيرة الازهار . الثمر مكافئ . الوراق ريشية

١ الشجائيب . SPITTOGLOU, L.

الارادة شجيرة . اوراقها بيضاوية الى لانس . الى الان . معصية منقشرة مفروضة منتبهة بحرقه حارية مطوية الى الداخل . الثمر يضي ا على شريفي او درني . اضلاع نصف الثمر مضحلة . الثنات مفقودة او قليلة الرضوح تحت الاضلاع لاجلة . حاملات الثمرتين متلاصقان — اعشاب غالباً مشبكة صوانية راسية ار . لاجلة وزاد اراجاليتها وشميت كل منها ثلث

* * اعشاب حولة نامية في اماكن رطبة

E. Barbellieri

* * نباتات غالباً معمرة رؤوسها ذات زناد تقو في اماكن جافة

+ عصانة الخشب كثرة

E. glomeratum f *campulosa* Billardieri و *Heldreichii*

١ عصانة الخشب كثرة ذات ثلاثة انياب

E. dichotomum γ *falcatum* γ

+++ كل العصافة ذات ثلثة انياب

E. Creticum λ *maritimum* ٩

١. *E. Barrolieri*, Boiss. شنداب باريلير ① الاوراق الجذرية والساقية السفلى غشائية

مستطيلة - رمحية شرافية او ذات اسنان حسكية والساقية العليا جالسة وغالباً ذات ثلث قطع فالقطعة الوسطى اطول من الجانبين واعرض ذات اسنان حسكية. الساق مخفض متشعب من الاعلى. الرؤوس جالسة. اوراق الظرف ١٢-١٤ حسكية القاعدة. العصافة اطول كثيراً من الكاس ذات حمة قصيرة - تموز - في الطين الرطب بقرب شاطئ طرابلس

٢. *E. glomeratum*, Lam. الشنداب المعبأ (عود القزم) 2٤ اخضر اغبر ٢٥ متر

الى متر علواً. الاوراق غدية الرحلة قليلاً غشائية الحوافي مزدوجة التفصيل الريشي وقطعها خطية حسكية مستقيمة سريعاً في الاوراق السفلى. والساق متصلب معاني. اوراق الظرف ٥ تقريباً ٢ اضعاف الراس طولاً الى ٥ والرأس صغير. العصافة اقصر من الكاس - الصيف - المحقول في جبال سورية. كثير الوجود وياكل المزروسة بشراهة

depaupertatum, Post. ب. المنقعر. الساق نحيل مخفض ١٢، متر الى ٢٠ علواً.

الاوراق صغيرة قليلة القطع. الرؤوس قليلة صغيرة راسمية الترتيب تقريباً بين بعليك والشعد

٣. *E. campestre*, L. الشنداب السهلي (الشقائل) 2٤ اخضر اغبر ٢٣ متر الى ٣٠

علواً. الاوراق مخبائية مشبكة الوردية والجذرية منها بيضة المحوط مقصوفة الى ثلاث قطع رابعة ريشية ومشرحة حسكية الاسنان والساقية معانة قريشية ذات اذينات. الساق متشعب كورني. اوراق الظرف ٦-٧ ضعفاً الراس طولاً. العصافة اطول من الكاس - الصيف - اماكن جافة بقرب الاسكندرية

٤. *E. Billardieri*, Laroche. شنداب بليارديير 2٤ ٣٣ متر الى ٣٧ علواً ازرق.

الاوراق الجذرية طويلة الرجالات كبيرة بيضية - مستديرة المحيط مفصلة الى ٢ قطع مجمدة كفية النصوص اوريشية حسكية الاسنان. والساقية جالسة كفية ذات ٢ قطع رمحية اوريشية حسكية الاسنان. الكورنب مسترسل. اوراق الظرف ٧-٩ ثلثة اضعاف الراس طولاً الى ٤ بتخللها حسك. العصافة اطول من الكاس - الصيف - تحت جرود لبنان وجبل الشيخ

٥. *E. Heldreichii*, Boiss. شنداب هلدريخ (القرصة) 2٤ اخضر باهت او مزرق من

الاعلى ١٢ متر الى ٢٥ علواً وقاعدته مغلفة بالهاف الاوراق الندية. صفحية الاوراق الجذرية صغيرة مستديرة ثنائية التفصيل الثلاثي المنشأ. الاوراق الساقية مثلها وقصيرة الرجالات. الرؤوس كورنية.

اوراق الظرف ٧-٨ بلا حسك مجزئة خطية - رمية ٢ اضعاف الراس طولاً أو ٤ . العصافه اطول قليلاً من الكاس - الصيف - جرود لبنان وجبل الشيخ

E. dichotomum, Desf. ٦. الشنداب المشعب 24 اخضر. الاوراق الجذرية والعلوية الساقية غشائية قلبية - مستطيلة شرافية ذات رجيلات . والساقية المتوسطة والعلوية سحائية جالسة كنية التفصيل وقطعها رمية ذات اسنان حسكية . الساق مخفض كورني منفرش . اوراق الظرف ٧-٨ خطية حسكية متباعدة ٢ اضعاف الراس طولاً . العصافه اطول من الكاس والخارجية منها ذات ٢ انياب والبنية كاملة - الربيع - مواضع رملية بقرب الاسكندرية

E. falcatum, Laroche. ٧. الشنداب المنجلي 24 الاوراق السفلى غشائية طويلة الرجيلات قلبية - بيضية - شرافية غير منقسمة او ذات ٢ فصوص . الاوراق الساقية جالسة سحائية كنية التفصيل وقطعها رمية منعقبة مغلية حسكية الاسنان . الساق مسنن مشعب كورني الفم او راسمياً . اوراق الظرف ٥ - ٦ خطية - رمية حسكية ٢ اضعاف الرؤوس طولاً . العصافه ذات ٢ انياب الا الداخلية منها وهي كاملة - الربيع - الحقول الجافة في الساحل البحري والجبال المنخفضة من انطاكية الى الكرمل *palmatifidum*, Post. ب . الكفي التفصيل . الاوراق الجذرية ذات ٥ قطع مستطيلة

- رمية مزدوجة الاسنان . قطع الاوراق الساقية مستطيلة - مغلية مزدوجة الاسنان حموبها - بيروت

E. Creticum, Lam. ٨. الشنداب الاكريشي (قرص عني . شوك العقباني) 24 ازرق . الاوراق الجذرية الاولى سريعة الزوال غضة قلبية - مستطيلة بعينها اوراق جذرية بيضية المحيط او مستطيلة ثنائية التفصيل الريشي قطعها مخروقة حسكية الاسنان راجعة . الاوراق الساقية متراكمة جالسة قصيرة كنية التفصيل اوريشية قطعها رمية - خطية حسكية . الساق متشعب من الاعلى . اوراق الظرف ٥ منفرجة مجزئة ٢ اضعاف الراس طولاً الى ٤ ذات حسكين بقرب فاعدهما . كل العصافه ذات ٢ انياب واطول من الكاس - الربيع والصيف - الحقول . كثير الوجود في سواحل سورية وفلسطين واسفل جبالها

oblongum, Post. ب . المستطيلي . الاوراق الجذرية وبعض الساقية مستطيلة مسننة -

بيروت

E. maritimum, L. ٩. الشنداب البحري 24 اغبر . ام الجذور زحافة ستولونية . الاوراق سحائية ذات اعصاب والجذرية منها غير منقسمة قلبية - كلبية ذات رجيلات والساقية عريضة معانقة كنية الفصوص وكلها حسكية الاسنان متينتها . الكورنب منفرش . اوراق الظرف ٥ معينة عريضة حسكية الاسنان واطول قليلاً من الراس . العصافه ذات ٢ انياب . انبوبة الكاس قلبيية اخيراً وحلها

العليا حشكية وخرقها رحيمة غضة مدببة - الصيف - رمل شاطئ سورية

٢ الأكتينوليا ACTINOLEMA, Fenzl.

الازهار مزوجية والمحورية منها خشوية جالسة تقريباً والذمية سدوية ذات زوائد . هذب الكاس ذو ٥ تفاصيل ورقية . البتلات منتصبة متغامزة مستطيلة - رحيمة . الذر قليل النفاطح الظهري . اضلاع نصف النمر ٥ متساوية مرتفعة كالة اسفنجية مسنة العرف الظهري مندرة المجانين . البتات كبيرة واحدة تحت كل ضلع . حامل الثمرة ملتصق بها - اعشاب سنوية ثنائية التشعب وثلاثية صواناتها بسيطة منفردة ذات ظرف عريض شفاف تقريباً مثبلك الوردية . الازهار ٢ - ٥

٢١٢. *A. eryngioides*, Fenzl. الأكتينوليا الشندادية Ⓞ املس . قطر البتات الكامل ٢١٢ مم إلى ٢٣٠ . الساق مبيض كثير الفروع والتفاصيل بين العند طويلة . الاوراق الصلي مستطيلة مسنة قصيرة الرجيعة . الاوراق عند نقط التشعب ٢ - ١٠ اضيق من البقية حشكية الاسنان والعليا رحيمة ذات ٢ انياب . اوراق الظرف ٥ - ٦ غير متساوية حشكية الاسنان . الثمر يضي مستطيلي واضلاعه مجهزة بعرف من اسنان متراكمة كالة نجه بالنعاقب الى الجبال . الاوراق ذرية - ابار - جنول حلب ودمشق وإلى الشرق

٣ السانكيولا SANTUCULA

الازهار مزوجية . اسنان الكاس ٥ تشبة تقريباً . البتلات متصصة منها ٢ - ٣ - مقنونة منتبهة مخرفة مثنية الى الاسبية . الثمر يضي - كروي مضغوط قليلاً . اوراق الاور الشدية . البتات كثيرة والاضلاع مضحلة . حامل الثمرة منفرد - اعشاب - ٢٠ - ٣٠ سم ارتفاعاً . اوراق قليل الاشعة وصويوناتها في رؤوس والازهار الحشوية جالسة تقريباً والمندرة ذات زوائد

٢١٣. *S. Europæa*, L. السانكيولا الأوروبية 2٤ انوارق . البتات في ظريفة الرجات كفية المخرق والاقسام وقطعها يضي - مقنونة ذات ٣ خرق مشارة - حشوية . البتات انبائية وكثيراً ما تكون مركبة والصويونيات كروية كثيرة الازهار . اوراق النمر ٢ - ٣ مدندة اقصر من الرياس خلية ذات صلبة - غابات غير رضاء

٤ القطرب

فصوص الكاس ٥ كبيرة مدببة . الاوراق ١١ - ١٢ - ١٣ - ١٤ - ١٥ - ١٦ - ١٧ - ١٨ - ١٩ - ٢٠ - ٢١ - ٢٢ - ٢٣ - ٢٤ - ٢٥ - ٢٦ - ٢٧ - ٢٨ - ٢٩ - ٣٠ - ٣١ - ٣٢ - ٣٣ - ٣٤ - ٣٥ - ٣٦ - ٣٧ - ٣٨ - ٣٩ - ٤٠ - ٤١ - ٤٢ - ٤٣ - ٤٤ - ٤٥ - ٤٦ - ٤٧ - ٤٨ - ٤٩ - ٥٠ - ٥١ - ٥٢ - ٥٣ - ٥٤ - ٥٥ - ٥٦ - ٥٧ - ٥٨ - ٥٩ - ٦٠ - ٦١ - ٦٢ - ٦٣ - ٦٤ - ٦٥ - ٦٦ - ٦٧ - ٦٨ - ٦٩ - ٧٠ - ٧١ - ٧٢ - ٧٣ - ٧٤ - ٧٥ - ٧٦ - ٧٧ - ٧٨ - ٧٩ - ٨٠ - ٨١ - ٨٢ - ٨٣ - ٨٤ - ٨٥ - ٨٦ - ٨٧ - ٨٨ - ٨٩ - ٩٠ - ٩١ - ٩٢ - ٩٣ - ٩٤ - ٩٥ - ٩٦ - ٩٧ - ٩٨ - ٩٩ - ١٠٠ - ١٠١ - ١٠٢ - ١٠٣ - ١٠٤ - ١٠٥ - ١٠٦ - ١٠٧ - ١٠٨ - ١٠٩ - ١١٠ - ١١١ - ١١٢ - ١١٣ - ١١٤ - ١١٥ - ١١٦ - ١١٧ - ١١٨ - ١١٩ - ١٢٠ - ١٢١ - ١٢٢ - ١٢٣ - ١٢٤ - ١٢٥ - ١٢٦ - ١٢٧ - ١٢٨ - ١٢٩ - ١٣٠ - ١٣١ - ١٣٢ - ١٣٣ - ١٣٤ - ١٣٥ - ١٣٦ - ١٣٧ - ١٣٨ - ١٣٩ - ١٤٠ - ١٤١ - ١٤٢ - ١٤٣ - ١٤٤ - ١٤٥ - ١٤٦ - ١٤٧ - ١٤٨ - ١٤٩ - ١٥٠ - ١٥١ - ١٥٢ - ١٥٣ - ١٥٤ - ١٥٥ - ١٥٦ - ١٥٧ - ١٥٨ - ١٥٩ - ١٦٠ - ١٦١ - ١٦٢ - ١٦٣ - ١٦٤ - ١٦٥ - ١٦٦ - ١٦٧ - ١٦٨ - ١٦٩ - ١٧٠ - ١٧١ - ١٧٢ - ١٧٣ - ١٧٤ - ١٧٥ - ١٧٦ - ١٧٧ - ١٧٨ - ١٧٩ - ١٨٠ - ١٨١ - ١٨٢ - ١٨٣ - ١٨٤ - ١٨٥ - ١٨٦ - ١٨٧ - ١٨٨ - ١٨٩ - ١٩٠ - ١٩١ - ١٩٢ - ١٩٣ - ١٩٤ - ١٩٥ - ١٩٦ - ١٩٧ - ١٩٨ - ١٩٩ - ٢٠٠ - ٢٠١ - ٢٠٢ - ٢٠٣ - ٢٠٤ - ٢٠٥ - ٢٠٦ - ٢٠٧ - ٢٠٨ - ٢٠٩ - ٢١٠ - ٢١١ - ٢١٢ - ٢١٣ - ٢١٤ - ٢١٥ - ٢١٦ - ٢١٧ - ٢١٨ - ٢١٩ - ٢٢٠ - ٢٢١ - ٢٢٢ - ٢٢٣ - ٢٢٤ - ٢٢٥ - ٢٢٦ - ٢٢٧ - ٢٢٨ - ٢٢٩ - ٢٣٠ - ٢٣١ - ٢٣٢ - ٢٣٣ - ٢٣٤ - ٢٣٥ - ٢٣٦ - ٢٣٧ - ٢٣٨ - ٢٣٩ - ٢٤٠ - ٢٤١ - ٢٤٢ - ٢٤٣ - ٢٤٤ - ٢٤٥ - ٢٤٦ - ٢٤٧ - ٢٤٨ - ٢٤٩ - ٢٥٠ - ٢٥١ - ٢٥٢ - ٢٥٣ - ٢٥٤ - ٢٥٥ - ٢٥٦ - ٢٥٧ - ٢٥٨ - ٢٥٩ - ٢٦٠ - ٢٦١ - ٢٦٢ - ٢٦٣ - ٢٦٤ - ٢٦٥ - ٢٦٦ - ٢٦٧ - ٢٦٨ - ٢٦٩ - ٢٧٠ - ٢٧١ - ٢٧٢ - ٢٧٣ - ٢٧٤ - ٢٧٥ - ٢٧٦ - ٢٧٧ - ٢٧٨ - ٢٧٩ - ٢٨٠ - ٢٨١ - ٢٨٢ - ٢٨٣ - ٢٨٤ - ٢٨٥ - ٢٨٦ - ٢٨٧ - ٢٨٨ - ٢٨٩ - ٢٩٠ - ٢٩١ - ٢٩٢ - ٢٩٣ - ٢٩٤ - ٢٩٥ - ٢٩٦ - ٢٩٧ - ٢٩٨ - ٢٩٩ - ٣٠٠ - ٣٠١ - ٣٠٢ - ٣٠٣ - ٣٠٤ - ٣٠٥ - ٣٠٦ - ٣٠٧ - ٣٠٨ - ٣٠٩ - ٣١٠ - ٣١١ - ٣١٢ - ٣١٣ - ٣١٤ - ٣١٥ - ٣١٦ - ٣١٧ - ٣١٨ - ٣١٩ - ٣٢٠ - ٣٢١ - ٣٢٢ - ٣٢٣ - ٣٢٤ - ٣٢٥ - ٣٢٦ - ٣٢٧ - ٣٢٨ - ٣٢٩ - ٣٣٠ - ٣٣١ - ٣٣٢ - ٣٣٣ - ٣٣٤ - ٣٣٥ - ٣٣٦ - ٣٣٧ - ٣٣٨ - ٣٣٩ - ٣٤٠ - ٣٤١ - ٣٤٢ - ٣٤٣ - ٣٤٤ - ٣٤٥ - ٣٤٦ - ٣٤٧ - ٣٤٨ - ٣٤٩ - ٣٥٠ - ٣٥١ - ٣٥٢ - ٣٥٣ - ٣٥٤ - ٣٥٥ - ٣٥٦ - ٣٥٧ - ٣٥٨ - ٣٥٩ - ٣٦٠ - ٣٦١ - ٣٦٢ - ٣٦٣ - ٣٦٤ - ٣٦٥ - ٣٦٦ - ٣٦٧ - ٣٦٨ - ٣٦٩ - ٣٧٠ - ٣٧١ - ٣٧٢ - ٣٧٣ - ٣٧٤ - ٣٧٥ - ٣٧٦ - ٣٧٧ - ٣٧٨ - ٣٧٩ - ٣٨٠ - ٣٨١ - ٣٨٢ - ٣٨٣ - ٣٨٤ - ٣٨٥ - ٣٨٦ - ٣٨٧ - ٣٨٨ - ٣٨٩ - ٣٩٠ - ٣٩١ - ٣٩٢ - ٣٩٣ - ٣٩٤ - ٣٩٥ - ٣٩٦ - ٣٩٧ - ٣٩٨ - ٣٩٩ - ٤٠٠ - ٤٠١ - ٤٠٢ - ٤٠٣ - ٤٠٤ - ٤٠٥ - ٤٠٦ - ٤٠٧ - ٤٠٨ - ٤٠٩ - ٤١٠ - ٤١١ - ٤١٢ - ٤١٣ - ٤١٤ - ٤١٥ - ٤١٦ - ٤١٧ - ٤١٨ - ٤١٩ - ٤٢٠ - ٤٢١ - ٤٢٢ - ٤٢٣ - ٤٢٤ - ٤٢٥ - ٤٢٦ - ٤٢٧ - ٤٢٨ - ٤٢٩ - ٤٣٠ - ٤٣١ - ٤٣٢ - ٤٣٣ - ٤٣٤ - ٤٣٥ - ٤٣٦ - ٤٣٧ - ٤٣٨ - ٤٣٩ - ٤٤٠ - ٤٤١ - ٤٤٢ - ٤٤٣ - ٤٤٤ - ٤٤٥ - ٤٤٦ - ٤٤٧ - ٤٤٨ - ٤٤٩ - ٤٥٠ - ٤٥١ - ٤٥٢ - ٤٥٣ - ٤٥٤ - ٤٥٥ - ٤٥٦ - ٤٥٧ - ٤٥٨ - ٤٥٩ - ٤٦٠ - ٤٦١ - ٤٦٢ - ٤٦٣ - ٤٦٤ - ٤٦٥ - ٤٦٦ - ٤٦٧ - ٤٦٨ - ٤٦٩ - ٤٧٠ - ٤٧١ - ٤٧٢ - ٤٧٣ - ٤٧٤ - ٤٧٥ - ٤٧٦ - ٤٧٧ - ٤٧٨ - ٤٧٩ - ٤٨٠ - ٤٨١ - ٤٨٢ - ٤٨٣ - ٤٨٤ - ٤٨٥ - ٤٨٦ - ٤٨٧ - ٤٨٨ - ٤٨٩ - ٤٩٠ - ٤٩١ - ٤٩٢ - ٤٩٣ - ٤٩٤ - ٤٩٥ - ٤٩٦ - ٤٩٧ - ٤٩٨ - ٤٩٩ - ٥٠٠ - ٥٠١ - ٥٠٢ - ٥٠٣ - ٥٠٤ - ٥٠٥ - ٥٠٦ - ٥٠٧ - ٥٠٨ - ٥٠٩ - ٥١٠ - ٥١١ - ٥١٢ - ٥١٣ - ٥١٤ - ٥١٥ - ٥١٦ - ٥١٧ - ٥١٨ - ٥١٩ - ٥٢٠ - ٥٢١ - ٥٢٢ - ٥٢٣ - ٥٢٤ - ٥٢٥ - ٥٢٦ - ٥٢٧ - ٥٢٨ - ٥٢٩ - ٥٣٠ - ٥٣١ - ٥٣٢ - ٥٣٣ - ٥٣٤ - ٥٣٥ - ٥٣٦ - ٥٣٧ - ٥٣٨ - ٥٣٩ - ٥٤٠ - ٥٤١ - ٥٤٢ - ٥٤٣ - ٥٤٤ - ٥٤٥ - ٥٤٦ - ٥٤٧ - ٥٤٨ - ٥٤٩ - ٥٥٠ - ٥٥١ - ٥٥٢ - ٥٥٣ - ٥٥٤ - ٥٥٥ - ٥٥٦ - ٥٥٧ - ٥٥٨ - ٥٥٩ - ٥٦٠ - ٥٦١ - ٥٦٢ - ٥٦٣ - ٥٦٤ - ٥٦٥ - ٥٦٦ - ٥٦٧ - ٥٦٨ - ٥٦٩ - ٥٧٠ - ٥٧١ - ٥٧٢ - ٥٧٣ - ٥٧٤ - ٥٧٥ - ٥٧٦ - ٥٧٧ - ٥٧٨ - ٥٧٩ - ٥٨٠ - ٥٨١ - ٥٨٢ - ٥٨٣ - ٥٨٤ - ٥٨٥ - ٥٨٦ - ٥٨٧ - ٥٨٨ - ٥٨٩ - ٥٩٠ - ٥٩١ - ٥٩٢ - ٥٩٣ - ٥٩٤ - ٥٩٥ - ٥٩٦ - ٥٩٧ - ٥٩٨ - ٥٩٩ - ٦٠٠ - ٦٠١ - ٦٠٢ - ٦٠٣ - ٦٠٤ - ٦٠٥ - ٦٠٦ - ٦٠٧ - ٦٠٨ - ٦٠٩ - ٦١٠ - ٦١١ - ٦١٢ - ٦١٣ - ٦١٤ - ٦١٥ - ٦١٦ - ٦١٧ - ٦١٨ - ٦١٩ - ٦٢٠ - ٦٢١ - ٦٢٢ - ٦٢٣ - ٦٢٤ - ٦٢٥ - ٦٢٦ - ٦٢٧ - ٦٢٨ - ٦٢٩ - ٦٣٠ - ٦٣١ - ٦٣٢ - ٦٣٣ - ٦٣٤ - ٦٣٥ - ٦٣٦ - ٦٣٧ - ٦٣٨ - ٦٣٩ - ٦٤٠ - ٦٤١ - ٦٤٢ - ٦٤٣ - ٦٤٤ - ٦٤٥ - ٦٤٦ - ٦٤٧ - ٦٤٨ - ٦٤٩ - ٦٥٠ - ٦٥١ - ٦٥٢ - ٦٥٣ - ٦٥٤ - ٦٥٥ - ٦٥٦ - ٦٥٧ - ٦٥٨ - ٦٥٩ - ٦٦٠ - ٦٦١ - ٦٦٢ - ٦٦٣ - ٦٦٤ - ٦٦٥ - ٦٦٦ - ٦٦٧ - ٦٦٨ - ٦٦٩ - ٦٧٠ - ٦٧١ - ٦٧٢ - ٦٧٣ - ٦٧٤ - ٦٧٥ - ٦٧٦ - ٦٧٧ - ٦٧٨ - ٦٧٩ - ٦٨٠ - ٦٨١ - ٦٨٢ - ٦٨٣ - ٦٨٤ - ٦٨٥ - ٦٨٦ - ٦٨٧ - ٦٨٨ - ٦٨٩ - ٦٩٠ - ٦٩١ - ٦٩٢ - ٦٩٣ - ٦٩٤ - ٦٩٥ - ٦٩٦ - ٦٩٧ - ٦٩٨ - ٦٩٩ - ٧٠٠ - ٧٠١ - ٧٠٢ - ٧٠٣ - ٧٠٤ - ٧٠٥ - ٧٠٦ - ٧٠٧ - ٧٠٨ - ٧٠٩ - ٧١٠ - ٧١١ - ٧١٢ - ٧١٣ - ٧١٤ - ٧١٥ - ٧١٦ - ٧١٧ - ٧١٨ - ٧١٩ - ٧٢٠ - ٧٢١ - ٧٢٢ - ٧٢٣ - ٧٢٤ - ٧٢٥ - ٧٢٦ - ٧٢٧ - ٧٢٨ - ٧٢٩ - ٧٣٠ - ٧٣١ - ٧٣٢ - ٧٣٣ - ٧٣٤ - ٧٣٥ - ٧٣٦ - ٧٣٧ - ٧٣٨ - ٧٣٩ - ٧٤٠ - ٧٤١ - ٧٤٢ - ٧٤٣ - ٧٤٤ - ٧٤٥ - ٧٤٦ - ٧٤٧ - ٧٤٨ - ٧٤٩ - ٧٥٠ - ٧٥١ - ٧٥٢ - ٧٥٣ - ٧٥٤ - ٧٥٥ - ٧٥٦ - ٧٥٧ - ٧٥٨ - ٧٥٩ - ٧٦٠ - ٧٦١ - ٧٦٢ - ٧٦٣ - ٧٦٤ - ٧٦٥ - ٧٦٦ - ٧٦٧ - ٧٦٨ - ٧٦٩ - ٧٧٠ - ٧٧١ - ٧٧٢ - ٧٧٣ - ٧٧٤ - ٧٧٥ - ٧٧٦ - ٧٧٧ - ٧٧٨ - ٧٧٩ - ٧٨٠ - ٧٨١ - ٧٨٢ - ٧٨٣ - ٧٨٤ - ٧٨٥ - ٧٨٦ - ٧٨٧ - ٧٨٨ - ٧٨٩ - ٧٩٠ - ٧٩١ - ٧٩٢ - ٧٩٣ - ٧٩٤ - ٧٩٥ - ٧٩٦ - ٧٩٧ - ٧٩٨ - ٧٩٩ - ٨٠٠ - ٨٠١ - ٨٠٢ - ٨٠٣ - ٨٠٤ - ٨٠٥ - ٨٠٦ - ٨٠٧ - ٨٠٨ - ٨٠٩ - ٨١٠ - ٨١١ - ٨١٢ - ٨١٣ - ٨١٤ - ٨١٥ - ٨١٦ - ٨١٧ - ٨١٨ - ٨١٩ - ٨٢٠ - ٨٢١ - ٨٢٢ - ٨٢٣ - ٨٢٤ - ٨٢٥ - ٨٢٦ - ٨٢٧ - ٨٢٨ - ٨٢٩ - ٨٣٠ - ٨٣١ - ٨٣٢ - ٨٣٣ - ٨٣٤ - ٨٣٥ - ٨٣٦ - ٨٣٧ - ٨٣٨ - ٨٣٩ - ٨٤٠ - ٨٤١ - ٨٤٢ - ٨٤٣ - ٨٤٤ - ٨٤٥ - ٨٤٦ - ٨٤٧ - ٨٤٨ - ٨٤٩ - ٨٥٠ - ٨٥١ - ٨٥٢ - ٨٥٣ - ٨٥٤ - ٨٥٥ - ٨٥٦ - ٨٥٧ - ٨٥٨ - ٨٥٩ - ٨٦٠ - ٨٦١ - ٨٦٢ - ٨٦٣ - ٨٦٤ - ٨٦٥ - ٨٦٦ - ٨٦٧ - ٨٦٨ - ٨٦٩ - ٨٧٠ - ٨٧١ - ٨٧٢ - ٨٧٣ - ٨٧٤ - ٨٧٥ - ٨٧٦ - ٨٧٧ - ٨٧٨ - ٨٧٩ - ٨٨٠ - ٨٨١ - ٨٨٢ - ٨٨٣ - ٨٨٤ - ٨٨٥ - ٨٨٦ - ٨٨٧ - ٨٨٨ - ٨٨٩ - ٨٩٠ - ٨٩١ - ٨٩٢ - ٨٩٣ - ٨٩٤ - ٨٩٥ - ٨٩٦ - ٨٩٧ - ٨٩٨ - ٨٩٩ - ٩٠٠ - ٩٠١ - ٩٠٢ - ٩٠٣ - ٩٠٤ - ٩٠٥ - ٩٠٦ - ٩٠٧ - ٩٠٨ - ٩٠٩ - ٩١٠ - ٩١١ - ٩١٢ - ٩١٣ - ٩١٤ - ٩١٥ - ٩١٦ - ٩١٧ - ٩١٨ - ٩١٩ - ٩٢٠ - ٩٢١ - ٩٢٢ - ٩٢٣ - ٩٢٤ - ٩٢٥ - ٩٢٦ - ٩٢٧ - ٩٢٨ - ٩٢٩ - ٩٣٠ - ٩٣١ - ٩٣٢ - ٩٣٣ - ٩٣٤ - ٩٣٥ - ٩٣٦ - ٩٣٧ - ٩٣٨ - ٩٣٩ - ٩٤٠ - ٩٤١ - ٩٤٢ - ٩٤٣ - ٩٤٤ - ٩٤٥ - ٩٤٦ - ٩٤٧ - ٩٤٨ - ٩٤٩ - ٩٥٠ - ٩٥١ - ٩٥٢ - ٩٥٣ - ٩٥٤ - ٩٥٥ - ٩٥٦ - ٩٥٧ - ٩٥٨ - ٩٥٩ - ٩٦٠ - ٩٦١ - ٩٦٢ - ٩٦٣ - ٩٦٤ - ٩٦٥ - ٩٦٦ - ٩٦٧ - ٩٦٨ - ٩٦٩ - ٩٧٠ - ٩٧١ - ٩٧٢ - ٩٧٣ - ٩٧٤ - ٩٧٥ - ٩٧٦ - ٩٧٧ - ٩٧٨ - ٩٧٩ - ٩٨٠ - ٩٨١ - ٩٨٢ - ٩٨٣ - ٩٨٤ - ٩٨٥ - ٩٨٦ - ٩٨٧ - ٩٨٨ - ٩٨٩ - ٩٩٠ - ٩٩١ - ٩٩٢ - ٩٩٣ - ٩٩٤ - ٩٩٥ - ٩٩٦ - ٩٩٧ - ٩٩٨ - ٩٩٩ - ١٠٠٠ - ١٠٠١ - ١٠٠٢ - ١٠٠٣ - ١٠٠٤ - ١٠٠٥ - ١٠٠٦ - ١٠٠٧ - ١٠٠٨ - ١٠٠٩ - ١٠١٠ - ١٠١١ - ١٠١٢ - ١٠١٣ - ١٠١٤ - ١٠١٥ - ١٠١٦ - ١٠١٧ - ١٠١٨ - ١٠١٩ - ١٠٢٠ - ١٠٢١ - ١٠٢٢ - ١٠٢٣ - ١٠٢٤ - ١٠٢٥ - ١٠٢٦ - ١٠٢٧ - ١٠٢٨ - ١٠٢٩ - ١٠٣٠ - ١٠٣١ - ١٠٣٢ - ١٠٣٣ - ١٠٣٤ - ١٠٣٥ - ١٠٣٦ - ١٠٣٧ - ١٠٣٨ - ١٠٣٩ - ١٠٤٠ - ١٠٤١ - ١٠٤٢ - ١٠٤٣ - ١٠٤٤ - ١٠٤٥ - ١٠٤٦ - ١٠٤٧ - ١٠٤٨ - ١٠٤٩ - ١٠٥٠ - ١٠٥١ - ١٠٥٢ - ١٠٥٣ - ١٠٥٤ - ١٠٥٥ - ١٠٥٦ - ١٠٥٧ - ١٠٥٨ - ١٠٥٩ - ١٠٦٠ - ١٠٦١ - ١٠٦٢ - ١٠٦٣ - ١٠٦٤ - ١٠٦٥ - ١٠٦٦ - ١٠٦٧ - ١٠٦٨ - ١٠٦٩ - ١٠٧٠ - ١٠٧١ - ١٠٧٢ - ١٠٧٣ - ١٠٧٤ - ١٠٧٥ - ١٠٧٦ - ١٠٧٧ - ١٠٧٨ - ١٠٧٩ - ١٠٨٠ - ١٠٨١ - ١٠٨٢ - ١٠٨٣ - ١٠٨٤ - ١٠٨٥ - ١٠٨٦ - ١٠٨٧ - ١٠٨٨ - ١٠٨٩ - ١٠٩٠ - ١٠٩١ - ١٠٩٢ - ١٠٩٣ - ١٠٩٤ - ١٠٩٥ - ١٠٩٦ - ١٠٩٧ - ١٠٩٨ - ١٠٩٩ - ١١٠٠ - ١١٠١ - ١١٠٢ - ١١٠٣ - ١١٠٤ - ١١٠٥ - ١١٠٦ - ١١٠٧ - ١١٠٨ - ١١٠٩ - ١١١٠ - ١١١١ - ١١١٢ - ١١١٣ - ١١١٤ - ١١١٥ - ١١١٦ - ١١١٧ - ١١١٨ - ١١١٩ - ١١٢٠ - ١١٢١ - ١١٢٢ - ١١٢٣ - ١١٢٤ - ١١٢٥ - ١١٢٦ - ١١٢٧ - ١١٢٨ - ١١٢٩ - ١١٣٠ - ١١٣١ - ١١٣٢ - ١١٣٣ - ١١٣٤ - ١١٣٥ - ١١٣٦ - ١١٣٧ - ١١٣٨ - ١١٣٩ - ١١٤٠ - ١١٤١ - ١١٤٢ - ١١٤٣ - ١١٤٤ - ١١٤٥ - ١١٤٦ - ١١٤٧ - ١١٤٨ - ١١٤٩ - ١١٥٠ - ١١٥١ - ١١٥٢ - ١١٥٣ - ١١٥٤ - ١١٥٥ - ١١٥٦ - ١١٥٧ - ١١٥٨ - ١١٥٩ - ١١٦٠ - ١١٦١ - ١١٦٢ - ١١٦٣ - ١١٦٤ - ١١٦٥ - ١١٦٦ - ١١٦٧ - ١١٦٨ - ١١٦٩ - ١١٧٠ - ١١٧١ - ١١٧٢ - ١١٧٣ - ١١٧٤ - ١١٧٥ - ١١٧٦ - ١١٧٧ - ١١٧٨ - ١١٧٩ - ١١٨٠ - ١١٨١ - ١١٨٢ - ١١٨٣ - ١١٨٤ - ١١٨٥ - ١١٨٦ - ١١٨٧ - ١١٨٨ - ١١٨٩ - ١١٩٠ - ١١٩١ - ١١٩٢ - ١١٩٣ - ١١٩٤ - ١١٩٥ - ١١٩٦ - ١١٩٧ - ١١٩٨ - ١١٩٩ - ١٢٠٠ - ١٢٠١ - ١٢٠٢ - ١٢٠٣ - ١٢٠٤ - ١٢٠٥ - ١٢٠٦ - ١٢٠٧ - ١٢٠٨ - ١٢٠٩ - ١٢١٠ - ١٢١١ - ١٢١٢ - ١٢١٣ - ١٢١٤ - ١٢١٥ - ١٢١٦ - ١٢١٧ - ١٢١٨ - ١٢١٩ - ١٢٢٠ - ١٢٢١ - ١٢٢٢ - ١٢٢٣ - ١٢٢٤ - ١٢٢٥ - ١٢٢٦ - ١٢٢٧ - ١٢٢٨ - ١٢٢٩ - ١٢٣٠ - ١٢٣١ - ١٢٣٢ - ١٢٣٣ - ١٢٣٤ - ١٢٣٥ - ١٢٣٦ - ١٢٣٧ - ١٢٣٨ - ١٢٣٩ - ١٢٤٠ - ١٢٤١ - ١٢٤٢ - ١٢٤٣ - ١٢٤٤ - ١٢٤٥ - ١٢٤٦ - ١٢٤٧ - ١٢٤٨ - ١٢٤٩ - ١٢٥٠ - ١٢٥١ - ١٢٥٢ - ١٢٥٣ - ١٢٥٤ - ١٢٥٥ - ١٢٥٦ - ١٢٥٧ - ١٢٥٨ - ١٢٥٩ - ١٢٦٠ - ١٢٦١ - ١٢٦٢ - ١٢٦٣ - ١٢٦٤ - ١٢٦٥ - ١٢٦٦ - ١٢٦٧ - ١٢٦٨ - ١٢٦٩ - ١٢٧٠ - ١٢٧١ - ١٢٧٢ - ١٢٧٣ - ١٢٧٤ - ١٢٧٥ - ١٢٧٦ - ١٢٧٧ - ١٢٧٨ - ١٢٧٩ - ١٢٨٠ - ١٢٨١ - ١٢٨٢ - ١٢٨٣ - ١٢٨٤ - ١٢٨٥ - ١٢٨٦ - ١٢٨٧ - ١٢٨٨ - ١٢٨٩ - ١٢٩٠ - ١٢٩١ - ١٢٩٢ - ١٢٩٣ - ١٢٩٤ - ١٢٩٥ - ١٢٩٦ - ١٢٩٧ - ١٢٩٨ - ١٢٩٩ - ١٣٠٠ - ١٣٠١ - ١٣٠٢ - ١٣٠٣ - ١٣٠٤ - ١٣٠٥ - ١٣٠٦ - ١٣٠٧ - ١٣٠٨ - ١٣٠٩ - ١٣١٠ - ١٣١١ - ١٣١٢ - ١٣١٣ - ١٣١٤ - ١٣١٥ - ١٣١٦ - ١٣١٧ - ١٣١٨ - ١٣١٩ - ١٣٢٠ - ١٣٢١ - ١٣٢٢ - ١٣٢٣ - ١٣٢٤ - ١٣٢٥ - ١٣٢٦ - ١٣٢٧ - ١٣٢٨ - ١٣٢٩ - ١٣٣٠ - ١٣٣١ - ١٣٣٢ - ١٣٣٣ - ١٣٣٤ - ١٣٣٥ - ١٣٣٦ - ١٣٣٧ - ١٣٣٨ - ١٣٣٩ - ١٣٤٠ - ١٣٤١ - ١٣٤٢ - ١٣٤٣ - ١٣٤٤ - ١٣٤٥ - ١٣٤٦ - ١٣٤٧ - ١٣٤٨ - ١٣٤٩ - ١٣٥٠ - ١٣٥١ - ١٣٥٢

مفروض وحافياها منتهيان بهابطين طويلين مستقيمين. القلم واحد. الثمر نصفي لعدم بلوغ النصف الواحد يضي مكل بالكَاس . الاضلاع قليلة الوضوح والثلثات مفنودة - اعشاب سنوية ترهها ككروي .

اوراق الظرف والظريف وقطع الكاس ريشية بمجهزة بسبول

L. cuminoides, L. القطرب الكبوفي (الكبون البري) © الملس . الساق منتصب

مستدق منحرج قليل الفروع . الاوراق خطية المحيط ريشية وقطعا صغيرة جالسة متعابلة او يضية

مترادفة مستطيلة المخرق . الرؤوس منفضة قبل الانقسام . الزهرة ذات زنبدة داخل الظريف -

الربيع - المزارع . كثير الوجود

السبط الثالث . الاخينوفوريات ECHINOPHOREÆ.

٦. *Echinophora* . النخت نام وقاعة الثمر محاط به . الثلثات منفردة

٧. *Ptycnocycla* . النخت غير نام . الثلثات غير محدودة العدد

٥ الاخينوفورا ECHINOPHORA, L.

الصويان مركب قليل الاشعة . الزهرة المركزية للصويين جالسة مشمرة والبنية سدوية ذات

زنبذات . الثمر مستطيل - هرمي مستدير . حامل القلم مخروطي كامل تقريباً - اعشاب معبرة ذات

شوك ازارها صغراء

E. Gidderophora, Guss. الاخينوفورا السبغوربية ٢٤ منفرج الزغب قصيرة .

الساق منقط كورني الفروع . الاوراق المجذرية يضية - عريضة المحيط ثلاثية التفضيل الريشي وقطعا

اسنينة - مستطيلة مشنوقة بعد نصفها الى ٥ خرق الى ٧ خطية ذات حمة يضاء . الاوراق العليا قصيرة

المخرق او غير مخروقة . الصيانات عديدة ذات ٢ اشعة قصيرة الى ٥ . اوراق الظرف ريمية قصيرة .

اوراق الظريف مثلية - ريمية متعلبة اخيراً منفرجة منعقبة - آخر الصيف - اماكن مقفرة . عيتاب

٦ البكموسكالا PTYCNOCYCLA, L.

الازهار مزواجية . زهرة الصويان المركزية جالسة مشمرة والمحيط سدوية مصطفة صفاً واحداً ذات

زنبذات . كاس جميع الازهار ذات ٥ اسنان . الثمر اسطواناني او مستطيلي محاط بزنبذات الازهار العاقرة .

اغلفة الثمر غشائية على الاعلاحة مضبوطة . الثلثات ٣ او ٤ في الاوراب - اعشاب معبرة نجمية ازارها يضاء

عفائنه والثمر سفائ

P. tomentosa, Decaisn. البكنوسكلا اللبادية 24 مستغبر. الساق اسطواناني مخطط منتصب. الاوراق زغبية والسلي منها طويلة الرجيات ريشية وقطعا زوجان الى ٣ صغيرة مستطيلة ريشية الفصوص او الخرق كالمها او ممتنها وتقبل الاوراق العليا الى غمد خطي. الصبوانات طويلة الزناد لبادية كثيرة الاشعة قصيرتها. اوراق الظرف والظريف قصيرة ريشية منعقة. زينات الازهار العائرة ٦ الى ١٠ - الربيع - صخور بادية التيه وسبنا

السبط الرابع. السميذنيات. SMYRNEE.

* اغلفة الثمر رقيقة كنراو قل ملساء

- ٨ *Astoma*. 24 الاثمار توأمية ٢٠٠١ متر عرضاً. الجذر كروي (شكل ١٤٩)
- ٩ *Coriandrum*. ٢٠٠٢ متر عرضاً قليلة الانضغاط واضلاعها متعرجة
- ١٠ *Bifora*. ٢٠٠٣ وطولها ٢٠٠٢ متر عرضاً غير بارزة (شكل ١٥٠)
- ١١ *Conium*. ٢٠٠١ متر عرضاً واضلاعها بارزة (شكل ١٥١)
- ١٢ *Physospermum*. 24 الاثمار ريشية - توأمية ٢٠٠١ متر عرضاً واضلاعها غير واضحة
- ١٣ *Smyrniacum*. ٢٠٠١ الاثمار توأمية واضلاعها غير بارزة. الجذر بضباضج والازهار صفراء
- ١٤ *Smyrniopsis*. ٢٠٠١ او ٢٠٠٢ نصف الثمر منشوري خماسي الزوايا بارز الاضلاع

* * اغلفة الثمر فليبية ضخمة او قشرية او ذات فواقع

- ١٥ *Lecockia*. 24 الثمر ريشي ٢٠٠٨ متر طولاً فليبي توتوي (شكل ١٥٣)
- ١٦ *Hippomarathrum*. 24 الثمر توأمي يعلو قرص كاسي. الاضلاع درنية (شكل ١٥٤). الاوراق مشرحة الى خرق مخزنية يابسة
- ١٧ *Cachrys*. 24 الثمر ريشي مستطلي ٢٠١ متر طولاً اسفنجي. الاضلاع مضخمة (شكل ١٥٥)
- ١٨ *Prangos*. 24 مثل المتقدم ذكره الآن للاضلاع اخضجة عريضة (شكل ١٥٦)
- ١٩ *Colladonia*. 24 الثمر مستطلي - دبوسي. قطع الاوراق كبيرة مستطيلة (شكل ١٥٧)

٨ الاستوما *ASTOMA*, D. C.

هدب الكاس مضحل. الثمر مضغوط مجانبة عرضة أكثر من طولاً توأمي. حامل القلم قرص مخفض في الفرضة بين نصفي الثمر. نصف الثمر كروي مغلف بمنح. الاضلاع مضخمة نثرياً. الدرز ضيق

شكل ١٤٩



ثمار الاستوما المسلية الورق

— عشب جذره بضاضي ينبه ٢٧ Scaligeria و ٢٨ Carnum

A. seselifolium, D. C. الاستوما المسلية

الورق 2٢ ملمس. الماق متفرع على هيئة كورنب. الاوراق
المجزرية والساقية السفلى بيضة المحيط غضة ثنائية التفصيل الريشي
وقطعا بيضة مخروقة الى خرق صغيرة كالة راجمة. الاوراق العليا
جالسة تقريباً قليلة ريشية خطية المخرق. اشعة الصبوانات شجيلة
طويلة. اوراق الظرف ٤ الى ٦ خطية-هلبية-نيسان-تلول
القدس. مارسابا. البقاع

٩ الكزبرة (النقدة) CORIANDRUM, L.


اسنان الكاس ٥ غير متساوية. حامل القلم مخروطي كامل. الثمر يضي-كروي، الاضلاع
الاولية متعرجة والجانبية منها بعيدة عن الحافة. الثانوية ٤ خطية حادة بارزة—اعشاب سنوية ذات
ازهار بيضاء ورائحة ثقيلة

C. sativum, L. ١. الكزبرة المزروعة ٥ الاوراق السفلى ريشية ذات زوجين الى ٢
وقطعا اسفينية بيضة كالة مسنة-منصوصة. الاوراق العليا جالسة تقريباً ثنائية التفصيل الريشي او
ثلاثية خطية-هلبية. اشعة الصبوان ٥-١٠. الظرف منقود. اوراق الظريف ثلث او اقل من ذلك
خطية-رجحية قصيرة. القلم ٢ اضعاف حامله طولاً-الربيع-المزارع. كبر الوجود

C. tordylioides, Boiss. ٢. الكزبرة الثورديلية ٥ الاوراق ريشية ذات زوج او
زوجين قطعاً بيضة-مستطيلة كالة منقصصة. اشعة الصبوان كثيرة. اوراق الظرف منقودة او
قليلة او عديدة قصيرة منعقنة غشائية الحوافي. اوراق الظريف كثيرة رجحية منعقنة غشائية الحوافي—
الربيع-حلب. بعلبك. دمشق والى الشرق

١٠ البيفورا BIFORA, Hoffm.

هدب الكاس مضحل. عرض الثمر اكثر من طولو وهو ثنائي مكمل مجاملي قلبي صغيرين
مخروطيين. نصف الثمر كروي تقريباً. الاضلاع الاولى ٥ غير بارزة. الاوراق عريضة دائرية مفضنة.
الثبات منقودة—نباتات سنوية ازهارها بيضاء ورائحتها ثقيلة



B. testiculata, L. الفينورا الخصوية © املس.
المسوق زاوية متفرعة. الاوراق ثنائية التركيب الريشي والمجذرية
منها مستطيلة - اسطوانية مقصوفة - مسننة المخرق والساقية خطية
المخرق. اشعة الصوبان ٢ - ٣ و اشعة الصوبين ٢ - ٦ وجميع
الازهار مشعة. وكل من الطرف والظريف ورقة واحدة -
الربيع - مزارع سورية وفلسطين

١١ الكونيرم

حافة الكاس مضحلة. الثمر مضغوط مجامبة بيضي، اضلاع نصف الثمر متساوية بارزة.
الاوراق كثيرة المخطوط والثقات مضحلة. حافة حامل الفلم مسننة - اعشاب ذات ازهار بيضاء
والاوراق مشرحة



C. maculatum, L. الكونيرم المنقطع (الشوكران).
(شكل ١٤٨ و ١٥١) © الساق زاوية متساوية. الاوراق ثنائية
التركيب الريشي بيضبة - مستطيلة المخرق مسننة. الحافة
ذات ١٢ اشعة الى ٢٠ وظرف الظريف ١٢ - ١٤
مقوجة شرافية - الربيع - ارض البور. كثير الزهور
Leiocarpum, Boiss. الحامل الفلم مسننة - اعشاب

الشوكران المنقطع
الاوراق مسننة

الاضلاع كاملة - مع الزر

١٢ الفيسوسبيرم

هدب الكاس ذو اسنان. الثمر مضغوط ثنائي الفلج. الاوراق مسننة بارزة كاله
او بارزة. الاوراق ذات فية واحدة، حامل الفلم ثنائي كمال - اعشاب مسننة بارزة
F. squarrelifolium, All. الفيسوسبيرم (الكونيرم) الريشي
الاعلى. الاوراق طويلة الرجلات مثلثة - عريضة المدببة - اسطوانية المخرق - مسننة
مقصوفة او مسننة راجحة. الاوراق النابضة ارشدة ككاملة الصوبان ١٠ - ١٥
الطرف والظريف كثيرا الاوراق اضلاع اسطوانية المدببة - اعشاب مسننة بارزة
حاملها - الصيف - جابات شمالي سورية

١٢ السبيرنيوم SMYRNIUM, L.

اسنان الكاس مضخلة. الثمر منضبط مجانباً تروأى مكل مجامل قلم ضيق. الاضلاع الظهرية فقط بارزة وجميع الاضلاع غير بارزة. الاوراب كثيرة الثقات - اعشاب محولة متصببة جنرها مغزلي وكثيراً ما تكون اوراقها متخالفة وارهارها صفراء وقد تكون مزواجية

* الثروع والاوراق العليا مترادفة

S. rotundifolium)

* الثروع والاوراق العليا متخالفة

S. Orphanidis ٢ *connatum* ٣ *Olusatrum* ٤

S. rotundifolium HERN, MILL. ١. السبيرنيوم المستدير الورق @ اغبر. الساق غير مجنح.

الاوراق السفلى ثنائية المنشأ الثلاثي وقطعها بيضبة شرائية. الاوراق العليا مترادفة جالسة غير منقسومة قلبية معانقة مستديرة كاماء كاله. اثنتا الصوان ٧-١٢. اضلاع الثمر بارزة - الربيع - قلدون في ثالي دمشق

S. Orphanidis Boiss. ٢. السبيرنيوم الورقانيديسي @ امس. الساق غليظ ناصوري.

الاوراق الجذرية ثلثة المنشأ الثلاثي وقطعها لينة - ثنية مفصصة - مسنة ذات رجلات. والساقية السفلى كبيرة بيضبة - قلبية مفصصة ذبوا كبيرة ومسننة. اسماكاله وسهولة على رجلة عريضة غدية. والعليا متخالفة جالسة بيضبة - قلبية معانقة سائبة راجية. اثنتا الصوان ١٥-٢٠. الاضلاع قلبية الوضوح. الثمر منضبط حامل طولا ثغري. - اول الصيف - الملائقية

S. Orphanidis Boiss. et KY. ٣. السبيرنيوم اثنتا الاضلاع @ الثروع متخالفة.

الاوراق الجذرية عريضة ثنائية المنشأ الثلاثي وقطعها لينة - ثنية مفصصة - مسنة ذات رجلات. والساقية السفلى كبيرة بيضبة - قلبية مفصصة ذبوا كبيرة ومسننة. اسماكاله وسهولة على رجلة عريضة غدية. والعليا متخالفة جالسة بيضبة - قلبية معانقة سائبة راجية. اثنتا الصوان ١٥-٢٠. الاضلاع قلبية الوضوح. الثمر منضبط حامل طولا ثغري. - اول الصيف - الملائقية



سك ١٥٢

S. Orphanidis Boiss. ٤. السبيرنيوم اولوية الثروع

@ الساق منضبط. الاوراق السفلى. طرلة الرجلث ثنائية الملائقية

الثلاثي وقطعها بيضيه شرافية وكثيراً ما تكون ذات ٢ فصوص والعليا ثلثية المنشأ ذات غمد قصير
بيضي غشائي الحافة وقطعها بيضية - معينية . الصيوان مقعر واشعته ٥ - ١٥ متضخمة اخيراً . الثمر
٢.٠٠٦ متر طولاً واضلاغة الظهرة بارزة حادة - الربيع - مواضع مهمله . كثير الوجود في سورية

١٤ السبيرنيوبسيس *SMYRNIOPSIS*, Boiss.

اسنان الكاس مضحلة . الثمر منضغط مجانبية مكمل بجاملي قلبين عريضين منبعجين . نصف الثمر
منشوري ذوه زوايا حادة وجميع الاضلاع بارزة حادة . الاوراب ذات فتة او ٢ او ثنات كثيرة - اعتشاب
محولة او معبرة شبيهة بالسبيرنيوم

S. Syriaca, Boiss. ١ . السبيرنيوبسيس السوري ٥ متر علواً . الاوراق المجذبة

ثلاثية الانفصل الريشي وقطعها اسفينية - بيضية منشارية وجانبها الخارجى راجع قليلاً . الاوراق العليا
دولانية قليلاً جالسة ثلثية المنشأ او غير منفصلة اسفينية - مستطيلة كاملة تقريباً . اشعة الصيوانات ١٢ -
١٥ . اوراق الظرف والظرف ٣ - ٥ قصيرة خطية - رجمية - الصيف - الصخور والوهاد بين زبانة
وزحلة وقرب ارز الحدث

S. cachroides, Boiss. ٢ . السبيرنيوبسيس الكاكريسي ٢.٥ متر علواً . الاوراق السنلى

مستطيلة كاملة والبقعة قصيرة الرجلة مقلطحها ريشية ذات زوجين ٣ وقطعها مستطيلة راجعة شرافية
غير متسومة او مقسومة الى قسمين . والعليا مستقيمة الى غمدود مستطيلة قبيعية ذات ٢ قطع صغيرة او
عريانة . اشعة الصيوان عديدة طويلة ذات زوايا . اوراق الظرف والظرف مستطيلة - الصيف -
من مزارع انطاكيا الى حلب والى الشرق

١٥ اللكوكيا *LECOCKIA*, D. C.

شكل ١٥٣



صويون اللكوكيا الاكرتية

اسنان الكاس ٥ قصيرة . الثمر منضغط مجانبية بيضي .
نصف الثمر ذوه اضلاع ضخمة قلينية عريضة كالة حسكية من
الجانبين . الاوراب ميزانية - عشب معمر
L. Cretica, Lam. . اللكوكيا الاكرتية ٢.٥ متر الساق
عالٍ منقطع متفرع قليلاً من الاعلى . الصيوانات المجانبية غالباً
عقمية . الاوراق السنلى طويلة الرجلات مثلثة - عريضة المحيط
ثلثية المنشأ واقسامها ريشية وورقها مستطيلة مسننة او مخروقة .
الاوراق العليا متصاغرة ريشية . الظرف مفقود . اوراق الظرف

مخرزية. الاشعة ٦-١٠ صلبة. القلم طويل مستقيم وحاملة مخروطي طويل - ابار - الجبال قرب مرعش. لبنان من ١٠٠٠ متر الى ١٨٠٠

١٦ الهيوماراثروم *HIPPOMARATHRUM*, Link.

اسنان الكاس ٥ واضحة. الثمر مضغوط مجانبية يضي عريض نوامي تقريباً مكمل بقصر عريض كويبي وحاملي فلين صغيرين. نصف الثمر ذو اضلاع بارزة ضخمة ملساء ودنية او عرقية. الاغلفة قشرية صلبة - اعشاب معبرة متفرعة ازهارها صفراء واوراقها مشرحة الى خرق مخرزية باسنة

شكل ١٥٤



صوبون هيوماراثروم بوسيه

H. Boissieri, Reut. et Haussk. هيوماراثروم

بوسيه ٢٤ الساق مخطط دولاني التفرع او متقابلة. الاوراق قصيرة الخمل والساقية منها متصاعدة جالسة. الصوانات ذات ٤ اشعة او قصيرة. اوراق الظرف والظريف رحيمة قصيرة جداً. الثمر نوامي ٢٠٠ متر طولاً وعرضه اكثر من طوله والاضلاع ضخمة كالة مغطاة بآليل مندمجة حرسنية مستعرضة - الخريف - اماكن محجرة في سورية. كثير الامتداد نادر الوجود

اما هيوماراثروم المحرق *H. scabrum*, Fenzl. (Boiss. Fl. Or. II. 933) فرها هو تباين من المتقدم ذكره وربما ينبت بقرب قلندون والى الشمال

١٧ الكاكرس *CACHRYS* L.

اسنان الكاس مضحلة. القرص عريض وكثيراً ما تكون حافته مموجة. الثمر يضي او مستطيلي منضغط قليلاً مجانبية واغلفته اسفنجية ضخمة. الاضلاع ٥ قليلة البروز - اعشاب معبرة يتلاتها صفراء واوراقها مشرحة الى خرق شعرية

شكل ١٥٥



ثمر الكاكرس الزاوي الثمر

C. gonlocarpa, Boiss. الكاكرس الزاوي الثمر ٢٤

الساق عال كورني. اوراق الظرف والظريف خطية-هلبية. الثمر ٢٠١٢ متر طولاً غير متساوي النصفين على الغالب. نصف الثمر مستطيلي ذو خمس زوايا كالة عادم الميازيب - الربيع - صوف ضاغ. الكرمل. جنوبي فلسطين

١٨ الشلطة PRANGOS, Lindl.

هدب الكاس مفقود تقريباً. القرص عريض وكثيراً ما تكون حافته متموجة. الثمر منضغط قليلاً مجانباً وأغلفته اسفنجية. اضلاع نصف الثمر ممتدة الى ارجحة فلينية أو غشائية مسطحة أو متموجة - اعشاب معمرة يتلاهما صفراء وأوراقها مشرحة الى خرق خطية

١. *P. asperula*, Boiss. الشلطة الخشينة (فرش الضبع) ٢٤ الساق عال. زاوي.

شكل ١٥٦



الأوراق خشنة ذات حلبات بيضاء. اشعة الصبوان ١٠ - ١٢. أوراق الظرف والظريف خيطية. الثمر ٢.٠١ متر طولاً. الارجحة مجبرة متموجة اعرض من قطر البذرة - تلؤل لبنان وساحل سورية المجري ومزارعها

٢. *P. nemorosa*, Boiss. شلطة جبل الشيخ ٢٤

متر الى ٢.٥ علواً متفرج الريحب قصبة. خرق الأوراق الجذرية منراثة. اشعة الصبوان ٥ - ٧. أوراق الظرف والظريف رحيمة خيطية قصيرة

الثمر ثلثة اضعايف زبديتو طولاً يضي واجحة مستقيمة متضخمة اسفنجية التواعد اضيق كثيراً من نصف الثمر ومقطوعها مستعرض مثلث وحافتها كاملة حادة - الصيف - جبل الشيخ

ثمران من الشلطة الخشينة

١٩ الكولادونيا COLLADONIA, D. C.

حافة الكاس ذات ٥ اسنان قصيرة أو كاملة. القرص عريض كوبيسي. الثمر منضغط قليلاً ظهراً وأغلفته اسفنجية. اضلاع نصف الثمر وكلاً أو بعضها ذات ارجحة فلينية - اعشاب معمرة ذات ازهار صفراء وأوراقها ريشية كبيرة القطع

١. *C. alata*, Boiss. الكولادونيا الخشنة ٢٤ الأوراق السفلى بيضية المحيط ريشية وقطعها زوج

او زوجان بيضية كالة شراتية وقد تكون قلبية والسفلى قد تنقسم الى قسمين. اشعة الصبوان ٧ - ١٠ طويلة. أوراق الظرف والظريف مستطيلة لحمية. الثمر اقصر قليلاً من الزنبدة اهليلجي خطي. نصفا

الثمر متشابهان. ارجحة كل الاضلاع ممتدة الى قاعدة الثمر - الصيف - سورية

٢. *C. anisoptera*, Boiss. الكولادونيا الأنيسونية الجناح ٢٤ الأوراق مستطيلة رحيمة

المحيط ذات ٤ ازواج أو ٥ جالسة تقريباً مشقوقة أو مفصلة الى قطعتين أو ٢ مستطيلة - رحيمة واجعة. اشعة الصبوان كثيرة طويلة. أوراق الظرف والظريف بيضية - مستطيلة. الثمر ٢.٠١٣ متر الى ٢.٠١٤

طولاً اهليلجي ابيض قليلاً عند قاعدة الثمر. اجنحة نصف الثمر الواحد ٤ ونادراً ٥ واجنحة الآخر ٢ وكلها قشرية ممتدة الى قاعدة الثمر - الصيف - البقاع وارض بشاره وسبسطية

٢. *C. crenata*, Boiss. الكولادونيا الشراقية 24 الاوراق السفلى غير منسومة مستطيلة

شكل ١٥٧



قلبية القاعدة والساقية بيضية المحيطة ثنائية التفصيل الريشي وقطعها مستطيلة جالسة او مستندقة القاعدة شراقية والعليا متصاعدة. اشعة الصوبان ٥ الى ٧ طويلة. اوراق الظرف والظريف رحمية مدببة. الثمر دويبي ٢٠٠٨ مترالى ٢٠١ طولاً. اجنحة نصف الثمر الواحد ٤ ونادراً ٥ واجنحة الآخر ٢. الاجنحة الظهرية متصاعدة نحو القاعدة. ترى شكل ١٥٧ هذه الاثمار قبل نضجها - الصيف - من صوف ضاغ الى لبنان والجبل الشرقي

٤. *C. triflorata*, Boiss. الكولادونيا الصغيرة الثمر 24

الاوراق السفلى بيضبة المحيطة ثنائية التفصيل الريشي وقطعها مستطيلة رحمية صوبون الكولادونيا الشراقية شراقية. اشعة الصوبان ٦ الى ٧. اوراق الظرف والظريف مستطيلة حادة. الثمر ٢٠٠٨ مترالى ٢٠١ طولاً اقصر من الزائدة يضي ونصفه الرابع. غالباً ذو ٤ اجنحة والآخر ذو ٢. الاجنحة قشرية والظهرية منها مثلية ضيقة جداً - الصيف - سورية

وينبغي انقان درس انواع هذا الجنس لعله يمكن ضم بعضها في البعض الآخر

المسقط الجناس . الامينيات. *AMINIFLORÆ*

١. الثلاث كاملة او مفترسة او ممتدة عراء ونادراً يضاء

٢. *Amniflora*. ٢٠ او 24 الاوراق كاملة. الازهار صفراء او صفراء مخضرة

٣. *Amniflora*. 24 او ٢٠ الاوراق ويشبه ا. ب. بية القطع مفصصها. الازهار يضاء

٤. *Amniflora*. 24 الاوراق ويشبه بيضبة التطلع (شكل ١٦) اعشاب مائة ازهارها يضاء

٥. *Amniflora*. ٢٠ الاوراق ثنائية الريشي التفصيل. الازهار صفراء مخضرة او محمرة

٦. *Amniflora*. ٢٠ الاوراق. مربعة الى مربع ثنائية. الازهار صفراء

٧. *Amniflora*. 24 او ٢٠ الاوراق مربعة الى مربع ثنائية. نباتات البادية

٨. الثلاث مفترسة. اوراق ممتدة ونادراً ممتدة ذات خرقعة عند قمتها

٩. *Amniflora*. ٢٠ او 24 الاوراق من الاسمية. الاضلاع قليلة البروز

١٠. *Amniflora*. ٢٠ او 24 الاوراق من الاسمية. الاضلاع قليلة البروز

- ٢٨ Carum. ① او 24 الليمون مسطح من الانسية. الاضلاع بارزة
 ٢٩ Sium. 24 اعشاب مائية او مستنقعية اوراقها ريشية مستطيلة - رمية القطع
 ٣٠ Ammi. ① او ② الاوراق احادية الفصيل الربيعي او ثنائية. الاضلاع خيطية
 ٣١ Falcaria. ① الازهار مزوجية. الاضلاع خيطية. الثمر مستطلي
 ٣٢ Sison. ① الاوراق احادية الفصيل الربيعي وقطعها ٥ - ٦ مستطيلة

٣٠ اليوپلثروم BUPLEVRUM, L.

اسنان الكاس مضحلة. الثمر مضغط مجانبية او نوأبي تقريباً. حامل القلم مفلطح او مخفض كامل.
 اضلاع نصف الثمر متساوية مخززية حادة او ضخبة قليلاً او مضحلة تقريباً. البذر مفلطح من الانسية
 ونادراً مجوف - اعشاب او نجيلات ازهارها صفراء او مخضرة واوراقها كاملة

1. Perfoliat_a. § المتقويات الورق ① الاوراق اوراقها الاعلى منها مقنوبة. الظرف مفتود

B. croceum | protractum ٢

2. Glumacea. § العصافيات ① الاوراق خطية او رمية. اوراق الظريف غشائية عصافية

او المبلجة - رمية تعلو الازهار

B. Odontites ٣ nodiflorum 4 brevicaulis ٥ Aleppicum ٦

3. Graminea. § النجيليات. الاوراق خطية او مستطيلة - رمية ذات اعصاب كثيرة متوازية.

اوراق الظريف ضيقة عشبية لا تعلو الازهار

* الثمر حبيبي او لحمي

B. glaucum ٧

* * الثمر املس

+ سنويات

B. Kurdicum 8 dichotomum 9 Gerardi 10 Libanoticum 11 Cappadocicum 12

24 او ①

B. linearifolium 13 irregulare 14

4. Coriacea. § السخنيانيات 24 الاوراق سخنيانية ذات عصب واحد وارودة مشبكة

B. fruticosum 15

B. croceum, Fenzl. 1 اليوپلثروم الزعفراني ① مستغير. الساق متشعب من الاعلى

منفرش الكورنب . الاوراق السفلى مستطيلة والمحاقية بيضية - مستطيلة مثقوبة والعليا مستديرة صفراء .
اشعة الصيوان ٩ - ١٢ . اوراق الظريف مثل الازهار طولاً المثلجية - رحيمة مدبية ذهبية اللون ذات ٣
اعصاب . الثمر مستطيل منشوري منحني - الربيع - من عنتاب الى حلب والى الشرق

B. protractum, Link. et Hoff. ٢ . اليوبيلثروم المطول Ⓞ اغبر . الساق منشعب

شكل ١٥٨



صيوان اليوبيلثروم المطول

من القاعدة . الاوراق الجذرية مستطيلة مستدقة القاعدة والعليا مستطيلة
حادة مثقوبة . اشعة الصيوان ٢ - ٥ . اوراق الظريف ثلاثة اضعاف الازهار
طولاً بيضية مستديرة حموية ذات ٥ اعصاب الى ٧ . الثمر بيضي محبب
واضلاعاً خطية - الربيع - مزارع سورية وقبرس الى علو ٣٠٠٠ متر
latifolium, Post. ب . العريض الورق . الاوراق بيضية

كالة . الثفرع غير كثيف - يبروت

heterophyllum, Boiss. ت . المختلف الورق . قزم . الاوراق الجذرية رحيمة - خطية

او خطية والعليا مدبية - في المواسع الجافة . نادر

B. Odontites, L. ٣ . اليوبيلثروم اودنتيس . (الديق) Ⓞ الاوراق ذات ٥ اعصاب .

اشعة الصيوان ٥ اقل والطويلة منها اطول من الظريف . اوراق الظريف رحيمة - مستطيلة حادة
نايبة شفاقة ذات ٢ اعصاب - اول الصيف - الحنول . كثير الوجود

tenuifolium, Post. ب . النحيل الورق . الاوراق خطية مخززية - اللاذقية

condensatum, Post. ت . المندمج . الصيوانات والصويونات وكل اجزاء النبات نصف ما

في الرمز حجماً . اوراق الظريف رحيمة - يبروت . وربما بحسب نوعاً

B. nodiflorum, Sibth. ٤ . اليوبيلثروم العقدي الزهر Ⓞ الاوراق ذات ٢ اعصاب

الى ٥ . الصيوانات جالسة في نقط التشعب وانتهائية تظهر على هيئة رؤوس لقصر الاشعة . اوراق
الظريف مستطيلة - رحيمة حادة حموية تخنانية شفاقة ذات ٢ اعصاب حنوية - الربيع - المزارع .
كثير الوجود

B. brevicaulis, Schlecht. ٥ . اليوبيلثروم القصير الساق Ⓞ الاوراق ذات ٥

اعصاب . الصيوانات جالسة في نقط التشعب او انتهائية ذات ٢ اشعة الى ٤ غير متساوية قصيرة .
اوراق الظريف رحيمة ضيقة مدبية تخنانية مظلة ذات ٥ اعصاب - الربيع - الاماكن العشبية والمزارع
من حلب الى صحراء الجبل الشرقي والى الشرق

B. Aleppicum, Boiss. ٦ . اليوبيلثروم الحلبي Ⓞ الساق نحيل . الاوراق ذات ٥

اعصاب الى ٧. اشعة الصويان ٣-٤ غير متساوية قليلاً وإطولها مثل أوراق الطريف طولاً. أوراق الطريف بيضبة. البليطة عريضة شفافة قصيرة الحبة ذات ٥ اعصاب - الربيع - من مزارع حلب الى الشرق

B. glaucum, Rob. et Cast. اليوبيلقروم الاخير ٥ اغبر. الساق قرم كثير الشعب من القاعدة. الاوراق خطية. الصويانات انتهائية ونادراً جانبية ذات ٢ اشعة الى ٥ غير متساوية. أوراق الطريف رمية خضبة الحوافي اطول من الازهار ذات ٢ اعصاب. الثمر ذوزينة كروي - توافي حبي حكي مضعل الاضلاع - الربيع - من تدمر الى القاهرة
B. gracile, Post. ب. الدقيق. اعضاء النبات كلها نجيحة - تدمر

B. Kurdicum, Boiss. ٨. اليوبيلقروم الكردي ٥ مستنبر. الساق ١٥ مترالى ٢٠ علواً. الاوراق ذات ٧ اعصاب غالباً. الصويانات انتهائية ذات ٦ اشعة زاوية الى ١٠ قصيرة متساوية تقريباً. أوراق الطريف ٥ مثل الصويونيات الكثيرة الازهار طولاً. الزنيدات خضبة اقصر قليلاً من الثمر والثمر خطي منشوري مزب ضخ الاضلاع - الصيف - مرعش. غيور ضاح

B. dichotomum, Boiss. ٩. اليوبيلقروم المشعب ٥ قرم كثير الشعب يابسة. الاوراق يابسة ذات ٥ اعصاب اقل. الصويانات انتهائية واشعثها ٢-٣ طويلة شعرية متساوية طولاً. أوراق الطريف ١-٢ قصيرة. أوراق الطريف ٢-٤ رمية حادة اقصر من الصويونين القليل الازهار. الثمر خطي منشوري ضعا الزينة طولاً. الاضلاع حادة - الربيع - الجبل الاقارع
B. Gerardi, Jacq. ١٠. يوبيلقروم جرارد ٥ الساق منتصب ٢٠ مترالى ٢٥ علواً.

الاوراق ذات ٢ اعصاب الى ٥. الصويانات انتهائية ذات ٥ اشعة الى ٧ غير متساوية. أوراق الطريف ٥ رمية مخزنية اطول من الصويونين ذات عصب واحد. الزنيدات معادلة الثمر المستطلي المنشوري طولاً. الاضلاع خطية - الصيف - مواضع مهلة ومزارع من حلب الى لبنان وإلى الشرق
B. acuminatum, Post. ب. المدبب. أوراق الطريف طويلة الشدب - البقاع

شكل ١٥٩



B. Libanoticum, Boiss. et Bl. ١١. اليوبيلقروم اللبناني

٥ الساق ٢٠ مترالى ٢٥ علواً كثير الشعب من قاعدته. الاوراق ذات ٢ اعصاب الى ٥. الصويانات متعددة انتهائية وجانبية قصيرة الزنيدات واشعثها ٤-٥ قصيرة غير متساوية طولاً. أوراق الطريف ذات عصب واحد رمية مدببة اقصر من الصويونين المشر. الزينة خضبة اقصر قليلاً من الثمر والثمر يضي منشوري مزب ضخ الاضلاع بأرزها - الصيف - صويانات اليوبيلقروم اللبناني

— لبنان وساحل سورية البحري

١٢. *B. Cappadocicum*, Boiss. البیولقروم الکپادوکی ☉ الساق ٥٥ متر الى ٤٨ علواً. الفروع خيطية متعرجة. الاوراق ذات ٥ اعصاب الى ٦. اشعة الصیوانات الجانبية ١ ونادراً أكثر من ذلك. اشعة الصیوان الانتهای ٢-٣. اوراق الظریف رحيمة القاعدة هليمة القمة مثل الصویون القليل الازهار طولاً او اطول منه. الزیندات معادلة الثمر البیضي طولاً تقريباً. الاضلاع خيطية قليلة البروز — الصیف — اماکن جافة بين انطاكية وحلب الى الشعرة والى الشرق

oligactis, Boiss. ب. القليل الاشعة. الصیوانات حتى الجانبية منها غالباً ثلثية الاشعة —

بين عينتاب ومرعش

١٣. *B. linearifolium*, D. C. البیولقروم الخطي الورق 2٤ مستغير نحیي القاعدة. الاوراق ذات ٥ اعصاب الى ٧. الصیوانات ذات ٣ اشعة ونادراً ٥ قصيرة غير متساوية. اوراق الظریف مستطيلة — رحيمة ذات ٣ اعصاب اقل وغالباً اقصر من الزیندة. الثمر غالباً اطول من الزیندة. الاضلاع خيطية بارزة — الصیف —

Schimperianum, Boiss. ب. الشمپیری. الاضلاع قليلة الوضوح. الفروع أكثر انفتاحاً

ما في الرمز — وادي فیران

١٤. *B. irregulare*, Poiss. et Ky. البیولقروم غیر المتساوي 2٤ نحیي القاعدة. الاوراق ذات ٥ اعصاب. اشعة الصیوان ٢-٣ قصيرة غير متساوية طولاً. اوراق الظریف مثلثة حادة اقصر من الزیندة. الثمر اطول من الزیندة. الاضلاع مجتمعة — الصیف — جرود لبنان وتحت جرودو. ويرجح انه تباین محجج الثمر من النوع السابق ذكره

١٥. *B. theliconum*, L. البیولقروم النجی ٢٤ يابس الفروع. الاوراق مخنثانية مستمرة مستطيلة هليمية نشه اوراق الزیتون. الصیوانات انماية كثيرة الاشعة. اوراق الصیوان والصویون قصيرة متعقبة سريعة السقوط. الثمر مستطيلي اطول من زیندتو حاد الاضلاع — الصیف — الکسروان. وربما ليس هو وطني هناك

٢١ الكرفس (التراجيل) *APIUM*, L.

اسنان الکاس مضطحة. الثمر مستدير تقريباً منضغط مجانبية تواءمي. اضلاع نصف الثمر • خيطية متساوية. حامل القلم مخفض. الاوراب ذات فتحة واحدة. حامل الثمر غير منقسم — اعشاب معبرة او صبرلة ازهارها يضاء رائحتها ثقيلة خاصة

A. graveolens, L. الكرفس الثقيل الرائحة Ⓞ املس. الجذر مغزلي. الساق متعصب مثل ناصوري. الاوراق لحمية والسفلى منها ريشية ذات ٥ قطع اسفينية منقوصة مفصصة مسننة الثمة والعليا جالسة وقطعا ٢. اشعة الصيوان غير متساوية - الصيف - الاخاديد والمستنقعات

٢٢ القُرَّة *HELOSCIADIUM*, Koch.

اسنان الكاس مضحلة. الثمر يضي او مستطيل منضغط مجانبية. اضلاع نصف الثمر ٥ خطية بارزة متساوية. حامل القلم مخفف. الاوراب ذات فتحة واحدة. حامل الثمر غير منسوم - اعشاب مائية معمرة ازهارها بيضاء



صيوان القرّة العنقديّة الزهر وورقة منها

H. nodiflorum, L. القرّة العقدية

الزهر 2٢ املس. الساق ناصوري متاصل عند قاعدته. الاوراق ريشية وقطعا يضية - رحيمة متقابلة مخرفة القاعدة متساوية الاسنان كالتها. الصيوانات قبال الاوراق جالسة او محمولة على زناد اقصر من الاشعة. اوراق الظريف رحيمة يضاء الحافة. الثمر يضي - الصيف - في الماء. كثير الوجود في سورية وفلسطين

٢٣ البقدونس *PETROSELINUM*, Hoffm.

اسنان الكاس مضحلة. الثمر يضي منضغط مجانبية نوامي تقريبا. اضلاع نصف الثمر ٥ خطية متساوية. حامل القلم مخروطي قصير. الاوراب ذات فتحة واحدة. حامل الثمر منشعب شعبتين - اعشاب احادية الاغمار ازهارها صفراء مخضرة

P. sativum, L. البقدونس المزروع Ⓞ الاوراق لماعة مثناة المحيط والسفلى منها ثنائية التصليل الريشي وقطعا اسفينية - يضية منقوصة - مسننة والعليا منقوصة الى ٢ قطع رحيمة كاملة مستندة افاعة. الصيوان مزند واشعته متعددة متساوية تقريبا - الصيف - مزروع ومنفلة من البساتين

٢٤ الريڊولفيا *RIEOLFIA*, Mcris.

هدب الكاس مضحل. الثمر مستطيل - خطي منضغط مجانبية مكمل من القمة مجاملي قليلين متسعين يكوّنان قرصاً عريضاً. اضلاع نصف الثمر ٥ مستدقة متلاشية تقريبا. الاوراب ذات فتحة واحدة - اعشاب سنوية ازهارها صفراء واوراقها مشرحة

شكل ١٦١



صوبون ريدولفيا المزارع

R. segetum, Mor. ريدولفيا المزارع © الساق ٢٣ متر

الى ٢٦ علواً. الاوراق مثلثة - مستطيلة المحيط عريضة الرجلات وقطعها مشرحة الى خرق خيطية متراكمة. اشعة الصوبان كثيرة العدد. الظرف والظريف مفقودان. الزيتلات متضخمة اخيراً ذات زوايا والثمر ثلثاها طولاً - الربيع - كثير الوجود في سورية وفلسطين وواحة عيون موسى في سيناء

٢٥ القزوح **DEVEREA, D. C.**

اسنان الكاس مضحلة. الثمر يضي او كروي منضبط مجانبية. اضلاع نصف الثمر خيطية متلاشية تقريباً. حاملات القلبين مخروطيان وحافتاهما متموجتان قليلاً. الاوراب ذات فته واحدة. حامل الثمر متشعب شعبتين. الثمر توأمي عفائي - اعشاب معبرة بابسة سوقها عديمة الاوراق يتلاصقها يضاء وصفره - مخضرة

D. tortuosa, Desf. القزوح المتعرج 24 املس. السوق متعرجة كثيرة الشعب من

قاعدتها. الاوراق السفلى مستديرة المحيط تقريباً ثنائية التصلب الريشي وقطعها خطية - مغزوية حادة والبقية مسطحة الى غبود مستطيلة. اشعة الصوبانات ٢-٧. اوراق الظرف والظريف خالدة - الربيع - اماكن رملية في ارض الصعيد وبادية سيناء وبحيرة مصر

شكل ١٦٢

**D. triradiata, Hochst.** القزوح الثلاثي الاشعة 24

السوق منتصبه اثلثة مترادفة القزوح قصيرها من الاعلى. الغبود الساقية بيضية - مثلثة: قصيرة. اشعة الصوبانات ٢-٥. الظرف والظريف ساقطان صوبان القزوح الثلاثي الاشعة بسرعة - الصيف - بادية سيناء وبادية ارض الصعيد

٢٦ الهيمبيللا **PIMPINELLA, L.**

اسنان الكاس مضحلة. الثمر منضبط مجانبية يضي ونادراً مستطيلي. اضلاع نصف الثمر خيطية متلاشية تقريباً. الاوراب ذات فتين او ٢ ونادراً ٥ الى ٦. الاليوم من مفلطح من الانسية - اعشاب سنوية او محمولة او معبرة ازهارها يضاء

* الثمر زغبي او وري

+ سنويات

P. Anisum ١ *Cretica* ٢ *puberula* ٣ *eriocarpa* ٤

† † محولات

P. peregrina ٥ *corymbosa* ٦ *Olivieri* ٧

† † † معبرات

P. tragium ٨

** الثمر الملس

P. anthriscoides ٩

P. Anisum, L. ١. البيبيلا الأنيسون (اليانسون) ٥ قصير الزغب. الاوراق السفلى قلبية مسند برة مفصصة والمتوسطة ثنائية المنشأ وقطعها اسفينية مفصصة مسننة والعليا جاسة منفصلة الى خرق خطية غير منقسمة او مفصصة الى ٢ قطع. الپتلات زغبية من الخارج. الثمر كثيف الغناء ٢٠.٢٥ متر طولاً. القلمان منفرجان طويلان وحاملهما مخروطيان - الصيف - منفلت من البساتين.

P. Cretica, Poir. ٢. البيبيلا الكريتية ٥ قصير الزغب او مستحسن. السوق نجيلة. الاوراق السفلى قلبية شرافية الاسنان غير منقسمة. المتوسطة ذات ٣ فواصل مستديرة او بيضية واسفينية مفصصة او مسننة والعليا منفصلة الى خرق قليلة طويلة خطية كاملة او ثلثة الخرق. اشعة الصيوان ملساء. الپتلات ملساء. الثمر يرضي متفرق الزغب ٢٠.١ متر طولاً. القلمان طويلان منعققان وحاملهما متقاربان حلبيان - مخروطيان - الربيع - اماكن جافة. كثير الوجود في سورية وفلسطين.

Arabica, Boiss. ب. العربي. قزم. الاوراق السفلى صغيرة اسفينية منقسمة الى ثلث قطع وفصوص - اماكن مقفرة في سورية. بادية سينا

P. puberula, D. C. ٣. البيبيلا الزغبية ٥ قصير اللحية او الصوف اللادى. الساق كثير الشعب من القاعدة. الاوراق السفلى غير منقسمة او مفصصة الى ٣ قطع مسند برة - قلبية مفصصة - مسننة. قطع الاوراق المتوسطة اسفينية ذات ٣ خرق مسننة. الاوراق العليا جاسة ريشية وخرقها قصيرة خطية - هلبية منفرجة. اشعة الصيوان خشنة لحوية. الثمر صغير يرضي طويل اللحية ملازمهما. القلمان طويلان منعققان وحاملهما متقاربان مخسفان اضيق من الثمر - الربيع - اماكن مقفرة بين عينتاب ومرعش وتدمر الى الشرق

P. eriocarpa, Russ. ٤. البيبيلا الصوفية الثمر ٥ لحوي. السوق مخفضة مستدقة متشعبة من القاعدة. الاوراق السفلى ذات رجيلات غير منقسمة قلبية - مسند برة شرافية مسننة والمتوسطة ريشية وقطعها اسنينية - مستطيلة مفصصة ذات رجيلات. وقطع الاوراق العليا خطية - مخرزة باسة.

الصيوانات ذات ٥ اشعة الى ٧ متفرجة مستدقة . الثمر مستطلي طويل اللحية ايضها . الفلجان طويلان مستقيمان مستدقان وحاملهما مخروطيان طويلان - الريح - من حلب الى الدرب بين القدس واربجا وإلى الشرق

P. peregrina, L. ٥. الهيبيلا المرتحلة ⑤ زغبي خشن . الساق مترعلاً منعطف اللحية من الاسفل كورني من الاعلى . الاوراق السفلى ريشية ذات ٢ أزواج الى ٤ اسفينية - يضيضة او قلبية - يضيضة مسننة الفصوص والعليا مشرحة الى خرق اسفينية رحيمة وخطية . الصيوانات كثيرة الاشعة مجموعة في الإثمار . الثمر ٢٠٠١ مترطولاً يضيضي طويل اللحية . الفلجان طويلان مستقيمان مستدقان وحاملهما مخروطيان ثلث الثمر طولاً - من اذار الى تموز - سواحل سورية وفلسطين وجبالها الى ١٢٠٠ متر *viridis*, Post. ب . الخضر ٢٥ مترعلاً . خرق الاوراق الساقية قصيرة .

الصيوانات اصغر منها في الرمز نجيلة الاشعة - ييرت

P. corymbosa, Boiss. ٦. الهيبيلا الكورنية ⑥ سنشيب او مستمس ٢٣ مترعلاً .

الساق ضخيم كثيف الفروع والاوراق من القاعدة فيكون النبات كورنياً ٢٣ متر الى ٢٣ عرضاً . الاوراق ثنائية التفصيل الريشي والورقات اسفينية مستطيلة مقنطرة او منقصة فصوصاً مستطيلة . والاوراق العليا متصاغرة . اشعة الصيوانات ١٠ - ١٥ . الثمر يضيضي قصير اللحية . الفلجان املسان او قصيرا اللحية طويلان منعطفان وحاملهما متخسفان - الصيف - من عينتاب الى دمشق والبقاع

P. Olivieri, Boiss. ٧. هيبيلا اوليفيري ⑦ لبادي . الساق ضخيم كورني الفروع كثيف

الاوراق . الاوراق ثنائية التفصيل الريشي وقطعها يضيضة - مستطيلة مخروقة او مقنطرة الى فصوص كالة . والاوراق العليا متصاغرة اسفينية الفصوص . اشعة الصيوانات ٦ الى ١٠ غير متساوية . الثمر كروي تقريباً مخشن بدرنات حلبيية . الفلم طويل وحاملة حلبي - اول الصيف - اللؤلؤ بقرب دمشق (حسب بويستيه) ويجب ابعان النظر فيه لئلا يكون تبايناً من المتقدم ذكره فقط

P. Tragium, Vill. ٨. الهيبيلا تراجيوم ⑧ مستغبر او اخضر باهت زغبي خملي . السوق

متعرجة ٢١ متر الى ٢٣ علواً مشعبة . الاوراق الجذرية مستطيلة المحيط ريشية ذات زوجين الى ٤ وورقاتها مخنانية يضيضة - معينة وزادراً قلبية القاعدة شرافية الاسنان . الاوراق الساقية قليلة جالسة مفصلة الى خرق خطية . اشعة الصيوان ٣ - ١٠ خملية واخيراً مجنمة . البتلات عناقية من الخارج . الثمر يضيضي قليل الزغب . الفلجان متعرجان وحاملهما قرصيان - آخر الصيف -

depauverta, Boiss. ب . المنقرعة . السوق عريانة تقريباً متفرجة من قاعدتها تقريباً . قطع

الاوراق الجذرية صغيرة حادة الاسنان . اشعة الصيوان ٢ الى ٤ - قم جبل لبنان وتحت جردوه

١. *P. anthriscoides*, Boiss. البيينلا الاثرسكية ٢٤ امس ٢٦ متر الى متر علواً.

الجذر ضخم مغزلي. الساق ضخم كورني الفرع. الاوراق الجذرية مثلثة المحيط ثنائية التفصيل الريشي وقطعها ١٥-٢٠ متر الى ٢٠-٣٠ طولاً مستطيلة كالة النصوص مسننها. الاوراق العليا متصاغرة قليلة الخرق. اشعة الصيوان ١٢-١٥ متساوية تقريباً. اوراق الظرف والطريف قليلة خطية رحيمة. الثمر بيضي-مستطلي واضلاعه خيطية قليلة البروز. القلم منعطف ٢ اضعاف حامله المخروطي المنخفض طولاً-الصيف - اماكن رطبة في جرود جبل اللكام ولبنان. بعلبك

٢٧ السكاجيريا SCALIGERIA, D. C.

هدب الكاس مضحل. الثمر منضغط مجانب كروي توأمي تقريباً. الاضلاع غالباً متلاشية. الاوراب مضحلة ذات فتيين او ٣. الاليوم من محوف من الانسية ذو ميزابن - اعتشاب جذورها ضخمة وازهارها بيضاء وثمرها امس

١٦٣



١. *S. Crestica*, Urv. السكاجيريا الاكرتية ٥ الفروع

معتدلة الغلظ. الاوراق الجذرية مثلثة المحيط ثنائية التركيب الريشي وقطعها بيضية مسننة او منقصة. الاوراق الساقية السفلى قليلة الخرق خطيتها والبقية مستقيمة الى غمدود. اشعة الصيوان ٥-١٠ مستدقة طويلة. الزنيدات منفرشة في الاثمار اطول كثيراً من الثمر. القلم طويل منعطف اطول كثيراً من حامله - الربيع - اماكن صخرية ونحبية في لبنان وساحل سورية البحري وفلسطين

٢. *S. meifolia*, Fenzl. السكاجيريا الميية الورق ٥ الساق عار والفروع خيطية كثيرة

الشعب. كل الاوراق مستطيلة - معينة المحيط ثنائية التفصيل الريشي وقطعها جالسة مستطيلة مشرحة الى خرق هلبية. الاوراق العليا مستقيمة الى غمدود قصيرة. الصيوانات متعددة مرتبة على هيئة عنقود واشعتها ٢-٥ غير متساوية خيطية. الثمر صغير كروي توأمي ثلث الزنيدة الشعيرة اربعها طولاً. القلم انفي يكاد لا يكون اطول من حامله النرصي - الصيف - اماكن نحبية من عيتاب الى راشيا والبقاع والى الشرق

٢٨ الكراويا (التقدة) CARUM, L.

هدب الكاس مضحل او ذو اسنان. الثمر منضغط مجانب بيضي او مستطلي. اضلاع نصف الثمره خيطية بارزة واحياناً حادة او ضخمة. الاوراب ذات فتحة الى ٣. حامل الثمر متشعب القمية ان

غير مفسوم. الألبوم أسطواني محدب من الوحشية ومسطح من الانسية - اعشاب ملساء محولة او معبرة مغزلة الجذر او بضباضيته ازهارها بيضاء ونادراً مصفرة.

* الجذر مغزلي مستطلي

C. polyphyllum | *caudatum* ٢

** الجذر كروي تقريباً

C. elegans ٢ *ferulaefolium* ٤ *Pestalozzæ* ٥ *Bethelense* ٦

C. polyphyllum, Boiss, et Bl. ١ . الكراويا الكثيرة الورق © الساق ضخيم مزرب

٢٥ متر علواً كبير الأوراق. الفروع متعرجة. الأوراق رحمة المحيط ثلاثية التفصل الريشي وخرقها خطية حادة متراكمة يابسة. أشعة الصيوانات ٦ الى ١٢ غير متساوية. أوراق الظرف ٥ الى ٧ هلبية. الظريف مفقود تقريباً. الثمر مستطلي نصف الزينة الى مثلها طولاً. القلم منعطف ثلثة اضعاف حاملاً المخروطي المنخفض طولاً - ايار - حمص. بيروت. نادر

C. caudatum, Post. ٢ . الكراويا المذنبة © الأوراق المجذرية *** والساق

الاسفل ثنائية التفصل الريشي قليلة الخرق خطيتها كالنبا والعليا مستقيمة الى غمود عريضة مخططة غشائية المحواف ذات اذنان طويلة خطية. أشعة الصيوان ١٠ - ١٢. الظرف ورقة واحدة رحمة خطية غشائية المحواف او مفقود. الظريف قليل الوريدات خطيتها. الزينات غير متساوية الطول. الثمر ***

* - الربيع - بيروت. نادر

شكل ١٦٤



C. elegans, Fenzl. ٣ . الكراويا المحسنة 2٤ الأوراق ثنائية

التفصل الريشي او ثلاثية وخرقها غير متراكمة خطية طويلة. أشعة الصيوان ٦ - ١٠. أوراق الظرف والظريف خطية مخززية غشائية المحيط. البيض مخروطي مقلوب مجذوم القمة. الزينات غير متضخمة منفرجة ضعفا الثمر المستطلي او ٢ اضعاف طولاً. القلم هلي منعطف متعرج اطول كثيراً من حامله

- الصيف - الجرد ونحت الجرد من مرعش الى لبنان والبقاع والجبل صوبين الكراويا المحسنة الشرقي. السهول من عنتاب وحلب ودمشق الى الشرق

junceum, Boiss. ب. الاثلة. الساق متفرع من منتصفه وكثيراً ما يستعلي. أشعة الصيوان

٢ - ٥ خطية. الزينات المثمرة مجموعة قليلاً تقارب الثمر طولاً - جبال مرعش. الجبل الاقرب

minimum, Post. ت. الصغرى. ٢٠٥ متر الى ٢٠٦ علواً. أكثر الأوراق جنزية قليلة

الانقسام. أشعة الصيوان قصيرة - قم لبنان

٤. *C. ferulaefolium*, Desf. **الكراويا الحليثية** الورق 24 الساق متعرج. الاوراق كما في السابق ذكره. اوراق الظرف والظريف قليلة رمجية مدببة. الزينيدات الثمرة منفرجة كوكبية ضخمة مثل الثمر المنشوري الاسطواني طولاً وعرضاً تقريباً. القلم منعطف اطول قليلاً من حامله - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

brachycarpum, Boiss. ب. **القصر الثمر**. بعض الزينيدات ضعفا الثمر طولاً وكلما اقل نضجاً منه. خرق الاوراق اقل عددًا واضيق ما في الرمز - يروت

٥. *C. Pentalozae*, Boiss. **كراويا** پستالوتزا 24 الاوراق ثنائية التفصيل الريشي وخرقها خطية طويلة لحمة حادة والعليا متصاغرة. اشعة الصيوان ٥ - ٧ طويلة. الظرف ورقة واحدة او مفقود. اوراق الظرف ٥ - ٧ رمجية يضاء الحوافي. الزينيدات مثل الثمر المستطيلي طولاً او اطول منه. الاضلاع خيطية يضاء. القلم منعطف اطول من حامله - الصيف - جرود لبنان وجبل الشيخ

٦. *C. Eschscholense*, Post. **الكراويا الببطينية** 24 ٤٤ متر علواً. الساق اسطواني مترادف الفروع. الاوراق السفلى طويلة الرجالات مثلثة المحيط ثلاثية التفصيل الريشي وخرقها مستطيلة حادة. والعليا قليلة الخرق خطيتها طويلة. اشعة الصيوان ١٠ - ١٢. اوراق الظرف والظريف ٢ - ٥ مستطيلة غشائية الحوافي. الزينيدات ٣ اضعاغ الازهار طولاً. الثمر * * * - الربيع - المزارع بقرب يمين. نوع يشبه الكراويا الكثيرة الورق في هيئة نموها وشكل اوراقها الا ان الاوراق اقل تراكمًا والعليا منها اقل انقسامًا وخرقها قصيرة

٣٩ السيوم *SIUM*, L.

الأكاس ذات ٥ اسنان. الثمر يضي او مستطيلي منضغط عجانبة. اضلاع نصف الثمر ٥. حامل القلم كامل مخروطي منخسف. الاوراب ذات ٢ ثقات سطحية تقريباً. حامل الثمر مضلل - اعشاب اائية او مستقيمة ازهارها يضاء

S. bonariense, M. B. **السيوم الرعجي** الورق 24 الساق ضخم منتصب منخبط. الاوراق ريشية ذات ٢ ازواج الى ٥ والقطع كبيرة غير متساوية الفاعة مستطيلة - رمجية حادة الاسنان وفي الاوراق السفلى قليلة تقريباً. اشعة الصيوان ١٠ الى ١٥. اوراق الظرف والظريف رمجية ضيقة محرفة. الثمر مستطيلي واضلاعه أضيق من الاوراب - الصيف - المستنقعات بقرب مرعش

٣٠ الأمي *AMMI*, L.

اسنان الأكاس مضطربة او صغيرة جداً. حامل القلم منخسف. الثمر يضي او مستطيلي منضغط

مجانبة. اضلاع نصف الثمر ه خيطية متساوية. الاوراب ذات فتة واحدة. حامل الثمر متشعب. البذر اسطوانى محدد مفلطح من الامام - اعشاب سنوية او محولة ازهارها يضاء

١. *A. majus*, L. الامي الاكبر ⊙ الساق مخطط متفرع. الاوراق بيضية - مستطيلة المحيط ثنائية التفصيل الريشي او ثلثية وخرقها مستطيلة او خطية - اسنينة كاملة او مسننة او مشقوقة. اشعة الصيوان اكثر من ٢٠ نحلة منفرجة في الثمر. اوراق الظرف طويلة وشرحة الى خرق قليلة خيطية. الثمر مستطيل املس بارز الاضلاع - الربيع - المزارع والبساتين. كثير الوجود

٢. *A. Copticum*, L. الامي القبطي ⊙ الساق مخطط كثير الاوراق والاوراق مشرحة الى خرق خيطية متراكبة. اشعة الصيوان كثيرة ٢٠١ متر طولاً نحلة متساوية تقريباً. اوراق الظرف قصيرة خيطية ونادراً ثلثية الخرق. الثمر صغير بيضي حسيكي واطلاعه ضخمة كالة - قصر العين في مصر

٣. *A. Visnaga*, L. الامي قسنكا (النحلة . الصقلين) ⊙ الساق ضم اسطوانى مكثيف الاوراق يابس المتفرع. الاوراق مشرحة الى خرق خيطية ضيقة. اشعة الصيوان ٦٠ او اكثر ناشئة من قرص عريض مجتمعة في الثمر متضخمة اخيراً. اوراق الظرف طويلة خيطية ذات ٢ خرق ومنعقفة اخيراً. الزنيدات المثمرة ضخمة مجبوعة. الثمر بيضي املس واطلاعه ضخمة - الصيف - اماكن منروكة كثير الوجود

٢١ الفلكاريا *FALCARIA*, Host.

الازهار مزوجية. الكاس ذات ٥ اسنان. الثمر مستطيل خطي منضغط مجانب. اضلاع نصف الثمر خيطية متساوية. حامل القلم صغير متسع الفرس. حامل الثمر سائب مشقوق - اعشاب ملساء محولة او معبرة ازهارها يضاء

F. Rivini, Host. فلكاريا ريفينوس ⊙ مستغبر. الساق مخطط والفروع كورنية. الاوراق سخنيانية والجذرية منها بسيطة او ثلثية المنشأ والساقية ثنائية المنشأ الثلاثي الواحديئة واقسامها خيطية - رعية مخروقة او غير مخروقة ومتقاربة السنينات حسيكيتها - الربيع - بجانب الطرق وفي الحقول ولا سيما في الجبال

٢٢ السيسون *SISON*, L.

حافة الكاس مضخمة. الثمر بيضي منضغط مجانب نواهي. اضلاع نصف الثمر ه خيطية متساوية. حامل القلم مخروطي كامل الحافة. الثمرات منفردة في الاوراب قصيرة عريضة. حامل الثمر متشعب -

عشب محول ازهاره صغيرة بيضاء

S. exaltatum, Boiss. السيسون العلى ٥ متر الى مترين علواً. الساق كثير الفروع.

الاوراق الجذرية ريشية وقطعها ١٨-٢٠ مستطيلة منقصة حموية. والساقية مستقيمة الى غمد خطي او حاملة خرق قليلة خطية - حلالية قصيرة. اشعة الصوان ٤-٧ متساوية تقريباً وقصيرة. الفلم اقني معادل حاملة طولاً - آخر الصيف - بين الانجم في لبنان من ٨٠٠ متر الى ١٤٠٠

السبط السادس. السكانديسينيات. SCANDICINEÆ.

٢٢ *Grammosciadium*. 2٤ اسنان الكاس طويلة. الاوراق مشرحة الى خرق حلالية

٢٤ *Charophyllum*. ٥ او 2٤ اسنان الكاس مضحلة. الاقلام طويلة (شكل ١٦٥)

٢٥ *Physocaulos*. ٥ اسنان الكاس مضحلة. الاقلام منقودة. عقد الفروع متفتحة

٢٦ *Anthriscus*. ٥ اسنان الكاس مضحلة. الثمر مستدق القمة قصير المنقار

٢٧ *Scandix*. ٥ اسنان الكاس مضحلة. الثمر طويل المنقار (شكل ١٦٧)

٢٣ الكراموسياديوم *GRAMMOSCIADIUM*, D. C.

اسنان الكاس طويلة متنامية باسنة. الثمر خطي - اسطواني - منشوري مكلل باسنان الكاس وحاملي القلمين وقلمها المستقيم المنفرجون. اضلاع نصف الثمر ٥ بارزة قشرية والجانبية منها مجعنة. الاوراب ضيقة ذات فتحة واحدة - اعشاب معمرة ازهارها بيضاء واوراقها مشرحة الى خرق حلالية واوراق الظرف والظريف مشرحة

G. characineoides, Boiss. et Haussk. كراموسياديوم هو صكحت 2٤ الساق ٢٣

من علواً قليل الفروع القصيرة قرب ٢٣. الاوراق خطية ضيقة طويلة وقطعها صغيرة قصيرة متباعدة. اشعة الصوان ٥ الى ٩. الفلم اقصر من حاملة الضخم - الصيف - اماكن عشبية في صوف ضاغ من ١٠٠٠ متر الى ما فوق

٢٤ الشيروفيل *CHÆROPHYLLUM*, L.

هدب الكاس مضحل. الثمر منضغط مجانب خطي ونادراً مستطلي. اضلاع نصف الثمر ٥ كاله متساوية. الاوراب ضيقة ميزانية ذات فتحة واحدة. الفلم طويل - اعشاب ازهارها بيضاء ونادراً مصفرة ١ *C. Syriacum*, Hempr. et Ehrenb. الشيروفيل السوري ٥ قصير الغشاء. الاوراق ثنائية التصلب الريشي وقطعها صغيرة بيضية مفصلة الى خرق صغيرة بيضية - مستطيلة. الساق كورني

الفروع من القاعدة . أوراق الظريف مستطيلة مهدبة غشائية المحافة . الثمر لحوي خطي ثلث الزنيدة الضخمة طولاً . القلم أربعة أضلاع حامله المخروطي الشكل ١٦٥



. C. Libanoticum, Boiss. et Ky. ٣

الشيروفيلم اللبناني 2٤ أليس . الأوراق ثنائية المنشأ الثلاثي وقطعها كبيرة غضة مستطيلة - رمحية شرافية - مسنة . أوراق الظرف والظريف قصيرة غشائية الحوافي مدببة ملمساء . الثمر خطي أربعة أضلاع زبدية النخيلة إلى ٥ طولاً . القلم ثلاثة أضلاع حامله غير المخرف طولاً - آخر النصف - من يبلان إلى لبنان ١٠٠٠ متر إلى ١٨٠٠

صوبان الشيروفيلم اللبناني وهو مزاجي الأزهار

PEYSOCAULOS, Tausch.

٣٥ الفيسوكولوس

استنان الكاس مضخمة . الثمر منضبط ثمانية خطي - مستطيلي . اضلاع نصف الثمر ٥ كالة . الأوراب ذات فتحة واحدة . السمة جالسة على قمة حامل القلم المخروطي . حامل الثمر كامل - اعشاب سنوية ازهارها صغيرة بيضاء

شكل ١٦٦



صوبان الفيسوكولوس الهندي

١٦٦. Peysocaulos, L.

الساق ناصوري منتفخ تحت العقد . الأركان ثنائية ثنائية التركيب الريشي وقطعها بيضية مستطيلة كالة موصصة مسنة . اشعة الصوبان ٦-٩ اليابسة خشنة . الثمر ٥ زبدية الضخمة اليابسة طولاً متدرن هلي خشن - النصف -

oligactis, Post. ب . التليل الاشعة . اشعة

الصوبان ٢ إلى ٣ - أماكن صخرية وغابات من جبل الكام إلى الكرمل

٢٦٦. Peysocaulos, Hollub.

٣٦ الأثرسكس

استنان أناس مضخمة . الثمر بصي - مستطيلي وقد يكون مستدق أقمه . اضلاع نصف الثمر

لا تظهر كثيراً إلا عند قمة الثمر. الأوراب متلاشية والثقات منفردة مستدقة وغالباً غير واضحة. حامل الثلم مخروطي محرف - أعشاب معبرة أو محولة أزهارها بيضاء

A. nemorosa, M. B. ١. الأثرسكس الغبيضي 2٤ الأوراق هليبية - عفائية من الأسفل

ثلاثية التفصيل الريشي أو رباعية قطعاً بيضية مستطيلة حادة ريشية مفصلة أو مشقوقة وخرقاً خطية - مستطيلة. أوراق الظريف ٥ مستطيلة مدببة مهدبة. الثمر مستطيل كثيف الأدران المنتهية بهليب - الصيف -

macrocarpa, Boiss. ب. الكبير الثمر. الأوراق زغبية من الأسفل ملساء من الأعلى.

الثمر مستطيل خطي أطول ما في الرموزيته أكثر تدبيراً وهلبة كثيف صلب - أعلى أرز لبنان
A. lamprocarpa, Boiss. ٣. الأثرسكس اللهاع الثمر ٥ الأوراق غضة قليلة الهلب من الأسفل والجذرية منها ثنائية التفصيل الريشي. ورجيلات أقسامها الأولية طويلة صوفية القاعدة. القطع بيضية مستطيلة مخروقة كالة الأسنان. أشعة الصبوان ٥ إلى ٧. أوراق الظريف ٥ مستطيلة مدببة صوفية المحافة. البتلات متشعبة. الثمر مستطيل ملمس لامع أصفر - الربيع - تحت جرود جبل لبنان - جبل الطور

٢٧ السكاندكس *SCANDIX*, L.

حافة الكاس مضحلة. البتلات الخارجة من الصبوان شعاعية. الثمر منضغط مجانب طویل المنقار. اضلاع نصف الثمر كالة متساوية. الثقات منفردة في الأوراب غير واضحة - أعشاب سنوية أزهارها بيضاء وأوراقها ثنائية التفصيل الريشي أو ثلاثية

* المنقار منضغط ظمراً أكثر أو قل

S. Pecten-Veneris ١ Iberica ٣ pinnatifida ٢

** المنقار منضغط مجانب

S. australis ٤ grandiflora ٥

*** المنقار اسطواناني مخززي

S. Palæstina ٦

S. Pecten-Veneris, L. ١. السكاندكس مشط زهرة (أبو مغيرة) ٥ أشعة

الصبوان ٢ أو ٣ تنضج أخيراً. أوراق الظريف بيضية - مستطيلة كاملة أو مخروقة خرقين أو ٣ مهدبة أو

شكل ١٦٧



صويوين السكدكس مشط زهرة

مستطلمة. البتلات متشعبة قليلاً مفروضة قليلاً.
البر ذوزنيدة. المنقار خشن ٣ اضعاف البر
طولاً مقلطح. القلم ضعفاً حامله الى ٢ اضعاف طولاً
- الربيع - مزارع سورية وفلسطين

brevirostris, Boiss. ب. القصير

المنقار. المنقار نصف البر او ثلثه طولاً. النبات
صغير - الجبل الشرقي

longistylis, Post. ت. الطويل

المنقار. القلم اطول من حامله اضعافاً كثيرة.
البتلات الخارجية متشعبة - بيروت. قب الياس
S. Iberica, M. B. ٣. السكاندكس

الاسبانيولي ① اشعة الصيوان ٤ - ٩ طويلة.

اوراق الظريف منعقنة مستطيلة - خطية ذات

فصين وصوف قصم. البتلات الخارجية متشعبة عميقة الفضة. البر ذوزنيدة. المنقار هدي الحافة خشن

ثلاثة اضعاف البر طولاً. القلم ثلثة اضعاف حامله طولاً - الربيع - المزارع من عنتاب الى فلسطين

major, Post. ب. الاكبر. الساق ضخمة. القلم ٤ اضعاف حامله طولاً. اوراق الظريف

احياناً مشقوقة ٢ شق - عنتاب. البناع

S. pinnatifida, Vent. ٢. السكاندكس الريشي المخرق ① قزم على الغالب. خرق الاوراق

هليية واحياناً مستطيلة. الصيوانات بسيطة واشعثها ٢ الى ٣ قصيرة. اوراق الظرف مشرحة الى خرق

شعرية. البتلات متشعبة قليلاً بيضية - مغلوقة مخرومة. البر جالس. المنقار خشن ثلثة اضعاف البر

او اقل من ذلك طولاً. القلم قصير جداً - الربيع - مواضع صخرية من جبل طوروس الى سينا

S. australis, L. ٤. السكاندكس الجنوبي ① خرق الاوراق قصيرة خطية - هليية. الصيوان

بسيط واشعث ٢ الى ٣ طويلة. اوراق الظريف مستطيلة ضيقة الحافة غشائيتها هديهما ككاملة او

ذات سنين. الزبدة قصيرة جداً. البتلات صغيرة متشعبة قليلاً مخرومة. المنقار اسطوانى تقريباً خشن

ضعفاً البر طولاً. القلم معادل حامله ونادراً ضعفاه طولاً - الربيع - وادي هشتيت

S. grandiflora, L. ٥. السكاندكس الكبير الزهر ① خرق الاوراق شعرية او قصيرة.

اشعة الصيوان ٢ - ٥ طويلة منفرجة. اوراق الظريف بيضية عريضة الحافة الغشائية ذات سنين او

كاملة. الپتلات الخارجة منشعة طويلة الخالب بيضة-متدولة وكاملة او مخرومة. الزندات قصيرة. المنفار مستدق اسطوانى تقريباً مضغوط جانبياً وقد يكون منحنيًا وهو ٢ اضعاف الزرالى ٤ طولاً. القلم ٣ اضعاف حامله الى ٤ طولاً - الربيع - مارس ركس في لبنان

٦. *S. Palestina*, Boiss. السكندكس الفلسطيني ☉ خرق الأوراق خطية. أشعة

الصوبان ٦-١٢ دبوسية اسفنجية. أوراق الظريف خطية مهدبة متشعبة شعبتين. الپتلات صغيرة.

الجمرة المركزية للصوبين جالسة غير منشقة اسفنجية ضخمة بيضة - مخروطية مستدقة الى منقار مخززي مثلها طولاً والأثمار المحيطية قصيرة الزندات ومنفارها ضعفاها طولاً تقريباً. القلم ضعف حامله طولاً - الربيع - اماكن مخصصة في مرج ابن عمر وما بجاوره

السبط السابع. السلسينيات. *SESELINEÆ*.

٢٨ *Ceanothus*. الپتلات بيضاء. اسنان الكاس حادة. اعشاب مائية او مستنقعية

٢٩ *Celidium*. الپتلات بيضاء. حافة الكاس متلألئية

٤٠ *Feniculum*. الپتلات صفراء. حافة الكاس مفتحة كاملة

٤١ *Kundmannia*. الپتلات صفراء. اسنان الكاس بيضية

٤٢ *Critinum*. الپتلات صفراء. الأوراق لحمية. نباتات نامية على صخور الشاطئ.

٣٨ الأينانثة *CENANTHE, L.*

اسنان الكاس حادة. حامل القلم مخروطي. الثمر اسطوانى مستطيل او بيلي. القلم متصب. اضلاع نصف الثمر كالة واجازية منها او الجبيج نائمة ضيقة. الاورام ذات فتحة واحدة. حامل الثمر مفقود - اعشاب مائية او خشبية... اوراقها مشرقة وازهارها مزوجية بيضاء وغالباً متشعبة

١. *C. angulosa*, Griseb. الأينانثة الكثرية النوايا ٢ الياف الجذر خيطية. الساق

مستقيم مئرب متعرج غير ناصوري. الأوراق السنلى ثلثية المنفارة الريشي رطابها بيضة-اسفنجية ريشية المحرق او الفصيل والأوراق العليا ريشية مشرقة وخرقها خطية حاربلة. أشعة الصوبان ٧-١٣ متضخمة في الإثمار. الصوبينات البهرة مضطمة نصف - كروية متدرة قليلاً من الأعلى. الثمر اسطوانى والخارجي منه مثل الزندة الضخمة طولاً - الربيع - سورية

٢. *C. media*, Griseb. الأينانثة المتوسطة ٢ الجذور جالسة مستطيلة او اسطوانية

تقريباً. الساق ناصوري مئرب. الأوراق منشابة تقريباً حادبة الفصيل الريشي او ثنائية خطية

الخرق . اشعة الصيوان ٥ - ٨ تضخم أخيراً . الثلاث متشعبة . الصويونات المشعة مندوجة نصف - كروية محدبة من الأعلى . الثمر اسطواني قصير وزيدته ضخمة - الربيع - صليبا في لبنان
٢. *ae. pimpinelloides*, L. . الأيوانات البيبيلالوية ٢٤ الياف الجذرية خيطية وقرب قمتها بفضاض بيضي أو كروي تقريباً . الساق مخطط نحيل . الأوراق الجذرية ثنائية التركيب الريشي وقطعها اسفينية يضة شرافية أو مقصوفة والأوراق المتوسطة ذات خرق خيطية قصيرة والأوراق العليا طويلة الخرق أو خيطية غير مقسمة . اشعة الصيوان ٤ - ٨ متضخمة في الأنماط ومنضمة . الثلاث متشعبة . الصويونات المشعة مجتمعة مسطحة من الأعلى . الثمر اسطواني مثل زبدية الفضة طولاً وأكثر - الربيع - اللاذقية . عين الحرامية بين طراباس وحص . عيه

٤. *ae. prolifera*, L. . الأيوانات المولدة ٢٤ الياف الجذرية اسطوانية دبوسية . الساق ضخ مجسم كورني الفرع . الأوراق متشابهة ثنائية التركيب الريشي وقطعها اسفينية - يضة شرافية - مسننة . الصيوانات طويلة الزناد بعضها سدوية وغيرها مشعة . الأزهار متشعبة . الصيوانات المشعة محاطة بخمس صويونات سدوية ٧ متلهوجة تكون ظرقاً للصيوان المشع مركباً من اشعة مقلطية صلبة طرفها مشقوق على غير انتظام . الصويون المشع نصف - كروي مندوج محدب من الأعلى . الثمر جالس منشوري - الربيع - من انطاكية الى مرج ابن عمر

٢٦ الكنديوم *ONIDRUM*, Cuss.

حافة الكاس مضخمة . الثمر اسطواني تقريباً . اضلاع نصف الثمر ٥ حادة أو منجحة متساوية .
 الأوراب ذات فتة واحدة - اعشاب معمرة أزهارها بيضاء وأوراقها مشرحة ريشية
٢. *C. Orientale*, Boiss. . الكنديوم الشرقي ٢٤ متر طراً أملس . تقطع الأوراق يضية اسفينية وخرقها اسفينية - مستطيلة وأحياناً منقصة . الأوراق العليا مسنجة الى غمد خيطية . الصيوان كثير الأشعة .
 أوراق الظرف والظرف مليية . الثمر يضي شخخ الاضلاع . القلم منتف أطول كثيراً من حامله -
 - أماكن نجبة تحت جرد جبل اللكام ولبنان

٤٠ الشجرة (الرازيانج . السنوت) *FENICULUM*, Holm.

حافة الكاس متفتحة كاملة . البتلات بيضة - مقلوبة مجذوبة . حامل القلم كبير مخروطي . الثمر مستطيل - اسطواني . اضلاع نصف الثمر ٥ بارزة كاله الخبزيم . الأوراب ذات فتة واحدة - اعشاب معمرة وأوراقها مشرحة وأزهارها صفراء

١. *F. officinale*, All. الشجرة المخزنية (الشومار . البادجان) ٢٤ الأوراق مشرحة

الى خرق شعرية طويلة . الصوان منعر واشعة ٧ الى ٢٠ - الصيف - في الاخاديد بقرب مرعش

٢. *F. piperitum*, D. C. الشجرة المغلفة ٢٤ الأوراق ثنائية التفصيل الريشي وخرقها

خطية متبسة . اشعة الصوان ٥ - ٧ قصيرة غير متساوية طولاً - الصيف - لبنان فوق صيدا

٤١ الكُندَمِنيا *KUNDMANNIA*, Scop.

اسنان الكاس بيضية . البتلات مستطيلة حادة قبيعية . حامل القلم مخروطي . الثمر منشوري - اسطواني . الاضلاع خيطية كالة متساوية . الاوراب كثيرة الثقات - اعشاب مجرة لمساء اوراقها ريشية وازهارها صفراء

K. Syriaca, Boiss. الكندمنيا السورية ٢٤ الساق ٢٦ متر علواً متعرج متفرع من

الناهة . الاوراق غضة مثانة المحيط ثنائية التفصيل الريشي وقطعها جالسة بيضية ٢٠ متر الى ٢٠١٥ طولاً متقاربة الاسنان وحياناً مشقوفة شقين او ٣ غير منتظمة . اشعة الصوان ١٥ - ٢٥ . اوراق الظريف بيضية مثانة قصيرة - شقوق الصنوبر بقرب انطاكيا

٤٢ الكَرِثُوم *CRITHMUM*, L.

حافة الكاس مضخمة . الثمر يضي - مستطيل . الاضلاع ٥ حادة . اغلة الثمر اسفنجية ضخمة . الثقات عديدة - اعشاب لمساء خشبية القاعنة اوراقها لحمية وازهارها بيضاء - مخضرة *C. maritimum*, L. الكرثوم البحري ٢٤ الساق مجسم متعرج متفرع . الاوراق ثنائية التفصيل الريشي وقطعها خطية - رجمية ٢٠٢ متر الى ٢٠٣ طولاً حادة ضيقة القاعنة . الصوان كثير الاشعة . اوراق الظرف والظريف قصيرة رجمية منعقفة - الصيف - الصخور المشرفة على البحر على شاطئ سورية وفلسطين

السبط الثامن . اليوسدانيات *PEUCEDANEE*

* جميع الاضلاع متساوية البعد

٤٣ *Silene* ٢٤ الاوراق ثلثية المنشأ الثلاثي او ثنائية واقسامها مستديرة كبيرة

٤٤ *Ferula* ٢٤ الاوراق مشرحة . الازهار مزوجية صفراء او مخضرة . الثقات ١ - ٤

٤٥ *Ferulago* ٢٤ " " الازهار مزوجية صفراء او مخضرة . الثقات عديدة (شكل ١٦٨)

٤٦ *Johrenia* ٢٤ و ٥ خرق الاوراق خطية او خطية - رجمية (شكل ١٦٩)

- ٤٧ *Peucedanum*. 2f خرق الأوراق اهليلجية خطية. الثقات في الأوراق ١-٣ (شكل ١٧٠)
 ٤٨ *Anethum*. ٥ خرق الأوراق هلبية. الأزهار صفراء. تفغل الورب فتنة ١
 ٤٩ *Kruberia*. ٥ خرق الأوراق خطية راجمة. الأزهار صغيرة بيضاء. الثمر (شكل ١٧١)
 ٥٠ *Tordylium*. ٥ الأوراق بسيطة أو ريشية وقطعها بيضية. الثمر ذو حرف صفيق (شكل ١٧٢)
 ٥١ *Ainsworthia*. ٥ قطع الأوراق ٣-٥ بيضية. الثمر اصغر مما في السابق (شكل ١٧٣)
 * الاضلاع الجانبية بعيدة كثر أو قل عن الظهيرة المتوسطة
 ٥٢ *Zozimia*. ٥ الثلاث بيضاء غير متشعبة. الثقات مائلة لكل الأوراق
 ٥٣ *Heracleum*. ٥ أو 2f الثلاث بيضاء متشعبة. الثقات غير مائلة الأوراق (شكل ١٧٤)
 ٥٤ *Synclerosciadium*. ٥ حرش. اسنان الكاس رمجية غير متساوية. الثلاث بيضاء.
 القلمان صلبان (شكل ١٧٥)
 ٥٥ *Malaballa*. 2f اسنان الكاس متلاشية. الثلاث صفراء متشعبة
 ٥٦ *Pastinaca*. ٥ حافة الثمر غير ضخمة. الثلاث صفراء

٤٣ السيلر *SILER*, Scop.

الكاس ذات ٥ اسنان. الثمر منضغط ظهرًا. الاضلاع الأولية خطية بارزة قشرية والثانوية ٤
 مثل الأولية. الثقات واحدة تحت كل ضلع ثانوية. حامل القلم مخروطي مخفف - اعشاب مستقيمة
 ملساء ازهارها بيضاء

S. trilobum, L. السيلر الثلاثي الفصوص 2f الأوراق مستغبرة من الاسفل والسفلى منها
 ذات رجيلات طويلة ثنائية المنشأ الثلاثي أو ثلاثية وقطعها كبيرة مستديرة كالة شراكية مفصصة وإلتهائية
 ذات رجلة ثلثية القطع أو الفصوص. الصيوان كثير الأشعة طويلها. الظرف والظريف مفقودان تقريبًا.
 الثمر اهليلجي - مستطيل. القلم منعطف ضعفا حاملًا طولًا - الصيف - أكرضاع. لبنان أعلى اهدن

٤٤ الحلثيث *FERULA* L.

الأزهار مزواجة. اسنان الكاس صغيرة أو مضخمة. حافة الثمر غير ضخمة. الاضلاع متساوية
 الابعاد إلا أن الظهيرة منها مستدقة والجانبية قريبة إلى الحافة. الثقات واحدة سطحية في كل ورب أو
 ٣-٤ أو متعددة غير واضحة - اعشاب معمرة ازهارها صفراء أو خضراء مبيضة وأوراقها مشرحة وتزهرها
 عنقودي أو كورنبي وقد يكون دولابيًا. الظرف مفقود أو مركب من أوراق قليلة العدد ساقطة. الصيوانات

المركبة مشبرة غالباً جالسة او قصيرة الزيدات والمجانبة سدوية او مزواجة

* الثقات منفردة في الاوراب عريضة

F. Hermonis ١ meifolia ٢ Sinaica ٣ Blanchei ٤

* * الثقات ٢ - ٣ في الاوراب

F. communis ٥ Tingitana ٦

١ F. Hermonis, Boiss. حلثيث جبل الشيخ (السلوى) 2٤ الساق ٢٦ متر الى متر علواً

دولابي الفرع من الاعلى. الاوراق السفلى مشرحة غبراء ملساء وخرقها صغيرة متراكمة خطية منشعبة ٣

شعب او ٤. الاوراق العليا مستقيمة الى غمد غريض متنفخ مستطيلي مدبب معانق. اشعة الصيوان ٦ -

٨ والمركبة منها جالسة تقريباً - الصيف - جرود جبل الشيخ

٢ F. meifolia, Fenzl. الحلثيث المي الورق 2٤ متر الى ١٢٦ علواً. الساق دولابي

الفرع من الاعلى عنقودي. خرق الاوراق هلية متراكمة قصيرة جداً نوتياوية. غمد الاوراق العليا

عريض متنفخ معانق والشفرة صغيرة. اشعة الصيوان ١٠ الى ١٥ والمحورية منها جالسة - الصيف -

جرود الجبل الانزع

٣ F. Sinaica, Boiss. الحلثيث السينوي 2٤ امس مستعبر. الساق ضخ اسطواني

عنقودي - كورني من الاعلى. الاوراق مشرحة ريشية وجميع اضلاعها عريضة. المحرق قصيرة خطية

غالباً ذات ٢ خرق الى ٥ كالة حموية غير عصبية مسترخية. والساقية عريضة العمد طويلة رجمية وخرقها

قصيرة مخززية. الصويوانات المركبة ذات زيدات - ايار - الجانب الشمالي من جبل كنربنا في

طورسينا

٤ F. Blanchei, Boiss. حلثيث بلاش 2٤ الساق مستعل والنروع دولابية. الاوراق

حليمة الشعر بياضه والسفلى منها مثالثة بيضية المحيط ثلاثية المنشأ تقريباً وتقاصيلها ثلثية التركيب الريشي.

رجيلات كل الناصل متينة. خرق الاوراق خطية قصيرة كالة او متشعبة شعبتين او ٣ كالة. الصيوان

المركزي جالس او مزند. نصف الثمر غير الناضج بيضي محاط بمحافة نصف قطر الزهر عرضاً. الاضلاع

بارزة. الاوراب ذات فتحة واحدة عريضة. الدرزدو ٤ فئات - الربيع - الجبل الابيض قرب تدمر

٥ F. communis, L. الحلثيث العام 2٤ امس. الساق متران الى ٢٧٥ علواً ضخ وفروعه

متقابلة او دولابية. الاوراق عريضة خضراء خماسية المنشأ الى تساعية مشرحة الى خرق متراكمة خطية

شعرية مسترخية. الاوراق العليا منصاعرة. الصيوان المركزي جالس تقريباً. الثمر بيضي - مغلوب او

الهلبي مستدق القاعدة ونادراً بيضي - مستدير. الاضلاع نمطية بارزة. المحافة ربع قطر الزهر عرضاً -

الربيع - مواضع غير مزروعة في مرج ابن عمر وجبل الطور
 ٦. *F. Tingitana*, L. الحلثيات الطنجري 24 ملمس. الساق عنقودي كورني من الأعلى.
 الاوراق عريضة خضراء مستغبرة شفاقة مثلثة بيضية المحيط ثلاثية التركيب الريشي وخرقها قصيرة مستطيلة
 كالة حموية وحافتها ملفوفة الى الاسفل قليلاً. رجيلة الاوراق العليا متسعة عمودية. الثمر اهليلجي محاط
 بطوق ربع قطره عرضاً. الاضلاع بارزة - الربيع - من طرابلس الى حيفا

٤٥ الفرولاكو *FERULAGO*, Koch.

الازهار مزوجية. الكاس ذات ٥ اسنان. الثمر منضغط ظهرًا محاط بمجافة نحيلة او ضخمة. الاضلاع
 متساوية البعد وثلاث منها خطية او قشرية او مخنجة والجانبية مضخمة. القنات عديدة ظهرية مغطاة
 بالاعطلة او منقرضة في انلام الالبوم والدرزبة منها سطحية - اعشاب معبرة غالباً مستعملة ازهارها صفراء
 ولورائها مشرحة

* القنات متساوية. قواعد رجيلات اقسام الاوراق الثانوية مجهزة عند

منشأها بقطعة مشرحة تقاطع الرجلتين

٢ *Syriaca* ٢ *Cassia* ١ *F. pauciradiata*

** القنات الظهرية اكبر من البقية. منشأ رجيلات القطع عريانة

٤ *F. frigida* ٤ *bracteata*

١. *F. pauciradiata*, Boiss. et Held. الفرولاكو القليل الاشعة 24 متر علواً ملمس
 مستغبر. الساق عنقودي. الاوراق ثنائية التفصيل الريشي او ثلاثيته وقطعها مستطيلة صغيرة حموية.
 الصيوان طويل الزند واشعته ٢-٧ من ٢٠٠٥ متر طولاً ودون. الزيدات اقصر من الثمر. الاضلاع
 قليلة البروز - الصيف -

major, Post. ب. الاكبر. خرق الاوراق ٢٠٠٥ متر الى ٢٠١ طولاً - عيتاب

٢. *F. Cassia*, Boiss. الفرولاكو الاقروعي 24 ملمس. الساق كورني. الاوراق السفلى
 ثنائية التركيب الريشي وقطعها صغيرة بيضية متقابلة متباعدة احياناً ومشرحة الى خرق قصيرة هلبية. اشعة
 الصيوان ٦-٨. الثمر الفخ مثل الزيدة طولاً بيضي - مستطيلي ذو حافة متموجة وهو ربع قطر البزر عرضاً.
 الاضلاع ذات اجنحة ضيقة - الربيع - الغابات عند سفح الجبل الاقروعي

٣. *F. Syriaca*, Boiss. الفرولاكو السوري 24 ملمس مستغبر. الساق كورني من الأعلى.
 الاوراق السفلى مشرحة ريشية واقسامها الاولى والثانية طويلة الرجيلات وخرقها رحيمة او مستطيلة حادة

خشنة ٢٠٠٤ متر طولاً. أشعة الصيوان ٢-١٢ طويلة. الزيدة أطول من الثمر. الاضلاع بارزة قشرية - حريان - شقوق الصغور من انطاكية الى جنوبي فلسطين

٤. *F. frigida*, Boiss. الفرولاكو البارد 2٤ مستغبر. الساق اسطوانية مغطاة قليل

شكل ١٦٨



الفروع كورني من الاعلى. الاوراق خشنة مشرحة ضخمة الاضلاع وقطعا قصيرة منفصلة الى خرق ضخمة صغيرة متلثة مستطيلة. خطية كاملة كالة او منقصة. أشعة الصيوان ١٠-١٥. نصف الثمر امس محاط بحافة نصف قطر البذر عرضاً. الاضلاع ضخمة مخززية. - الصيف - جرود لبنان وجبل الشيخ

٥. *F. bracteata*, Boiss. et Haussk. الفرولاكو

المفلس 2٤ الساق مترعلاً ضخ كثيف العنقود سباقية من الاعلى. صويين من الفرولاكو البارد الاوراق متفرقة الزغيب مرادة مشرحة وخرقها مستطيلة قصيرة منفرجة حادة متشعبة شعبتين او ثلاث. فروع العنقود قصيرة متقابلة او دوائية يابسة. أشعة الصيوان ٦-٩ قصيرة. اوراق الظرف والظريف عديدة غشائية قشبة خملية مستطيلة مدببة وما للظرف اقصر من الأشعة وما للظريف أطول من الزيدات. نصف الثمر اهليلجي أطول من الزيدة ضيق الحافة - الصيف - صوف ضاح *multiradiata*, Post. ب. الكثير الاشعة. أشعة الصيوان ١٠ الى ٢٠ طولها في الازهار ٢٠١ متر الى ٢٠٢ وفي الإثمار ٢٠٢ متر الى ٢٠٥ - جرود جبل الشيخ

٤٦ الجورنيا JOHRENIA, D. C.

الازهار خشوية. الكاس ذات ٥ اسنان كالة او مضحلة. الثمر منضغط ظهراً ضخ الحافة. الاغلفة فطرية كثر او قل. الاضلاع متساوية البعد وكلها ذات فئات والجانبية قريبة الى الحافة او منضمة اليها. الفئات الوريقة والدرزية مفقودة او غير واضحة - اعشاب عالية ملساء غبراء معبرة او محولة فروعها يابسة متشعبة وازهارها صفراء عادية الظرف واوراقها ثنائية التفصيل الريشي

شكل ١٦٩



صيوان الجورنيا المتشعبة

١. *J. dichotoma*, D. C. الجورنيا المتشعبة

خرق الاوراق خطية - رمحية حادة مسطحة راجمة. أشعة الصيوان ٥-٧ غير متساوية. نصف الثمر يبضي مغلخ فطري الحافة. الدرز مسطح - الصيف - من جبل اللكام الى لبنان وجبل الشيخ

٣ *J. fungosa*, Boiss. الجورينا الفطرية @ الساق اسطواني . خرق الاوراق خطية ضيقة ملتفة الحوافي . اشعة الصيوان ٥ - ٧ غير متساوية . نصف الثمر يبضي او مستطيلي محدب ولا تتناثر الفصحة المركزية عن الحافة لان جميع اغلفة الثمر فطرية . الدرزمقر - الصيف - الجبال بين عينتاب ومرعش . ويرجح انه تبان من المنقذم ذكره

٢ *J. juncea*, Boiss. الجورينا الاثلية 2٤ خرق الاوراق ٢٠٢ مترالى ٢٠٠٢ طولاً مستطيلة مدببة عصبية من الاسفل وملتفة الحوافي . الزناد طويلة . اشعة الصيوان ٧ - ٨ غير متساوية والطويلة منها ٢٠٤ متر طولاً . اوراق الظريف ٥ - ٧ خطية مدببة مثل الزينات طولاً - الصيف - الحقول المنقذة في الجبل الشرقي

٤٧ الاندرايسيا . (نجور الاكراد) PEUCEDANUM, L.

الازهار خشوية . اسنان الكاس مضخمة او أكثر او اقل وضوحاً . الثمر مفلطح ظهراً او عدي محاط بحافة متسعة . الاضلاع متساوية البعد تقريباً والثلاث المتوسطة خطية والجانبية قريبة الى الحافة او متحدة بها . الثقات منفردة في الاوراب ١ و ٢ او ٣ - اعشاب معمرة ازهارها صفراء . الظرف منقود



شكل ١٧٠

P. depaupertatum, Boiss. et Bal. الاندرايسيا المنقذة

2٤ الموق عريانة الاغصود الخطية - الرحمة . كل الاوراق جنزية قصيرة احادية التفصيل الريشي او ثنائيتها وقطعا لحمية اهليلجية - خطية كاملة او مستطيلة - اسفينية ذات ٢ فصوص الى ٥ حادة . اشعة الصيوان ٢ - ٥ غير متساوية يابسة . اوراق الظريف صغيرة مستطيلة بيضاء غشائية . الصويونات ذات زهرة الى ٤ . الثمر مستطيل او اهليلجي . الاضلاع خطية بارزة شفافه . الثقات مستدقة - الصيف - قم لبنان والجبل الشرقي *alpinum*, Boiss. ب . المجردي . السوق قصيرة ٢٠٤ متر

الى ٢٠٦ علواً - مع الرز

صيوان الاندرايسيا المنقذة

٤٨ الشبث ANETHUM L.

اسنان الكاس مضخمة . الثمر عدي منضغط ظهراً متسع الحافة . الاضلاع خطية متساوية البعد والثلاث الوسطى منها محيزمة والاثنتان الجانبيتان متحدتان بالحافة . الاوراب ذات فتحة واحدة مائلة الورب - اعشاب عالية اوراقها مشرحة وازهارها صفراء

A. graveolens, L. الشبث الثقيل الرائحة © املس . الاوراق ثنائية الفصّل الريشي

الى خرق طويلة خيطية - هلبية . الصبوان كثير الاشعة . الظرف والظريف مفقودان . الثمر اهليلجي - الربيع - مزارع مصر

٤٩ الكرويرا KRUBERA, Hoffm.

شكل ١٧١



الكاس ذات ٥ اسنان . الثمر عدسي منضغط ظهراً . الاضلاع

٥ ضخمة قشرية مرتفعة ذات غضون مستعرضة والظرفية منها محيضة .

الثقات تحت الاضلاع مضحلة تقريباً - اعشاب سنوية لمساة

ازهارها صغيرة بيضاء

K. peregrina, L. الكرويرا المرحلة © املس .

الساق ضخيم مثلم متشعب متعرج كثير الاوراق كورني الثمة . الاوراق ثلثية

الفصّل الريشي وخرقها صغيرة متراكمة راجحة مستطيلة . اشعة الديوان

٢-٦ قصيرة ثم ضخمة يابسة . الثمر اهليلجي حاد اطول من الزبدات الضخمة - الربيع - مزارع محبسة من المحولة الى غرة

٥٠ التورديلوم TORDELIUM, L. [HASSELQUISTIA, L.]


اسنان الكاس اكثر واقل وضوحاً . الثمر منضغط ظهراً وحافته اسنخية مغضنة - متدربة . الاضلاع

خيطية متساوية البعد تقريباً . الثقات خيطية منفردة في الاوراب ونادراً متعددة - اعشاب سنوية مشعرة

* الاثمار الداخلية للصويين جرية الهبة

T. Aegyptiacum, L. ١ التورديلوم المصري © الاوراق ريشية وقطعها صغيرة مشقونة

شكل ١٧٢



او منفصلة الى خرق قصيرة كالة . خرق الاوراق العليا ضيقة

حادّة . الظريف هلي اقصر من الصويين . اطول اشعة

الصبوان ٤-٢ متر طولاً . الثمر مستدير املس او درني

عند القرص وغير مكثيف الحليات والجزء الداخلي شفاف

والخارجي مضحل الاجمال - الربيع - من مزارع سورية الى

الى جنوبي فلسطين الى علو ١٠٠٠ متر

T. syriacum, L. ٢ التورديلوم السوري ©

الاوراق السفلى بسيطة والبنية ريشية وقطعها كبيرة بيضبة

صبوان التورديلوم المصري

جونية. اشعة الصبوان قصيرة منضخمة اخيراً مجمعة. اوراق الظريف رحيمة ملوثة اطول كثيراً من الصويون. اطول اشعة الصبوان ٢.٠٢ متر طولاً. الثمر كبير مستدير عناقى - حليمي والجزء الداخلى شفاف والخارجي مجلي مغضن - الريح - مزارع سورية الى علو ١٠٠٠ متر

* كل الاثمار مفلطحة

٢. *T. Hasselquistiae*, D. C. . ثورديليوم هسلكويمت © الاوراق السفلى بسيطة والبقية ريشية ذات زوج او زوجين قطعاً بيضية جونية - مسنة . الظريف هلي اطول من الصويون. الثمر يضي وقرصة درني صناعي وحافنة متفخمة متفخمة - الريح - ثنائي سورية

٤. *T. Apulum*, L. . الثورديليوم الايبولي © قطع الاوراق ٢ ازواج الى ٤ يضية متوسطة الحجم شرافية - منصوبة وفي الاوراق العليا ضبة اقل عدداً. اشعة الصبوان طويلة. اوراق الظريف هلية منعققة اقصر من الصويون . قرص الثمر حليمي وحافنة ضبق من البزرة شفاقة من الانسية مظلمة فلامدة من الوحشية - الريح - وادي عوثنى في البلقاء

٥١ الانيسورثيا *AINSWORTHIA*, Boiss.

هدب الكاس مضحل. الثمر منضغط ظهراً وحافنة متسعة ومتفخمة. الاضلاع خطية متساوية البعد او الجانبية منها متباعدة قليلاً. الثغرات منفردة في الاوراب - اعشاب سنوية هلية او عناقية ازهارها بيضاء والظرف والظريف هليان . جنس تندراج هيئة اوراق انواعه بعضها الى بعض * كل حافة الثمر متفخمة مظلمة

١. *A. cordata*, L. . الانيسورثيا القلبية © غير كثيف الزغب. الاوراق قصيرة الرجلة يضية - قلبية - شرافية غير منشبة او العليا ذات ٢ تناصيل يضية والانتهائية اسفينية . الظريف اطول من الازهار. الثمر يضي - مستدير - الريح - وادي قنوين



٢. *A. trachycarpa*, Boiss. . الانيسورثيا القصيرة الثمر © ابرية خشنة . الاوراق السفلى بسيطة يضية قلبية والبقية مفصلة ريشية وقطع ٢-٥ يضية - شرافية جالمة والانتهائية ذات رجيلة

مجدومة القاعدة . الظريف اطول من الازهار. الثمر يضي - مستدير صويون الانيسورثيا القصيرة الثمر - الريح - السواحل البحرية في سورية وفلسطين والجبال الى علو ١٠٠٠ متر. ويرجح ان هذا النوع تبان من المتقدم ذكره

* * أنسي حافة الثمر محمر شفاف ووحشيها متفتح ايض مظلم

A. Carmel, Boiss, ٣. الأيسورثيا الكرمل ① لحوي خشن. الأوراق شرافية مسننة بسيطة
قلبية - بيضية او جميعها او عليها ذات ٢ اقسام بيضية والانتهاية من هذه الاقسام قلبية ذات رجيعة.
الظريف مثل الازهار طولاً. الثمر مستدير وحافة مثل البزرة عرضاً - الربيع - بين الانجم الى جهة الكرمل
الشمالية. القدس. وربما هو ايضاً تبائن من النوع الاول يمتاز بهيئة الثمار

٥٣ الزوزيميا Zozimia, Hoffm.

الكاس ذات ٥ اسنان. الثمر منضغط ظهراً وحافة متسعة متفتحة والفتحة بين البزرة والحافة عريضة
زجاجية. الاضلاع نحيلة والمتوسطة منها متساوية البعد والجانبية متباعدة قريبة الى الحافة. الاوراب ذات
فتة واحدة عريضة مائلة الورب - اعشاب محولة او ثلثية الاعولم زغبية او عفائية اوراقها مشرحة ريشية
وازهارها يضاء

Z. absinthifolia, Vent. الزوزيميا الافسنتينية الورق ① مستعر زغبى رمادي
كثرا وقل. الجذر ضخيم مغزلي. العنق ليفي. السوق ضخمة مثلبة قصيرة وكثيراً ما تسجل الى زناد ضخمة
جذرية تقريباً. الاوراق ريشية ذات ٤ ارواج الى ٧ والنطع مستطيلة - مشرحة الى خريفات قصيرة خطية
كالة. الصوان كثير الاشعة. الثمر مستدير او اهليلجي مخروم النمة - الربيع - تلؤل جافة وصخور من
شمال سورية الى غزة وطورسينا

٥٣ المراكليم Hieracleum, L.

الكاس ذات ٥ اسنان. الثمر منضغط ظهراً متسع الحافة. الاضلاع نحيلة غير متساوية البعد.
الاوراب ذات فتة واحدة دبسية - اعشاب معبرة غالباً عالية ونادراً منخفضة رجلياتها متسعة القاعدة
على هيئة غود وازهارها غالباً مزواجة

H. Amanum, Boiss. et Ky. ١. المراكليم اللكامي ① مستعر عال. الاوراق خضراء
من الاعلى سنجاية من الاسفل ريشية ذات زوجين وقطعها مستطيلة عريضة مفصلة الى خرق مستطيلة
ذات سنينات حادة متراكبة. التزهر قصير الزغب الهليبي. الصوان كثير الاشعة. المبيض هليبي. الثمر
كبير مبضي - مستدير مخروم منفرد الهليبات - ايار - جبل اللكام عدل ٢٠٠٠ متر
H. humile, Sibth. et Sm. ٢. المراكليم السافل 24 من ٢٠٠٠ متر الى متر علو. العنق



صوبون المراكبوم الصافل

شكل ١٧٥



حرفني. الأوراق ريشية ذات ٣ أزواج إلى ٥ صغيرة مجذومة القاعدة أو اسنيتيها يضيئة كالة تحادة الاسنان أو مقصوفة جالسة وقد تكون القطع السفلي ريشية قصيرة الرجالات. أشعة الصوبان ٢ إلى ٧. الثمر زغبوي أو مستهلس يضيئ متناوب كال - الصيف - جرود لبنان والجبل الشرقي

٥٤ السينلكوسيا ديوم. *SYNELCOSCIADIUM*, Boiss.

اسنان الكاس طويلة رحيمة غير متساوية وأخيراً سافطة. الثمر منضغط ظهراً وحافته عريضة. الاضلاع نحيلة مضحلة تقريباً غير متساوية البعد. القلم متصب وأخيراً متصلب. الأوراق ذات فنة واحدة خيطية - اعشاب سذوية مسترقة ساقها عالٍ كثير التشعب يابسة أزهارها بيضاء وأشعة الصوبان غير متساوية وبعد التزهير ضخمة متجمعة

S. Carmeli, Labill. سينلكوسيا ديوم الكرمل ©

الأوراق ريشية ذات زوجين أو ٢ قطعاً مسننة يضيئة أو مستطيلة أو خطية. أشعة الصوبان ٢ - ٥. الثمر ملازم الملب اهليلجي مغروم - الربيع - أماكن محمية في سورية

٥٥ الملائيا *MALABAILA* Hoffm.

صوبان سينلكوسيا ديوم الكرمل

حافة الكاس مضحلة. حامل القلم مخروطي متموج الحافة. الثمر مستدير أو يضيئ - مقارب منضغط ظهراً وحافته متممة زجاجة من الداخل ومنفتح من الخارج. الاضلاع نحيلة غير متساوية البعد. الأوراق ذات فنة واحدة - اعشاب معبرة أزهارها صفراء

M. Sekakul, Russell. ١ الملائيا الصقاقل (الصقاقل) ٢٤ ٢٣ متر إلى ٢٥ علواً زغبي

مبيض. الجذر ضخيم بضاضي - مستطيل. الأوراق ثنائية التركيب الريشي وقطعاً مستطيلة مسننة أو مقصوفة. أشعة الصوبان ٦ - ٢٠. الثمر اماس أو قليل الغناء مستدير مفروض الثنية ونادراً يضيئ - مقارب. الحافة اعرض من البثرة وجروؤ الشفاف مثل الجزء المنتفخ الخارجي عرضاً - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

M. pumila, Boiss. ٢ الملائيا المنخفضة ٢٤ ٢٠ متر إلى ٢٠٨ علواً زغبي مستهلس. الجذر

طويل عمودي ضخ. الأوراق ٢.٠ متر إلى ٤.٠ طولاً ثنائية التفصل الريشي وقطعها صغيرة مستطيلة مخروقة او منفصلة الى خريقات بيضية كالة. الصبوان قريب للمجدر لنصر الساق ذوو اشعة فمادون. الثمر مستدير ٥.٠٠ متر عرضاً املس مفروض القمة وحافته ابيض من البزرة قليلاً واعرض من الجزء الداخلي الشفاف - الريح - قرب الاسكندرية

٥٦ الأسطفيين *PASTINACA*, L.

حافة الكاس مضحلة او صغيرة السنينات. الثمر منضغط ظهراً وحافته ضيقة غير ضخمة. الاضلاع نحيلة غير متساوية البعد. الثقات نحيلة منفردة في الاوراب ونادراً مزدوجة - اعشاب محولة ازهارها صفراء *P. teretiuscula*, Boiss. الأسطفيين الأسطواني ثمرية * الساق اسطوانية مخطط. الأوراق ريشية ملساء من الاعلى زغبية او نحيلة شجائية من الاسفل وقطعها عريضة بيضية او بيضية - مستطيلة شرافية والعليا منها غالباً ثلثية النصوص. الثمر يضي اهلبيجي او اهلبيجي املس. الثقات ممثلة الى قرب قاعدة الثمر - الصيف - قرب حصرون

السبط التاسع. الكوكليات *CAUCALINEÆ*.

* وجه الاليوم الداخلي مثلث او مفر

- ٥٧ *Exoacantha* * أوراق الظرف والظريف طويلة حسكية الرأس. الثمر صغير جداً
- ٥٨ *Artedia* * الثمر ذو جناح عريض منقسم الى خرق بيضية - مقلوبة مجذومة (شكل ١٧٦)
- ٥٩ *Orlaya* * الثمر كبير وابر الاضلاع الثانوية مصطفة صنيان او ٢ (شكل ١٧٧)
- ٦٠ *Daucus* * او الثمر متوسط وابر الاضلاع الثانوية مصطفة صناً واحداً (شكل ١٧٨)
- ٦١ *Cherioscladium* * الثمر مغطى بهلب * اضلاع او عرض نصف الثمر طولاً (شكل ١٧٩)
- ٦٢ *Cuminum* * اضلاع الثمر الاولى مجهزة بعناء والثانوية بهلب
- ٦٣ *Turgentopsis* * اضلاع الثمر الاولى مجهزة بمجليات والثانوية بهلب مصطف صنيان
- * وجه الاليوم الداخلي مثلث مطوي الى الداخل
- ٦٤ *Torilis* * ابر الاضلاع الثانوية مائلة كل الارب (شكل ١٨٠)
- ٦٥ *Caucalis* * ابر الاضلاع الثانوية مصطفة صناً واحداً الى ٢ (شكل ١٨١)
- ٦٦ *Turgenia* * ضلعان من نصف الثمر محاذيا الدرز والنبية ظهري (شكل ١٨٢)
- ٦٧ *Lisca* * ضلعان نصف الثمر المجانبين مضمحلان. والثالث الظهري ذات اعرف

٥٧ الأكسواكونثا *EXOACONTHA*, Labill.

حافة الكاس مضحلة. الثمر صغير منضغط قليلاً مجانبية. نصف الثمر اسطوانى فونزوايا والاضلاع الاولى ٥ والثانوية ٤ فلينية بارزة كالة. الفئات سطحية منفردة بين الاضلاع. الدرز عريض منطع. حامل القلم منفود - اعشاب محولة ازهارها بيضاء واوراق ظرفها وظرفها بابسة حسكية الراس *E. heterophylla*, Labill. الأكسواكونثا المختلفة الورق ⑤ الساق ضخيم مثل كورني. الاوراق المجذرية مستقيمة باكرار ريشية ذات زوج اوزوجين متباعدين. الاوراق الصاقية ريشية ذات ٣ خرق الى ٥ خطية. الزند متضخم. ورقة للظريف الوحشية اربعة اضعايف البقية طولاً - الربيع - اماكن مخصصة من مرعش الى الناصرة

٥٨ الارتيديا *ARTEDIA*, L.

حافة الكاس مضحلة. الثمر مستدير - يضي منضغط ظهراً. الاضلاع الاولى ٥ والثانوية الظهرية ٢ خطيتان والمجانبية ٢ متمعتان الى جناحين عريضين منقسمين الى خرق بيضية مقلوقة بمجدومة خيلانها مستديرة. الفئات منفردة تحت الاضلاع الثانوية. الوجه الدرزي مشبك مغضن - اعشاب سنوية ازهارها بيضاء واوراقها مشرحة الى خرق هليية

شكل ١٧٦



ثمرة من الارتيديا المحرشية

A. squamata, L. الارتيديا المحرشية ⑤ املس. الساق قليل التشعب. الصوبان طويل الزند كثير الاشعة قصيرها. اوراق الظرف والظريف مشرحة الى خرق هليية. الازهار الخارجية منشعة - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

٥٩ الاورليا *ORLAYA*, Hoffm.

شكل ١٧٧



صوبان الاورليا المنطحة الثمر

حافة الكاس ذات ٥ اسنان. الثمر يضي منضغط ظهراً. الاضلاع الاولى ٥ خيطية والثانوية ٤ بارزة مجزومة ذات صنفين او ٢ صنف من الابر. الاوراب ذات فتحة واحدة تحت الاضلاع الثانوية - اعشاب سنوية واوراقها ثنائية التفصيل الريشي وازهارها بيضاء

O. platycarpus, L. ١ الاورليا المنطحة الثمر

(القطرب) ⑤ املس او قليل الغناء هليية. اشعة الصوبان ٢

— ٣ أقل من ٢٠١ متر طولاً. أوراق الظرف والظريف مستطيلة - رحيمة عريضة الحافة الغشائية غير معادلة الأضلاع طولاً. البتلات الخارجية منشعة ٥ أضلاع البقية طولاً. الثمر مستطيل ٢٠١٢ متر طولاً. الأبر خصية - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

breviaculeata, Boiss. ب. القصيرة الأبر. الأبر قصيرة جداً - سفح الجبل الأقرب
O. maritima, Gou. ٢. الأورلي البحرية ☉ خلي رمادي. أشعة الصيوان ٢ - ٥ غير متساوية طولاً أطولها ٢٠٢ متر. أوراق الظرف والظريف خطية مدببة غير غشائية الحوافي. البتلات صغيرة منشعة قليلاً. الثمر اهليلجي ٢٠٠٨ متر طولاً. الأبر إلالية - الربيع - رمال ساحل سورية وفلسطين البحري وبادية بحرية مصر

٦. الجزر (الحرمل. الدوقو) *DAUCUS*, L.

اسنان الكاس ٥ غضة وإحياناً منقودة. الثمر يضي أو مستطيل منضغط ظهراً قليلاً. الأضلاع الإلية ٥ خطية هلينة والثانوية ٤ متساوية بحجمه والجناح مخروق إلى صف واحد من الأبر. الأوراب ذات فتحة تحت الأضلاع الثانوية - أعناب أحادية الإثمار هلينة لحوية على الغالب ازهار ما يضاء أو مصفرة * الظرف منقود. الصيوان غير مجتمع في الإثمار

D. pulcherrimus | *leptocarpus* ٢

** الظرف ذو عنة أوراق. الصيوان مجتمع في الإثمار

+ الأبر ممتدة إلى ربع طولها

D. Broteri ٣

+ الأبر ممتدة عند قاعدتها فقط. الأوراق مشرحة إلى خريقات

D. littoralis ٤ *setulosus* ٥ *aureus* ٦

+ + الأبر مستقلة تقريباً. قطع الأوراق بيضبة مستطيلة. الصيوان عشي في الإثمار

D. Carota ٧

١. *D. pulcherrimus*, Willd. الجزر الاظرف (اللزاقة) ☉ ٢٦ متر إلى ١٠٢ علماً.

الأوراق السفلى مثثة المحيط ملساء أو قليلة الغناء ثلاثية التركيب الريشي أو رباعية وخرها خطية صغيرة. الأوراق الساقية عريضة الرجالات غمدتها قليلة المخروق. أشعة الصيوان متساوية الطول ١٠ إلى ١٦ عدداً و٤٠٤ متر إلى ٢٠٦ طولاً في الإثمار. أوراق الظريف مستطيلة - رحيمة مهدبة. الأبر هلينة ممتدة القاعدة - الربيع -

eriocarpus, Boiss. ب. الصوفي الثمر. الأبرخمية. الثلاث زغبية من الخارج - من

عقبات ومرعش الى انطاكية. بعلبك

٣ *D. leptocarpus*, Hochst. الجزر الخفيف الثمر. الساق نحيل ٢٦ متر علواً منعطف

الهلبي من الاعلى. الاوراق مستطيلة - رحيمة المحيط قليلة الهلبي ثنائية التنصیل الريشي وقطعها صغيرة رحيمة مخروقة خرقين او ٢. خرق الاوراق العليا متصاعدة. اشعة الصيوان ٧ الى ١٢ عدداً ٢.٣ متر الى ٢.٠٢ طولاً خشنة. اوراق الظريف ملازمة الهلبي خطية - مخززية. ابر الاضلاع الثانوية متسعة القاعدة متحدة من الاسفل هلبية لمساء اطول اضعافاً كثيرة من قطر الثمر الخطي - الربيع - مزارع مرعش الى الشرق

٤ *D. Broteri*, Ten. جزر بروتر. هليبي غنائي. الساق متشعب من القاعدة والشعب

شكل ١٧٨



صيوان جزر بروتر

كثيرة الشعب. الاوراق مستطيلة المحيط ثنائية التنصیل الريشي وخرقها مستطيلة - خطية. الصيوان صغير واشعة قصيرة. اوراق الظرف ذات ثلاث خرق خطية اقصر من الصيوان. اوراق الظريف خطية - هلبية معادلة الصويون طولاً بسيطة ونادراً ذات ثلث شعب. الزهرة المركزية نادراً عاقرة. ابر الاضلاع متباعدة متحدة الى ربع طولها في عرف عريض رحيمة مخززية. الالة اطول من قطر الثمر - الربيع - مزارع سورية وفلسطين

bicolor, Boiss. ب. ذو اللونين. أكبر من الرمز. الزناد

طويلة. الظرف والظريف غالباً اطول من الصويون. الزهرة المركزية واحياناً جميع ازهار الصويونات المركزية عاقرة بنسجية - عمريت. الكرمل

٤ *D. littoralis*, Sibth. et Sm. الجزر الشاطئي. كثير السوق قليل النروع املس او

منعطف الغناء. الاوراق قصيرة الغناء مستطيلة المحيط ثنائية التركيب الريشي وقطعها منصلة الى خريقات صغيرة قصيرة لحمية مخروقة خرقين او ثلاث. اشعة الصيوان ٧ - ٩ غير متساوية طولاً. اوراق الظرف كاملة او قصيرة الخرق الثلاث ثلث الصيوان طولاً. اوراق الظريف رحيمة غشائية الحافة كاملة قصيرة الهلب اقصر من الصويون المندمج. ابر متسعة القاعدة قليلة الانحام رحيمة. الالة - الربيع -

genuinus, Boiss. ١. الحنفي. ابر ١٠ - ١٢ على الضلع الواحدة - في الرمل برب

الشاطي في سورية وفلسطين

Forskahlei, Boiss. ب. فورسكال. ابر على الضلع الواحدة ٦ الى ٩ احبائاً متسعة

القاعدة - في الرمل بقرب الشاطئ في سورية وفلسطين وبأدي بحرية مصر. قرب القدس
Gaillardoti, Boiss. ت. كلياردو. السوق متعصبة. الأبر على الضلع الواحدة ٩ إلى ١٠

قصرة - قرب طرطوس

longiradiatus, Post. ث. الطويل الأشعة. الأشعة ٢٠٤ من طولاً - الرمل قرب بيروت

D. setulosus, Guss. ٥. الجزر الهليبي ٥ السوق متعصبة أو متصاعدة. الأوراق السفلى

ثنائية التفصيل الريشي وقطعها منصلة إلى خرق مستطيلة خطية وألميا متصاعدة. الصيوان صغير
متعدد الأشعة. أوراق الظرف ريشية المخرق أطول قليلاً من الصيوان. أوراق الظرف بسيطة خطية

مخرزية ذات هليبي. الأبر متعصبة القاعدة متعدة قليلاً طويلة هليبية إلية أطول من قطر الثمر

brachylenus, Boiss. ب. الثصير الأشعة. الصيوان أصغر ما في الرمز وأشعة أقصر.

الظرف أقصر قليلاً من الصويوين - من عيتاب ومرعش إلى طرابلس

D. aureus, Desf. ٦. الجزر الذهبي ٥ هليبي - غنائي مصر عند الجناف. الساق كورني

تقريباً. الأوراق مشرحة إلى خرق صغيرة خطية حادة. أشعة الصيوان ١٥ - ٢٥ أو أكثر. أوراق

الظرف ريشية وخرقها هليبية منعقبة أقصر من الأشعة. أوراق الظرف ذات ٢ شعب معادلة الأضمار
طولاً. الثلاث بيضاء مصفرة عند جناحها. الأبر متعدة القاعدة ريمية إلية اثنتي عشرة ضعفاً قطر الثمر طولاً

- الربيع - من صيدا إلى سبطية

D. Carota, L. ٧. الجزر كاروتا ٥ الساق منعقبة الخمية من الأسفل خشن من الأعلى.

الأوراق ثنائية التركيب الريشي أو ثلاثية وأقسامها مستطيلة أو بيضية - أسفينية - معينية وفي الأوراق العليا

ريمية - خطية وخرقها مستطيلة أو خطية. أشعة الصيوان كثيرة. الظرف غالباً أقصر من الصيوان

وأوراقه ذات ثلاث شعب أو ريشية. أوراق الظرف خطية غشائية المحوافي كالملة متشعبة ٢ شعب.

الزهرة المركبة عاقرة أرجوانية. الأبر ريمية - مخرزية مستتلة تقريباً ذات ثاب ٣ منعقبة مثل عرض

التمر طولاً أو أطول من ذلك - الربيع - مزارع جميع سورية وفلسطين ومصر. ويتباين هذا النوع كثيراً

باعينار حجمه وشكل أوراقه ولبه ووهيئة صيواناته وظرفه وظرفه وأنماؤه فمن أشهر النباتات ما يأتي شرحها

maximus, Post. ب. الأكبر. أقسام الأوراق أسفينية - بيضية أو مستطيلة. أشعة الصيوان

ونقطة نفعه ضخمة. الظرف مثل الصيوان أنساعاً. الأبر إلية (D. maximus, Desf.) - حص.

الجبل الشرقي. الجليل

Blanchet, Post. ت. بلانشي. أقسام الأوراق أسفينية معينية تقريباً. أشعة الصيوان غير

متساوية. أوراق الظرف ثلث الصيوان أنساعاً. الأبر قصيرة مستتلة (D. Blanchet, Rout.)

— مارس ركس بقرب بشري

glabrescens, Post. ث. المستطلي. مستطلي او قليل الحية خشن من الاعلى. الاوراق
الاسفل منها احادية التفصيل الريشي. اقسام الاوراق السفلى صغيرة يضية - اسفينة مسنة او مخروقة
خرقاً رحيمة خموية. الظرف نصف الصبوان اتساعاً. الظريف مثل الصوبيون اتساعاً - انطاكية

٦١ الشيتوسباديوم *CHETOSCIADIUM*, Boiss.

اسنان الكاس قصيرة مخززية. الثمر مستطلي منضغط قليلاً ظهراً مستطلياً طويلاً دقيقاً.
الاضلاع والاوراق مضحلة - اعشاب سنوية ازهارها بيضاء.

شكل ١٧٩



C. trichosperma, L. الشيتوسباديوم المشعر

البذر ① ملازم الشعير. الساق اسطوانية متشعب من القاعدة.

الاوراق مثلية المحيط ثنائية التفصيل الريشي وخرقها صغيرة

مستطيلة حادة. اشعة الصبوانات ٢-٦ قصيرة. هلب الثمر

اصفر - محمر ارجواني ٣ اضعاف عرض نصف الثمر الى ٦ طولاً. صبران الشيتوسباديوم المشعر البذر

القلم مستقيم اقصر قليلاً من الثمر - الربيع - اماكن متروكة في سورية وفلسطين

٦٢ الكمون *CUMINUM* L.

اسنان الكاس مخززية غير متساوية. الثمر مستطلي مستدق القاعدة والقمبة منضغط قليلاً مجانبية.

اضلاع نصف الثمر الاولى ٥ خطية كالة قصيرة العناء والثانوية ٤ معادلة للاوليات بروزاً او اكثراً

بروزاً منها ذات هلب كثر طولاً او قل. الثقات ضخمة منفردة تحت الاضلاع الثانوية. القلم يابس

وحاملة مخروطية - اعشاب سنوية اوراقها مشرحة الى خرق شعيرة طويلة وازهارها صغيرة بيضاء او حمرة

C. Cuminum, L. الكمون هينوم ① الساق متشعب من القاعدة تقريباً. اشعة الصبوان

٥-٢. اوراق الظرف والظريف هلبية منعققة اخيراً اطول من الاشعة والشعيعات - الشتاء والربيع -

hirtum, Boiss. ب. العفائي. الاضلاع الثانوية مصطنة صنين قصيرة الملبس - مزارع

ارض الصعيد

٦٣ التورجينيوبسيس *TURGENIOPSIS*, Boiss.

حافة الكاس ذات ٥ اسنان قصيرة. الثمر منضغط مجانبية. اضلاع نصف الثمر الاولى ٥ خطية

ضيفة قصيرة الحلقات والجانبية ٤ عريضة كالة ذات صفيين أو ٣ من الملب الدرني . الثقات منفردة تحت الاضلاع الثانوية نجيلة او متلاشية - اعشاب سنوية ملساء ازهارها بيضاء والازهار المركبة في الصويرين مدوية

T. faeniculacea, Fenzl. . التورجينويوسى الشمرى ٢٥٠ مترالى ٢٥ علواً الساق متشعب . الاوراق مشرحة الى خرق هلبية قصيرة في الاوراق السفلى وطويلة في العليا . الصيوان طويل الزند واسعته ٢ - ٣ . الظرف مقفود . اوراق الظريف شعرية . الازهار المنمرة في الصويرين ٢ - ٣ . الابر هلبية درنية القاعة ملساء الالية نصف قطر الثمر طولاً . المسبة جالسة على حامل مخروطي - الربيع - تحت جرود الجبل الاقرب الى لبنان والجبل الشرقي

٦٤ التوريلس *TORILIS, Hoffm.*

حافة الكاس ذات ٥ اسنان . الثمر منضغط مجانب . الاضلاع الالية ٥ هلبية والثانوية مخنثة بكثرة الابر المائلة كل الاوراب . الثقات منفردة تحت الاضلاع الثانوية . وجه الاليوم من الانسي مثل - اعشاب سنوية او محولة اورانها ثنائية التفصيل الريشي او احادية

* * * الظرف ذو ٤ اوراق الى ٦ . ابر الثمر غير الالية

T. Anthriscus, L. . التوريلس الاثرسكس ٥ خرق الاوراق مستطيلة عريضة مسنة - مفصصة . اشعة الصيوان ٥ - ١٢ . ابر الثمر اقصر من نصف قطره مخنثة غير الالية - الربيع - الخلف الغربي لجبل سودة في البقاء

* * * * * الظرف مقفود او ذو ورقة واحدة . ابر الثمر الالية


T. infesta, L. . التوريلس المتعب ٥ خرق الاوراق مستطيلة - ضيقة . الصيوان طويل الزند متشعب قبل الانقسام واسعته ٢ - ٨ . البتلات الخارجية متشعبة - الربيع - سياجات واماكس مهلة . كثير الوجود في سورية وفلسطين

T. occulta, Post. . ب . المستعر . الساق كثير الشعب كثيف الاوراق . الصيوانات قصيرة الزناد قليلة الاشعة قصير عبا مستمرة بين الاوراق - صردة

T. heterophylla, Guss. . التوريلس المختلف الورق ٥ الفروع قليلة متشعبة . الاوراق السفلى ثنائية التفصيل الريشي والعليا ثلاثية المنشأ وقطعها رحيمة منشابة والاوراق الغاية في العلو خطية كاملة . الصيوانات طويلة الزناد منقصة قبل الانقسام واسعتها ٢ - ٣ . الصيوانات قليلة الازهار . البتلات غير متشعبة - الربيع - جبل اللكام ولبنان

٤. *T. triradiata*, Boiss. et Held. . التوريلس الثلاثي الاشعة ☉ الساق نجيل كبير

شكل ١٨٠



الشعب وفروعه مستدقة ورقية من الأسفل عارية تقريباً من الأعلى متشعبة على هيئة عقود كورني. خرق الأوراق السفلى مستطيلة والعليا خطية. الصوبان طويل الزند منغض قبل الإتمام ذو ٣ أشعة متساوية قصيرة منفردة. الصوبون صغير مندمج. البتلات الخارجية متشعبة. البرابر قصيرة. القلم طويل منفرج وحاملة مضحل - الربيع - يبروت

٥. *T. neglecta*, Roem. et Sch. . التوريلس المهمل صوبان مشبر من التوريلس الثلاثي الاشعة

☉ الساق عال . قطع الأوراق متباعدة كبيرة مستطيلة مقصوفة - مسننة. الصوبان طويل الزند وأشعة ٧ - ١٢ غير متساوية. البتلات الخارجية متشعبة. الثمر كبير وافر متوسطة الطول - الربيع - أماكن مهلة. كثير الوجود

٦. *T. nodosa*, L. . التوريلس العقدي ☉ الساق متكى - متشرف متفرع. الأوراق مثل أوراق

التوريلس المتعب هيئة. الصوبان جالس أو قصير الزند وأشعة ٢ - ٣ مندج. الثمر يضي جالس تقريباً والأبر قصيرة منفردة خشنة الآلة - الربيع - أماكن مهلة. كثير الوجود

٦٥ الكوكس CAUCALIS, Hoffm.

حافة الكاس ذات ٥ أسنان. الثمر منضغط قليلاً مجانب. الاضلاع الأولية ٥ خطية ذات هلب والثانوية ٤ أكثر بروزاً ذات صف إلى ٣ من الأبر. الثنائات منفردة تحت الاضلاع الثانوية - اعشاب سنوية ازهارها يضاء وظرفها مقنود أو ذورقة واحدة

* الأبر مصطفة صفًا واحدًا

١. *C. daucoides*, L. . الكوكس المجزري ☉ الأوراق يضية المحبط ثلاثية التفصيل الريشي

وخرقها مستطيلة ٢.٠٠١ متر إلى ٢.٠٠٢ طولاً. الصوبان طويل الزند وأشعة ٢ - ٥. الثمر اهليجي مستطيل حاد الطرفين. الأبر الاضلاع الثانوية مخززية عريضة القاعدة مثلبة شعبة القبة مثل قطر نصف الثمر طولاً أو أطول. القلم مثل حامله المخروطي طولاً - الربيع - بين المزارع في لبنان

٢. *C. tenella*, Del. . الكوكس النحيل ☉ الأوراق مستطيلة المحبط ثنائية التفصيل الريشي

أو ثلاثية وخرقها ٢.٠٠٢ متر إلى ٢.٠٠٥ طولاً حادة خطية. الزند طويل. أشعة الصوبان ٥ - ٩ قصيرة غير متساوية. الثمر خطي. الأبر مخززية لمساواة خشنة ثلاثة أضعاف نصف الثمر طولاً. القلم قصير -

الربيع - اماكن مهلة وعشبية. كثير الوجود

شكل ١٨١



** الابر مصطفة صفيان او٢

٣. *C. leptophylla*, L. الكوكلس الخفيف الورق

الاوراق مستطيلة المحيط ثنائية الفصيل الربشي وخرقها خلية حادة متراكبة. الزند قصير. اشعة الصيوان ٢-٣. الثمر مستطيل. الابر مخززية ثلثية الاصطناف خشنة الالة. المسبة جالسة - الربيع - المزارع والاماكن المهلة. كثير الوجود في سورية وفلسطين والبلقاء

صيان الكوكلس الخفيف الورق

erythrotricha, Post. ب. الاحمر الشعر. البتلات محبرة والابر محبرة - ارجوانية مصطفة

صفيان القلم مثل حامله طولاً. من حلب الى صردة (*C. erythrotricha*, Boiss. et Haussk.)

٤. *C. Gaillardoti*, Boiss. كوكلس كلياردو

٤ متباعدة وقطعها قصيرة مقصوفة الى خرق مستطيلة - خطية. الزند طويل. اشعة الصيوان ٢-٣.

الابر عريضة القاعدة مصطفة صفيان مستوية. القلم مثل حامله طولاً - الربيع - اماكن محجرة عدد سطح جبل قيسون. وربما هو ايضاً تبين من الكوكلس الخفيف الورق

٥. *C. fallax*, Boiss. et Bl. الكوكلس الكاذب

الزند طويل. اشعة الصيوان ٢-٥. الثمر يضي. الابر مخززية ثلاثية الاصطناف خشنة الالة اطول من قطر الثمر. الاثمار قصيرة - الربيع - مزارع واماكن نجمية في لبنان الى علو ٢٠٠٠ متر

٦٦ التورجينا TURGENIA, Hoffm.

الكاس ذات ٥ اسنان. الثمر منضغطة مجانبة توأمي تقريباً. الصلمان المهاديتان للدرز مجهزان

شكل ١٨٢



بدرنات او ابر والسبع الباقية ظهري ذات صف الى ٣ من الابر المتساوية تقريباً. الثقات منفردة تحت الاضلاع الثانوية - اعقاب سنوية خشنة قازهارها يضاء اوارجوانية صغيرة. زهرة الصويون المركزية سدوية

٦. *T. latifolia*, L. التورجينا العريضة الورق

كثاوقل وأبيرى خشن. الساق مثل قليل الشعب. الاوراق يضيبة المحيط احادية التركيب الربشي وخرقها ١٠.٢ متر الى ٢.٢ طولاً مستطيلة

صويون التورجينا العريضة

الورق ١٠.٢ محبقة

رجمية مقصوفة - مسنة. اشعة الصيوان ٣-٤ منفرجة. اوراق الظرف

والظرف حرشية. الثمر ١٠.٢ متر طولاً يضي مستدق القمة. ار الاضلاع الظهري مصطفة صناً واحداً الى ٣ عريضة القاعدة مخززية خشنة الالة - الربيع -

genuina, Gren. et Godr. ١. الحقيقية. الابرة الظهريّة طويلة. ابر الحوافي قصيرة - في المزاج. كثير الوجود في سورية وفلسطين
tuberculata, Gren. et Godr. ب. المتدرة. الابرة الظهريّة طويلة. الحوافي قصيرة
الدرنات - عيتاب. حلب والى الشرق
brachyacantha, Boiss. ت. القصيرة الابرة. الابرة الظهريّة قصيرة. الحوافي قصيرة
الدرنات - لبنان. خان الخارج
unifaria, Post. ث. الاحادية الاصطفاف. الاثمار خضراء. الابرة الظهريّة طويلة مصطفة
صفاً واحداً. ابر الحوافي قصيرة - عيتاب

٦٧ الليسيا LISÆA, Boiss.

الكاس ذات ٥ اسنان. البتلات الخارجية طويلة متشعبة. القبر منضغط مجانب. اضلاع نصف
التمر الاولى الجانبية مضحلة والظهريّة ٢ ممتدة الى اعراف قليلة السنينات. الاضلاع الثانوية مضحلة
او مسطحة الى صف بسيط من الدرناات. الفئات مضحلة تحت الاضلاع الثانوية - اعشاب خشنة
ازهارها بيضاء

L. Syriaca, Boiss. الليسيا السورية ☉ هلي خشن. الماق قليل الشعب. الاوراق
ريشية وقطعها مستطيلة ٠٢ متر الى ٠٣ طولاً مقصوفة - مسننة او مخروقة. الزناد طويلة. اشعة
الصوبان ٥ - ٨. اوراق الظرف والظرف غشائية. التمر يضي - كروي ينشق الى نصفين. الاضلاع
الثانوية مضحلة او ذات ٢ درنات الى ٤. عرف الاضلاع الظهريّة ينقسم الى ٦ ابر او ٧ مثلية طويلة -
الربيع - من حلب وانطاكية الى بسطة الى الشرق. وربما ليس هذا النوع الا تبان من الليسيا
المختلفة التمر (L. heterocarpa, D. C.)

الرتبة الثامنة والاربعون الارالية ARALIACEÆ.

الازهار قياسية خشوية. انبوبة الكاس ملتصقة بالمبيض ذات ٤ اسنان او ٥. البتلات ٥ - ١٠
مصرعية في البرعم مندغمة اعلى المبيض. الاسدية كالبتلات عدداً نخلها. المبيض سفلي ذو غرفة واحدة
او عدة غرفات. البويضات منفردة منتصب. الاقلام كالغريفات عدداً والغريفات منفصلة او متحدة
كنراو قل. التمر عني ينصل الى عججات قشرية على الغالب - انجم متعرشة

القسموس HEDERA, L.

فصوص الكاس ٥ قصيرة. البتلات ٥. الامدية ٥. القرص محذب. الاقلام متحدة على هيئة مخروط

والسماط جالسة على قيق. المبيض ذو ٥ غريقات. العنينة مكحلة بقص عريض وعلى دوائر تدوب
فصوص الكاس وغريقات ٥. العجوات بيضة - مثلبة. البزور منفردة بيضة - النجم فروعها ذات
جنور مشطية تنثبت في الجدران والأشجار

H. Hehly, L. القشور هيلكس (العشقي) ذو الأوراق مخيانية ملساء لماعة ذات ٥
فصوص زاوية ولأوراق الفروع المتفرعة كاملة بيضة - معينية مدببة. الصيوانات عشودية كوكبية الزغب.
فصوص الكاس مثلبة عريضة وقصيرة. العنينات بلبلية - كروية سود - الصيف والخريف - الجدران
وقشور الأشجار شائع في الجرد وتحت الجرد

الرتبة التاسعة والأربعون الكورنية CORNACEÆ.

الأزهار قياسية خشوية. أنبوبة الكاس ملتصقة بالمبيض بلا حافة أو مجذومتها أو ذات ٤ أسنان
لى ٥ مصراعية. البتلات ٤ الى ٥ مصراعية مندغمة في قاعدة القرص اعلى المبيض. الاسدية كالبتلات
عدداً ونادراً ضعفها مندغمة معها المبيض سفلي ذو غرينة واحدة الى ٤ وألثم واحد. البويضات منفردة.
الشمر نووي والنواة ذات غرينة واحدة الى ٤ - النجم أو أشجار

الكورنس (الإقرانيا. القرانيا) CORNUS, L.

هدب الكاس ذو ٤ أسنان. البتلات ٤ مصراعية. الاسدية ٤. القرص وسادي. المبيض ذو
غريقتين والفلم واللسة ١. النووية كروية أو بيضة ذات غريقتين وبزرتين. النواة عظمية أو قشرية
- النجم أو شجيرات أو أرقامها متعاقبة

C. mas, L. ١ الكورنس الذكر ذو الفروع الحديثة ملازمة الشعر ثم ملساء. الأوراق عسوية
أورمجة. الأزهار صفراء تنقسم قبل ظهور الأوراق وهي مرتبة في صيوانات محاطة بظرف ذي ٤ أوراق. البتلات
رجمية منعقفة. النووية الهيكلية سرية - الربيع - عتياب



C. australis, C. A. Mey. ٢ الكورنس الجنوبي ذو الفروع ملازمة الھلب. الأوراق الهيكلية
أورمجة حادة أو مستدقة مجهزة من الأسفل بهلب قصير ملازم متشعب. العنينات متعاقبة ملازمة الھلب
مبتسمة بعد ظهور الأوراق. البتلات بيضاء منفردة مستطيلة - رجمية هلبية من الخارج. النووية كروية
مكحلة بهدب الكاس مسودة عند نضجها - من أبار إلى تونز - أماكن نجمية من جبال شالي سورية إلى لبنان

خطاؤه واقع في الطبع

| وجه | سطر | خطاؤه | صواب | وجه | سطر | خطاؤه | صواب |
|-----|-----|----------------|----------------------|-----|-----|--------------------|--------------------|
| ٢ | ١٨ | مفقودة او خطية | ش فوية | ١٤ | ١٤ | التيه | التيه . ماريوط |
| ٤ | ٣ | lobata | lobata . ت . ٥٠ | ٩ | ٩ | وزحلة | وزحلة الى جنوبي |
| ٦ | ٢٧ | مرجيمون | القدس . مرج عيون . | ٥٨ | ٢١ | B . ب | ب . ب |
| ٩ | ٣ | الفيوم | العريش | ٦٣ | ٦ | العديسي | العديسية |
| ٢٢ | ٢٢ | منر | منر . ماريوط | ١٩ | ١٩ | وساحل | وسهل |
| ١٠ | ١٢ | الربوي | الكثير | ٢٠ | ٢٠ | ذو | ذات |
| | | () | () الظهرية | ٧ | ١٩ | ١٩ | ١٩ campestre |
| ٣٠ | ١٤ | اليونكة | اليونكة | ٦٧ | ١٨ | willd. | Willd. |
| ٣١ | ١٩ | الحوزان | الحوزان | ٦٨ | ٩ | الساحلي | الساحلي |
| ٣٢ | ٢٢ | راس | PAPAVE-
ACEÆ | ٧٠ | ١٢ | F | E |
| ٣٣ | ٢٤ | قطعا | وقطعا | ١٥ | ١٥ | F | E |
| ٣٩ | ٢٢ | الزنيذات | الزنيذات واقصر منها | ١٧ | ١٧ | F | E |
| ٣٢ | ٦ | الثوة | الثوة وفادراً ٤ او ٢ | ٧٦ | ١٠ | اوزاوي | زاوي القبة |
| | | (٢٩) | | ٧٦ | ١٢ | camyptop-
terum | camyptop-
terum |
| ٣٤ | ٩ | مستدبرة | مستدبرة | ٧٧ | ٩ | الحقبة | الحقبة |
| ٣٥ | ١ | صنبن | صنبن او افي كل غريفة | ٩٠ | ١٨ | بنجبية | وردية |
| | ٢٤ | اجنحة | اجنحة الا في بعض ٣٩ | ٩١ | ٤ | Aucheri | Aucheri |
| ٤٠ | ٢٢ | ازواج | زوجين | ٩٤ | ١٦ | Fresn. | Fresn. |
| ٤٤ | ٢٢ | CRV | CRU | ٩٧ | ٢١ | المنشأ | المنشأ اوريشية |
| ٤٩ | ٣ | الشمالي | الشمالي . بادية جعفر | ٩٨ | ١٠ | فلسطين | فلسطين الاسكدرية |
| ٧ | ٧ | سبنا | فلسطين . سبنا | ٩٩ | ٥ | المنشأ | المنشأ اوريشية |

| صواب | خطا | وجه سطر | صواب | خطا | وجه سطر |
|----------------------|------------|---------|---------------------|-----------|---------|
| كثيرة | قليلة | ١١٦٣ | سينا ومصر | سينا | ٢٢ ٩٩ |
| سورية. جنوبي فلسطين | سورية | ١٩٦٧ | ديمان . سبطية | ديمان | ٢٥١ ٠٦ |
| سورية وفلسطين وبحرية | سورية | ٢٣ | القاعدة او عاريها | القاعدة | ٢١١ ٠ |
| مصر | | | كاملة او | كاملة | ٢٠ |
| الباءياء | البامية | ٦١٦٩ | الرسكية | الرسكي | ٢٦١ ١٤ |
| وفلسطين . العريش . | وفلسطين | ٥١٧٣ | المدحجة | المدح | ١٢١ ٢٠ |
| بسيط او ذات ٥ | بسيط | ١٤١٧٤ | الشرق . بحرية مصر | الشرق | ٦١٢ ٤ |
| فصوص | | | السيلا ٤ او ٥ | السيلا ٤ | ٦١٣ ٢ |
| اشعة الى ٥ | اشعة | ١١٧٥ | او محولة او | او | |
| وسينا . قرب القاهرة | وسينا | ٥١٧٩ | الاقلام ٤ | الاقلام ٢ | ٤١٣ ٣ |
| وردية | ارجوانية | ٤١٨٤ | السنوية | السنوية | ١٩١ ٢٥ |
| سنوية ونادراً محولة | سنوية | ٢١ | ٥ | ٦ | ٧١٢ ٦ |
| التيه الى بحرية مصر | التيه | ٢٨١ ٨٦ | Sehreb. Sehreb. | | ١٩ |
| ٥ او ٥ | ٥ | ١٤١ ٨٥ | شعبتين او مفقودة | شعبتين | ٢٢١ ٢٧ |
| شرقها . بحرية مصر | شرقها | ١٨ | الغالب وحيثاً ١٠ | الغالب | |
| ضعفها او اضعافها | ضعفها | ٧١٩٠ | المبيض او حولة | المبيض | |
| صيدا . غور الاردن . | صيدا | ١٦٢ ٠٠ | خيطية | خيطية | ٤١٤ ١ |
| الكورونيات | الكورونيات | ٢٢٠ ٥ | الرمل سورية وفلسطين | الرمل | ١٠ |
| الكرونيات | البقيات | ١٥ | والبادية ومصر | | |
| الكسيات | الكسيات | ٨٢٠ ٦ | الداخن | المحيط | ١٩١ ٤٥ |
| سورية وفلسطين | سورية | ١٨٢ ٠ ٨ | التيلا ٥ او | التيلا ٢ | ٢٢١ ٤٩ |
| ٥ | ٥ | ٥٢١ ٧ | جالسة تقريباً | جالسة | ٩١٥ ١ |
| بادية جعفر | بادية | ١٣ | المدغمة | المدغمة | ٤١٥ ٦ |
| الطويلة | الطويل | ١٤٢ ٢٠ | ذا | ذو | ١١٥ ٧ |
| حلب . القدس | حلب | ١٤٢ ٢١ | المستوي | الاصح | ١١١ ٦٠ |
| — بحرية مصر | — | ١٧٢ ٢٢ | H | P | ١٥ |

| وجه سطر | خطاؤه | صواب | وجه سطر | خطاؤه | صواب |
|---------|----------|--------------------------|---------|-----------|----------------------|
| ٢٢ | — | — | ١٠٢٨٤ | المتنوع | المتنوعة |
| ١٠٢٢٥ | وسينا | وسينا . مصر | ١٢٩٤ | المحاط | المحاطة |
| ١٩٢٣٠ | مصر | مصر . الاسكندرية | ٢٧٢٠٠ | وفلسطين | وفلسطين وبادية مصر |
| ٢٢٣١ | البلقاء | البلقاء . الاسكندرية | ١٨٢٠١ | ولبنان | ولبنان . بير السبع . |
| ١٤٢٣٥ | البناع | البناع . شمالي فلسطين | ٢٦٢٠٤ | البحري | البحري في سورية |
| ٩٢٤٢ | ويبروت | ويبروت ومرج ابن عامر | — | — | وفلسطين |
| ١٠٢٥١ | سينا | سينا . مصر | ١٥٢٢١ | — | فلسطين |
| ٨٢٦١ | — | — وادي الكلت | ٢١٢٢٤ | نوبة | عتبة |
| ٢٢٢٦٤ | غزة | غزة . العريش . بير السبع | — | — | الاسكندرية |
| ٢٤٢٦٩ | غزة | غزة الى العريش | ١٢٢٣٠ | سورية | سورية . وادي الكلت |
| ١٥٢٧٦ | الريثوني | الريثوني | ١٩٢٣١ | دمشق | دمشق . الى القدس |
| ٧٢٧٨ | ومصر | ومصر . بين القدس واربعا | ١٩٢٣٥ | دمشق | دمشق . الاسكندرية |
| | | | ١٨٢٣٦ | وردية | وردية اوليونية |
| | | | ١٦٢٤١ | والاربعون | والاربعون الفكيديية |

| وجه سطر | خطاؤه | صواب |
|---------|---|---|
| ٧٢٣١١ |  |  |

جدول

يضمن أسماء الرتب والاسباط والأجناس في اللاتينية

| | | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Cnidium | 375 | Bergia | 156 | Abutilon | 168 |
| Cochlearia | 70 | Biebersteinia | 189 | Acacia | 808 |
| Colladonia | 356 | Bifora | 351 | ACACIÆ | 206 |
| Colutea | 255 | Biscutella | 77 | Acer | 198 |
| Coluteocarpus | 63 | Biserrula | 282 | Actinolema | 348 |
| Cometes | 149 | Bongardia | 20 | ADENANTHEREÆ | 206 |
| Conium | 352 | Boreava | 82 | Adenocarpus | 210 |
| Couringia | 58 | Brassica | 55 | Adonis | 5 |
| Corchorus | 170 | BRASSICÆ | 34 | Æthionema | 74 |
| Coriandrum | 351 | Bryonia | 340 | Agrimonia | 319 |
| Cornus | 396 | Buffonia | 132 | Ainsworthia | 383 |
| Coronilla | 284 | Bunias | 85 | Aizoon | 342 |
| CORONILLÆ | 205 | Duplevrum | 358 | Albizzia | 310 |
| Corrigiola | 148 | Cachrys | 355 | Alcea | 164 |
| Corydalis | 29 | CÆSALPINÆ | 206 | Alchemilla | 319 |
| Coloneaster | 324 | Cakile | 87 | Alhagi | 290 |
| Crambe | 86 | CAKILINÆ | 87 | Alliaria | 52 |
| CRASSULACÆ | 326 | Calepina | 83 | Alsine | 133 |
| Cratægus | 323 | CALYCIFLORÆ | 202 | ALSINÆ | 131 |
| Crithmum | 376 | Calycotome | 210 | Althæa | 164 |
| Crotalaria | 207 | Camolina | 71 | ALYSSINÆ | 34 |
| CRUCIFERÆ | 32 | CAMELINÆ | 35 | Alyssum | 64 |
| Cucumis | 338 | CAPPARIDÆ | 92 | Ammania | 334 |
| CUCURBITACÆ | 338 | Capparis | 95 | Amni | 368 |
| Cuminum | 391 | Capsella | 72 | AMMINÆ | 344, 357 |
| Cytisopsis | 246 | Cardamine | 44 | AMPELIDÆ | 197 |
| Cytisus | 212 | Carpoceras | 79 | AMYGDALÆ | 310 |
| Datisca | 341 | Carrichtera | 60 | Amygdalus | 313 |
| DATISCEÆ | 341 | Carum | 360 | Anagyris | 207 |
| Daucus | 388 | Cassia | 306 | Anastatica | 46 |
| Delphinium | 15 | CASSIÆ | 206 | Anchonium | 91 |
| Devera | 363 | CAUCALINÆ | 344, 386 | Androskia | 46 |
| DIANTHÆ | 109 | Caucalis | 392 | Anemone | 4 |
| Dianthus | 110 | Caylusca | 100 | ANEMONÆ | 2 |
| Dictamnus | 190 | Cerastium | 138 | Anethum | 331 |
| Didesmus | 87 | Cerasus | 314 | ANGIOSPERMÆ | 1 |
| Diploxys | 58 | Ceratocarpus | 29 | Ankyropetalum | 116 |
| Dipterygium | 95 | Ceratocephalus | 13 | Anthriscus | 371 |
| DISCIFLORÆ | 170 | Cerantonia | 307 | Apium | 361 |
| Dorycnium | 247 | Cercis | 307 | ARABIDÆ | 33 |
| Draba | 69 | Chærophyllum | 370 | Arabis | 42 |
| Drosera | 322 | Chetosciadium | 391 | Arenaria | 136 |
| DROSERACÆ | 322 | Choiranthus | 40 | Argyrolobium | 209 |
| Ecballium | 339 | Chorispora | 91 | Artedia | 337 |
| Echinophora | 349 | Cicer | 290 | Astoma | 350 |
| ECHINOPIORÆ | 344, 349 | CISTINÆ | 100 | Astragalus | 257 |
| Elatine | 156 | Cistus | 100 | Aubrietia | 63 |
| ELATINÆ | 156 | Citrullus | 339 | Balanites | 194 |
| Enarthrocarpus | 88 | CLEMATIDÆ | 2 | Barbarea | 42 |
| Epilobium | 336 | Clematis | 3 | BAUHINÆ | 206 |
| Epimedium | 3 | Cleome | 92 | BERBERIDACÆ | 19 |
| | | | 31 | Benbenis | 20 |

| | | | | | |
|------------------------|----------|----------------------|-------|-----------------------|-----|
| Nelia | 194 | Hernacleum | 384 | Erodium | 184 |
| NELIACEAE | 194 | Herniaria | 144 | Erophila | 70 |
| Melilotus | 231 | Hesperis | 47 | Eruca | 59 |
| Mesembryanthemum | 341 | Hibiscus | 169 | Erucaria | 89 |
| Mimosa | 307 | Hippocrepis | 285 | Erucastrum | 56 |
| MIMOSEAE | 206 | Hippomarathrum | 355 | Ervum | 297 |
| MOLLUGINEAE | 149 | Hirschfeldia | 57 | Eryngium | 345 |
| Monsonia | 188 | Holosteum | 138 | Erysimum | 53 |
| Morettia | 45 | Hussonia | 89 | Euclidium | 84 |
| Moricandia | 59 | Hydrocotyle | 344 | EUMIMOSEAE | 206 |
| Moringa | 201 | HYDROCOTYLEAE | 343-4 | Eutrigonella | 218 |
| MORINGEAE | 201 | Hymenocarpus | 245 | Exocontha | 387 |
| Myagrum | 84 | Hypecoum | 27 | EXOGENAE | 1 |
| Myosurus | 7 | HYPERICINEAE | 157 | Fagonia | 178 |
| Myriophyllum | 332 | Hypericum | 158 | Falcaria | 369 |
| MYRTACEAE | 333 | Iberis | 79 | Farsetia | 61 |
| Myrtus | 333 | Indigofera | 254 | Ferula | 377 |
| Nasturtiopsis | 41 | INGEAE | 207 | Ferulago | 379 |
| Nasturtium | 40 | ISATIDEAE | 26 | Fibigia | 62 |
| Neslia | 82 | Isatis | 81 | FICOIDAE | 341 |
| Neurada | 322 | Johrenia | 380 | Foeniculum | 375 |
| NEURADEAE | 313 | Jussiea | 337 | Fragaria | 317 |
| Nigella | 14 | Koniga | 64 | Frankenia | 108 |
| Nitraria | 173 | Kruberia | 382 | FRANKENIACEAE | 108 |
| Notoceras | 46 | Kundmannia | 376 | Fumana | 104 |
| Nuphar | 23 | Lagocia | 348 | Fumaria | 80 |
| Nymphaea | 21 | Lathyrus | 298 | FUMARIACEAE | 28 |
| NYMPHEACEAE | 21 | Lavatera | 156 | Galega | 254 |
| Ochradenus | 97 | Lawsonia | 335 | GALEGEAE | 204 |
| Oclitodium | 85 | Lecoclia | 354 | Garidella | 14 |
| Oenanthe | 374 | LEGUMINOSEAE | 202 | Genista | 210 |
| Oligomeris | 100 | Leontice | 20 | GENISTEAE | 208 |
| ONAGRARIAE | 336 | LEPIDINEAE | 33 | GERANIACEAE | 181 |
| Onobrychis | 287 | Lepidium | 73 | Geranium | 181 |
| Ononis | 213 | Leptaleum | 71 | Geum | 316 |
| Orlaya | 387 | LINACEAE | 171 | Githago | 130 |
| Osmithopus | 283 | Linum | 171 | Glaucium | 26 |
| Oroba | 303 | Lisaea | 395 | Glinus | 150 |
| OXALIDEAE | 139 | LOMENTACEAE | 37 | Glycyrrhiza | 256 |
| Oxalis | 180 | Lotononis | 208 | Glycyrrhizopsis | 257 |
| Paeonia | 19 | LOTEAE | 204 | Gonocytisus | 213 |
| PEONIEAE | 2 | Lotus | 248 | Grammosciadium | 370 |
| Pellurus | 130 | Lupinus | 208 | Grewia | 163 |
| Papaver | 23 | LYCHNIDEAE | 109 | Gymnocarpum | 147 |
| PAPAVERACEAE | 22 | Lythrum | 334 | Gypsophila | 113 |
| Paronychia | 115 | LYTHRARIACEAE | 333 | Habrosia | 148 |
| PARONYCHIEAE | 111 | Mærua | 95 | HALORAGEAE | 332 |
| Pastinaca | 386 | Malabaila | 385 | Hamatolobium | 288 |
| Peganum | 191 | Malcolmia | 48 | Haplophyllum | 192 |
| Pellargonium | 188 | Malva | 167 | Hedera | 395 |
| Peltaria | 89 | MALVACEAE | 163 | HEDYSAREAE | 205 |
| Petroselinum | 363 | Malvella | 168 | Hedysarum | 286 |
| PEUCEDANEAE | 344, 376 | Mathiola | 38 | Heldreichia | 77 |
| Peucedanum | 381 | Medicago | 225 | Helianthemum | 101 |
| PICENOGRAMMA | 1 | Melandrium | 130 | HELLEBOREAE | 2 |
| PILASCOLEAE | 205 | | | Helleborus | 18 |
| Physanthyllis | 245 | | | Helosciadium | 362 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----|----------------------|----------|--------------------|-----|
| Staphylea | 199 | ROSACEÆ | 310 | Physocaulos | 371 |
| Stellaria | 187 | ROSEÆ | 313 | Physospermum | 353 |
| STELLARINEÆ | 131 | RUBEÆ | 311 | Pimpinella | 363 |
| Sterigma | 92 | Rubus | 316 | Pistacia | 200 |
| Synelcosciadium | 385 | Ruta | 191 | Pisum | 304 |
| | | RUTACEÆ | 190 | Pocockia | 219 |
| TAMARISCINEÆ | 151 | | | PODALYRIEÆ | 203 |
| Tamarix | 152 | SABULINEÆ | 131 | Polycarpon | 144 |
| Telephium | 150 | Sagina | 132 | Polycarpon | 143 |
| Telmisssa | 331 | Sanicula | 348 | Polygala | 107 |
| Tephrosia | 255 | SANICULEÆ | 344, 345 | POLYGALÆÆ | 107 |
| TEREBINTHACEÆ | 199 | SAPINDACEÆ | 107 | POLYPETALÆ | 202 |
| Tetradiclis | 191 | Saponaria | 117 | POMEÆ | 313 |
| Tetragonolobus | 253 | Savignya | 60 | Portulaca | 151 |
| Texiera | 83 | Saxifraga | 325 | PORTULACACEÆ | 151 |
| THALAMIFLORÆ | 1 | SAXIFRAGACEÆ | 324 | Potentilla | 317 |
| Thalictrum | 4 | Scaligeria | 366 | POTENTILLEÆ | 311 |
| Thlaspi | 77 | SCANDICINEÆ | 344, 370 | Poterium | 319 |
| THLASPIDIÆÆ | 36 | Scandix | 372 | POTERIEÆ | 312 |
| TILIACEÆ | 169 | Schimpera | 84 | Prangos | 256 |
| Tillica | 326 | Schouwia | 76 | Prosopis | 307 |
| Tordylium | 332 | Scleranthus | 148 | Prunus | 315 |
| Torilis | 392 | Sclerocephalus | 147 | Psoralea | 253 |
| Triadema | 157 | Scorpiurus | 282 | Pteranthus | 149 |
| Tribulus | 174 | Securigera | 246 | Pycnocycla | 349 |
| TRIFOLIEÆ | 203 | Sedum | 328 | Pyrus | 322 |
| Trifolium | 232 | Seetzenia | 176 | | |
| Trigonella | 218 | Senebiera | 80 | Queria | 185 |
| Tunica | 113 | SENEBIEÆÆ | 86 | | |
| Turgenia | 304 | Sesbania | 256 | Radiola | 171 |
| Turgeniopsis | 391 | SESELINEÆ | 344, 374 | Ranunculus | 7 |
| | | Silene | 118 | RANUNCULACEÆ | 1 |
| UMBELLIFERÆ | 342 | SILENEÆ | 109 | RANUNCULEÆ | 2 |
| Umbilicus | 327 | Siler | 377 | RAPHANEÆ | 38 |
| | | SILICULOSÆ | 34 | Raphanus | 90 |
| Vahlia | 325 | SILICOSÆ | 32 | Rapistrum | 86 |
| Velezia | 110 | SIMARUBEÆ | 193 | Reaumuria | 151 |
| Vicia | 291 | Sinapis | 57 | Reseda | 97 |
| VICIEÆ | | Sison | 369 | RESEDACEÆ | 97 |
| Vigna | 305 | SISYMBRIEÆ | 83 | Retama | 212 |
| Viola | 105 | Sisymbrium | 50 | RHAMNACEÆ | 194 |
| VIOLARIEÆ | 104 | Sium | 368 | Rhamnus | 195 |
| Vitis | 197 | Smyrniopsis | 354 | Rhus | 200 |
| | | SMYRNIEÆ | 344, 350 | Rhynchosia | 306 |
| Zilla | 86 | Smyrnium | 353 | Ribes | 326 |
| Zizyphus | 195 | Sorbus | 322 | Ricotia | 61 |
| Zozimia | 384 | Spartium | 212 | Ridolfia | 362 |
| ZYGOPHYLLEÆ | 174 | Spergula | 140 | Robbairia | 142 |
| Zygophyllum | 176 | Spergularia | 140 | Rœmeria | 25 |
| | | SPERGULEÆ | 132 | Rosa | 320 |



فهرس الرنب والاسباط والاجناس والانواع

| | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|------------------|-----------|--------------|
| ٢٦٨ | آفي | ١٩٤ | ازدرخت . ازدرخية | ١٢٧ | آذان الفار |
| ٢٥٧ و ٣٤٤ | آمينيات | ٢٥٧ | استراغلس | ٢٢٣ | آس . آسية |
| ٢٧١ | انثرسكس | ٢٥٠ | استوما | ٢٦٤ | آنيسون |
| ٢٢٢ | انجاص بري | ٢٨٦ | اسطفلين | ١٦٨ | ابوقلون |
| ٢٠٧ | انجيات | ١٢٢ | اعطاني | ١٦٧ | ابه كوجي |
| ٩١ | انقونوم | ٢٩٦ | اقرانيا | ٢٢٦ | ايلويوم |
| ٢٨١ | اندارسيا | ٢٥٢ و ٢٥٧ | اصابع العروس | ٢٢٢ | اجاص |
| ٤٦ | اندرويسكيا | ٢٢٩ | آكليوم | ١٨٧ | إجرية الغراب |
| ٢٥٤ | إندكوفرا | ٢٤٨ | آكتينوليا | ٥ | ادونس |
| ٠٤٦ | انستاتكا | ٢١٩ | آكرونيا | ٢٠٦ | اديناثيريات |
| ١١٦ | انكرويتلم | ٢٨٧ | آكسواكونثا | ٢١٠ | ادينوكريس |
| ٦٣ | اويرياتيا | ١٥٦ | الآنية . الآنية | ٢٢٧ | اذناب القطه |
| ٢٨٧ | اورليا | ٢١٠ | البزيا | ٨٥ | اخطوديوم |
| ٢٨٣ | اورثوبس | ١٦٤ | الثيا | ٢٤٩ | اخينوفورا |
| ٢٠٢ | اوروبس | ٢١٩ | الخملا | ٢٤٩ و ٢٤٤ | اخينوفوريات |
| ١٠٠ | اوليكومرس | ١٢١ و ١٢٢ | المبنة والسبينة | ٤٢ | اربس |
| ٢٢٦ | اوناكريه | ٦٤ | الموسون | ٢٣ | اربسيات |
| ٢٨٧ | اونورنخس | ٥٢ | الماريا | ٢٨٧ | ارتقديا |
| ٧٩ | ايرس | ٦٤ | اليسم | ٢٠٩ | ارجيرولوبيوم |
| ٧٤ | ايهونيا | ٢٤ | اليسينيات | ٢٩٥ | ارالية |
| ٢٦ و ٨١ | ايستس واساتيات | ٢٢٧ | اميلكس | ٥٢ | اريسوم |
| ٢٧٤ | ايناثه | ٢٢٤ | امانيا | ٧٠ | اروفيا |
| ٢٨٢ | اينسورثا | ٩٢ | امرميل | ٥٩ | اروكا |
| ٢١٦ | باطس | ١٤٥ | امليده | ٨٩ | اروكاريا |

| | | | | | |
|---------|------------------|-----------|--------------------|----------------|------------------|
| ٣٦٦ | نقرد | ٨٥ | بونياس | ٢٠٥ و ٢٩٢ | باقية و باقيات |
| ٨٢ | نكسييرا | ٢٠٦ | بوهينيات | ١٦٩ | بامية |
| ٢٢١ | نلسا | ١٨٩ | بيدرستينا | ٢٠١ | بان . بانة |
| ١٥٠ | تلييوم | ٢٨٢ | بيسرولا | ٢٧٦ | بادجان |
| ٢٢٦ | تليا | ٧٧ | بيسكيوتلا | ٢٨١ | بجور الاكراد |
| ٢٩٤ | تورجينا | ٢٥١ | بيفورا | ١٨٧ | بدو |
| ٢٩١ | تورجينوپسس | ٢٥٨ | بيولثوم | ١١٤ | برايع |
| ٢٨٢ | تورد يلوم | ١٩١ | بيكام | ٢٤ و ٥٥ | براسكا و براسكات |
| ٢٩٢ | توريلس | ٢٤٩ | بيكوسكلا | ٤٢ | بربرا |
| ١١٢ | تونكا | ١٨٨ | بلاركونوم | ١٩ و ٢٠ | برريس و بربريسية |
| ١٦٩ | تيلية | ٨٠ | بلناريا | ٢٢٧ | برسيم |
| ٢٦ و ٧٧ | تلاسي و تلاسپيات | ٢٦٢ | بجنلا | ٢١٥ | برفروق و برفوق |
| ٤ | تلكترم | ٢١١ و ٢١٧ | بوتتلا و بوتتليات | ١٥٦ | بركيا |
| ٢٧٨ | ثيرة | ٢٠٢ | بودليريات | ٢٤٠ | بريونيا |
| ١٠ | ثيرة | ١٠٧ | بوليفالا بوليفالية | ٢٢٨ | بزاو البقر |
| ١١٢ | جيسوفيلا | ١٤٢ | بوليكربون | ٢٠٤ | بزلا |
| ١٨١ | جرانية . جرانوم | ٢٧٦ و ٢٤٤ | بيوسدنيات | ١٤٩ | بسومة |
| ٦٢ و ٤٠ | جرباع | ١٩١ | نترادكلس | ٢٢٩ | بطيخ و بطيخ اصغر |
| ٤٠ | جرجار | ٢٥٢ | نتراكوتولوبس | ٢٠٠ و ١٩٩ | بطم . بطمية |
| ٢٠٧ | جروود | ١ | نخبة الازهار | ٢٦٢ | بقدونس |
| ١٨٧ | جزناء | ٢٦١ | تراجل | ١٥١ | بقل . بقلية |
| ٥٨ و ٤١ | جرمير | ٢٠٨ | ترمس | ٢٢ و ٢١٩ و ٢١٢ | بلان و بلانبات |
| ٢٨٨ | جرر | ١٥٧ | تريادنيا | ١٠٤ و ١٠٥ | بنفسج و بنفسجة |
| ٢٠١ | جلبان | ١٧٤ | تريبولس | ٨٢ | بور يافا |
| ٢٢٨ | جلماثا | ٢٥٥ | تروسبا | ١٢٢ | بوفونيا |
| ٢٠٢ | جلبيينة | ٢١٢ | تفاحيات | ٢١٦ | بوكرتن |
| ٢٠٧ | جنبوط | ٢٦٦ | قعدة | ٢٠ | بونكرديا |

| | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|
| ٢٢٦ | دحرجية | ١٦٧ و ١٦٩ | خجازی وخجازية | ٢١٠ و ٢٠٢ | جنسنا وجنسنيات |
| ٦٩ | درابا | ٢٢٧ | خيزر القاق | ٢٨٠ | جورینیا |
| ٢٢٢ | دروسا ودروسية | ١٦٧ و ١٦٨ | خيزرة | ٢٢٧ | جوسيا |
| ١٤١ | دققي | ١٢ | خريق | ٢١٦ | جیوم |
| ١٩٠ | دکتنس | ٥٧ | خردل | ٢٩٠ | حاج |
| ١٥٩ | دموع البسين | ٥٥ | خردل اسود | ١٥ | حبة البركة |
| ١٨٤ | دهامین | ٣٠٧ | خرنوب | ١٥ | حبة سوداء |
| ٢٤٧ | دورکينم | ٢٢ | خرنوبية | ٢ | حبل مسكي |
| ٢٨٨ | دوقو | ٢٤ | خريبيية | ١٤٦ | حرايت |
| ٩٥ | ديستر مجيم | ٩٧ | خرام . خرامية | ١٤٥ | حربط |
| ٨٧ | ديدمس | ٢٦١ | خزام القط | ٥٨ | حرة المجال |
| ٦٤ | ذحان | ٢٢ و ٢٣ | خشناس و خشناسية | ١٩١ و ٢٨٨ | حومل |
| ١٢٢ و ١٠٠ | ذناية | ٥٩ | خصمان الجمل | ٢٦ | حشيشة الماميتا |
| ٢٧٥ | زاريانج | ٢٥١ | خضيرة | ٧٠ | حشيشة الملاحق |
| ٨٦ | رستوم | ١٦٤ | خطمي | ٦٠ | حلاوة |
| ٢١٢ | رغم | ٢٢٤ | خط | ١٨٠ | حلاوة الفه |
| ٤٥ | رحي | ٢٦٩ | حلة | ٢١٨ و ٢١٩ | حلبة |
| ١٤٧ | رخية | ٢٠ | خبرة اذار | ٢٧٧ | حليث |
| ٢٦١ | رخمي | ٢١٥ | خوخ | ١٨٩ | حماض . حماضية |
| ١٧١ | ردبولا | ٩١ | خورسبوررا | ٢٩٠ | حمص |
| ٤٠ | رشاد | ٢٢٩ | خيبار | ٥٩ | حمية |
| ١٠٢ و ١٠٢ | رعر | ٤٠ | خيرائس | ٢٢١ و ٢٢٢ | حندقوق |
| ٢٨ | رَفَنيات | ٢٤١ | دانسكا و دانسكية | ٢٢٩ | حفظل |
| ١٢٦ و ١٢١ | رملية و رمليات | ١٤١ | داحية | ٢٣٥ و ٢٢٢ | حناء و حنائية |
| ٢٢٦ | ريس | ٢٥٩ | ديق | ٢١ | حودان |
| ٦١ | ريكونيا | ١١٠ و ٢١٦ | ديقة | ٥١ | حوة |
| ٢٥ | ريديريا | ٥٨ | دلو تكمس | ٢٢٨ | حي العالم |

| | | | | | |
|----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|
| ٢٧٧ | سبار | ٢٢٤ | سكسفر اجية | ٢٠٦ | ريغوسيا |
| ١٠٩١١٨ | سبلينة وسبلينة | ٢٢٥ | سكسفر اكا | ٢٢٢ | زعرور |
| ١٩٢ | سباروية | ١٤٨ | سكليرانش | ٩٢ | زفرة |
| ٢٨٥ | سينكوسباديوم | ١٤٧ | سكليروكفلس | ١٩٤ | زقوم |
| ٢٦٨ | سهم | ٢٨٢ | سكوربيوروس | ٢٠٩ | زلم |
| ٢٠٨ | سبال | ٢٤٦ | سكيورجرا | ٢٠٧ | زمرريق |
| ٢٨٠ و ٢٠ | شاهترج وشاهترجيه | ٢٧٨ | سلوى | ١٩٤ | زئزئخت |
| ٢٨١ | شبت | ٢٨٠ و ٢٥ | سلج | ٢٨٤ | زوزما |
| ٢١٤ | شبرق | ٥١ | سلجيه | ١٧١ | زير |
| ٢٠٨ | شجرة المبال | ١٥٢ | سسم | ١٧٤ | زيكوفيله |
| ١١٧ | شرش الحلاوة | ١١٢ | سپاج | ١٩٧ | ساينديه |
| ٩٥ | شفاق النعمان | ٢٠٠ | سباق | ١٢٢ | ساكينا |
| ٢٤٦ | شفاقل | ٢٥٤ | سبيرنيوميس | ١٤٠ | سپركولا |
| ٢٠٤ | شقر وشقريات | ٢٥٢ | سبيرنيوم | ١٤٠ | سپركولاريا |
| ٥٨ | شقيبر | ٢٥٠ و ٢٤٤ | سپرنيا | ١٢٢ | سپركوليات |
| ١٥٧ | شقيق وشقيقه | ٢٠٦ | سنامكي | ١٩٩ | سفاقيليا |
| ١٧٨ | شكاعة | ٢٦٠ و ٨٠ | سنيكارا وسنياريات | ٩٢ | سنركا |
| ٥٦ | شلمج | ٢٠٨ و ٢٠٦ | سنط وسنطيات | ٢٤٦ | سنسوپيس |
| ٢٥٦ | شلطة | ٢٤٨ | سنكيولا | ١٩٥ | سدر |
| ٨٨ | شلوة | ٢٤٤ و ٢٤٤ | سنكيوليات | ١٠٨ | سرد |
| ٧٨ | شمرمورة | ٢٧٥ | سنوت | ١٩٠ و ١٩١ | سذاب: سنايه |
| ٢٧٥ | شمرة | ٤٦ | سهبه | ١٢٨ | سراسنيوم |
| ٢٤٥ | شنداب | ٢٥٧ و ٢٥٦ | سوس وسوسي | ٢٧٤ و ٢٤٤ | سسلينيات |
| ١٤ | شهيز | ٢١٢ | سيتيس | ٢٢ و ٥٠ | سسميريوم وسسميريات |
| ٢٩٩ | شوارب البسينة | ١٧٦ | سيتريينا | ٢٦٦ | سكاليريا |
| ٢٤٧ | شوك العفرياني | ٢٥٦ | سيسمان | ٢٧ و ٢٤٤ | سكاند سينيات |
| ٢٥٢ | شوكران | ٢٦٩ | سيسمون | ٢٧٢ | سكاند كس |

| | | | | | |
|-----------|---------------|-----|------------------|-----------|---------------|
| ٢٦١ و ٢٥٧ | قناد | ٢٥٤ | عوارينة | ٢٧٦ | شومار |
| ١٠٢ | قذم | ٢٤٦ | عود القزم | ١٤ | شوفيز |
| ٢١٥ | قراصبا | ٢٥٤ | عوبنة | ٧٦ | شوبا |
| ٢٩٦ | قراينا | ٢٤٢ | غاسول | ٢٩١ | شيتوسيا ديوم |
| ٩٧ | قرضة | ١٤٢ | غباشي | ٢٧٠ | شيروفيلم |
| ٢٦٢ و ٤٠ | قرّة | ١٠١ | غبيرو غبيرة | ١١٧ | صابونية |
| ٢٤٧ | قرص عفي | ٢٠٦ | غبيرة | ٨٤ | صنبراه |
| ٢٤٦ | قرصة | ٥٠ | غبيشي | ٢٨٥ | صناقل |
| ١٧٠ | قرصة الازهار | ١٧٥ | غرقد | ٢٦٩ | صنلين |
| ٢٢٢ | قرط | ٩٠ | فجل | ٨٦ | صلة |
| ٢٠٩ | قرظ | ٥٢ | فجيلة | ٢٢ | صليبية |
| ١٧٧ | قرمة | ٦١ | فرسيبيا | ٢٤٢ | صووانية |
| ٢٠٠ | قريمة | ٢٥٦ | فرش الضبع | ١٥٢ و ١٥١ | طرفاه طرفانية |
| ٢٦٥ | فرن | ١٧١ | فرق | ١ | ظاهرات التزوج |
| ١٠٩ و ١١٠ | فرنفل قرنليات | ١٠٨ | فرنكينا. فريكنية | ١٥ | عائق |
| ٢٠٢ | قرنية | ٢١٧ | فرولا | ١٧٧ | عاذر |
| ٢٩ | قربنة | ٢٧٩ | فرولاكو | ٢٩٠ | عاقول |
| ٢٦٢ | فروج | ٢٠٠ | فمفق | ١٥٥ | عيل |
| ٢٩٦ | فسوس | ٢٦٩ | فلكاريا | ١٩٦ | عجرم |
| ٢٥٥ | فصنور | ٢٠٨ | فول بري | ٢٩٧ | علس |
| ٢٩١ | فضامة | ٦٢ | فهبجيا | ٢٩٢ | عديسة |
| ٢٤٨ | فطرب | ٢٤٥ | فيستلس | ٢٠ | عرب الديك |
| ١٧٦ | فلأب | ٢٥٢ | فيسوسهرم | ١٩٧ | عرش |
| ٢٧٦ | قطيط | ٢٧١ | فيسوكولس | ٢١١ و ٢١٦ | علقن وعلقيات |
| ٦٠ | قليقة | ٢٢٥ | قاليا | ٢٠٩ | عنبر |
| ٢١٠ | قندول | ٢٢٦ | قنات | ١٩٥ | عناب |
| ١٩٨ | قربب | ٢٤٠ | قنفا الحمار | ٢١٤ | عنيبة |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| ٨٦٣ و ٣٤٤ | كوكليات | ١٦٩ | كرويا | ٢٠٦ | كاسيات |
| ٠٥٦ | كولادونيا | ١٤ | كريدلا | ٢٠٢ | كاسية الازمار |
| ٦٣ | كوليوتوكريس | ٢٦٢ | كريدوم اسود | ٢٥٥ | كاكوس |
| ١٤٩ | كومينس | ٢٢٤ | كريبي | ٢٧ و ٨٧ | كاكولة . كاكليات |
| ٥٢ | كونرغيا | ١١٤ | كرامة | ٢٠٤ | كاليجيات |
| ٢١٢ | كونوسيتيس | ٢٥١ | كريرة | ٢٥ و ٥٧ | كبر |
| ٢٥٢ | كونوم | ٢٠٦ | كسبا | ٩٢ | كبيرة . كبريات |
| ١٢٥ | كويرا | ٨٢ | كسينا | ٧٢ | كسلا |
| ١٠٠ | لاذم . لاذنية | ٨١ | كيبولا | ١٧١ | كنان . كنانة |
| ١٦٦ | لافانرا | ٢٦ | كلوسيوم | ١٢٠ | كفاكو |
| ٢١٠ | لج | ٩٢ | كلومة وكلوميات | ٢٢٦ | كراسبولية |
| ٧١ | لنليم | ٢٥٤ | كليكا | ٨٦ | كرامبة |
| ٧٢ و ٣٥ | ليدينيات . ليديوم | ١٥٠ | كلنس | ٢٧٠ | كرامنياديوم |
| ٢١٤ و ٣١٢ | لين | ٢٥ و ٧١ | كليفا وكلينيات | ٢٦٦ | كراويا |
| ٢٣٤ | لثوم | ١٤٤ | كماش | ٧٩ | كريبوس |
| ٢٩٨ | ليروس | ٢٤٩ و ٢٩١ | كئون . كهون بري | ٢٩ | كزنوكيس |
| ٩٦ | لصف | ٢٧٦ | كندمنيا | ١٢ | كزنوكلس |
| ٢١٤ | لصيق | ٢٧٥ | كينديوم | ٢٧٦ | كريثوم |
| ٥٦ | لفت | ٢٢٤ | كوتوناستر | ٦٠ | كرخندرا |
| ٢٥٤ | لكوكيا | ٢٩٤ | كورنس وكورنية | ١٤٧ | كرد |
| ٢٠٥ | لويات | ٢٨٤ | كورونلا | ٤٤ | كرد مينة |
| ٢٤٨ | لوتس | ٢٠٥ | كورونليات | ٢١٤ | كرز |
| ٢٠٨ | لوتونونس | ١٤٨ | كوريجولا | ٢٩٧ و ٢٩١ | كرمنة |
| ٢٠٤ | لويات | ٢٩ | كوريدالس | ٢٦١ | كرفس |
| ٢١ و ٢١٢ | لوز ولوزيات | ١٢١ و ٢٧ | كوكية وكوكيات | ١٩٧ | كرم . كرمية |
| ٢٧ | لومشية | ٢٩٢ | كوكلس | ٢٨٢ | كرويرا |
| ١٠٩ | ليخنيات | ٧٠ | كوكلياريا | ٢٠٧ | كروتلاريا |

| | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|----------------|
| ٤٧ | هسبرس | ٢٢٢ | مير يوفلم | ٢٩٥ | ليسيا |
| ٨٩ | هصونيا | ٢٠٦ و ٢٠٧ | ميروسا . ميروسيات | ٢٠ | ليوتنكة |
| ٧٧ | هلدر ينفيا | ٧ | ميروسورس | ٢٠٥ | ماش |
| ١٠١ | هليانثيم | ١٩ | نارمشك | ٢١٥ | محامب |
| ٢٨٢ | هتولوجيوم | ٢٢٩ | نافعة | ٢٢٢ | مخيلة |
| ١٢٨ | هولوسيوم | ١ | ناميات من خارج | ٢٢٢ | مخلص |
| ١٥٧ و ١٥٨ | هيسيكية | ٢٥٤ | نبات النيل | ٢٨٥ و ١٧٨ | مدامين |
| ٢٧ | هيكوم | ١٩ و ١٩٤ | نبيق . نيقية | ٢٢٥ | مديكاكو |
| ٢٤٤ | هيدروكوتلية | ٢٢٢ | نجاص بري | ١٨٨ | مرغيظ |
| ٢٤٤ و ٢٤٢ | هيدروكوتليات | ٨٢ | نسليا | ٢٠١ | مستيك |
| ٢٤٥ | هينوكريس | ٢٩٥ و ٢٦ | نعمانة . برية | ١٨٥ | مسبكة |
| ٤٦ | وراقة | ٢٢٩ | نفل قطن | ٢٤١ | مسبريانثيم |
| ٢٢٠ | ورد | ٢٠٢ و ٢٢٢ | نفلة . نفلليات | ١٢٧ | مصيرية |
| ٤٧ | ورد اريحا | ٢٥١ | نفدة | ١٩٥ | مغيلان |
| ١٩ | ورد الحمير | ٤٦ | نوتوسراس | ٢٨٥ | ملايلا |
| ٢٢١ | ورد بري | ٢١ | نوفر | ١٢٠ | ملاندريوم |
| ٢١ و ٢١٢ | وردية . وردية | ٢١ | نصفية | ٢٠٢ | ملحي . ملعويات |
| ٢١٢ | وزال | ٢١٢ و ٢٢٢ | نيوراديات | ٤٨ | ملكوميا |
| ١ | وعائية البذر | ٢٢٢ | هالوراجية | ١٥١ | ملاح |
| ٢٩ | يابان مثيري | ١٤٨ | هبروسيا | ١٧٠ | ملوخية |
| ٢٤٢ | ياشند | ١٩٢ | هيلوفيلم | ٩٢ | مشفة |
| ١٨٤ | ياغزال دُرُنُر | ٢٨٥ | هيوكريسيس | ٢٨ | مشور |
| ٢٦٤ | يانسون | ٢٥٥ | هيومارانوم | ٢٠٢ | منفصلة الپتلات |
| ٢٨٢ | يقطينية | ٢٨٦ | هديساروم | ٥٩ | موريكنديا |
| ١٨٨ و ٥٩ | يقق | ٢٠٥ | هديساريات | ١٤٩ | مولوجينية |
| ٨٤ | يوكلديوم | ٢٨٤ | هراكليوم | ٨٤ | مياكروم |
| ٢٠٦ | يومجوسيات | ١٤٤ | هرنباريا | ٩٥ | ميروا |

تذيل في

الجغرافية النباتية للأقاليم المذكورة في هذا الكتاب

أقاليم سورية وفلسطين النباتية

يمتدُّ سورية شمالاً لسلسلة جبال طوروس وهي تفصلها عن آسيا الصغرى ويختلف نباتها ونبات شمالها عن نبات سورية بحيث تحسب تلك الجبال حاجزاً طبيعياً نباتياً. ويمتدُّ أكثر سورية وفلسطين شرقاً بادية سورية وهي ليست بادية حقيقية لانه يقع فيها بعض المطر في فصل الشتاء ويثبت فيها عشب ترعاه المواشي ويسكنها قبائل شتى من العرب. وتندرج هذه البادية الى جهة شمالي سورية في السهل المنسج الممتد من نواحي حلب الى ما بين النهرين، وكان هذا السهل مسكوناً في قديم الزمان ولم تنزل فيه آثار عظيمة تدل على كثرة الذين سكنوه ووفرة ثرواتهم الا انه امسى قليل السكان تجول فيه العرب والأكرد. ويمتدُّ فلسطين جنوباً بادية التيه وهي قفر حقيقي يختلف نباته اختلافاً عظيماً عن نبات سورية وفلسطين فيكون حشاً نباتياً طبيعياً. ويمتدُّ سورية وفلسطين غرباً البحر المتوسط. فيتضح لمن تأمل هذه الحدود ان سورية وفلسطين منفصلتان انصافاً طبيعياً عن بقية البلدان فكأنهما جزيرة محاطة من الشمال بجبال عالية ومن الشرق والجنوب ببوادي مغلقة ومن الغرب بالبحر

ويمتدُّ شرق سورية وفلسطين سلسلة جبال من الشمال الى الجنوب وهذه السلسلة منقسمة الى عدة سلسلات تقاطعها اودية من الشرق الى الغرب وتوصل السهل الداخلي بالساحل البحري. وتسمى السلسلة الاولى في كتب جغرافي العرب جبال اللكّام وهي تمتد من نواحي مرعش الى جبل موسى بقرب السويدية وجبالها اقل علواً من لبنان وأكثر علواً من جبال الناصرة. وفي جمرود هذه السلسلة انواع كثيرة متوسطة بين نبات جبال طوروس ولبنان. ويفصلها وادي العاصي عن جبال الناصرة والثانية جبال الناصرة وهي تبتدئ في الجبل الاقرع الذي يشرف على البحر شمالي اللاذقية باثني عشر ساعة وتمتد الى الشرق نحو ثلثين كيلومتراً ثم تنعطف نحو الجنوب وتمتد الى وادي النهر الكبير الذي يفصلها عن سلسلة لبنان. وجبال هذه السلسلة دون جبال اللكّام ولبنان علواً ونباتها غير معروف جيداً كنبات تلك الجبال ولا سيما نبات لبنان

والثالثة جبل لبنان وهو يبتدئ من وادي النهر الكبير ويمتد جنوباً الى وادي نهر القاسمية. وعلو بعض جمروده كظهر القضيبي وجبل مكل ثلثة آلاف متر وفيها نبات خاص بها كثير الاهمية عند النباتيين

وعلى بعد نحو اثني عشر كيلومتراً من جبل لبنان سلسلة ثانية توازي وتسمى الجبل الشرقي وجبل الشيخ وعلو بعض جرودها أيضاً نحو ثلثة آلاف متر ونباتها يشبه نبات لبنان في الاختصاص . ويجول بين هاتين السلسلتين سهل مرتفع نحو ألف متر فوق البحر هو البقاع وهو قعر مجيرة قديمة تفترك صفات نباته بنبات سهول شرقي سورية وينشأ فيه نهر اللطاني ويصب في البحر المتوسط جنوبي لبنان ونهر العاصي ويصب قرب انطاكية بين جبال النصيرية والككام

وفصل بين لبنان وجبال شمالي فلسطين سهل مرج عيون وبلاد الشقيف وعرضه نحو عشرين كيلومتراً من جنوبي لبنان الى شمالي بلاد بشاره

أما جبال فلسطين فهي سلسلة تمتد من بلاد بشاره الى مسافة يوم جنوبي الخليل وتنتهي بسهل بادية التيه . وبعض قممها منفصلة كجبل الطور في بلاد الجليل وجبل عبال وجرزم بقرب نابلس وغير ان أكثرها قضيب متصل بعلو نحو ألف متر فوق البحر ويشغل نحو ثلثي عرض فلسطين . ويتفرع من مثلثي ثلث هذا القضييب الشمالي بالثلث المتوسط الى الشمال الغربي جبل الكرمل وهو اقل علواً من اعلى جبال فلسطين الا ان نباته أكثر اختصاصاً لانفصاله عن بقية السلسلة

ويتمد من جنوبي جبل الشيخ سلسلة جبال شرقي غور الاردن مارة بالجلولان وجبل عجلون وجبل عوشا وجبال مواب ومنتهية جنوبي الكرك بالسلسلة الممتدة جنوباً الى الحجاز وكما يفصل سهل البقاع بين لبنان والجبل الشرقي هكذا يفصل غور الاردن بين جبال فلسطين وجبال شرقي الاردن وهو من اعظم غرائب الدنيا ويبتدئ من مجيرة الحولة المنخفضة ثمانين متراً عن سطح البحر وينحدر فجأة الى بحر طبرية المنخفض نحو مئتي متر عن سطح البحر المتوسط ثم ينحدر تدريجاً الى بحر اوط المنخفض نحو اربعمئة متر عن سطح البحر المتوسط

واذا اتبعنا مسير نهر العاصي من الشمال الى يبابه في البقاع ثم اللطاني الى موضع انبثاقه من جنوبي البقاع ثم الحاصباني والحولة وبحر طبرية والاردن وبحر لوط ووادي القبة رأينا وادياً طويلاً يمتد من شمالي سورية الى جنوبي فلسطين بل الى البحر الاحمر ويفصل بين سلسلة الجبال الغربية والسلسلة الشرقية . فالسلسلة الشرقية تنخفض حتى تصير روابي وتلالاً في شمالي سورية حيث يتصل وادي العاصي بسهل سورية الممتد الى ما بين النهرين

والساحل البحري يختلف عرضه من عرض الشاطئ فقط الى عشرين كيلومتراً ويختلف علوه من مساواة سطح البحر الى مئة متر وتنف

والسهول الداخلية تمتد الى الشرق من سلسلة الجبال الشرقية ويختلف ارتفاعها من سبع مئة متر الى الف ويطلع منها بعض الروابي والتلال والجبال

ويرتفع في منتصف سهل سورية جبل منفرد يسمى جبل حوران لم يعرف نباته حتى المعرفة ويرجح انه يوجد فيه انواع مختصة به لبعده عن بقية الجبال ووقوعه بين سهول بركانية وتختلف هذه الاقاليم في تربتها وفي مقدار المطر الذي ينزل عليها ويتبع من هذا الاختلاف تنوع عظيم في نباتها ولا يأتيها المطر غالباً الا اذا هبت عليها الريح الجنوبية الغربية فان هذه الريح مهب من صحاري افريقية حارة جافة وتمر على مياه البحر المتوسط فتتصّب بخاراً غزيراً منه ثم تأتي سلسلة الجبال الممتدة على طول سورية وفلسطين وتمازج هوائها البارد فينسكب المطر منها غزيراً على الجانب المقابل للبحر المتوسط من هذه الجبال وعلى الساحل الممتد بينها وبين البحر. ومعدل المطر في الساحل على عرض بيروت كما ثبت بالارصاد الجوية في المدرسة الكلية في بيروت نحو ٢٥٥ قيراطاً في السنة ولعلّ معدل لبنان اقل من ذلك فليل كما ثبت بارصاد مدرسة برمانا. ويتبع من غزارة المطر هذه خصب تربة الساحل ووجه الجبل البحري ومقدار انواع نباتها. ولأنّ لم يتحقق مقدار المطر النازل في جنوبي ساحل فلسطين وشمال سورية بالنهاس المدققي زماناً طويلاً الا انه يرجح انه اقل من مطر بيروت في فلسطين^(١) واكثر منه في نواحي جبل اللكام. وعلى قلة المطر في جنوبي فلسطين دليلان اولها قربة الى البادية التي لا ينزل فيها مطر او ينزل شي يسير منه وثانيها طبيعة نباته. وكذلك على كثرة في شمالي سورية دليلان ايضاً اولها بعدة عن البادية وكثرة البخار في الريح الغربية الجنوبية لطول المسافة التي تقطعها في مجيئها من الصحراء الى تلك الجبال وثانيها غزارة نباته ونشاطه وكثرة الغابات ووفرة المياه الا ان القطع في ذلك يكون بواسطة الملاحظات

غير انه لا تفرغ الغيوم تماماً من رطوبتها عند مصادمتها الجبال البحرية بل تندفع فوقها وتصادم السلسلة الثانية الممتدة من روابي عينتاب وكيس الى جبال موآب وينسكب منها مطر اقل من مطر السلسلة البحرية والساحل البحري فكثيراً ما يغزر المطر في الجهات البحرية حيث لا يقع شي منه في الجبال الشرقية ولذلك كان نبات تلك الجهات اقل نشاطاً وانواعاً من نبات السلسلة البحرية والساحل

ثم يهطل ما يبقى من الرطوبة في الغيوم على السهول المتصلة والبادية الممتدة بين سورية وارض الفرات ومطر تلك البقاع قليل وفصل الشتاء فيها قصير وتصير الريح بعد مرورها بها جافة حارة كما يشاهد في بادية جنوبي بلاد العجم وبلاد التتر

وقد قسمت اقاليم سورية وفلسطين النباتية الى ستة اقسام باعتبار ارتفاع الاراضي وانخفاضها

(١) ويؤيد ذلك ما بعثه الى المختطف صديقنا الناضل يوسف افندي الجبل من ان معدل المطر السنوي في القدس نحو ٢٢ قيراطاً كما ثبت من قياسات ثلاثة وعشرون عاماً (من ١٨٦٠ الى ١٨٨٣)

واختراق الجبال لها واسطحها وانبساطها على هيئة سهول وبوادي وخصت كل اقليم منها بلون في الخارطة المرافقة لهذه المقالة

اما الساحل البحري وهو الملون في الخارطة بالاخضر الباهت فعريض في بلاد اللاذقية وعكار ثم يضيق على شواطئ لبنان ويعرض في نواحي مرج ابن عامر وساحل فلسطين من جبل الكرمل الى بلاد غزة حيث ينتهي في وادي العريش . ويحاط نبات هذا الساحل نبات جميع شواطئ البحر المتوسط ومن اعم نباتاته الشقر (شقائق النعمان) والشقيق الاسوي (ويسمى ايضا شقائق) والخشخاش السوري (ولكل من هذه الانواع ازهار كبيرة قرمزية او زرقاء او صفراء او بيضاء بهجة جدا) والسيلينة انوسيون (وهو نوع من القرنفل ازهاره وردية يثبت بكثرة في البساتين واحيانا تغطي الارض بانواره الجميلة) والطرفاء وانواع الكنان الازرق الازهار او الوردية او الصفراء وانواع الخطمي بازهارها الكبيرة الوردية والندول والوزال بازهارها الصفراء بهجة وانواع النفل المتعددة الالوان والباونج بازهارها البيضاء والصفراء والدقة بازهارها الوردية الجميلة وانواع القصعين والنمناح وحشيشة القلي والزعفران والعصل وعرق النجيل والقصب الفارسي والفزار . والسماع في هذا الساحل قد يخال انه سائح في مروج ايطاليا او جنوبي فرنسا او بحرية مصر غير ان هذا الساحل لا يخلو من انواع خاصة بهذا الاقليم لا تنبت في غيره كالكربد الاخيلية والطرفاء السورية والحلبة اليربوتية والنفلة الضيقة الورق والكيسة وغيرها مما لا يلزم الاشارة اليه هنا لانه قد ذكر في مفردات النبات

اما الجبال من الساحل الى علو نحو الف متر وهي الملونة بالاحمر في الخارطة فنباتها اكثر اخضاراً من نبات السواحل وكثير منه لا ينبت الا في هذه الجبال ومن اعم نباتها الغبرة وهي تنبت في الارض الرملية الحمراء وغالباً بقرب الصنوبر والبندق العطر وانواع الهبيريك والنبق والكرم والقيق والبطم والجبنستا والخرنوب والبلان والعليق والزعفران والزمزريق والخلص والاس والشنداب وكثير من الرتبة الصوانية والخصوان والقرقان والدردر ودويك الجبل اي بخور مريم والزيتون وشجرة الدرادر والحوز وكثير من الرتبة الشفوية كالشعينة وغيرها وحليب البوم والتين والثوت والسنديان والذلب والصنوبر والدفنان والشرين والديشار والسرخص . وعدا هذه النباتات التي تكسو الجبال فتتمظهرها الخاص انواع كثيرة مختصة بهذه الجبال وبعضها مختص ببعض السلسلات كاللكام اولبنان او جبال فلسطين فقد سُميت باسماء هذه الجبال كالبنفسج اللبناني والهبيريك اللكامي والهراكليوم اللكامي واينسورثا الكرمل وكثير غيرها ما يعتد عليه في شرح المفردات

اما الجبال المجردة ونحت الجرد وهي الملونة بالازرق في الخارطة فعلاها اكثر من الف متر من سطح

البحر وهي عارية من الشجر تقريباً لفدة البرد والريج في الشتاء وتقطيعها للولج مدة ثلثة اشهر واكثر. ونباتها شديد الاختصاص يكاد لا يوجد الا في هذه الجبال ويثبت تحت الجردود الارز والدفران والقرين وغيرها من الاشجار وانواع كثيرة من الاعشاب والانجم المحمرة التي لا يعرف لها اسماء دارجة. وامانبات الجردود فاكثرة مخض بها غير ان بضعة متفرقة ايضاً الى جردود آسيا الصغرى والعجم. اما هيئة نبات الجردود فتوافق موضع نموه وتعرض الهواء الشديد والثلج فان فروعه كثيفة مجمعة على هيئة جباب وكثيراً ما يكون فيه شوك قنفذي وتخفي الازهار والثمار تحت هذا الشوك وهكذا يسلم من شرهة المعز الذي يرعى في تلك الجردود. واما فصل الازهار والثمار في الجردود فقصر يبتدئ من حين زوال أكثر الثلج في تموز وينتهي عند وقوع أول ثلج الخريف في تشرين الثاني

اما السهول الداخلية وهي الملونة بالاصفر في الخارطة فهي شديدة الرياح والبرد في الشتاء قليلة المطر واشجارها وانجمها قليلة واكثر نباتها يثبت في الريح ويجف في الصيف وهو أكثر اختصاصاً من نبات الساحل البحري واقل من نبات الجردود وتحت الجردود. وبما يميز نباتها قلة الأوراق وصغرها وذلك تحفظ طبيعي لتقليل منغول الهواء فيها واكثر سوقها صلابة لمقاومة الرياح. واذا جفت انكسرت من عنها ودرجها الهواء وطردتها الى اماكن بعيدة فاعانها على زرع بزرها. وانواعها اقل عدداً من انواع السواحل والجبال لعدم وجود اختلاف ظروف التربة والمناخ في تلك السهول ويتدرج نباتها الى نبات البادية وقلما يوجد بينها انواع شهيرة معروفة باسماء عامة كنبات الاقاليم السابق ذكرها فنضرب صفحاً عن ذكر اسمائها العلمية

واما البادية وهي الملونة باللون التريفي في الخارطة فنباتها شديد الامتياز عن نبات الاقاليم الساحلية والجبلية لانه يعيش بلا ماء تقريباً غير ان انواعه كثيرة ولذبيذة للنباتي وسباني تنصليها اما غورا الاردن وهو الملون بالاخضر الغامق في الخارطة فنباته شبيهة بنبات المنطقة الحارة ولا سيما بنبات ارض السودان لانخفاضه تحت سطح البحر وشدة الحرارة الحاصلة من حصر اشعة الشمس بين الجبال التي ترتفع على جانبيه. فان الحرارة تصعد الى ٥٠° س في الظل في فصل الصيف ويكاد لا ينفع فيه مطر في الشتاء لان الغيث النازل من النسيم يتجفّر قبل وصوله الى قعر الوادي. واعم نباتات الجزء الجنوبي من الغور سبط السبال والخل والعشر والرّم والبان والصلبة والطرشاء والملاح والغردق والنبق والوسج والسلفادورا والذبق الهندي والائل والجور القراني والزقوم والكرد. واكثر هذه الانواع افريقية على ان بعضها كالعشر والزقوم والسلفادورا توجد في الهند ايضاً. وفي الجزء الشمالي في مستنقعات المحولة كثير من البايير والائل واقتصب الفارسي والغزار والموسن وزنبق الماء وعدد غفير من النباتات المائية



وبالاجمال لا يوجد على سطح الارض بلاد صغيرة كسورية وفلسطين تتضمن اقاليم مختلفة مثلها فان فيها جبالاً شامخة تنطح رؤوسها السحاب ويغطيها الثلج الخالد . وفيها اغوار مناخها كمنح جنوب الهند وحضرموت وقفر مالح في نواحي جبل اصدوم ومستنقعات مالحة مياهها مرة كالعلم . وفيها سواحل تقبى سواحل فرنسا وإيطاليا وجزائر الغرب وسهول متسعة وفيافي شاسعة فكانت قد اجتمع في هذه البلاد مثال جميع البلدان والاقاليم على وجه البسيطة . وربما لا تعدادها بلاد اخرى (تساويها مساحة) في عدد انواع نباتها وعدد رتبها واجناسها . وما ان آسيا الصغرى تحسب نباتياً جزءاً من قارة اوروبا صار موقع سورية وفلسطين ملتقى القارات الثلاث القديمة واشترك نباتها بصفات نبات اوروبا وآسيا وافريقية

اقاليم بوادي جعفر والنيه وسينا وبر مصر النباتية

بادية جعفر والنيه وسينا قطعة ارض مثلية الشكل طولها من الشمال الى الجنوب نحو مئتي ميل ومعظم عرضها نحو مئة واربعين ميلاً ويجدها شمالاً فلسطين والبحر المتوسط وشرقاً جبال الشراخ وخليج عقبة وغرباً ترعة السويس وخليجها وقاعدة هذا المثلث مقببة الى الشمال وتنتهي قمته في الجنوب بمكان يدعى براس محمد وهو يدخل في شمالي البحر الاحمر فاصلاً بين خليج عقبة والسويس . وينقسم المثلث المشار اليه الى ثلاثة اقسام طبيعية لكل منها خصائص نباتية فالقسم الشمالي منه يسمى بادية جعفر والمتوسط بادية النيه (اوتيه بني اسرائيل) والجنوبي بادية سينا (او طور سينا)

اما بادية جعفر وهي الملونة بالاصفر في شمالي الحارطة فقفر رمل ساحلي على شاطئ البحر المتوسط يجترق قسمه الشمالي الحاذي للبحر المذكور السكة القديمة بين مصر وفلسطين وهي سكة مشهورة كانت تسلكها القوافل في الازمان الخالية ومن كان مولعاً في التاريخ واقتناء اثار الاقدمين لا ينفص من منظرها المنقرب بل يرتاح الى مشاهدتها كل الارتياح فلقد عبرها كثيرون من القواد المشهورين بالبسالة والاقلام وسير واجبوهم في قفروها المتسع وذلك مثل سينستريس ونحو كيميس واسكندر ذي القرنين وقصر وعمر وصالح الدين ونبوليون الاول وبرهم باشا . اما سطح هذه البادية فليس منبسطاً بل متضارس الشكل ذو تلال نضائي الروابي التي تشاهد على مفرقة من يافا وعكا وصور وبيروت وبقية المدن البحرية السورية وفلسطين ويختلف ارتفاع التلال المذكورة من مترين الى عشرين متراً ويغفل تلك النواحي بعض الجبال المرافلة . وفي هذه البادية آبار متعددة كبر التبنّي والناطع والعبد وبركة عيس والعريش والمرجح ان

وإلا صلافة وإلا راحة وإلا دي البر وإلا السباعية وفي بعض هذه الأودية بما أرياف
بجبرات قديمة وقد تتبع المؤلف سلسلة من هذه البحيرات على طول وادي فيران وإلا دي صلافة
إلا نسب الهواه وسلسلة أخرى من وادي فيران إلى قرب منتهى وادي الشيخ حتى الجبل المسقى كرمي موسى.
وهذه الأرياف مؤلفة من طين حواري ويرتفع بعضها نحو ٢٠ مترًا. ويستدل من هذه الأرياف على أن
جبال سينا كانت في الأعصر الجيولوجية القديمة مغطاة بنضاد رملية وكلسية وكان حيثقل مقدار المطر
أكثر مما هو الآن ولا شك أن الجبال كانت في هاتيك الأزمنة مغطاة بالتراب ومكسوة بالغابات
والنباتات كجبال فلسطين ولبنان. غير أن تلك النضاد قد تحطمت وتلاشت منذ أجيال عديدة ولم يبقَ
منها أثر سوى الأرياف المشار إليها وانكشف الحجر الجيري (الكرانيت) والهويري والديوريت وهي باقية
بالوئمة الناصعة عارية من التراب والنبات. ومن خصائص الكرانيت وسائر الصخور التي من رتبها أنها
إذا انحلت لا تصير ترابًا بل تجزأ فيكون منها رمل خشن شديد الصلابة حاد الزوايا تحلج السيول
وتفرش في الأودية فيصير تربة لبعض النباتات التي تنمو في تلك الأرض الجافة الملتوحة وقد بقي
بعض التراب في شقوق الصخور والسهول الصغيرة المسطحة في الجبال حتى إلى الجرد فكون تربة
يقو عليها بعض النباتات الخاصة بهذه الجبال المنفرة

وما يعجب السامعين في شبه جزيرة سينا هيئة الأودية التي تبدو كأنها مجرى سيول ثنوية فقط
وبشاهد أن بعضها محصورة بين جدران شاهقة وبعضها عريضة تحدّها جبال سهاء المرتقى. وأرض هذه
الأودية مؤلفة من رمل كراتيني بمخل وجهه كتل كبيرة من الكرانيت جرفتها السيول ومع أن مقدار
المطر الذي يهطل على هذه الجبال قليل الكمية فع ذلك يسهل انحطاطه من سطوحها لعدم وجود تراب
وجذور أشجار وأشجار فيها كما يتحدّر من سطح بيت فتطغى الأودية بسرعة كلية وتصير أنهاراً شديدة عنيفة. وفي
هذه الجبال عيون كثيرة تعرفها العرب الطورة وفيها بعض الواحات كواحة فيران وواحة الطور
وواحة ذهب وواحة دبر النجلى عند سفح جبل موسى وفي الواحات المنخفضة بكثرة النخل والبنق (العناب)
وتجرة السبال ويزرع فيها العرب بعض الخضروات والمحجوب والفواكه ويكثر في أرض الأودية كلها
وجود الرطوبة

ينقسم نبات طور سينا إلى نبات الأودية ونبات الجرد ومن نبات الأودية الصنوبر والعشيشي
والذئابة ولم ليدة والغبيرة (وهي السنّا المكّي) والكرد والرعر والحمرل. والبنق (وهو نوع من العناب)
والطراف والباب والسبال والرثم وأنواع القناد (أصابع العروس) والديقة والبري ودوينة الفار
والبروق والنص والجهة. ومن نبات الجرد القناد والنصنور وأبو حماد (أي الثين البري) والشومر
والصنفاص والكونوتياستر

اما بر مصر فينقسم الى وادي النيل وبادية مصر والصحراء. اما وادي النيل وهو المكون بالاصفر في
 الخارطة فهو باد معدل عرضه نحو ٣٠ كيلومتراً محصور بين سلاسل جبال مختلفة الطول وطولها من اصوان
 الى البحر المتوسط نحو ٢٠٠ كيلومتر ويتسع هذا الوادي من عرض القاهرة الى البحر على هيئة مثلث يسمى
 بحرية مصر او الدالية وقاعدة الدالية متجهة الى البحر المتوسط وقمتها الى جهة القاهرة وتربة هذا الوادي
 عميقة مخضبة جداً لما فيها من المواد العضوية المحبولة بالنيل من داخل افريقيا. ولا يقع مطر الا
 على سبيل الدور في ارض الصعيد وفي الجزء من الوادي الواقع الى جنوبي القاهرة الا انه يهطل مطر
 غزير في الدالية ولا سيما على شاطئ البحر المتوسط. ويزرع في هذا الوادي كل انواع المحبوب
 كالحنطة والارز والشعير والعدس والفول والحمص والكرسة والبرغل والماش وانواع الخضراوات
 وينتشر فيه النخل والذوق والبلح والسنط والقرظ (العنبر) والسيبان والقطن والبرسيم ومن نبات
 الخاص بالحدودان وابو قرن والبركيما والموخية ونبات النيل والزلم والعش والسفادورا والحلفاء
 ولا تختلف بادية مصر عن بادية النبه وسينا لان تركيبها الجيولوجي شبيه بتركيب تلك البرية لان
 فيها من البراري الرملية وهي الملونة بالاصفر في الخارطة ويشبه نباتاتها نبات برية جندوبة الرملة.
 وفيها من السهول الكسبية وهي الملونة بالرمادي في الخارطة ونباتها يشبه نبات سهل النبه وفيها ايضاً
 جبال كراتينية وهي الملونة بالاحمر في الخارطة. ومن النباتات المنتشرة بين هذه البادية وبوادي جعفر
 والنبه وسينا القليلقة والجرباع والزفرة والصف والدنابة والغرفد والشكاعة والبندو واليهق والحمرل
 والسدر والكريبي والسيال والطرفاء والرم ونباتات اخرى كثيرة

وتكاد لا تحسب الصحراء من اعمال مصر ونباتاتها قليلة الا في الواحات ولم تدرس جيداً حتى الآن
 وبالاجمال فان عدد رتب نبات البادية ومصر واجناسها وانواعها اقل كثيراً مما في سورية وفلسطين
 ولعل جميع انواعها لا تزيد عن الالف وذلك لعدم اختلاف اقاليمها ومناخها وتربتها. واما انواع سوريا
 وفلسطين فاكثرت من الناحية

واظن ان عدد انواع ذوات الازهار في كل الاراضي المذكورة في هذا الكتاب هو نحو ثلثة آلاف
 وهو عدد غفير بالنسبة الى قلة اتساع البلاد ومقدار المطر الواقع عليها

